



مقاله علمی - پژوهشی

سطوح مختلف اسانس‌های میخک و مرزه بر فراسنجه‌های تخمیری در تکنیک تولید گاز و
تأثیرات ضد میکروبی آنها بر باکتری پیتواستریپتوکوکوس آنروبیوس (*Peptostreptococcus*
anaerobius) جداسازی شده از شکمبهحجت ایمانی مقدم^۱، سمانه قاسمی^۲، سعید سبحانی راد^{۳*}، مهدی بهگر^۴

تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

ایمانی مقدم، ح.، س. قاسمی، س. سبحانی راد، م. بهگر. ۱۴۰۰. سطوح مختلف اسانس‌های میخک و مرزه بر فراسنجه‌های تخمیری در تکنیک تولید گاز و تأثیرات ضد میکروبی آنها بر باکتری پیتواستریپتوکوکوس آنروبیوس (*Peptostreptococcus anaerobius*) جداسازی شده از شکمبه. پژوهش‌های علوم دامی ایران ۱۳(۳): ۳۳۵-۳۴۹.

چکیده

به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف اسانس‌های میخک و مرزه بر فراسنجه‌های تخمیری در شرایط برون تنی، دو آزمایش تولید گاز و کشت میکروبی طراحی گردید. تکنیک تولید گاز در قالب آزمایش فاکتوریل ۳×۳ شامل اسانس‌های مرزه و میخک هر کدام ۳ سطح (۰، ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی گرم) طراحی شد. مقدار تولید گاز در طی ساعات ۲، ۴، ۶، ۸، ۱۶، ۲۴، ۴۸، ۷۲، ۹۶ و ۱۲۰ اندازه‌گیری شد. سطوح بالای اسانس میخک در ساعات ابتدایی تخمیر باعث افزایش معنی‌دار گاز تولیدی گردید. در مقابل اسانس میخک در ساعات ۲۴-۸ تولید گاز را کاهش داد. در آزمایش میکروبی، سطوح مختلف اسانس‌های مرزه و میخک (۲۰، ۳۵ و ۴۰ میکرولیتر برای هر اسانس بصورت جداگانه) و همچنین سطوح ترکیبی اسانس‌های مزبور (۹ تیمار حاوی سطوح ترکیبی) و یک گروه شاهد (استرپتومایسین) مورد مقایسه قرار گرفتند. بعد از انجام کشت باکتری پیتواستریپتوکوکوس آنروبیوس در محیط کشت و تقابل آن با اسانس‌های مرزه و میخک مشاهده گردید تمامی تیمارهای حاوی اسانس (ساده و ترکیبی) نسبت به شاهد، تیمارهای حاوی اسانس مرزه نسبت به شاهد و سطوح ترکیبی اسانس‌های مزبور نسبت به سطوح ساده اثر بازدارندگی بیشتری بر رشد این باکتری داشته‌است. به طور کلی نتایج مرحله اول آزمایش نشان داد که استفاده از اسانس میخک باعث کاهش تولید گاز و فراسنجه‌های تخمیری شد، اما اسانس مرزه بر مقدار تولید گاز، قابلیت هضم ماده آلی، انرژی قابل متابولیسم و مقدار اسیدهای چرب فرار تأثیر نداشت. نتایج حاصل از آزمایشات کشت میکروبی نیز نشان داد اسانس‌های مرزه و میخک اثر ممانعت‌کنندگی بر رشد باکتری پیتواستریپتوکوکوس آنروبیوس داشته و در نتیجه تولید آمونیاک توسط این باکتری کاهش می‌یابد.

واژه‌های کلیدی: اسانس مرزه، اسانس میخک، اسیدهای چرب فرار، پیتواستریپتوکوکوس آنروبیوس، تولید گاز.

مقدمه

میکروارگانیزم‌ها می‌شود. به هر حال، این همزیستی همراه با اتلاف انرژی به صورت متان و اتلاف پروتئین به صورت آمونیاک است (۷). در این راستا، متخصصین تغذیه نشخوارکنندگان به دنبال راهی جهت

همزیستی بین میکروارگانیزم‌های شکمبه و حیوان سبب ایجاد شرایط و محیط مناسب تخمیر خوراک و محصولات میکروبی توسط

۴- استادیار پژوهش‌شده کشاورزی هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، کرج، ایران.

*- نویسنده مسئول: Email: sobhanirad@gmail.com

DOI: 10.22067/ijasr.v13i3.73987

۱- دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

۲- استادیار دپارتمان کشاورزی، دانشکده فنی و کشاورزی شهریار، دانشگاه فنی و حرفه ای استان تهران، تهران، ایران.

۳- استادیار گروه علوم کشاورزی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

روی منابع دیگر کربوهیدرات رشدی در حد صفر و یا خیلی کم دارد (۱۳).

در میان اسانس‌های گیاهی موثر بر متابولیسم میکروب‌های شکمبه و کاهش شدید غلظت نیتروژن آمونیاکی در شکمبه، اسانس‌های میخک و مرزه نیز عنوان شده‌اند (۵). اثرات ضد پروتوزوایی عصاره میخک در مطالعات برون تنی با آزمایش تولید گاز اثبات شده است (۱۰). در این خصوص گزارش شده است که عصاره میخک با کاهش فعالیت پپتیدولیتیکی در شکمبه بر متابولیسم نیتروژن تاثیرگذار است (۵). همچنین اثرات عصاره میخک بر تخمیر شکمبه‌ای و کاهش اسیدهای چرب آزاد و نیتروژن آمونیاکی گزارش شده است (۷). گونل و همکاران (۱۸) نیز بیان کرده‌اند اوژنول (Eugenol) ترکیبی فنولی است که بخش عمده ترکیبات موثر میخک را تشکیل می‌دهد و اثرات ضد میکروبی وسیعی بر باکتریهای گرم مثبت و منفی دارد (۱۸). در خصوص اثرات اسانس مرزه، طلا تپه و همکاران (۳۸) اثر این اسانس بر تخمیر شکمبه‌ای در بزها و کاهش نیتروژن آمونیاکی را گزارش نموده‌اند. حدود یک یا دو درصد گیاه مرزه را اسانس این گیاه تشکیل می‌دهد، از مهمترین ترکیبات تشکیل دهنده اسانس می‌توان از کارواکرول (۳۰ تا ۴۰ درصد)، تیمول (۲۰ تا ۳۰ درصد) و ترکیبات فنلی دیگر نام برد (۲۷).

مطالعات اندکی در مورد اثرات اسانس میخک و به خصوص اسانس مرزه بر خصوصیات هضمی اقلام خوراکی در داخل کشور انجام شده است. همچنین در خصوص اثرات متقابل اسانس‌های مرزه و میخک در آزمایشات برون تنی، مطالعه‌ای توسط نگارندگان یافت نشد. بنابراین هدف از انجام این آزمایشات تأثیر افزودن سطوح مختلف دو اسانس میخک و مرزه بر فراسنجه‌های تخمیری و اثرات ضد میکروبی آنها بر باکتری پیتواسترپتوکوکوس آنروبیوس در آزمایش تولید گاز بود.

مواد و روش‌ها

۱ اسانس‌گیری نمونه‌های گیاهی به روش کلونجر^۱:

دو گیاه میخک و مرزه پس از شناسایی در آزمایشگاه علوم زراعی دانشگاه آزاد مشهد مجتمع بین المللی گلپهار بوسیله دستگاه کلونجر (شرکت فودس آلمان) اسانس‌گیری انجام شد. به منظور اسانس‌گیری، ابتدا نمونه خشک و سپس برای افزایش سطح تماس، آسیاب شد. پودر آسیاب شده در بالن ژوژه ریخته شد و پس از آن تا دو سوم حجم بالن با آب مقطر پر شد. سپس بالن ژوژه‌های حاوی مواد به دستگاه اسانس‌گیری کلونجر متصل شدند.

بهبود راندمان انرژی و پروتئین در شکمبه از طریق تغییر در محیط شکمبه می‌باشند (۶). استفاده از افزودنی‌هایی مانند آنتی بیوتیک‌ها در کاهش اتلاف انرژی و پروتئین در شکمبه موفق بوده‌اند (۷)، اما در سال‌های اخیر نگرانی‌های عمومی در رابطه با استفاده بی‌رویه از آنتی بیوتیک‌ها به دلیل شیوع مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری‌ها و انتقال آن‌ها از دام به انسان، افزایش یافته است. همچنین ممنوعیت استفاده از آنها در اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۶ باعث کاهش استفاده از آنها شده است. به همین دلیل دانشمندان به دنبال استفاده از مواد جایگزین جهت تغییر در تخمیر شکمبه هستند که می‌توان به پروبیوتیک‌ها، مخمرها، اسیدهای آلی، عصاره و اسانس‌های گیاهی اشاره کرد (۶).

دامنه و سیعی از ترکیبات آلی توسط گیاهان تولید می‌شوند که به نظر می‌رسد تأثیر مستقیمی بر رشد آنها ندارد (۱). این ترکیبات معمولاً مسؤل بو، رنگ و طعم در گیاهان هستند و به عنوان ناقل‌های شیمیایی بین گیاه و محیط عمل می‌کنند و اغلب فعالیت ضد میکروبی در مقابل باکتری‌ها، قارچ‌ها و مخمرها دارند (۱۵). فعالیت اسانس‌های گیاهی بر علیه باکتری‌ها، پروتوزوآها و قارچ‌ها به اثبات رسیده است، اما طرز عمل آنها دقیقاً روشن نیست (۴، ۱۲ و ۱۵). چندین فرضیه جهت توصیف ویژگی‌های ضد میکروبی اسانس‌های گیاهی بیان شده است. فرضیه ای که بیش از همه مورد پذیرش قرار گرفته است اثر متقابل اسانس‌های گیاهی بر غشای سلول‌های باکتریایی است. تجمع اسانس‌های گیاهی بین زنجیره‌ها یا اسیدهای چرب موجب تغییرات ساختاری در غشای سلولی شده و موجب افزایش بی‌ثباتی و سیالیت غشا می‌گردد (۱۷). همچنین اسانس‌های گیاهی ممکن است باکتری‌های تولید کننده آمونیاک^۱ زیاد مانند کلاستریدیوم استیکلندی^۲ و پیتواسترپتوکوکوس آنروبیوس^۳ در شکمبه را مهار نمایند. باکتری‌های تولید کننده آمونیاک زیاد به تعداد بالا در شکمبه وجود ندارند اما دارای فعالیت‌های دی‌آمیناسیون خیلی شدیدی می‌باشند و آمونیاک زیادی در شکمبه تولید می‌کنند (۳۲، ۳۶ و ۳۹). بنابراین کاهش باکتری‌های تولید کننده آمونیاک بالا می‌تواند موجب کاهش دی‌آمیناسیون اسیدهای آمینه، کاهش غلظت آمونیاک و افزایش بازده استفاده از پروتئین در شکمبه گردد (۳۹). باکتری پیتواسترپتوکوکوس آنروبیوس به صورت یک کوکسی غیر متحرک گرم مثبت، که معمولاً به شکل منفرد یا دوتایی است دیده می‌شود، بی‌هوازی بوده و ۱ تا ۱/۲ میکرولیتر قطر دارد. این ارگانسیم پکتین را به سرعت تخمیر می‌کند و بعنوان محصولات نهایی اصلی اسیداستیک و هیدروژن تولید می‌نماید. مقادیر کمی اسید فرمیک در اثر تخمیر پکتین نیز تولید می‌شود. همچنین مشاهده شده است این باکتری به جز رشد خیلی آهسته و کمی که بر روی گلوکز، سلوبیوز، مالتوز و سوکروز دارد، بر

3- *Peptostreptococcus anaerobius*

4- Clevenger

1- Hayper Producing Bacteria

2- *Clostridium sticklandii*

پروتئین خام ۰/۰۸۱۵ + تولید گاز ۰/۷۲۲۲۲ + ۲۴/۹۱ = (در صد)
 ماده آلی قابل هضم (معادله ۱)
 ۲ (پروتئین خام) ۰/۰۰۰۲۸۵۹ + پروتئین خام ۰/۰۰۵۷ + تولید گاز
 $(\text{MJ/kg DM}) = ۲/۲ + ۰/۱۳۵۷$ انرژی متابولیسمی (معادله ۲)
 ۰/۰۰۴۲۵ - گاز تولیدی ۰/۰۲۲۲ = (میلی مول به ازای ۲۰۰
 میلی گرم ماده خشک) اسیدهای چرب فرار (معادله ۳)

تهیه باکتری‌های خالص شکمبه ای

برای فراهم کردن باکتری‌های شکمبه، بعد از گرفتن مایع شکمبه و صاف کردن آن، در ۱۰۰۰ دور برای ۱۰ دقیقه سانتریفیوژ شده، سوپرناتانت آن را جدا کرده و سپس با استفاده از قارچ کش‌ها (بنومیل، ۱۰ میلی گرم در لیتر و نیستاتین، ۲۰۰ واحد در هر میلی لیتر)، قارچ‌های بی‌هوازی شسته شدند. محلول بدست آمده به عنوان محیط حاوی باکتری‌های خالص شکمبه استفاده شد (۲۲ و ۴۰).

مراحل جدا سازی باکتری پیتواستریپتوکوکوس انثروبیوس از محتویات شکمبه

به منظور جداسازی باکتری پیتواستریپتوکوکوس انثروبیوس از باکتری‌های خالص شکمبه ای، در محیط کشت بایل آسکولین آزاید آگار^۱ (BAAA) ابتدا کشت اولیه در محیط کشت محلول و مغذی که دارای ترکیبات مناسب شامل تریپتیکاز، پکتین، دول‌سیتول و لاکتات می‌باشد صورت گرفت که پس از طی شدن زمان انکوباتور گذاری در محیط کشت مورد نظر (BAAA) کلنی‌هایی به رنگ قهوه‌ای به قطر ۱ الی ۲ میلی متر ایجاد شد. با بررسی کلنی‌ها و رنگ آمیزی گرم و مشاهدات میکروسکوپی می‌توان تاییدی بر باکتری مورد نظر که همان پیتواستریپتوکوکوس انثروبیوس است، داشت (۱۴ و ۳۰).

انجام کشت چند خطی^۲

هدف از انجام این کشت رسیدن به کلنی‌های تک و خالص شده باکتری مورد نظر می‌باشد که در طی سه مرحله به صورت موازی و زیگزاگی کشت می‌شوند، به این صورت که ابتدا سوزن آس را برای اینکه استریل یا ضد عفونی شود روی شعله چراغ گرفته و کلنی مورد نظر را برداشته و در نهایت به شکلی کشت انجام می‌شود که در قسمت‌های دوم و حداکثر سوم کشت با کلنی‌های خالص رو به رو گردیم. برای در اختیار داشتن محیط کشت مورد نظری که در آن باکتری پیتواستریپتوکوکوس انثروبیوس به خوبی رشد کرده باشد و انجام آزمایش مقابله با اسانس، مجدداً در محیط‌های کشت جامد و مناسب، محیط کشت مایع و نیمه مغذی و مناسب استفاده شد و سپس

به منظور آغاز کار منبع حرارت روشن شده و زمان شروع آزمایش ثبت شد. اسانس به دلیل ترکیبات خود معمولاً دارای چگالی کمتر از آب است، به همین خاطر روی آب قرار می‌گیرد. در پایان عملیات اسانس گیری، شیرخروجی دستگاه کلونجر باز شد و اسانس در ظرف مخصوص خود ریخته شد.


آماده سازی نمونه‌ها و تیمارهای آزمایشی: برای انجام

آزمایش تولید گاز از مخلوط علف یونجه و دانه جو (نسبت ۱:۱) و اسانس‌های تهیه شده میخک و مرزه هر کدام با سه سطح (۰، ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی گرم) به صورت طرح کاملاً تصادفی در قالب آزمایش فاکتوریل ۳×۳ و در مجموع ۹ تیمار استفاده شد. علف یونجه و دانه جو از واحد گاوداری شیری تهیه شده بودند.

تهیه نمونه مایع شکمبه: مایع شکمبه از دو رأس گوسفند (۴۹/۵±۲/۵ کیلوگرم وزن زنده) که دارای فیستولای شکمبه‌ای بودند قبل از وعده‌ی خوراک‌دهی صبح گرفته شد. حیوانات روزانه با یک کیلوگرم یونجه و ۰/۳ کیلوگرم کنسانتره (شامل دانه جو، کنجاله سویا، سبوس، آهک، نمک و مکمل معدنی و ویتامینه) بر اساس ماده‌ی خشک تغذیه می‌شدند. مایع شکمبه جمع‌آوری شده از گوسفندان به نسبت مساوی با یکدیگر مخلوط و فوراً به وسیله پارچه متقال چهار لایه صاف شد و در فلاسک مخصوص به آزمایشگاه منتقل شد. سپس ظرف محتوی مایع شکمبه در آب گرم ۳۹ درجه سانتی‌گراد قرار داده شد.

آزمایش تولید گاز: آزمایش تولید گاز بر اساس روش منک و همکاران (۲۷) انجام شد. مقدار ۲۰۰ میلی‌گرم از مخلوط یونجه و جو (نسبت ۱:۱) به همراه ۹ تیمار آزمایشی (مقادیر مختلف اسانس میخک و یا مرزه) در سرنگ‌های شیشه‌ای ۱۰۰ میلی‌لیتری ریخته شد و به آن محیط کشت حاوی مایع شکمبه به میزان ۳۰ میلی‌لیتر اضافه شد و در حمام آب گرم ۳۹ درجه سانتی‌گراد آنکوباسیون شدند. مقدار تولید گاز در طی ساعات ۲، ۴، ۶، ۸، ۱۶، ۲۴، ۴۸، ۷۲، ۹۶ و ۱۲۰ اندازه‌گیری شد. برای تهیه محیط کشت از مایع شکمبه صاف شده، از پارچه متقال چهار لایه استفاده شد. ترکیب نهایی محیط کشت (۵۰۰ میلی‌لیتر) به شرح زیر بود: آب مقطر ۲۳۷ میلی‌لیتر، محلول نمک‌های پرنیاز ۱۱۸/۵ میلی‌لیتر، محلول بافر ۱۱۸/۵ میلی‌لیتر، محلول نمک‌های کم نیاز ۰/۰۶ میلی‌لیتر، رزوزارین ۰/۶۱ میلی‌لیتر، محلول احیاء کننده ۲۵ میلی‌لیتر (شامل ۲۳/۸ میلی‌لیتر آب مقطر، ۱ میلی‌لیتر سود ۱ نرمال و ۱۴۲/۵ میلی‌گرم سولفید سدیم). همچنین ماده آلی قابل هضم (معادله ۱) و انرژی متابولیسمی (معادله ۲) بر اساس روش پیشنهادی منک و استینگاس (۲۶) و مقدار اسیدهای چرب کوتاه زنجیر (معادله ۳) در هر سرنگ بر اساس معادله ارائه شده گنجاچو و همکاران (۱۶) به صورت زیر تخمین زده شد:

محیط‌ها به مدت حداقل ۱۸ و حداکثر ۲۴ ساعت در انکوباتور قرار داده شد و این شرایط برای این ایجاد شد که باکتری‌ها در فاز فعال و مناسب باقی بمانند (شکل ۱). پس از انکوباتور گذاری محیط کشت را به مدت یک هفته در یخچال می‌توان نگهداری کرد (۲۹).



شکل ۱- نمایی از انجام کشت چند خطی باکتری پیتواستریپتوکوکوس انتریبیوس در محیط کشت BAAA

Figure 1. A view of the streak method used to treat the bacteria *Peptostreptococcus anaerobius* in the BAAA culture

جدول ۱- توضیح تیمارهای آزمایشی شامل سطوح مختلف اسانس‌های مرزه و میخک استفاده شده در آزمایش دیسک دیفیوژن

Table 1- Statement of experimental treatments include different levels of clove and savory essences used in experiment of disk diffusion

تیمارهای آزمایشی Experimental Treatments	سطوح اسانس (میکرولیتر) Levels of essential oils (μl)		تیمارهای آزمایشی Experimental Treatments	سطوح اسانس (میکرولیتر) Levels of essential oils (μl)	
	مرزه Clove	میخک Savory		مرزه Clove	میخک Savory
T ₁	20	-	T ₉	20	40
T ₂	35	-	T ₁₀	35	20
T ₃	40	-	T ₁₁	35	35
T ₄	-	20	T ₁₂	35	40
T ₅	-	35	T ₁₃	40	20
T ₆	-	40	T ₁₄	40	35
T ₇	20	20	T ₁₅	40	40
T ₈	20	35	T ₁₆	Positive control (streptomycin)	

پس از خاتمه کشت به مدت ۴۸ ساعت در انکوباتور با حرارت ۳۷ درجه سانتی گراد قرار داده شد تا باکتری‌ها به رشد خود ادامه دهند یا توسط اسانس‌های مورد نظر از رشد بازمانند. پس از گذشت مدت فوق در حاشیه دیسک‌ها منطقه‌ای ایجاد شد که به آن حداقل غلظت بازدارندگی اسانس یا منطقه تدافعی گفته می‌شود. بنابراین می‌توان به قدرت بازدارندگی اسانس‌ها و فعالیت باکتری‌ها پی برد. هر چه قدر این منطقه تدافعی کمتر یا در حد صفر باشد نشان دهنده قدرت باکتری و مقابله آن با اسانس‌های مرزه و میخک می‌باشد. همچنین از آنتی بیوتیک استریپتومایسین (شاهد مثبت) نیز برای مهار کنندگی باکتری استفاده شد. روش اندازه‌گیری منطقه تدافعی بدین صورت بود

تهیه رقت‌های سریالی از اسانس‌ها و تعیین حداقل غلظت بازدارندگی^۱

در آزمایش حاضر از روش دیسک دیفیوژن^۲ جهت غربالگری فعالیت ضد میکروبی اسانس‌های مرزه و میخک استفاده شد، بدین صورت که ابتدا از دو اسانس میخک و مرزه هر کدام با سه رقت ۲۰، ۳۵ و ۴۰ میکرولیتر بر دیسک به روش فاکتوریل استفاده گردید و تیمارهای آزمایشی هر کدام با چهار تکرار مطابق جدول ۱ مورد آزمایش قرار گرفت. روش عمل بدین صورت بود که دیسک‌های تزریق شده توسط اسانس با فاصله معینی روی محیط کشت مورد نظر (BAAA) از باکتری پیتواستریپتوکوکوس انتریبیوس قرار داده شد.

2- Disk diffusion

1- Minimum inhibitory concentration (MIC)

ایمانی مقدم و همکاران، سطوح مختلف اسانس‌های میخک و مرزه بر فراسنجه‌های... ۳۳۹

که با استفاده از کولیس بر حسب میلی متر قطر هاله باکتری مورد نظر اندازه گیری و سپس ثبت شد (۲۹).

جدول ۲- مقدار تولید گاز تجمعی تیمارهای آزمایشی در ساعات مختلف انکوباسیون (میلی لیتر)

Table 2- The amount of cumulative gas production of experimental treatments in different incubation hours (ml)

تیمارهای آزمایشی ^۱ Experimental Treatments ¹	ساعات انکوباسیون Incubation hours								
	2	4	8	16	24	48	72	96	120
مرزه Clove									
0	5.46 ^b	14.33 ^b	43.25	74.58	88.25	106.08	113.67	114.83	116.25
250	7.54 ^{ab}	15.79 ^{ab}	37.75	65.75	76.33	96.25	106.58	107.79	110.63
500	10.67 ^a	19.50 ^a	42.29	67.38	78.63	95.63	107.29	108.54	111.88
SEM ²	1.10	1.40	3.22	4.96	5.73	4.67	4.14	4.13	3.51
میخک Savory									
0	6.83	16.92	48.33 ^a	79.75 ^a	90.58 ^a	107.17	115.83	116.54	118.21
250	8.13	17.04	43.58 ^a	70.38 ^a	80.71 ^a	97.38	106.71	108.38	111.75
500	8.71	15.67	31.50 ^b	57.58 ^b	71.92 ^b	93.42	105.00	106.25	108.79
SEM ³	3.51	4.13	4.14	4.67	5.73	4.96	3.22	1.40	1.10
مرزه×میخک Savory ×Clove									
0×0	9.75	20.50	51.25	81.25	92.25	111.50	121.25	122.00	123.25
250×0	2.88	12.13	52.63	83.38	94.63	113.88	120.38	122.50	123.25
500×0	3.75	10.38	26.88	59.13	77.88	92.88	99.38	100.00	102.25
0×250	1.75	11.13	45.38	80.63	91.38	106.38	114.13	114.75	117.75
250×250	10.00	18.50	36.25	60.75	69.00	88.75	102.75	104.50	107.38
500×250	11.88	17.75	31.63	55.88	68.63	93.63	102.88	104.13	106.75
0×500	9.00	19.13	48.38	77.38	88.13	103.63	112.13	112.88	113.63
250×500	11.50	20.50	42.50	67.00	78.50	89.50	97.00	98.13	104.63
500×500	11.50	18.88	36.00	57.75	69.25	93.75	112.75	114.63	117.38
SEM ³	1.90	2.42	5.59	8.56	9.93	8.09	7.17	7.16	6.08
P value									
مرزه Clove	<0.01	0.04	0.45	0.42	0.31	0.23	0.42	0.42	0.50
میخک Savory	0.48	0.74	<0.01	<0.01	0.09	0.12	0.16	0.20	0.17
مرزه×میخک Savory ×Clove	<0.01	0.01	0.42	0.75	0.81	0.48	0.18	0.14	0.10

^{a,b} میانگین‌های هر ستون با حروف غیر مشترک دارای اختلاف معنی‌دار می‌باشند ($P < 0.05$).

^۱ تیمارهای آزمایشی بر حسب میلی گرم می‌باشند.

^۲ میانگین خطای استاندارد

^{a,b} Means within same column with different superscripts differ ($P < 0.05$).

¹ Experimental treatments based on mg.

² Standard Error of Means

جدول ۳- فراسنجه‌های تولید گاز در تیمارهای آزمایشی

Table 3- Gas production parameters in experimental treatments

تیمارهای آزمایشی ^۱ Experimental Treatments ¹	تولید گاز از بخش قابل تخمیر (میلی لیتر به ازای ۰/۲ گرم) b	نرخ تولید گاز (میلی لیتر در ساعت) c
مرزه Clove		
0	116.39	0.06
250	111.53	0.053
500	111.43	0.056
SEM ²	3.69	<0.01
میخک Savory		
0	116.99	0.063
250	110.17	0.057
500	112.20	0.049
SEM ³	3.69	<0.01
مرزه×میخک Savory ×Clove		
0×0	121.97	0.062
250×0	122.88	0.061
500×0	104.33	0.058
0×250	116.33	0.060
250×250	107.75	0.051
500×250	110.51	0.049
0×500	112.67	0.066
250×500	99.89	0.061
500×500	121.74	0.041
SEM ³	6.38	<0.01
P value		
مرزه Clove	0.56	0.57
میخک Savory	0.42	0.13
مرزه×میخک Savory ×Clove	0.69	0.06

^{a,b} میانگین‌های هر ستون با حروف غیر مشترک دارای اختلاف معنی‌دار می‌باشند (P < ۰/۰۵).

^۱ تیمارهای آزمایشی بر حسب میلی گرم می‌باشند.

^۲ میانگین خطای استاندارد

^{a,b} Means within same column with different superscripts differ (P < 0.05).

¹ Experimental treatments based on mg.

² Standard Error of Means

تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. مقایسه میانگین‌ها با آزمون دانکن و در سطح احتمال ۰/۰۵ انجام شد.

$$Y_{ijk} = \mu + A_i + B_j + AB_{ij} + e_{ijk}$$

که:

Y_{ijk} = مشاهده مربوط به سطح i ام فاکتور A و سطح j ام فاکتور

μ ، میانگین کل مشاهدات، A_i = اثر فاکتور i ، B_j = اثر فاکتور j ،

AB_{ij} = اثر متقابل فاکتور i در فاکتور j و e_{ijk} = خطای تصادفی.

نتایج

مقدار تولید گاز تیمارهای آزمایشی در ساعات مختلف انکوباسیون

تجزیه و تحلیل آماری: داده‌های حاصل از تولید گاز (میلی لیتر

به ازاء ۰/۲ گرم ماده خشک) به منظور محاسبه ضرایب با استفاده از رویه NLIN در نرم افزار SAS (نسخه ۹/۱) براساس مدل زیر آنالیز شدند.

$$GP = b(1 - e^{-ct})$$

که در این معادله GP = حجم گاز تولیدی در زمان t ، b = بخشی که در طول زمان گاز تولید می‌کند (کنند تجزیه)، c = نرخ تولید گاز (در ساعت) از بخش b در خوراک‌های کند تخمیر و c = زمان انکوباسیون بر حسب ساعت بود.

در پایان داده‌های بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SAS نسخه ۹/۱ با استفاده از رویه آماری GLM با استفاده از مدل زیر مورد

یا هر یک از اسانس‌ها قرار نگرفت. با وجود این اثرات متقابل دو اسانس بر پتانسیل گاز تولیدی تمایل به کاهش داشت ($P=0/06$). مقدار ماده آلی قابل هضم، انرژی متابولیک سمی و اسیدهای چرب فرار در جدول ۴ نشان داده شده است. سطوح مختلف اسانس مرزه تأثیری بر مقدار ماده آلی قابل هضم، انرژی متابولیک سمی و اسیدهای چرب فرار نداشت، اما با افزایش سطح اسانس میخک، مقدار ماده آلی قابل هضم و انرژی متابولیسمی تمایل به کاهش داشت ($P=0/09$).

در جدول ۲ نشان داده شده است. استفاده از سطح اسانس مرزه ۵۰۰ میلی‌گرم باعث افزایش گاز تولیدی در مقایسه با گروه شاهد در ساعات اولیه (۲ و ۴ ساعت) تخمیر شد ($P<0/05$). اما استفاده از میخک در سطح ۵۰۰ میلی‌گرم باعث کاهش گاز تجمعی تولیدی در ساعات ۸، ۱۶ و ۲۴ در مقایسه با سطح ۲۵۰ میلی‌گرم و گروه شاهد شد ($P<0/05$). همچنین اثر متقابل مرزه و میخک در زمان ۲ و ۴ ساعت معنی‌دار بود و باعث افزایش مقدار گاز تولیدی شد ($P<0/05$). فراسنجه‌های تولید گاز تیمارهای مختلف در جدول ۳ نشان داده شده است. مقدار تولید گاز (b) و نرخ تولید گاز (c) تحت تأثیر تیمارها

جدول ۴- ماده آلی قابل هضم، انرژی متابولیسمی اسیدهای چرب فرار در تیمارهای آزمایشی

Table 4-Digestible organic matter, Metabolizable energy and Digestible organic matter in experimental treatments

تیمارهای آزمایشی ^۱ Experimental Treatments ¹	ماده آلی قابل هضم Digestible organic matter (%)	انرژی متابولیسمی Metabolizable energy (MJ/kg DM)	اسیدهای چرب فرار Volatile free acids (mmol/200 mg DM)
مرزه Clove			
0	14.29	89.67	2.58
250	12.67	81.06	2.45
500	12.99	82.71	2.48
SEM ²	0.78	4.14	0.08
میخک Savory			
0	14.61	91.35	2.62
250	13.27	84.22	2.48
500	12.08	77.88	2.41
SEM ³	0.78	4.14	0.08
مرزه×میخک Savory ×Clove			
0×0	92.55	14.83	2.73
250×0	94.27	15.16	2.73
500×0	82.17	12.83	2.27
0×250	91.92	14.72	2.61
250×250	75.76	11.68	2.38
500×250	75.49	11.63	2.37
0×500	89.57	14.28	2.52
250×500	82.62	12.97	2.32
500×500	75.94	11.71	2.60
SEM ³	7.17	1.35	0.13
P value			
مرزه Clove	0.13	0.31	0.50
میخک Savory	0.09	0.09	0.17
مرزه×میخک Savory ×Clove	0.81	0.81	0.10

^{a,b} میانگین‌های هر ستون با حروف غیر مشترک دارای اختلاف معنی‌دار می‌باشند ($P<0/05$).

^۱ تیمارهای آزمایشی بر حسب میلی‌گرم می‌باشند.

^۲ میانگین خطای استاندارد

^{a,b} Means within same column with different superscripts differ ($P < 0.05$).

¹ Experimental treatments based on mg.


² Standard Error of Means

رشد باکتری پیتواستریپتوکوکوس/انثروپوس در شکل ۲ نشان داده شده

نتایج حاصل از تأثیر اسانس‌های مرزه و میخک بر قطر هاله عدم

میانگین ۶/۳ سانتی متر و کمترین رشد قطر هاله باکتری مربوط به تیمار ۴ (سطح ۲۰ میکرولیتر اسانس میخک) با میانگین ۰/۸۵ سانتی متر بود ($P < 0.05$). شکل ۳، تصویر تعدادی از هاله عدم رشد باکتری پیتواسترپتوکوکوس انثروبیوس را در غلظت‌های مختلف اسانس مرزه و میخک نشان می‌دهد.

است. بر اساس نتایج به دست آمده از روش دیسک دیفیوژن مشاهده شد میزان بازدارندگی از رشد باکتری مزبور در تمامی رقت‌های ذکر شده اسانس‌های مرزه و میخک معنی دار می‌باشد ($P < 0.05$). همچنین بالاترین رشد قطر هاله باکتری مربوط به تیمار ۱۱ (سطح ۳۵ میکرو لیتر اسانس میخک + سطح ۳۵ میکرو لیتر اسانس مرزه) با



شکل ۲- تاثیر اسانس‌های مرزه و میخک بر قطر هاله عدم رشد باکتری پیتواسترپتوکوکوس انثروبیوس

(T₁-T₁₆، تیمارهای آزمایشی توضیح داده شده در جدول ۱ می‌باشند).

Figure 2- Effect of clove and savory essences on diameter of inhibition zone of *Peptostreptococcus anaerobius* (T₁-T₁₆ are experimental treatments stated in Table 1)



شکل ۳- فعالیت ضد میکروبی اسانس‌های مرزه و میخک با باکتری پیتواسترپتوکوکوس انثروبیوس در روش کشت چند خطی

Figure 3- Antimicrobial activity of clove and savory essences with *Peptostreptococcus anaerobius* in streak method

انثروبیوس در بین تیمارهای آزمایشی گزارش شده است. میانگین قطر هاله عدم رشد باکتری در تیمارهای ۱ تا ۱۵ (سطوح

همانطور که در جدول ۵ مشاهده می‌شود در مقایسات گروهی میانگین میزان عدم رشد قطر هاله باکتری پیتواسترپتوکوکوس

سانتی متر مشاهده گردید و بنابراین نشان داد این مقایسه معنی دار می‌باشد ($P < 0/05$). میانگین قطر هاله عدم رشد باکتری در تیمارهای ۷ تا ۱۵ (سطوح مختلف ترکیبی اسانس‌های مرزه و میخک) با میانگین ۴/۶۸ در مقایسه با قطر هاله باکتری در تیمار ۱۶ (استرپتومایسین) با میانگین ۱/۹۸ نیز نشان داد این مقایسه معنی دار می‌باشد ($P < 0/05$). بنابراین اسانس‌های مرزه و میخک در هر دو صورت ساده و ترکیبی قادرند اثرات بازدارندگی معنی داری بر رشد باکتری پیتواسترپتوکوکوس انثروبیوس داشته باشد. همچنین نتایج مقایسه گروهی نشان داد میانگین قطر هاله عدم رشد باکتری در تیمارهای حاوی اسانس‌های مرزه و میخک (تیمارهای ۷ تا ۱۵) با میانگین ۴/۶۸ سانتی متر نسبت به سطوح ساده مختلف اسانس‌های مرزه و میخک (تیمارهای ۱ تا ۶) با میانگین ۲/۴۳ سانتی متر بیشتر می‌باشد ($P < 0/05$).

مختلف تمام اسانس‌های مرزه و میخک) با میانگین ۴/۳۸ سانتی متر در مقایسه با تیمار ۱۶ (استرپتومایسین) با میانگین ۱/۹۸ سانتی متر مشاهده گردید که تمامی تیمارهای حاوی اسانس (ساده و ترکیبی) نسبت به شاهد اثر بازدارندگی رشد را در باکتری مزبور افزایش دادند ($P < 0/05$). همچنین میانگین قطر هاله عدم رشد باکتری در تیمارهای ۱، ۲ و ۳ (سطوح ساده مختلف اسانس مرزه) با میانگین ۳/۳۴ سانتی متر در مقایسه با میانگین قطر هاله باکتری در تیمارهای ۴، ۵ و ۶ (سطوح ساده مختلف اسانس میخک) با میانگین ۱/۳۵ سانتی متر نیز نشان داد اسانس مرزه نسبت به اسانس میخک غلظت بازدارندگی بیشتری بر رشد باکتری مزبور داشته است ($P < 0/05$). میانگین قطر هاله عدم رشد باکتری در تیمارهای ۱ تا ۶ (سطوح ساده مختلف اسانس‌های مرزه و میخک) با میانگین ۳/۳۴ در مقایسه با قطر هاله باکتری در تیمار ۱۶ (استرپتومایسین) با میانگین ۱/۹۸

جدول ۵ - مقایسات گروهی برای سطوح متفاوت اسانس‌های مرزه و میخک بر قطر هاله عدم رشد باکتری پیتواسترپتوکوکوس انثروبیوس

Table 5- Orthogonal comparison for different levels of clove and savory essences on diameter of inhibition zone of *Peptostreptococcus anaerobius*

متغیرها Parameters	P-value
تمام سطوح مختلف اسانس‌های مرزه و میخک با شاهد (استرپتومایسین) All different levels of clove and savory essences vs. control (streptomycin)	<0.0001
سطوح ساده اسانس مرزه با سطوح ساده اسانس میخک Simple levels of clove essence vs. savory essence	<0.0001
سطوح ساده اسانس مرزه و میخک با شاهد (استرپتومایسین) Simple levels of clove and savory essences vs. control (streptomycin)	<0.0001
سطوح ترکیبی اسانس‌های مرزه و میخک با شاهد مثبت (استرپتومایسین) Complex levels of clove and savory essences vs. control (streptomycin)	<0.0001
سطوح ساده اسانس‌های مرزه و میخک با سطوح ترکیبی اسانس‌های مرزه و میخک Simple levels of clove and savory essences vs. complex levels of clove and savory essences	<0.0001

تولید گاز مخلوطی از کاه ارزن و کنسانتره (با نسبت ۸۰ به ۲۰) را کاهش می‌دهد (۱۰). در مطالعه‌ای دیگر استفاده از دزهای مختلف عصاره‌های گیاهی بر تولید گاز مخلوط ۵۰:۵۰ علف یونجه و کنسانتره مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که عصاره میخک در مقایسه با دیگر اسانس‌های مورد مطالعه توانایی متوسطی از این نظر دارد. در این مطالعه اثر کاهش عصاره میخک بر کاهش گاز تولیدی با افزایش دز خطی بود.

در مطالعه حاضر پتانسیل گاز تولیدی (b) تنها در زمان استفاده همزمان از دو اسانس تمایل به کاهش گاز تولیدی داشت. در گزارشی روپقی و همکاران (۳۴) نشان دادند که استفاده از عصاره میخک به مقدار ۳۰۰ بخش در میلیون تاثیر معنی داری بر ضرایب آزمون تولید گاز جیره مخلوط دارای نسبت ۶۰:۴۰ علوفه به کنسانتره نداشت. گزارشی از تاثیر اسانس مرزه بر ضرایب تولید گاز توسط نگارندگان یافت نشد.

بحث

در مطالعه حاضر اگرچه اسانس مرزه در ساعت آغازین تخمیر (۲ و ۴ ساعت) و اسانس میخک در ساعات بعدی تا ۲۴ ساعت باعث کاهش گاز تولیدی شدند، اثر متقابل مرزه و میخک در زمان‌های ۲ و ۴ ساعت باعث افزایش مقدار گاز تولیدی شد ($P < 0/05$). در مطالعه‌ای (۲۱) اثرات اسانس‌های مختلف بر کاهش گاز تولیدی مخلوط علف یونجه و کنسانتره (با نسبت ۸۰ به ۲۰) را مورد بررسی قرار دادند و علی‌رغم اثر کاهش‌ی تولید گاز توسط دیگر اسانس‌های مورد بررسی، تأثیری از عصاره میخک بر تولید گاز مشاهده نکردند. نتایج مطالعه حاضر این نتایج را تایید می‌کند. نتیجه مشابهی هم توسط گونال و همکاران (۱۸) با استفاده از ۵۰۰ میلی‌گرم عصاره میخک بر تولید گاز جیره حاوی علف یونجه-سیلاژ ذرت و کنسانتره به نسبت ۵۰:۵۰ گزارش شده است. در مقابل دیگر مطالعات انجام شده با اسانس میخک نشان داده است که استفاده از دزهای افزایشی این اسانس

کارواکرول) به مقدار ۰/۵ میلی گرم در لیتر از محیط کشت، تأثیری از این ماده بر قابلیت هضم ماده خشک و دیواره سلولی حاوی همی سلولز علف یونجه، دانه ذرت، کنجاله سویا و جیره مخلوط به مدت ۲۴ ساعت در شرایط آزمایشگاهی مشاهده نکردند.

داده‌های اندکی در خصوص اثرات متقابل استفاده از اسانس‌های گیاهی و همچنین اثرات اسانس مرزه بر فراسنجه‌های تخمیری منتشر شده است. روفیق و همکاران (۳۴) اثرات همپوشانی مثبت بین اسانس میخک و دارچین را در کاهش متان تولیدی در آزمایشات برون تنی نشان دادند.

علت تناقض و تفاوت در نتایج بدست آمده از آزمایشات مختلف در خصوص اثرات اسانس بر تخمیر و تغییر فراسنجه‌های تخمیری می‌تواند به دلایل مختلفی باشد که مهم‌ترین آن روش عصاره‌گیری و نوع جیره آزمایشی (نسبت علوفه به کنسانتره) است. طلا تپه و همکاران (۳۸) نشان دادند که اثر متقابل جیره و اسانس مرزه بر افزایش وزن بزغاله‌های بومی آذربایجان معنی دار است. ماتئوس و همکاران (۲۳) تأثیر استفاده از اسانس‌های دارچین و سیر را بر روی جیره‌های دارای کنسانتره متوسط و زیاد مقایسه نمودند و نشان دادند که نوع جیره دارای اثر متقابل معنی دار با اسانس‌های بکار رفته بر تولید گاز و نسبت اسیدهای چرب تولیدی دارد. همچنین کاردوزو و همکاران (۸) نشان دادند که مقدار pH محیط کشت حاوی مایع شکمبه در شرایط برون تنی می‌تواند دارای اثر متقابل بر پاسخ حاصل از اسانس‌های گیاهی مورد استفاده داشته باشد.

در آزمایش حاضر، کمترین اثر ضد میکروبی، مربوط به سطح ۲۰ میکرولیتر اسانس میخک و بیشترین اثر ضد میکروبی، مربوط به ترکیب ۳۵ میکرولیتر از هر کدام از اسانس‌های میخک و مرزه بوده است. بنابراین اثر ضد میکروبی اسانس‌های مرزه و میخک با سطح ۳۵ میکرولیتر افزایش یافته است. همچنین نتایج حاصل از آزمایشات کشت میکروبی باکتری تولید کننده آمونیاک (پیتواسترپتوکوکوس انثروبیوس) نیز نشان داد تمامی تیمارهای حاوی اسانس (ساده و ترکیبی) نسبت به شاهد، تیمارهای حاوی اسانس مرزه نسبت به شاهد و سطوح ترکیبی اسانس‌های مزبور نسبت به سطوح ساده اثر بازدارندگی بیشتری بر رشد این باکتری داشته است ($P < 0.05$). لذا اثر ممانعت‌کنندگی اسانس‌های مرزه و میخک بر روی این باکتری نشان داد که استفاده از اسانس‌های مرزه و میخک در این تیمارها باعث می‌شود که تولید آمونیاک احتمالاً کاهش یابد.

در تحقیقات نشان داده شده است که اسانس‌ها با کاهش جمعیت باکتری و تک یاخته‌های تولید کننده آمونیاک شکمبه به میزان فراوان سبب کاهش نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه می‌شوند (۳۹). کاهش غلظت نیتروژن آمونیاکی در جیره‌های حاوی آویشن شیرازی که ترکیباتی مشابه به مرزه و میخک دارد می‌تواند با اثر فعالیت ضد میکروبی این اسانس بر باکتری‌های گرم مثبت و باکتری تولید کننده

در خصوص اثرات متقابل دو اسانس میخک و مرزه گزارشی توسط نگارندگان یافت نشد. نتایج آزمایش حاضر نشان داد استفاده همزمان از دو اسانس به طور معنی‌داری پتانسیل تولید گاز را کاهش داده و همچنین تمایل به کاهش تولید گاز تجمعی در زمان ۱۲۰ ساعت و تولید اسیدهای چرب فرار داشت. علت کاهش تولید گاز را می‌توان، افزایش قند‌های محلول در واکنش ترکیبی به واسطه افزودن عصاره‌های گیاهی بیان کرد (۲۵). همچنین سایر محققان، اثرات همکوشی یا متضاد ترکیبات موجود در اسانس‌های گیاهی مذکور (تیمول و کارواکرول) را موجب تغییر در تأثیر گذاری اسانس و نتایج حاصله بیان کرده‌اند (۴).

در مطالعه حاضر ماده آلی قابل هضم، انرژی متابولیسمی و تولید اسیدهای چرب فرار بر اساس معادلات ارائه شده تخمین زده شد. استفاده از اسانس میخک تمایل به کاهش ماده آلی قابل هضم و انرژی متابولیسمی داشت اما تأثیری بر اسیدهای چرب فرار نداشت. در تضاد با این نتایج، روفیق و همکاران (۳۴) نشان دادند که استفاده از عصاره میخک در غلظت ۳۰۰ بخش در میلیون تأثیری بر انرژی متابولیسمی تخمین زده شده در آزمایش تولید گاز نداشت. در مطالعه حاضر مقدار اسانس مورد استفاده بیشتر از این مقدار بود (تا ۵۰۰ بخش در میلیون).

گونال و همکاران (۱۰) نیز نشان دادند که استفاده از عصاره میخک اگرچه تأثیری بر تولید اسیدهای چرب فرار نداشت با این حال باعث کاهش قابلیت هضم ماده خشک شد. با وجود این پاترا و یو (۳۲) کاهش اسیدهای چرب فرار و قابلیت هضم ماده خشک را با استفاده از اسانس میخک نشان دادند. کاهش تولید اسیدهای چرب فرار و کاهش قابلیت هضم واقعی ماده خشک با استفاده از عصاره میخک در آزمایشات قبلی نیز گزارش شده است (۱۰). در تضاد با نتایج حاضر، کاستیلجنوس و همکاران (۹) نشان دادند که استفاده از عصاره مرزه تا غلظت ۵۰۰ میلی گرم در لیتر از محیط کشت به مدت ۲۴ ساعت باعث افزایش تولید اسیدهای چرب جیره حاوی علوفه و کنسانتره با نسبت ۱۰ به ۹۰ شد.

کاهش ناپدید شدن ماده خشک با استفاده از عصاره میخک توسط جهانی عزیزآبادی و همکاران (۱۲) گزارش شده بود. با وجود این در مطالعه‌ای روی و همکاران (۳۵) نشان دادند که دزهای بیشتر از ۳۰۰ بخش در میلیون عصاره میخک در جیره‌ای که دارای نسبت برابر کنسانتره و علوفه است باعث کاهش تولید گاز، هضم حقیقی ماده خشک و ماده آلی در آزمایش تولید گاز می‌شود. در تضاد با این نتایج و نتایج مطالعه حاضر، کاستیلجنوس و همکاران (۹) نشان دادند که استفاده از عصاره میخک در جیره‌ای با نسبت کنسانتره به علوفه ۹۰ به ۱۰ باعث افزایش غلظت کل اسیدهای چرب فرار به مقدار ۵۲/۳-۳۲/۸ درصد می‌شود.

ریقی و همکاران (۳۳) با بررسی استفاده از ماده موثره مرزه

بر لیتر) غلظت نیتروژن آمونیاکی را شدیداً کاهش دادند ولی این نتیجه در مقادیر متوسط (۳۰۰ میلی گرم در لیتر) کمتر و در مقادیر کمتر (۳ میلی گرم در لیتر) مشاهده نشد.

کاهش غلظت آمونیاک در تیمارهای حاوی برخی از گیاهان دارویی در مقایسه با خوراک پایه ممکن است به دلیل مهار باکتری‌های تجزیه کننده پروتئین توسط مواد موثره موجود در گیاهان دارویی و در نتیجه کاهش تجزیه پروتئین در شکمبه باشد و یا اثر منفی مواد موثر موجود در گیاهان دارویی بر باکتری‌های تولید کننده آمونیاک با توان بالا باشد که موجب کاهش تولید آمونیاک در شکمبه می‌شود. همچنین کاهش پروتوزا و کاهش بلعیده شدن باکتری‌ها توسط آنها نیز می‌تواند از دیگر دلایل کاهش آمونیاک باشد (۵).

نتیجه گیری کلی

به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از اسانس میخک باعث کاهش تولید گاز و فراسنجه‌های تخمیری شد اما اسانس مرزه تأثیری بر مقدار تولید گاز، قابلیت هضم ماده آلی، انرژی قابل متابولیسم و مقدار اسیدهای چرب فرار نداشت. در این مطالعه وجود این اثرات همگوشی استفاده همزمان از دو اسانس مرزه و میخک بر کاهش تولید گاز مشاهده شد و در نتیجه اثرات همگوشی اسانس‌ها در مطالعات باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین برای مطالعات بعدی پیشنهاد می‌شود تأثیر اسانس‌ها به همراه منابع مختلف انرژی همانند پکتین، نشاسته و منابع مختلف پروتئینی در شرایط برون تنی و درون تنی مورد مطالعه قرار گیرد. همچنین توجه به تغییرات دیگر تولیدات تخمیری همانند نیتروژن آمونیاکی، متان و ترکیب جمعیت میکروبی در این آزمایشات نیز می‌تواند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد.

مقدار بالای نیتروژن آمونیاکی ارتباط داشته باشد (۲).

در سایر پژوهش‌ها نیز گزارش شده است که افزودن گیاهان دارویی در شرایط مطلوب، موجب کاهش غلظت آمونیاک موجود در شیرابه شکمبه می‌شود. شرایط مطلوب از این حیث مطرح است که فاکتورهایی مانند ترکیب شیمیایی و دوز مصرف ترکیبات فعال می‌تواند بر متابولیسم نیتروژن در شکمبه اثر گذار باشد. ترکیبات موثر متفاوت، آثار متفاوتی بر متابولیسم نیتروژن دارد (۵). طلا تپه و همکاران (۳۸) نیز نشان دادند که افزودن سطح ۲۰۰ میلی گرم اسانس مرزه باعث کاهش معنی داری در غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه بزغالها شد، بطوری که بیشترین مقدار مربوط به سطح ۲۰۰ میلی گرم اسانس مرزه بود. مک اینتاش و همکاران (۲۵) گزارش دادند که مخلوطی از اسانسهای گیاهی می‌تواند رشد سویه‌هایی از باکتری‌هایی که مقدار زیادی نیتروژن آمونیاکی تولید می‌کنند (مانند کلاستریدیوم استیکلانندی و پیتواسترپتوکوکوس انثروبیوس) را محدود کرده، در حالی که همزمان تأثیری بر رشد برخی دیگر از باکتری‌های این دسته نظیر کلاستریدیوم آمینوفیلوم ایجاد نمی‌کنند. انتقال اسیدهای آمینه به درون سلول باکتری از طریق نیروی محرک پروتون- سدیم صورت می‌گیرد (۱۱) یکی از سازو کارهای پیشنهاد شده برای عمل کارواکرول و تیمول، آسیب به غشاء سلول باکتری و اختلال در کارکرد نیروی محرک پروتون-سدیم می‌باشد که باعث از بین رفتن باکتری‌های تولید کننده آمونیاک می‌شود (۴). باسکویت و همکاران (۵) نشان داده‌اند که برخی از اسانس‌ها (اسانس رازیانه، روغن کادتی، اسانس فلفل سبز، اسانس دارچین، اسانس دارچین، اسانس میخک، اسانس مرزه، اسانس پونه، اسانس شوید، اسانس سیر، اسانس زنجبیل و روغن درخت چای) و ترکیبات اصلی آنها (انتول، سیلیکات، کارواکرول، تیمول، اوژنول و کاروون) در مقادیر بالا (۳۰۰ میلی گرم

منابع

1. Akhtar, M. S., B. Degaga, and T. Azam. 2014. Antimicrobial activity of essential oils extracted from medicinal plants against the pathogenic microorganisms: a review, *Biological Sciences and Pharmaceutical Research*, 2 (1): 1-7.
2. Benchaar, C., S. Calsamiglia, A. V. Chaves, G. R. Fraser, D. Colombatto, T.A. McAllister, and K.A. Beauchemin. 2008. A review of plant-derived essential oils in ruminant nutrition and production. *Animal Feed Science and Technology*, 145:209-228.
3. Bromand, M. A., M. Sharifi, Gh. Irajani, F. Shahcheraghi, B. Valizadeh, M. Rahbar, F. Fllah, F. RashedMarandi, and M. Sarmi. 2012. Performance Standard for Antimicrobial Susceptibility Testing. Seda, Tehran, Iran (In Persian).
4. Burt, S. 2004. Essential oils: Their antibacterial properties and potential applications in foods—a review. *International Journal of Food Microbiology*, 94: 223-253.
5. Busquet, M., S. Calsamiglia, A. Ferret, and C. Kamel. 2006. Plant extracts affect in vitro rumen microbial fermentation. *Journal of Dairy Science*, 89: 761-771.
6. Calsamiglia, S., L. Castillejos, and M. Busquet. 2006. Alternatives to antimicrobial growth promoters in cattle. Pages 129-167 in *Recent Advances in Animal Nutrition*. P. C. Garnsworthy, and J. Wiseman, ed. Nottingham University

- Press, Nottingham, UK.
7. Calsamiglia, S., M. Busquet, P. W. Cardozo, L. Castillejos, and A. Ferret. 2007. Invited Review: Essential Oils as Modifiers of Rumen Microbial Fermentation. *Journal of Dairy Science*, 90:2580–2595.
 8. Cardozo, P.W., S. Calsamiglia, A. Ferret, and C. Kamel. 2005. Screening for the effects of natural plant extracts at different pH on *in vitro* rumen microbial fermentation of a high-concentrate diet for beef cattle. *Journal of Animal Science*, 83:2572–2579.
 9. Castillejos, L., S. Calsamiglia, J. Martín-Tereso, and H. TerWijlen. 2008. *In vitro* evaluation of effects of ten essential oils at three doses on ruminal fermentation of high concentrate feedlot-type diets. *Animal Feed Science and Technology*, 145:259–270.
 10. Chandrasekharaiah, M., A. Thulasi, and L. Jose. 2015. Effect of Supplementation of Different Essential Oils on *in vitro* Methanogenesis, Fermentation and Digestibility of Finger millet straw based Diet in Rumen Liquor of Crossbred Cattle. *Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences*, 6 (2): 480–486.
 11. Chen, G., C. J. Sniffen, and J. B. Russell. 1987. Concentration and estimated flow of peptides from the rumen of dairy cattle: Effects of protein quantity, protein solubility, and feeding frequency. *Journal of Dairy Science*. 70:983–992.
 12. Dorman, H J. D., and S. G. Deans. 2000. Antimicrobial agents from plants: antibacterial activity of plant volatile oils. *Journal of Applied Microbiology*, 88: 308–316.
 13. Dehority, B.A. 2003. Rumen microbiology. Nottingham University Press, Nottingham, UK.
 14. Eschenlauer, S.C. P., N. Mckain, N. D. Walker, N. R. McEwan, C. J. Newbold, and R. J. Wallace . 2002. Ammonia production by ruminal microorganisms and enumeration, isolation and characterization of bacteria capable of growth on peptides and amino acids from the sheep rumen .*Applied Environmental Microbiology*, 68: 4925–4931.
 15. Gershenzon, J., and R. Croteau. 1991. Terpenoids. Pages 165–219 in *Herbivores: Their interactions with secondary plant metabolites*. Vol. 1. G. A. Rosenthal, and M. R. Berenbaum, ed. Academic Press, San Diego, CA.
 16. Getachew, G., H. P. S. Makkar, and K. Becker. 2002. Tropical browses: contents of phenolic compounds, *in vitro* gas production and stoichiometric relationship between short chain fatty acid and *in vitro* gas production. *Journal of Agricultural Science*, 139(3): 341–352.
 17. Griffin, S.G., S.G. Wyllie, J.L. Markham, and D.N. Leach. 1999. The role of structure and molecular properties of terpenoids in determining their antimicrobial activity. *Flavour and Fragrance Journal*, 14: 322–332.
 18. Günel, M., B. Pinski, and A. A. AbuGhazaleh. 2017. Evaluating the effects of essential oils on methane production and fermentation under *in vitro* conditions. *Italian Journal of Animal Science*, 16(3): 500–506.
 19. Halimi Shabestari, A., R. Salamat doustnobar, and N. Maheri-Sis. 2011. Evaluation Effects of Clove Methanol Extract on Methane Production in the *in vitro* Condition. *Pakistan Journal of Nutrition*, 10 (12): 1154–1157.
 20. Hart, K. J., D. R. Yanez-Ruiz, S. M. Duval, N. R. McEwan, and C. J. Newbold. 2008. Plant extracts to manipulate rumen fermentation. *Animal Feed Science and Technology*, 147: 8–35.
 21. Jahani-Azizabadi, H., M. DaneshMesgaran, A. R. Vakili, and K. Rezayazdi. 2014. Effect of some plant essential oils on *in vitro* ruminal methane production and on fermentation characteristics of a mid-forage diet. *Journal of Agricultural Science and Technology*, 16: 1543–1554.
 22. Lee, S. S., J. K. Ha, and K. J. Cheng. 2000. Relative contributions of bacteria, protozoa, and fungi to *in vitro* degradation of orchard grass cell walls and their interactions. *Applied and Environmental Microbiology*, 66: 3807 – 3813.
 23. Macheboeuf, D., D.P.Morgavi, Y.Papon, J.L.Mousset, M.Arturo-Schaan. 2008. Dose-response effects of essential oils on *in vitro* fermentation activity of the rumen microbial population. *Animal Feed Science and Technology*, 145: 335–350.
 24. Mateos, I., M. J. Ranilla, M. L. Tejido, C. Saro, C. Kemal, and M. D. Carro. 2013. The influence of diet type (dairy versus intensive fattening) on the effectiveness of garlic oil and cinnamaldehyde to manipulate *in vitro* ruminal fermentation and methane production. *Animal Production Science*, 53: 299–307.
 25. McIntosh, F. M., P. Williams, R. Losa, R. J. Wallace, D. A. Beever, and C. J. Newbold. 2003. Effects of essential oils on ruminal microorganisms and their protein metabolism. *Applied and Environmental Microbiology*, 69:5011–5014.
 26. Menke, K. H., and H. Steingass. 1988. Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analyses and gas production using rumen fluid. *Animal Research Development*, 28(3): 7–55.
 27. Menke, K. H., L. Raab, A. Salewski, H. Steingass, D. Fritz, and W. Schneider. 1979. The estimation of the digestibility and metabolizable energy content of ruminant feedstuffs from the gas production when they are incubated with rumen liquor *in vitro*. *Journal of Agricultural Science*, 92: 217–222.
 28. Momeni, T. K., and N. Shahrokhi. 1998. Essential oils and their therapeutic actions. Tehran University Press (In Persian).

29. Moree, L.V., J. L. Johnson, and W. E. C. Moree. 1986. Genus *Peptococcus* Kluver and Van Neil 1936, 400AL , pages 1082-1083, and Genus *Peptostreptococcus* Kluver and Van Neil , pages 1083-1092 in Bergey,s manual of systematic bacteriology. P. H. Sneath, N. S. Mair, E. M. Sharpe, and J G. Holt, ed. The Williams & Williams CO., Baltiore.
30. Paster, B. J., J. B. Russell, C. M. J. Yang, J. M. Chow, C. R. Woese, and R. Tanner. 1993. Phylogeny of the ammonia-producing ruminal bacteria *Peptostreptococcus anaerobius*, *Clostridium sticklandii* and *Clostridium aminophilum* sp. *International Journal Systematic Bacteriology*, 43:107–110.
31. Patra, A. K. 2011. Effects of essential oils on rumen fermentation, microbial ecology and ruminant production. *Asian Journal of Animal and Veterinary Advances*, 6(5): 416-428.
32. Patra, A.K., and Z. Yu. 2012. Effects of essential oils on methane production, fermentation, abundance and diversity of rumen microbial populations. *Applied Environmental Microbiology*, 78: 4271–4280.
33. Righi, F., M. Simoni, A. Foskolos, V. Beretti, A. Sabbioni, and A. Quarantelli. 2017. In vitro ruminal dry matter and neutral detergent fiber digestibility of common feedstuffs as affected by the addition of essential oils and their active compounds. *Journal of Animal and Feed Sciences*, 26: 204–212.
34. Rofiq, M. N., S. Martono, M. Görgülü, and M. Boga. 2012. Combination Effect of Clove and Cinnamon Oil on in Vitro Rumen Gas and Methane Production. *Proceeding of the 2nd International Seminar on Animal Industry*, Jakarta, 431-437.
35. Roy, D., S. K. Tomar, S. K. Sirohi, V. Kumar, and M. Kumar. 2014. Efficacy of different essential oils in modulating rumen fermentation in vitro using buffalo rumen liquor. *Veterinary World*, 7: 213-218.
36. Russell, J. B., H. J. Strobel, and G. Chen. 1988. Enrichment and isolation of a ruminal bacterium with a very high specific activity of ammonia production. *Applied and Environmental Microbiology*, 54: 872-877.
37. SAS User's Guide: Statistics, Version 9.0 Edition. SAS Inst. Inc., Cary, NC.
38. Talatapeh, A., P. Farhoomand, Y. A. Alijoo, M. Ghaderzadeh, and E. Norouzi. 2013. Effects of Summer Savory essential oil with two types of diets on performance, rumen fermentation and blood parameters of West Azerbaijan native kids. *Animal Sciences Journal (Pajouhesh & Sazandegi)*, 102: 71-80 (In Persian).
39. Wallace, R. J., N. R. McEwan, F. M. McIntosh, B. Teferedegne, and C. J. Newbold. 2002. Natural products as manipulators of rumen fermentation. *Asian-Australasian Journal of Animal Sciences*, 10: 1458–1468.
40. Zhang, Y., W. Gao, and Q. Meng. 2007. Fermentation of plant cell walls by ruminal bacteria, protozoa and fungi and their interaction with fiber particle size. *Archives of Animal Nutrition*, 61(2): 114–125.



Different levels of clove and savory essences on fermentative parameters in gas production technique and their antimicrobial effects on *Peptostreptococcus anaerobius* bacteria isolated from rumen

Hojat Imani Moghadam¹, Samaneh Ghasemi², Saeid Sobhanirad^{3*}, Mehdi Behgar⁴

Submitted: 27-06-2018

Accepted: 04-11-2020

Imani Moghadam, H., S. Ghasemi, S. Sobhanirad, and M. Behgar. 2021. Different levels of clove and savory essences on fermentative parameters in gas production technique and their antimicrobial effects on *Peptostreptococcus anaerobius* bacteria isolated from rumen. Iranian Journal of Animal Science Research 13(3): 335-349.

Introduction Since the legislation of European Union has prohibited the use of growth-promoting antibiotics such as monensin, scientists have been interested in alternatives to manipulate rumen fermentation. The use of growth-promoting antibiotics in animal feeds is banned in Europe due to potential risks such as the spread of antibiotic resistance genes or the contamination of milk or meat with antibiotic residues. Recently, essential oils have been increasingly evaluated to replace or facilitate reductions in the use of antibiotics. The most effects of plant essential oils, especially cloves and savory oils, are their antioxidant effects and their effects on the metabolism of ruminal microbes. The antiprotozoal effects of clove extract have been proven in the studies in vitro by gas production technique. Few studies have been done on the effects of clove oil, especially the savory oil, on the digestive properties in the country. Also, no study was found on the interactions of these essential oils in the experiments in vitro. Thus, the aim of this study was investigated to evaluate the effects of clove and savory oils on gas production and in vitro fermentation process and estimation of gas production parameters of feedstuffs (alfalfa hay and barley grain).

Materials and Methods Experimental treatments were included control (basal feeds without additive), basal feeds supplemented with three levels of clove oil (0, 250, 500 mg) and three levels of savory oil (0, 250, 500 mg) per kg of DM in a rumen culture. Ruminal fluid was collected from two fistulated sheep (49.5±2.5 kg). All samples isolated from the rumen were withdrawn 2 h after the morning ration had been consumed. Collected rumen contents were strained through four layers of cheesecloth and brought immediately to the laboratory. Gas production technique was used to detect the fermentation parameters of the treatments. About 200 mg of basal diet (alfalfa hay and barley grain, 1:1, with clove and savory oils) were incubated in 100ml glass syringes and 30ml of incubation liquid were added and were incubated in 39 C° water bath. The gas production was measured in 2, 4, 6, 8, 16, 24, 48, 72, 96, 120h. Three parallel syringes of each treatment were prepared in this experiment in a completely randomized design in a factorial arrangement. They were used to measure the gas production parameters (fermentable fraction (b) and rate (c) of gas production) cumulative gas production, organic digestibility and metabolizable energy of treatments until 120 h. In the present study, digestible organic matter, metabolizable energy, and production of volatile fatty acids were estimated based on the presented equations. In the second experiment, *Peptostreptococcus anaerobius* was isolated from the ruminal fluid, cultured in the medium of BAAA (Bile EsculinAzideAgar), and evaluated by different levels of cloves and fennel essences in a randomized complete design with sixteen treatments and three replicates using Duncan test at level 0.05. Experimental levels in this experiment including: 20, 35 and 40 µl of cloves essence, 20, 35 and 40

1- M.Sc. Graduate, Department of Agricultural Science, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

2- Assistant professor, Department of Agriculture, Faculty of Shahryar, Tehran branch, Technical and Vocational University, Tehran

3- Assistant professor, Department of Agricultural Science, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.

4- Associated professor, Nuclear Science & Technology Research Institute, Karaj, Iran.

(*- Corresponding author email: sobhanirad@gmail.com)

DOI: 10.22067/ijasr.v13i3.73987

μl of fennel essence, 20 μl of fennel essence + 20 μl of cloves essence, 20 μl of fennel essence + 35 μl of cloves essence, 20 μl of fennel essence + 40 μl of cloves essence, 35 μl of fennel essence + 20 μl of cloves essence, 35 μl of fennel essence + 350 μl of cloves essence, 35 μl of fennel essence + 40 μl of cloves essence, 40 μl of fennel essence + 20 μl of cloves essence, 40 μl of fennel essence + 35 μl of cloves essence, 40 μl of fennel essence + 40 μl of cloves essence, control. Statistical analysis of data was performed by SAS statistical software (9.1 version). Duncan's multiple test range was conducted in level 5%.

Results and Discussion High levels of savory oil were increased gas production in the first hours ($p < 0.05$), but clove oil was reduced gas production in 8-24 hours ($p < 0.05$). Although, few data have been published on the interaction effects of the use of the essential oils, as well as on the effects of savory oil on fermentation parameters. The amount of gas production (b) tend to be decreased ($P = 0.06$) due to the simultaneous use of savory and clove oils. Different levels of savory oil had no effect on estimated organic matter digestibility, metabolizable energy, and volatile fatty acids. But, with increasing the levels of clove oil, the amount of estimated organic matter digestibility, metabolizable energy tend to be decreased ($P = 0.09$). In the microbial experiment, after incubation of peptostreptococcus anaerobic in medium of Bile AesculinAzideAgar and adding different levels of cloves and fennel essences was observed that all levels of treatments were significant ($P < 0.05$); the highest growth of bacteria was related to treatment 11 (35 μl of fennel essence + 350 μl of cloves essence). This result showed ammonia-producing bacteria known peptostreptococcus anaerobic is inhibiting by different levels of clove and savory essences and finally resulting in the decrease of rumen fluid Ammonia nitrogen.

Conclusion According to our results we can conclude that using savory oil improves ruminal fermentation in vitro and with increasing the levels of savory oil, the amount of gas production, the organic matter digestibility, the metabolizable energy and volatile fatty acids concentration were decreased. Also in this study, were shown the co-effects of simultaneous use of savory and clove oils on the reduction of gas production. Therefore the effects of essential oils should be considered. For further studies, it is suggested that the effect of essential oils along with various sources of energy, such as pectin, starch, and various protein sources, should be studied in vitro and in vivo. Also, consideration of other changes in fermentation products such as ammonia nitrogen, methane and the composition of the microbial population in these experiments can also be of particular importance.

Key words: clove oil, savory oil, gas production, volatile fatty acid, Peptostreptococcus anaerobic.