

تأثیر اسید سالسیلیک بر ویژگی‌های جذب فسفر در خاک آهکی

ابراهیم سپهر^{۱*}، رقیه موسوی^۲

۱. دانشیار گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

۲. دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ - تاریخ تصویب: ۱۳۹۲/۷/۸)

چکیده

اسید سالسیلیک یکی از اسیدهای آلی مهم در ریزوفسفر گیاهان است که در شرایط کمبود فسفر از ریشه‌های گیاهی ترشح می‌شود. به‌منظور بررسی رفتار جذبی فسفر در حضور اسید سالسیلیک، آزمایشی در چهار غلظت اسید سالسیلیک ۰ و ۲ و ۵ و ۱۰ میلی‌مول در لیتر به صورت دسته‌ای با غلظت‌های فسفر ۰ تا ۴۵ میلی‌گرم بر لیتر) در خاکی آهکی انجام گرفت. نتایج نشان داد حضور اسید سالسیلیک به کاهش جذب فسفر بر کلوبندهای خاک به‌سبب رقبابت بر سر مکان‌های جذب منجر گردید؛ طوری که با افزایش غلظت اسید سالسیلیک حداقل جذب فسفر (q_{\max}) از ۳۲۶ به ۲۴۶ میلی‌گرم در کیلوگرم کاهش یافت. همچین مصرف اسید سالسیلیک منجر به کاهش پارامترهای شدت جذب لانگمویر (K_L) از ۰/۲۰ به ۰/۱۴ لیتر بر میلی‌گرم، ظرفیت جذب فرونالیچ (K_f) از ۵۹ به ۴۶ لیتر بر کیلوگرم، شبیع معادله تمکین (K_T) از ۶۲ به ۴۶، و عرض از مبدأ معادله تمکین از ۵۹ به ۵۲ میلی‌گرم بر کیلوگرم شد. با افزایش غلظت اسید سالسیلیک نیاز استاندارد فسفر محاسبه شده در غلظت تعادلی ۳۰ میلی‌گرم فسفر در لیتر توسط هر سه معادله به‌طور معناداری ($P < 0/01$) کاهش یافت؛ طوری که نیاز استاندارد فسفر محاسبه شده با معادله فرونالیچ از ۳۱/۵ به ۲۴/۷ میلی‌گرم در کیلوگرم تنزل پیدا کرد. در نتیجه می‌توان گفت کاربرد اسید سالسیلیک یا اصلاح ژنتیکی گیاهان برای ترشح بیشتر این اسید می‌تواند باعث افزایش قابلیت دسترسی فسفر شود و نیاز به مصرف کود را کاهش دهد.

کلیدواژگان: اسید سالسیلیک، اسیدهای آلی با وزن مولکولی پایین، فسفر، کمبود فسفر، هم‌دماهای جذب فسفر.

میلیون تن بر سد. از طرفی منابع سنگ فسفات طی ۶۰ تا ۸۰ سال آینده به پایان می‌رسد. (Vance *et al.*, 2003). همچنین بالابودن انرژی لازم برای تولید کودهای شیمیایی (بالغ بر ۴ بیلیون دلار برای نیاز سالانه کود فسفاته) و مخاطرات زیستمحیطی نیاز به جایگزینی مناسب را، که به کاهش مصرف کودهای شیمیایی فسفاته منجر شود، ایجاد می‌کند. استفاده از پتانسیل ژنتیکی گیاهان برای حصول بالاترین عملکرد و کارایی بهره‌وری از خاک و نیز استفاده از ریزموجودات همزیست و همیار برای افزایش رشد و جذب عناصر غذایی از راهکارهای مهم جایگزین است که در جهت حفظ محیط زیست و صرفه اقتصادی توصیه می‌شود. استفاده از کودهای آلی، که قادرند تحرك فسفر تجمع یافته را در خاک افزایش دهند، نیز به‌منظور افزایش کارایی استفاده از فسفر پیشنهاد شده است (Toor and .Bahl, 1997).

گیاهان می‌توانند با استفاده از استراتژی‌های مختلف بر کمبود فسفر فائق آیند که تشکیل همزیستی میکوریزی، اسیدی‌کردن ریزوفسفر (مؤثر در رهاسازی عناصر غذایی از کانی‌های معدنی)، ترشح فسفاتازها و اسیدهای آلی از مهم‌ترین

مقدمه

فسفر یکی از عناصر غذایی ضروری برای تغذیه گیاهی است؛ که پس از نیتروژن بیشترین مصرف را در دنیا دارد. هرچند مقدار فسفر کل در لیتوسفر زیاد است، پایین بودن فراهمی آن اصلی‌ترین عامل محدودکننده محصولات کشاورزی است (Paul 2007). استفاده از کودهای شیمیایی یکی از روش‌های بسیار رایج مقابله با کمبود عناصر غذایی، نظری فسفر است. اما فسفر بهدلیل شیمی پیچیده‌ای که دارد در خاک‌های آهکی و قلایی (Ca^{2+} و Al^{3+}) و خاک‌های اسیدی (به‌سبب Fe^{3+}) به‌سختی جذب می‌شود؛ طوری که کارایی کودهای شیمیایی فسفری در اغلب خاک‌ها در سال اول تقریباً ۱۰ تا ۲۵ درصد است (Khan *et al.*, 2009; Sepehr *et al.*, 2009). به عبارت دیگر، کمتر از ۲۰ درصد کودهای فسفاته مصرفی جذب گیاه و بقیه در اثر واکنش با کاتیون‌های فلزی موجود در خاک انباشته و تثیت می‌شود (Grotz and Guerinot, 2002). به طوری که تخمین زده می‌شود مصرف این کودها در سال ۲۰۴۰ به

* نویسنده مسئول: e.sepehr@urmia.ac.ir

می‌کنند و بسته به تعداد گروه‌های کربوکسیل اسیدهای آلی شامل بارهای منفی متفاوت‌اند؛ به همین دلیل قادرند با کاتیون‌های فلزی محلول تشکیل کمپلکس دهند یا جایگزین آئیون‌ها در خاک شوند. مولکول‌های اسید آلی با تغییر بار سطحی سطوح خاک بر جذب سطحی عناصر مؤثرند و سبب مسدودشدن مکان‌های سطحی و کاهش ثبیت فسفر می‌شوند (Simeoni *et al.*, 2003). در این مطالعه، به منظور بررسی تأثیر اسید سالسیلیک بر رفتار جذب فسفر بهوسیله ذرات خاک در شرایط آهکی، غلظت‌های مختلف اسید سالسیلیک بر روند جذب فسفر در یک خاک آهکی در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد.

مواد و روش‌ها

محلول اسید آلی حاوی غلظت‌های ۲ و ۵ و ۱۰ میلی‌مول اسید سالسیلیک (مرک آلمان) با محلول زمینه ۰/۰۱ مولار CaCl_2 برای آزمایش‌های هم‌دماهی جذب تهیه شد. آزمایش به صورت دسته‌ای با هشت سطح فسفر ۰، ۳، ۶، ۱۲، ۲۴، ۳۰، ۴۵ و ۵۰ میلی‌گرم بر لیتر از منبع (KH_2PO_4) انجام شد. بدین صورت که ۲/۵ گرم نمونه خاک داخل لوله سانتریفیوژ ریخته و به هر یک از لوله‌ها ۲۵ میلی‌لیتر محلول اسید سالسیلیک حاوی سری غلظتی معین افزوده شد. پس از ۲۴ ساعت تعادل در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد، با سانتریفیوژ ۳۰۰۰ دور در دقیقه، به مدت ۵ دقیقه، فاز محلول از فاز جامد جدا گردید و مقدار فسفر با روش رنگ‌سنجی مولبیدات آمونیوم با دستگاه اسپکتروفوتومتری در طول موج ۸۸۰ نانومتر قرائت شد (Olsen *et al.*, 1954). تفاوت غلظت فسفر در محلول‌های اولیه و تعادلی بهمنزله مقدار فسفر جذب شده در نظرگرفته شد. برای تعیین ویژگی‌های جذب فسفر سه معادله فروندلیچ و لانگمویر و تمکین به کار رفت:

معادله لانگمویر

$$q_e = (K_L C_e q_{max}) / (1 + K_L C_e)$$

:Ce: غلظت فسفر محلول تعادلی (mg/L); q_e : مقدار فسفر

جذب شده بر واحد وزن خاک (mg/kg); K_L : ضریب لانگمویر و نشانگر انرژی پیوند، q_{max} : حداکثر جذب تکلایه‌ای (mg/kg). (Xu and Ji, 2003)

معادله فروندلیچ

$$q_e = K_f C_e^{1/n}$$

: q_e : میزان ماده جذب شده در فاز جامد (mg/kg); Ce: (mg/kg)


غلظت تعادلی ماده جذب‌شونده در محلول (mg/L) و K_f و n ضرایب معادله فروندلیچ که به ترتیب نمایانگر ظرفیت و شدت جذب‌اند. (Xu and Ji, 2003)

$$q_e = A + K_T \ln C_e$$

معادله تمکین

(Dinkelaker *et al.*, 1989; Ryan *et al.*, 2001; Raghothama and Karthikeyan, 2005) آن‌ها می‌باشد (Raghothama and Karthikeyan, 2005) داده است تراوش آئیون‌ها و اسیدهای آلی مکانیسم مهمی در (Jones *et al.*, 2003; Strom *et al.*, 2005) جذب فسفر از خاک است (Gardner *et al.*, 1982) ارائه کردند و دریافتند نخستین گزارش در زمینه افزایش حلالت فسفر کم محلول و جذب فسفر در نتیجه اسیدهای آلی تراویده از ریشه گیاهان را (El-Taybe, 2005) از ریشه گیاه Lupinus albus در آزادسازی سیترات ترشح شده از ریشه گیاه Lupinus albus در آزادسازی فسفر از منابع نامحلول خاک و افزایش جذب فسفر مؤثر است. این اسیدها که شامل اسید سالسیلیک، مالیک، سیتریک، فوماریک، اگزالیک، و غیره است بهوسیله ریشه گیاهان، ریزموجودات خاک، یا طی تجزیه مواد آلی خاک تولید می‌شود. اسید سالسیلیک یا اورتو‌هیدروکسی بنزوئیک اسید (SA) یکی از اسیدهای آلی با جرم مولکولی کم^۱ است که به گروهی از ترکیبات فلزی تعلق دارد (El-Taybe, 2005). این ماده بهوسیله سلول‌های ریشه تولید می‌شود و همچون ماده‌ای شبکه‌های مهار سنتز اتیلن گیاه، افزایش میزان فتوسنتز و محتوى کلروفیل، تولید می‌دهد. ایفا می‌کند (El-Taybe, 2005; Popova *et al.*, 2003) از طرفی اسیدهای آلی با جرم مولکولی کم در شرایط محدودیت عناصر غذایی، مانند کمبود فسفر، به ریزوفسفر ترشح می‌شوند. مقادیر زیادی اسید سالسیلیک در نمونه‌های خاک برداشت شده از ریزوفسفر لوبيا و ذرت گزارش شده است (Raskin, 1992). غلظت اسیدهای آلی در خاک ریزوفسفر یا محلول خاک بین ۰/۰۱ تا ۰/۰۱ میکرومولار متغیر است (Strom *et al.*, 2005) نوع و مقدار اسیدهای آلی به منبع کربن و گونه ریزموجودات خاک بستگی دارد. ماهیت اسیدهای آلی مترشحه ریزوفسفرات به کمیت اسیدها اهمیت بیشتری دارد (Sperber, 1985). اسیدهای آلی با جرم مولکولی کم (LMWOAs) نقشی محوری در فرایندهای مختلف - شامل سهولت جذب عناصر غذایی، سمیت‌زدایی فلزی، هوازدگی مینرالی، جذب بیمارگرهای دارند (Hue *et al.*, 1986; Bolan *et al.*, 1994). اسیدهای آلی با وزن مولکولی کم می‌توانند خصوصیات شیمیایی سطح کلوئیدهای خاک‌های با بار متغیر را تغییر دهند و بر جذب سطحی K^+ و NO_3^- و Cl^- در این خاک‌ها مؤثر واقع شوند (Xu *et al.*, 2003; Xu *et al.*, 2004). این اسیدها گروه کربوکسیل و هیدروکسیل زیادی دارند. گروه کربوکسیل اسیدهای آلی باز منفی ایجاد

1. Low Molecular Weight Organic Acids



شکل ۱. تأثیر اسید سالسیلیک بر مقدار جذب فسفر

در خاک های آهکی جذب فسفر عمدهاً تحت تأثیر کربنات کلسیم است؛ اما اسیدهای آلی در نتیجه رقابت بر سر سایت های جذبی در خاک بر واکنش های رسوپ و جذب فسفری تأثیر می گذارند و فراهمی فسفر را افزایش می دهند. افزایش قابلیت استفاده فسفر به سبب اثر مطلوب اسیدهای آلی در افزایش حلالیت فسفر از سنگ فسفات در نتیجه کاربرد اسیدهای آلی (سیتریک، اگزالیک، EDTA) در خاک گزارش شد (Marschner 1995) Xu et al et al., 2003) افزایش مقدار فسفر قابل استفاده با زین و فراهمی فسفر در نتیجه آئینون ها و اسیدهای آلی مترشحه از ریشه گیاهان در خاک لومی شنی را گزارش کردند. Moradi et al. (2011) کاهش پتانسیل جذب فسفر را در سه نوع خاک آهکی از ردۀ اینسپتی سول ها، در حضور اسیدهای آلی با وزن مولکولی کم، گزارش دادند. Hue et al (2008) گزارش کردند مصرف هیومیک اسید حلالیت فسفر را بیش از ۷۰ درصد افزایش می دهد که بیانگر کاهش جذب فسفر به وسیله خاک در حضور اسید هیومیک است.

تأثیر اسید سالسیلیک بر ضرایب معادلات جذب و نیاز استاندارد فسفر

معادله جذب لانگمویر

نخستین بار Olsen and Watanabe (1957) معادله لانگمویر را برای توضیح جذب فسفات در خاک به کار برد. این معادله با فرض ثابت بودن انرژی پیوند، بدون توجه به مقدار فسفر جذب شده، ارائه شد. مزیت اصلی معادله لانگمویر این است که می توان حداکثر جذب فسفر را به وسیله آن تخمین زد. پارامترهای معادله جذب لانگمویر، که نشان دهنده ویژگی های جذب فسفر در خاک مطالعه شده است، در جدول ۲ می آید. مقدار ضریب تبیین (R^2) معادله نشان داد این مدل می تواند ارتباط بین مقدار فسفر جذب سطحی شده با غلظت تعادلی

و qe : مشابه رابطه فوق، K_T و A : ضرایب معادله تمکین که به ترتیب شیب و عرض از مبدأ معادله اند (Xu and Li, 2004).

با استفاده از هم دماهای جذب، شماری از شاخص های جذب سطحی و بافری فسفر خاک به صورت زیر محاسبه گردید: طرفیت بافری حداکثر^۱ که از حاصل ضرب شدت و حداکثر مقدار جذب محاسبه شد عبارت است از شیب حداکثر معادله لانگمویر (Holford, 1979)

$$MBC_L = K_L * q_{max}$$

ظرفیت بافری استاندارد^۲ شیب هم دماهای جذب در غلظت ۰/۳ میلی گرم فسفر در لیتر (Holford, 1979). نیاز استاندارد فسفر^۳: مقدار فسفر جذب شده به وسیله خاک در غلظت ۰/۳ میلی گرم فسفر در لیتر محلول خاک از هم دماهای جذب لانگمویر و فرونديچ و تمکین استخراج شد (Holford, 1979).

برای آنالیز آماری داده ها از نرم افزار SAS و برای رسما نمودارها از نرم افزار EXCEL استفاده شد.

یافته ها و بحث

نتایج تجزیه خاک نشان داد خاک مطالعه شده با ۵۵ درصد رس و با میزان کربنات کلسیم معادل (CCE) ۲۱ درصد جزء خاک های رسی- آهکی است. برخی ویژگی های شیمیایی خاک استفاده شده در آزمایش در جدول ۱ می آید.

جدول ۱. خصوصیات شیمیایی خاک مطالعه شده

فاکتور	آلی (mg/kg)	کربنات کلسیم (cmol/kg)	ظرفیت تبادل کاتیونی (%)	رس (۲۹ < ۵)	معادل (۵۵)	% (۲۱ < ۲)	نیاز (۷/۸)
				۲۹	۵۵	۲۱	۷/۸

مقدار فسفر جذب شده خاک مورد مطالعه با افزایش غلظت فسفر در محلول تعادل افزایش یافت؛ اما در حضور اسید سالسیلیک افزایش میزان فسفر جذب سطحی شده با افزایش غلظت اسید سالسیلیک کاهش یافت. منحنی جذب فسفر در هر سه غلظت اسید سالسیلیک، به ویژه در غلظت ۱۰ میلی مول بر لیتر، به طور معناداری پایین آمد که مبین تأثیر اسید سالسیلیک در کاهش جذب سطحی فسفر و اهمیت اسید مطالعه شده در افزایش فراهمی فسفر است (شکل ۱). واژه جذب فسفر در اینجا به همه فرایندهایی گفته می شود که باعث حذف فسفر از محلول خاک شود (Castro and Torrent, 1998).

1. Maximum Buffering Capacity
2. Standardized Buffering Capacity
3. Standard P Requirement

جدول ۲. برآش داده‌های جذب فسفر با معادله لانگمویر و محاسبه ضرایب آن و نیاز استاندارد فسفر بر اساس معادله لانگمویر (SPR_L)

SPR _L (mg P/kg)	R ² (%)	K _L (L/kg)	q _{max} (mg/kg)	SAL (mmol/L)
۱۶/۴a	۰/۹۹	۰/۲۰a	۳۲۶a	۰
۱۴/۲b	۰/۹۸	۰/۱۸ba	۳۱۹b	۲
۱۳/۸c	۰/۹۹	۰/۱۶b	۳۰۸c	۵
۱۳/۲d	۰/۹۸	۰/۱۴bc	۲۴۶d	۱۰
۳۲	۶	۷	۲۴	CV
۰/۰۹	۰/۰۱۳	۰/۰۳	۱۴	LSD

SAL: غلظت اسید سالسیلیک، q_{max}: حداکثر جذب فسفر لانگمویر، K_L: انرژی جذب لانگمویر، R²: ضریب تبیین معادله لانگمویر، SPR_L: نیاز استاندارد فسفر محاسبه شده بر اساس معادله لانگمویر

معادله جذب فروندلیج

معادله فروندلیج قدیمی‌ترین معادله استفاده شده در بررسی جذب فسفر در خاک است (Barrow, 1978) و بر پایه آن انرژی پیوند^۱ با افزایش میزان جذب به طور نمایی کاهش می‌یابد. ساده‌بودن و پایه‌گذاری بر اساس فرض‌های واقعی‌تر علت برتری این معادله است. ضریب تبیین (R²) معادله نشان داد معادله فروندلیج نیز می‌تواند به خوبی جذب فسفر را توصیف کند (جدول ۳ و شکل ۲). در اغلب مطالعات معادله فروندلیج توانایی بالایی در توصیف جذب فسفر در خاک‌های آهکی داشت. ظرفیت جذب فروندلیج (K_f)، که میزان جذب فسفر در غلظت تعادلی یک میلی‌گرم فسفر بر لیتر است، در حضور اسید آلی از ۵۹ به ۴۶ لیتر در کیلوگرم کاهش یافت که بیانگر افزایش تحرك فسفر و کاهش تعداد مکان‌های جذب فسفر در حضور اسید سالسیلیک است. این نتایج با نتایج Moradi *et al* (2011) مطابقت دارد. حداکثر جذب سطحی فسفر (q_{max}) و ظرفیت جذب فروندلیج (K_f) شاخص‌های کمیت جذب فسفر شناخته می‌شوند (Solis and Torrent, 1989). کاهش این پارامترها بیانگر کاهش مقدار ثبتیت و اشغال‌شدن سایت‌های جذب سطحی به وسیله اسید است. پارامتر n نشان‌دهنده شدت جذب است. برخلاف اغلب مطالعات، که روندی کاهشی و معناداری برای n در حضور مواد آلی گزارش کرده‌اند، در این مطالعه اسید سالسیلیک تأثیری در مقدار n نداشت. برخی مطالعات نشان می‌دهند دقت هم‌دماهی جذب در پیش‌گویی نیاز کودی فسفر به طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر از روش عصاره‌گیری خاک با استفاده از بیکربنات سدیم ۰/۵ مولار است (Samadi and Sepehr, 2013). نیاز استاندارد فسفر محاسبه شده با معادله

فسفر را به خوبی توصیف کند (شکل ۲). با مصرف اسید سالسیلیک پارامترهای معادله لانگمویر کاهشی معنادار یافت. حداکثر جذب فسفر لانگمویر (q_{max}) با افزایش غلظت اسید سالسیلیک از ۳۲۶ به ۲۴۶ میلی‌گرم در کیلوگرم کاهش پیدا کرد (جدول ۲). در اغلب مطالعات بین حداکثر جذب فسفر (q_{max}) و میزان رس، کربنات کلسیم، ماده آلی، و اکسیدهای آهن و آلومینیوم خاک همبستگی مثبت و معنادار گزارش شده است (Borggard *et al*, 1990; Yuan and Lavkulich, 1994; Zhang *et al*, 2005; Sanyal *et al*, 1993) از این رو کاهش حداکثر جذب فسفر در حضور اسید سالسیلیک بیانگر اشغال سایت‌های ثبتیت‌کننده فسفر به وسیله اسید آلی و افزایش فراهمی فسفر است؛ که خود دلیلی بر اهمیت اسیدهای آلی در کاهش مصرف کودهای فسفاته است (Mehadi *et al*, 1990) از حداکثر جذب فسفر به دست‌آمده از معادله لانگمویر برای پیش‌بینی نیاز فسفری گندم استفاده کردند و نشان دادند خاک‌هایی که q_{max} بیشتری دارند به کود فسفاته بیشتری نیازمندند. Masayuki *et al* (2010) نیز تأثیر اسید سیتریک را در کاهش حداکثر جذب سطحی فسفر (q_{max}) در خاک‌های اندی‌سول معنادار گزارش کردند. آن‌ها شاهد ۲۰ تا ۵۰ درصد کاهش جذب سطحی فسفر در حضور اسید سیتریک بودند. Khorshid *et al* (2008) تأثیر لجن فاضلاب را در کاهش حداکثر جذب فسفر در برخی از خاک‌های آهکی معنادار (P<0.01) گزارش کردند. ثابت انرژی پیوند لانگمویر (K_L، که نشان‌دهنده قدرت نگهداری فسفر به وسیله ذرات خاک است، در اثر کاربرد اسید سالسیلیک از ۰/۲۰ به ۰/۱۴ لیتر در میلی‌گرم کاهش یافت. کاهش K_L با افزایش غلظت اسید آلی بیانگر این واقعیت است که با افزایش غلظت اسید سالسیلیک بیون‌های فسفر با قدرت کمتری (نبیوهای الکترواستاتیکی) جذب خاک می‌شوند. یکی از موارد کاربرد ایزوترم‌های جذب برآورد نیاز کودی خاک‌های است (Samadi and Sepehr, 2013). گیاهان از لحظه نیاز به غلظت فسفر در محلول خاک برای رسیدن به حداکثر رشد متفاوت‌اند (Fox and Kamprath, 1970). در این پژوهش با استناد به نتایج Holford (1979) از غلظت ۰/۳ میلی‌گرم فسفر در لیتر محلول خاک استفاده شد. نیاز استاندارد فسفر محاسبه شده از طریق معادله لانگمویر (SPR_L) با افزایش غلظت اسید سالسیلیک از ۱۳/۲ به ۱۶/۴ میلی‌گرم در لیتر کاهش یافت که مشابه نتایجی است که Sepehr and Zabardast (2013) برای خاک‌های آهکی با کاربرد اسید هومیک گزارش کردند. کاهش SPR به معنی افزایش فسفر قابل استفاده گیاه و کاهش نیاز کودی است.

1. Binding energy

عرض از مبدأ معادله تمکین (A) از ۵۹ به ۵۲ میلی گرم در کیلو گرم کاهش یافت که بیانگر کاهش جذب سطحی فسفر در واحد غلظت فسفر و افزایش قابلیت استفاده فسفر برای گیاهان است. شبیه معادله تمکین (K_T) در حضور اسید سالسیلیک از ۶۲ به ۴۶ کاهش یافت. از این روز، اسیدهای آلی با وزن مولکولی پایین فاکتوری بسیار مهم در کاهش پتانسیل جذب فسفر و افزایش فراهمی فسفر برای گیاهان اند. با افزایش غلظت اسید سالسیلیک، مقدار فسفری که باید به وسیلهٔ خاک مورد مطالعه جذب شود تا غلظت 0.3 میلی گرم فسفر در لیتر محلول خود ایجاد کند از ۲۰۶ به ۱۵۲ میلی گرم در لیتر کاهش یافت.

محاسبهٔ شاخص‌های بافری (حداکثر ظرفیت بافری خاک، ظرفیت بافری تعادلی، ظرفیت بافری استاندارد)

از کاربردهای بسیار مهم هم‌دماهای جذب فسفر^۱ تعیین شاخص‌های ظرفیت بافری^۱ خاک‌هاست. ظرفیت بافری فسفر (PBC) یک خاک عبارت است از پایداری آن در برابر تغییرات غلظت فسفر در فاز محلول که یکی از عوامل بسیار مهم کنترل جذب به وسیلهٔ گیاه است (Probert and Moody, 1998). به عبارت دیگر، شبیه هم‌دماهای جذب نشان‌دهندهٔ ظرفیت بافری و شبیه‌های تند بیانگر ظرفیت بافری بالاست (Ozanne and Shaw, 1968). با افزایش غلظت اسید سالسیلیک گنجایش بافری از $58/3$ به $22/2$ میلی لیتر بر گرم کاهش یافت. ظرفیت بافری بیانگر تغییرات فاکتور کمیت (فسفر قابل جذب و ذخیره شده در خاک) به ازای واحد تغییرات در فاکتور شدت (فعالیت فسفر در فاز محلول که به وسیلهٔ آب یا کلرید کلسیم تعیین می‌شود (Fox and Kamprath, 1970)) است. بنابراین، کاهش این شاخص نشان‌دهندهٔ کاهش مقدار جذب سطحی فسفر است. ظرفیت بافری حداکثر (MBC_L) با افزایش غلظت اسید سالسیلیک از $57/6$ به $46/5$ میلی لیتر بر گرم خاک کاهش یافت. این نتایج با نتایج Moradi *et al* (2011)، Moazed *et al* (2010) و Zabardast (2013) مطابقت دارد. در خاک‌هایی با فسفر قابل استفاده یکسان پایین‌بودن MBC بیانگر بالابودن شدت فسفر در محلول خاک است. با کاهش حداکثر ظرفیت بافری در حضور اسید آلی پایداری فسفر خاک در برابر تغییرات فسفر افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، پس از خارج شدن فسفر از فاز محلول^۲ جایگزینی فسفر خارج شده و افزایش فسفر در فاز محلول به مقدار اولیه به راحتی انجام می‌گیرد. شاخص بافری دیگری که در پیش‌بینی قابلیت استفاده می‌گیرد، شاخص بافری دیگری که در پیش‌بینی قابلیت استفاده

1. Buffering capacity indices

فروندلیچ (SPR_F) با افزایش غلظت اسید سالسیلیک از $31/5$ به $24/7$ میلی گرم در لیتر کاهش یافت. معادلهٔ فروندلیچ نیاز استاندارد فسفر را در همهٔ غلظت‌های اعمال شده اسید سالسیلیک دو برابر معادلهٔ لانگمویر محاسبه کرد؛ با این تفاوت که میزان کاهش نیاز استاندارد فسفر با افزایش غلظت اسید سالسیلیک در این مدل بیشتر بود.

جدول ۳. برازش داده‌های جذب فسفر با معادلهٔ فروندلیچ و محاسبهٔ ضرایب آن و نیاز استاندارد فسفر بر اساس معادلهٔ فروندلیچ (SPR_F)

SPR _F (mg P/kg)	R ² (%)	K _F (L/kg)	1/n	SAL (mmol/L)
۳۱/۵a	۰/۹۸	۵۹a	۰/۵۲	.
۲۸/۳b	۱/۰۰	۵۳b	۰/۵۰b	۲
۲۷/۹c	۰/۹۹	۵۲c	۰/۵۰b	۵
۲۴/۷d	۰/۹۸	۴۶d	۰/۵۰b	۱۰
	۱/۴	۶	۲/۳	CV
	۰/۰۹	۰/۰۱۲	۱/۱	۰/۰۲
				LSD

SPR_F: غلظت اسید سالسیلیک، ۱/n: شدت جذب فسفر فروندلیچ، K_F: ظرفیت جذب فروندلیچ، R²: ضریب تبیین معادلهٔ فروندلیچ، SPR_F: نیاز استاندارد فسفر محاسبه شده بر اساس معادلهٔ فروندلیچ

جدول ۴. برازش داده‌های جذب فسفر با معادلهٔ تمکین و محاسبهٔ ضرایب آن و نیاز استاندارد فسفر بر اساس معادلهٔ تمکین (SPR_T)

SPR _T (mg P/kg)	R ² (%)	K _T	A	SAL (mg/kg)	SAL (mmol/L)
۲۰۶a	۱/۰۰	۶۲a	۵۹a	.	
۱۸۴b	۰/۹۹	۵۵b	۵۹a	۲	
۱۸۰c	۰/۹۹	۵۴c	۵۷a	۵	
۱۵۲d	۰/۹۲	۴۶d	۵۲b	۱۰	
	۴/۲	۱۲	۸	۳/۴	CV
	۳/۲	۰/۰۰۲	۰/۹۵	۳/۸	LSD

SPR_T: غلظت اسید سالسیلیک، A: عرض از مبدأ معادلهٔ تمکین، K_T: شبیه معادلهٔ تمکین، R²: ضریب تبیین معادلهٔ تمکین، SPR_T: نیاز استاندارد فسفر محاسبه شده بر اساس معادلهٔ تمکین

معادلهٔ جذب تمکین

در معادلهٔ تمکین، جذب فسفر در خاک تابعی از لگاریتم غلظت تعادلی آن در محلول خاک در نظر گرفته می‌شود. انرژی پیوند با افزایش مقدار جذب به طور خطی کاهش می‌یابد. بالابودن ضریب تبیین (R^2) این معادله بیانگر معتبربودن این معادله در توصیف ارتباط بین فسفر جذب شده و فسفر تعادلی در خاک مطالعه شده است (شکل ۲). پارامترها و ضرایب همبستگی این معادله در جدول ۴ می‌آید. با افزایش غلظت اسید سالسیلیک،

شاخص بافری برای خاک‌ها می‌تواند از طریق تعیین درجه همبستگی این شاخص‌ها با جذب گیاهی تعیین شود.


جدول ۵. تأثیر اسید سالسیلیک بر شاخص‌های بافری

SBCT	SBCF	SBCL	PBCI	MBC	غله‌ت اسید سالسیلیک (mM)
(ml/g)	(ml/g)	(ml/g)	(ml/g)	(ml/g)	
۱۹۸a	۵۴,۵a	۵۱,۹a	۵۸,۳a	۵۷,۶a	•
۱۹۸a	۴۰,۹b	۴۷,۲b	۲۹,۳b	۴۹,۴b	۲
۱۹۱,۷b	۴۸,۶c	۴۳,۹c	۳۹,۳c	۴۸,۲c	۵
۱۷۲,۴d	۴۱,۹d	۴۱,۶d	۲۲,۲d	۴۶,۵d	۱۰
۲۴	۱۲	۸,۴	۱,۲	۲,۳	CV (%)
۰,۲۷	۴,۵	۱,۱۵	۰,۱۲	۰,۳۳	LSD

MBC: حداقل ظرفیت بافری، PBCI: ظرفیت بافری فسفر در غله‌ت اسید سالسیلیک (mM) فسفر در لیتر، SBC_T: میلی‌گرم فسفر در لیتر، SBC_F: بهترین ظرفیت بافری استاندارد محاسبه شده با معادلات لانگمویر و فروندلیچ و تمکین

فسفر خاک برای گیاه استفاده می‌شود ظرفیت بافری استاندارد (SBC) است که شب معادلات جذب فسفر را در غله‌ت تعادلی ۰,۳ میلی‌گرم فسفر در لیتر نشان می‌دهد. با افزایش غله‌ت اسید سالسیلیک شب معادله لانگمویر در غله‌ت ۰,۳ از ۵۱,۹ به ۴۱,۶ میلی‌لیتر در گرم کاهش یافته و ظرفیت بافری استاندارد محاسبه شده با معادله فروندلیچ از ۵۴,۵ به ۴۱,۹ و با معادله تمکین از ۱۹۸ به ۱۷۲,۴ میلی‌گرم در گرم کاهش یافته. کاهش این پارامتر به معنی کاهش جذب فسفر در نتیجه بلوکشدن مکان‌های جذب بهوسیله اسید آلی است که با نتایج مشابه دارد (Sepehr & Zabardast 2013).

ظرفیت بافری استاندارد با استفاده از معادلات لانگمویر و فروندلیچ تقریباً در یک محدوده محاسبه شد. اما معادله تمکین مقدار این شاخص را بیشتر برآورد کرد. با توجه به اینکه معادلات جذب و شاخص‌های بافری متعددی در پیش‌بینی قابلیت استفاده فسفر خاک برای گیاه وجود دارد، بهترین



شکل ۲. برآذش داده‌های جذب با ایزووترم‌های لانگمویر و فروندلیچ و تمکین

اسیدهای آلی از ریشه می‌تواند قابلیت دسترسی فسفر را بالا برده و کارایی مصرف کود را افزایش دهد. همچنین ترشح این اسید به ریزوفسفر کارایی گیاه را در جذب فسفر و توانایی گیاهان را در استفاده از فسفر بومی خاک افزایش می‌دهد. این وضعیت به کاهش مصرف کودهای فسفره و در نتیجه کاهش اثرات زیستمحیطی آن‌ها منجر می‌گردد.

نتیجه‌گیری

نتایج این پژوهش نشان داد کاربرد اسید سالسیلیک در خاک آهکی باعث تغییر ویژگی‌های جذب فسفر و فسفر قابل استفاده می‌شود. با افزایش غلظت اسید سالسیلیک میزان جذب فسفر به وسیله ذرات خاک و نیاز استاندارد فسفر (SPR) به طور معنادار کاهش یافت. بنابراین مصرف اسید سالسیلیک همراه کودهای فسفره یا اصلاح ژنتیکی گیاهان برای ترشح بیشتر

REFERENCES

- Barrow, N. J. (1978). Description of phosphate adsorption curves, *Journal Soil Science*, (29), 447-462.
- Bolan, N. S., Naidu, R., Mahimairaja, S., and Baskaran, S. (1994). Influence of low molecular – weight organic acids on the solubilization of phosphate, *Biology and Fertility of Soils*, (18), 311-319.
- Borggaard, O. K., Jorgensen, S. S., Moberg, J. P., and Raben-Lange, B. (1990). Influence of organic matter on phosphate retention by aluminum and iron oxides in sandy soils, *Journal Soil Science*, (41), 443–449.
- Castro, B., and J. Torrent. (1998). Phosphate sorption by calcareous Vertisols and Inceptisols as evaluated from extended P-sorption curves. *European Journal Soil Science*. (49), 661-667.
- Dinkelaker, B., Romheld, V., and Marschner, H. (1989). Citric acid excretion and precipitation of calcium citrate in the rhizosphere of white lupin (*Lupinus albus L.*), *Plant Cell & Environment*, 12 (3), 285-292.
- El-Tayba, M. A. (2005). Response of barley grains to the interactive effect of salinity and salicylic acid, *Journal Soil Science*, 12 (53), 654-668.
- Fox, R. L., and Kamprath, E. J. (1970). Phosphate sorption isotherms for evaluating the phosphate requirement of soils. *Soil Science Society of America Proceeding*, (34), 902- 907.
- Gardner, WK., Parbery, DG., and Barber, DA. (1982). The acquisition of phosphorus by *Lupinus albus L.*: the effect of varying phosphorus supply and soil type on some characteristics of the soil/root interface, *Plant Soil*, (68), 33-41.
- Grotz, N., and Guerinot, M. L. (2002). Limiting nutrients: An old problem with new solutions, *Guerinot, Plant Biology*, (5), 158-163.
- Halford, I. C. R. (1979). Evaluation of Soil Phosphate Buffering Indices, *Australian Journal Soil Research*, (17), 495-504.
- Hua, Quan-Xian, Li Jian-Yun, Zhou Jian-min, Wang Huo-Yan, Du Chang-Wen and Chen Xiao-Qin. (2008). Enhancement of Phosphorus Solubility by Humic Substances in Ferrosols, *Soil Science Society of China*, 18 (4), 533-538.
- Jones, D. L., Dennis, P. G., Owen, A. G. & Hees, P. A. W. (2003). Organic acid behavior in soils – misconceptions and knowledge gaps. *Plant and Soil*, (248), 31-41.
- Khan, A. A., Jilani, G., Akhtar, M. S., Naqvi S. M. S., and Rasheed., M. (2009). Phosphorus solubilizing bacteria: Occurrence, mechanisms and their role in crop production, *Journal Agricultural Biological Science*, 1 (1), 48-58.
- Kang, C., Wang, Ch. (2003). Salicylic acid changes activities of H₂O₂ metabolizing enzymes and increases the chilling tolerance of banana seedlings. *Environment and Experimental Botany*, 9-15.
- Khorshid, M., Hosseinpur, A. s., And Oustan, Sh. (1387). Impacts of sewage sludge on phosphorus sorption characteristics and availability in some calcareous soils, *Journal of Science and Technology Agriculture and Natural Resources*, 7 (46), 791-802, (In Farsi).
- Marschner, H. (1995). "Mineral Nutrition of Higher Plants", 2nd ed. Academic press, London.
- Masayuki, Tani., Kunimoto, A., Taku K., and Masanori , K, (2010). Effect of organic ligands on phosphate and availability in Andisols of eastern Hokkaido, *Japan Soil Science*, 2 (32), 56-71.
- Mehadi, A. A., Taylor R. W., and Shuford J. W. (1990). Prediction of fertilizer phosphate requirement using the Langmuir adsorption maximum, *Plant Soil*, (122), 267-270.
- Moradi, N., and Rasouli Sadaghiani, H., Sepehr, E., Abdollahi, B. (1390). Effects of low-molecular weight organic acids on phosphorus sorption in some calcareous soils, *Iranin Journal of Soil and Water Research*, 2 (42), 233-239, (In Farsi).
- Moazed, H., Hoseini, Y., Naseri, A. A., and Abbasi, F., (2010). Determining Phosphorus adsorption isotherm in soil and its relation to soil characteristics. *International Journal of Soil Science*, 5(3), 131-139.
- Olsen, S. R., and Watanabe, F. S. (1957). A method to determine a phosphorus adsorption maximum of soils as measured by the langmuir isotherm, *Soil Science Society of America Proceeding*, (21), 144-149.
- Ozanne, P. G., and Shaw, T. C. (1968). Advantages of the recently developed phosphate sorption test over the older extractant methods for soil phosphate, In: Transactions of the 9th International Congress of Soil Science, Adelaide, Australia *International Society of Soil Science*, (2), 273-280.

- Probert, M. E., and Moody, P. W. (1998). Relating phosphorus quantity, intensity and buffer capacity to phosphorus uptake, *Australia Journal Soil Research*, (36), 389- 393.
- Popova, L., Ananieva, V., Hristova, V., Christov, K., Georgieva, K., Alexieva, V., and stoanova, Zh. (2003), Salicylic acid- and Methyl jasmonate-induced protection on photosynthesis to paraquat oxidative stress. *Bulgarian Journal Plant Physiology Special Issue*, 133-152.
- Paul, E.A., (2007). Soil Microbiology, Ecology and Biochemistry. 3ed Edition. Academic Press is an imprint of Elsevier.
- Raghothama, K. G., Karthikeyan, A. S. (2005). Phosphate acquisition, *Plant Soil*, 274(1), 37-49.
- Ryan, P., Delhaize, E., and Jones, D. (2001). Function and mechanism of organic anion exudation from plant roots, *Annual Review Plant Biology*, (52), 527-560.
- Raskin, I. (1992) Role of salicylic acid in plants. *Annual Review Plant Physiology*, 439-463.
- Samadi, A. and E. Sepehr. (1392). Validation of a regression model obtained from phosphorous adsorption isotherms for P fertilizer recommendation in cereals. *Journal of Science and Technology*, 17 (65): 173-184, (In Farsi).
- Sanyal, S. K., Datta, D. e., and Chan, P. Y. (1993). Phosphate sorption- desorption behavior of some acidic soils of South and Southeast Asia, *Soil Science Society American Journal*, (57), 937- 945.
- Sepehr, E., and R. Zabardast. (1392). Effect of Humic Acid on Adsorption Behavior of P in a Calcareous Soil. *Journal of Water and Soil*. 27, (4): 720-731, (In Farsi).
- Sepehr, E., Malakouti, M.J., Khodbarin, B., Karimian, N.J., and Samadi, A. (2009). Genotypic Variation in P efficiency of selected Iranian cereals. *International Journal of Plant Production*. 3(3): 17-28.
- Sperber J. I. (1985). Incidence of apatite solubilizing organisms in the rhizosphere. *Australian Journal Agricultural Research*, (9), 778-781.
- Sperber, J. I. (1998). The incidence of apatite solubilizing organisms in the rhizosphere and soil, *Australian Journal of Agricultural Research*, (9), 778-781.
- Simeoni, M. A., Batts, B. D., and McRae, C. (2003). Effect of groundwater fulvic acid on the adsorption of Arsenate by ferrihydrite and gibbsite, Apple, *Geochemistry*, (18), 1507-1515.
- Solis, P., and Torrent, J. (1989). Phosphate sorption by calcareous Vertisols and Inceptisols of spain, *Soil Science Society American Journal*, (53), 456-459.
- Ström, L., Owen, A. G., Godbold, D. L., and Jones, D. L. (2005). Organic acid behaviour in a calcareous soil implications for rhizosphere nutrient cycling, *Soil Biology and Biochemistry*, 37 (11), 2046- 2054.
- Toor, G. S., and Bahl, G. S. (1997). Effect of solitary and integrated use of poultry manure and fertilizer phosphorus on the dynamics of P availability in different soils. *Bioresource Technology*, (62), 25- 28.
- Vance, C. P., Uhde-Stone, C., and Allan, D. L. (2003). Phosphorus acquisition anduse: critical adaptations by plants for securig a nonrenewable resource, *New Pytologist*, (157), 423-447.
- Xu, R. K., Zhao, A. Z., and Ji, G. L. (2003). Effecte of anions of low molecular weight organic aniones on surface charge of variable charge soils, *Journal of Colloid and Interface Science*, (264), 322-326.
- Xu, R. K., Yang, M. L., Wang, Q. S., & Ji, G. L. (2004). Effect of low molecular weight organic acids on the adsorption of Cl⁻ by variable charge soils. *Pedosphere*, *Journal of Colloid and Interface Science*, (14), 405-408.
- Yuan, G., and Lavkulich, L. M. (1994). Phosphate sorption in relation to extractable iron and aluminum in Spodosols, *Soil Science Society Americna Journal*, (58), 343-346.
- Zhang, H., Schroder, J. L., Fuhrman, J. K., Basta, N. T., Storm, D., and Payton, M. E. (2005). Path and multiple regression analyses of phosphorus sorption capacity as affected by soil properties, *Soil Science Society American Journal*, (69), 96- 106.