

گزارش آفت جدید *Cydalima perspectalis* (Walker, 1859) (Lepidoptera: Crambidae) از ایران

سمیرا فراهانی^{۱*}، رسول امید^۲، منصور صالحی^۳، محمدرضا عارفی پور^۴

^۱*- نویسنده مسئول، استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

پست الکترونیک: s.farahani@rifr.ac.ir

- مری پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

- کارشناس ارشد، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

- کارشناس ارشد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

تاریخ دریافت: ۹۵/۰۵/۲۴ تاریخ پذیرش: ۹۵/۰۶/۱۰

چکیده

شب پره شمشاد، (*Cydalima perspectalis* (Walker, 1859)، آفت بومی درختان شمشاد در نواحی نیمه گرمسیری آسیای شرقی می باشد که سال ۲۰۰۷ به اروپا وارد شده است. سنین مختلف لاروی و پیش شفیره های شب پره شمشاد از تیر تا اواسط مرداد ۱۳۹۵ از روی گونه شمشاد خزری *Buxus hyrcana* Pojark. در استان گیلان جمع آوری شد. خسارت آفت در مناطق مورد مطالعه بسیار شدید بود. لاروهای *Cydalima perspectalis* از برگ ها و پوست شاخه ها تغذیه می کنند. سر در لارو سن آخر سیاهرنگ و برآق، رنگ بدن سبز با دو نوار طولی ضخیم سیاه و نوارهای باریک سفید در طرفین بدن و در سطح پشتی دارای خالهای سیاه با حاشیه سفید می باشد. طول شفیره حدود ۲ سانتی متر است. شفیره ها در لابلای برگها و شاخه ها تشکیل می گردد. حشرات کامل بوسیله مورفولوژی خارجی به راحتی قابل شناسایی می باشند. عرض بدن با بالهای باز در حشرات کامل تقریباً ۴ سانتی متر و بالهای به طور کامل قهوه ای رنگ و دارای لکه سفیدرنگ در ناحیه دیسکال بال جلو می باشند. این مقاله اولین گزارش از این آفت و خسارت آن روی میزبان *B. hyrcana* در ایران می باشد. انتظار می رود این آفت به سرعت در رویشگاه های شمشاد در شمال کشور گسترش یابد بنابراین انجام بررسی های بیشتر در این خصوص ضروری به نظر می رسد.

واژه های کلیدی: شب پره شمشاد، *Cydalima perspectalis*، جدید، شمال ایران

معرفی شده است (Mally & Nuss, 2010). این آفت بومی آسیای شرقی (کشورهای چین، ژاپن، تایوان، کره، بخش هایی از شرق روسیه و هند) می باشد. اولین گزارش آن از اروپا در سال ۲۰۰۷ از جنوب غربی کشور آلمان بود (Krüger, 2008) و از آن زمان به بعد، به تدریج

شب پره شمشاد، (*Cydalima perspectalis* (Walker, 1859)، از آفات مهم شمشاد محسوب می شود که در منابع قدیمی ممکن است با نام های متراծ *Diaphania Phakellura*, *Glyphodes perspectalis*، *perspectalis* *Neoglyphodes perspectalis* و *perspectalis* *Neoglyphodes* نیز

یک تا چهار نسل در سال بسته به دمای محیط متفاوت است (Nacambo *et al.*, 2014). تعداد نسل این آفت در کشور چین (زیستگاه اصلی) سه تا پنج نسل گزارش شده است (Wan *et al.*, 2014). زمستان گذرانی این آفت به صورت لارو سنین مختلف (بخصوص لارو سن سوم) می‌باشد (Székely *et al.*, 2011).

خسارت شب پره شمشاد بوسیله لاروها صورت می‌گیرد و لاروهای سنین آخر به دلیل حجم بالای تغذیه خسارت قابل توجهی را وارد می‌سازند و باعث می‌شوند درخت کاملاً عاری از برگ شود. لذا شناسایی و مشخص شدن نقاط پراکنش در کشور و همچنین پایش مستمر می‌تواند در جلوگیری از گستردگی شدن این آفت به سایر ذخیره‌گاه‌های شمشاد مفید باشد.

در این ارتباط، چند ذخیره‌گاه شمشاد جنگلی در غرب و شرق استان گیلان مورد پایش قرار گرفت (جدول ۱). فعالیت این آفت در شمشادستانهای شرق استان گیلان (مناطق چایجان، سرولات، سورخانی، اوشیان، چشمه دمکش با شدت زیاد و منطقه چاشت خور لات، سیاهکلرود و جواهردشت با شدت کمتر) و همچنین توده های شمشاد در غرب استان گیلان (ذخیره‌گاه جنگلی دکتر درستکار، لطین، سیاهبیل، خاله سرا، پیر هرات، خانه‌های آسیاب و لوندویل آستارا) ثبت شده است. خوشبختانه طی بازدیدهای بعمل آمده، شمشادهای منطقه دوران واقع در کیلومتر ۵ جاده جنگلی پونل به ارده فاقد آلودگی بودند. این اولین گزارش از خسارت این آفت از استان گیلان و میزبان (روی شمشاد گونه *B. hyrcana*) در دنیا می‌باشد.

درخت مورد حمله آفت از منظره دور حالت خشک شده به خود می‌گیرد (شکل ۱). لاروها در ابتدا شروع به خوردن برگ‌ها می‌کنند (شکل ۲ الف) و بعد از اینکه پوشش برگی از بین رفت شروع به تغذیه از پوست شاخه‌ها می‌نمایند (شکل ۲ ب).

دامنه پراکنش آفت گسترده‌تر شد، بطوریکه در همان سال از کشور سوییس، در سال ۲۰۰۸ از کشورهای بریتانیا، هلند و فرانسه، در سال ۲۰۰۹ از کشور اتریش (van derStraten & Muus, 2010) و در سال ۲۰۱۱ از کشور رومانی (Székely *et al.*, 2011) گزارش شد. این آفت سال ۲۰۱۲ از بخش اروپایی ترکیه (نژدیک استانبول) نیز گزارش گردید (Hizal *et al.*, 2012).

Székely و همکاران (۲۰۱۱) علت گسترش این آفت را هم بصورت طبیعی (مهاجرت) و هم با وارد کردن گیاهان آلوده (گیاهان جنس *Buxus*) عنوان کرده‌اند. پروانه برگخوار شمشاد در طول آماده سازی دهکده المپیک در سال ۲۰۱۲، از ایتالیا به منطقه قفقاز و جنوب روسیه به همراه شمشادهای آلوده منتقل شد. تخم‌ها و لاروهای تازه تفریخ شده به سختی قابل دیدن هستند و این عامل بسیار مساعدی برای جابه‌جایی و انتقال به مکان‌های جدید می‌باشد. همچنین حشرات کامل، پرواز کننده‌های قوی هستند و به طور طبیعی حدود ۵ تا ۱۰ کیلومتر در van der Straten & Muus, (2010).

طبق مطالعاتی که روی گیاهان میزبان این شب پره در کشور چین و ژاپن به عمل آمده است، سه خانواده گیاهی شامل *Ilex purpurea* Hasskarl (Aquifoliaceae) خانواده *Buxaceae* (شامل گونه‌های مختلف جنس *Euonymus*) (Celastraceae) و خانواده *Buxus* (از *E. alatus* (Thunberg) و *japonicus* Thunberg) از میزبان‌های اصلی این حشره می‌باشد (Wan *et al.*, 2014). بنابر گزارش Mally & Nuss (2010) از میزبان‌های گیاهی این آفت را بیشتر گونه‌های جنس *B. sempervirens* *B. microphylla* *B. sinica* و *B. perspectalis* تشکیل می‌دهند.

مطالعات اندکی روی بیولوژی *C. perspectalis* صورت گرفته است، به طوریکه در منابع اشاره شده است این آفت در کشور آلمان دو یا سه نسل در سال دارد

جدول ۱- مناطق نمونه برداری و پایش آفت *Cydalima perspectalis* در استان گیلان

منطقه	مختصات جغرافیایی	میزان آلدگی
رودسر، چابکسر، روستای چایجان	37°01 N, 50°27 E, 09 m	آلدگی شدید-سمپاشی شده
سیاهکلرود، دوآب	36°57 N, 50°26 E, 464 m	مشاهده یک لارو (در معرض تهدید)
اوشیان	36°58 N, 50°30 E, 63 m	آلدگی شدید-سمپاشی شده
گیسوم، پارک جنگلی دکتر درستکار	37°38 N, 49°01 E, 55 m	آلدگی شدید
لطین، سیاه بیل،	37°39 N, 48°59 E, 93 m	آلدگی شدید
سیاه بیل، پیرهرات	37°40 N, 48°57 E, 119 m	آلدگی شدید
رضوانشهر، پونل، جاده دوران	37°31 N, 49°02 E, 216 m	بدون آلدگی
خانه های آسیاب	38°33 N, 48°47 E, 91 m	آلدگی شدید
لوندویل	37°21 N, 48°55 E, 51 m	آلدگی شدید

شکل ۱- نمای ظاهری درختان شمشاد جنگلی (*Buxus hyrcana*) خسارت دیده از شب پره شمشاد (*Cydalima perspectalis*) در جنگل سیاه بیل

رنگ بدن لاروهای سنین بالاتر سبز با نوارهای ضخیم سیاه و نوارهای باریک سفید در طرفین بدن و در سطح پشتی دارای خالهای سیاه با حاشیه سفید می‌باشد. سطح بدن لاروها دارای مو است. اندازه بدن لارو سن آخر $\frac{3}{8}$ تا

حشره بالغ شب پره *C. perspectalis*، تخم‌های نیمه شفاف خود را در دسته‌های ۸ تا ۱۸ تایی در سطح زیرین برگ‌های شمشاد قرار می‌دهد که با گذشت زمان رنگ آن تیره می‌شود که تشکیل کپسول سر لاروی را نشان می‌دهد.

حاشیه ضخیم قهوه‌ای رنگ هستند و در بعضی دیگر بال‌ها به طور کامل قهوه‌ای با جلای فلزی می‌باشد. بال‌های جلو در هر دو فرم دارای یک لکه سفید مرکزی است (شکل ۳ ب). عرض بدن با بال‌های باز $3/8$ تا $4/0$ سانتی‌متر می‌باشد. انتهای شکم در حشرات نر تیزتر و دارای مو بوده ولی در حشرات ماده شکم حجمی‌تر و در انتهای شکم یک سوراخ وجود دارد.

۴/۵ سانتی‌متر می‌باشد. شفیره در بین شاخه‌ها و برگ‌های خورده شده در شبکه‌ای از تارهای سفید تشکیل می‌شود. شفیره تازه تشکیل شده سبز رنگ است که در سطح پشتی دارای دو نوار قهوه‌ای می‌باشد (شکل ۳ الف). به تدریج شفیره‌ها، قهوه‌ای رنگ می‌شوند. اندازه بدن شفیره به طور متوسط تقریباً $2/0$ سانتی‌متر می‌باشد. در جمعیت معمولاً دو فرم شکلی وجود دارد. بعضی افراد دارای بالهای سفید با



شکل ۲- لارو *Cydalima perspectalis*, الف) در حال تغذیه از برگها، ب) در حال تغذیه از پوست شاخه‌ها



شکل ۳- شفیره و حشره کامل *Cydalima perspectalis*, الف) شفیره، ب) حشره کامل

- (Lepidoptera: Crambidae). Entomologische Zeitschrift, 118: 81-83.
- Mally, R. and Nuss, M., 2010. Phylogeny and nomenclature of the box-tree moth, *Cydalima perspectalis* (Walker, 1859) comb. n., which was recently introduced into Europe (Lepidoptera: Pyralidae: Crambidae: Spilomelinae). European Journal of Entomology, 107: 393-400.
- Nacambo, S., Leuthardt, F.L.G., Wan, H., Li, H., Haye, T., Baur, B., Weiss, R.M. and Kenis, M., 2014. Development characteristics of the box-tree moth *Cydalima perspectalis* and its potential distribution in Europe. Journal of Applied Entomology, 138: 14-26.
- Székely, L., Dinc, V. and Juhász, I., 2011. Macrolepidoptera from the steppes of Dobrogea (south-eastern Romania). Phegea, 39 (3): 85-106.
- van der Straten, M.J. and Muus, T.S.T., 2010. The box tree pyralid, *Glyphodes perspectalis* (Lepidoptera: Crambidae), an invasive alien mot ruining box trees. Proceedings of the Netherlands Entomological Society Meeting, 21: 107-111.
- Wan, H., Haye, T., Kenis, M., Nacambo, S., Xu, H., Zhang, F. and Li, H., 2014. Biology and natural enemies of *Cydalima perspectalis* in Asia: Is there biological control potential in Europe? Journal of Applied Entomology, 138: 715-722.

لازم است آزمایش‌های کنترل بیولوژیک با گونه‌های تریکوگرامی موجود در کشور و با در نظر گرفتن امکان بکارگیری آن در جنگل‌ها انجام شود. انتظار می‌رود این آفت به دلیل قدرت پرواز بالا و چند نسلی بودن آن در سال، به سرعت در تمام رویشگاه‌های این گونه در ناحیه رویشی هیرکانی گسترش یابد بنابراین نیاز به بررسی‌های بیشتر در کنترل آن ضروری به نظر می‌رسد. همچنین باید بیولوژی و رفتارشناسی این آفت در کشور بررسی شود تا بتوان بهترین زمان مبارزه و روش را به کار برد.

منابع مورد استفاده

- Hizal, E., Kose, M., Yesil, C. and Kaynar, D., 2012. The new pest *Cydalima perspectalis* (Walker, 1859) (Lepidoptera: Crambidae) in Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 11(3): 400-403.
- Korycinska, A. and Eyre, D., 2009. Box tree caterpillar *Diaphania perspectalis*. Fera Plant Pest and Disease Factsheets, The Food and Environment Research Agency, UK.
- Krüger, E.O., 2008. *Glyphodes perspectalis* (Walker, 1859)-neu für die fauna Europas