



تجزیه و تحلیل ژنتیکی ناحیه سیتوکروم b در مرغ بومی خراسان

محمد رضا نصیری^۱، زهرا رودباری^{۲*}^۱دانشیار گروه علوم دامی و پژوهشکده زیست فناوری، دانشگاه فردوسی مشهد^۲دانشجوی مقطع دکتری، گروه علوم دامی، دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۰۴/۱۶، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۰۳/۰۴

چکیده

حفظ تنوع ژنتیکی در جمعیت مرغان بومی به عنوان سرمایه ملی و کوچک بودن اندازه جمعیت آنها بسیار حائز اهمیت است. بررسی توالی نوکلئوتیدی ناحیه سیتوکروم b میتوکندری در بین نژادها یا در درون آنها می‌تواند شاخص مناسبی از میزان تنوع موجود در جمعیت های مورد مطالعه باشد. هدف از پژوهش اخیر، بررسی ژنتیکی و فیلوژنتیکی توالی نوکلئوتیدی ناحیه سیتوکروم b از ژنوم میتوکندری مرغ بومی خراسان است. بدین منظور از ۵ قطعه مرغ بومی خراسان نمونه خون جمع آوری گردید. پس از استخراج DNA، تکثیر قطعه ۸۵۸ جفت بازی ناحیه سیتوکروم b میتوکندری توسط آغازگرهای اختصاصی انجام گرفت. قطعات تکثیر شده پس از خالص سازی به صورت رفت و برگشت توالی یابی شدند. تعداد ۲ هاپلوتیپ مختلف بر اساس ۲ نوکلئوتید چند شکل موجود در توالی ها تعیین گردید. توالی های نهایی بدست آمده از هر هاپلوتیپ با طول تقریبی ۷۸۰ جفت باز که شامل ۲۶/۲۵ درصد آدنین، ۱۲/۵۷ درصد گوانین، ۳۶/۳۶ درصد سیتوزین، ۲۳/۸۲ درصد تیمین بود. نتایج فیلوژنتیکی با استفاده از روش UPGM نشان داد، که مرغ بومی خراسان در گروه مرغان آسیایی قرار می گیرد و کمترین فاصله ژنتیکی با مرغ بومی چین دارد.

کلمات کلیدی: فیلوژنی، سیتوکروم b، مرغ بومی خراسان، ژنوم میتوکندری

مقدمه

بودن، عدم وجود نوتروکیبی در آنها، امکان تکثیر با استفاده از آغازگرهای اختصاصی و توالی یابی نواحی حفاظت شده و نواحی حفاظت نشده که برای مطالعات تکاملی گونه‌ها وابسته می‌باشد اشاره نمود (Bellagamba *et al.*, 2001). بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیتها با استفاده از ژنوم میتوکندری از سال ۱۹۷۹ شروع شد. از آن زمان به بعد مطالعات تئوری و تجربی این مولکول بسیار متغیر به داشت ما درباره جمعیتهای جانوری افزوده است و مقایسه توالی‌های مناطق مختلف ژنوم میتوکندری به دلیل سرعت بالای تکامل ژنوم میتوکندری در مقایسه با ژنوم هسته شواهدی را در مورد تنوع ژنتیکی و منشا تکاملی گونه‌ها فراهم می‌نماید (Lolai., 2001). اولین ۱۶۷۷۵ توالی کامل ژنوم میتوکندری مرغ به طول Cty-b (Desjardins & Morais, 1990) با کد دستری (X52392.1) گزارش گردید. در مطالعات توالی Kornegay (Cyt-b در ۹ گونه پرنده‌گان) (Crowe *et al.*, 1992) گزارش شامل ۱۳ ژن کد کننده زنجیره تنفسی، ۲۲ ژن کد مطالعه دیگری توالی ناحیه Cyt-b میتوکندری به طول ۱۱۴۰ جفت باز در مرغ بومی ژاپن نژاد Chuncky که متعلق به لاین تجاری کورنیش است، بررسی و روابط فیلوجنتیک و

نژادهای بومی هر کشور به عنوان یک سرمایه ملی و محصول استراتژیک مطرح می‌باشد، پرورش و نگهداری مرغ‌های بومی در بهبود اقتصاد خانوارهای روستایی اهمیت زیادی دارد، لذا حفظ و تکثیر این نژادها ضرورت دارد. مرغ‌های بومی بعضی از ذخیره ژنتیکی هستند که شناخت دقیق‌تر و کسب اطلاعات بیشتر در مورد آنها به جهت حفظ ذخایر ژنتیکی برای نسل‌های آینده نیز ضروری به نظر می‌رسد. یکی از کاربردی ترین راههای شناسایی این نژادها استفاده از تکنیک مولکولی به خصوص استفاده از ژنوم میتوکندریایی (mtDNA) است که اساس اینگونه تحقیقات بر پایه استخراج DNA، خالص سازی محصولات PCR و توالی یابی می‌باشد (Pirani *et al.*, 2010). میتوکندری اندامکی سیتوپلاسمی است، که در بیشتر سلول‌های بدن وجود دارند. این اندامک قادر به تولید انرژی برای سلول است. دارای DNA حلقوی اختصاصی و مستقل از DNA هسته‌ای است و در گونه‌های جانوری ۳۷ ژن را کد می‌کند، که شامل ۱۳ ژن کد کننده زنجیره تنفسی، ۲۲ ژن کد کننده tRNA و ۲ ژن کد کننده rRNA است و طول تقریبی آن در طیور ۱۶ هزار جفت باز می‌باشد (Mohammadi Pestehbig *et al.*, 2011). از مزایای mtDNA می‌توان به بیش از هزار نسخه به ازای هر سلول، کوچک بودن اندازه آن نسبت به DNA ژنومی، وراثت پذیری مادری، هاپلوئید

درجه نگهداری شد. استخراج DNA با استفاده از کیت GenNet صورت گرفت. کمیت و کیفیت DNA استخراج شده به روش طیف سنجی با Nano Drop-ND ۲۰۰۰ شرکت Thermo آمریکا سنجیده شد. طراحی آغازگر برای تکثیر بخشی از توالی ژن mtDNA Cyt-b Primer از Premier Biosoft, USA) premier ۵ کامل میتوکندری مرغ اهلی (شماره دسترسی X52396 Forward ۵'- CGC CCT CAC AAT CCT TAC AAC - ۳' Reverse ۵'- GTT TGA TAT GTG GGG GGG TTA C- ۳'

سپس، با استفاده از روش BLAST موجود در پایگاه بانک جهانی ژن (NCBI)، میزان همپوشانی آنها با توالی های موجود، مقایسه گردید. واکنش زنجیره ای پلیمراز برای تکثیر قطعه ۸۵۸ جفت بازی ناحیه ژنی Cyt-b از Biometra mtDNA توسط دستگاه ترموسایکلر T-personal براساس روش استاندارد انجام گرفت. اجزای واکنش PCR در حجم نهایی ۲۵ میکرولیتر شامل ۱۰۰ mM Tris-HCL(PH 8.8)، ۱ واحد آنزیم *Taq* پلیمراز، ۰/۲mM *MgCl₂*، ۱/۵ mM dNtp اختصاصی ژن و ۱۰۰ نانوگرم از DNA هدف که با استفاده از برنامه حرارتی و اسرشت سازی در دمای ۹۴ درجه سانتیگراد برای ۳۰ ثانیه، اتصال در دمای ۵۷ درجه برای ۳۰ ثانیه، تکثیر در دمای ۷۲ درجه برای ۴۵ ثانیه، یک مرحله و اسرشت

مسیر و منشأ مادریشان مورد بررسی قرار گرفتند. در مطالعه فوق ۹ عدد SNP از ۱۸ هاپلوتیپ از ۷ گروه هاپلوئیدی مشخص شد (Shen *et al.*, 2002). پژوهشی که بر روی ژنوم میتوکندری ۱۴۰ پرنده از زیر گونه های مرغ جنگلی انجام گرفت ۴۴ عدد SNP از ۴۲ هاپلوتیپ از ۶ گروه هاپلوئیدی شناسایی گردید (Silva *et al.*, 2008). Mohammadabadi *et al.* (2010) جهت بررسی تنوع ژنتیکی در بین سه نژاد مرغ بومی خراسان از چهار مارکر ریزماهواره استفاده کردند و گزارش کردند که این جمعیت مورد مطالعه با توجه به هetroزیگوتی مورد انتظار و مشاهده شده از تنوع بالایی برخوردار است. هدف از مطالعه اخیر بررسی و تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوجنتیکی ناحیه Cyt-b از DNA میتوکندریایی مرغ بومی خراسان است تا اطلاعاتی از وضعیت توالی این ناحیه از ژنوم میتوکندری این نژاد بدست آورده و ضمن مقایسه با سایر نژادها توالی بدست آمده برای این توده بومی در بانک جهانی ژن ثبت شود.

مواد و روش ها


نمونه های خون مرغان بومی خراسان از بانک خون گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی که بانک ژنومی ایران نیز می باشد، تهیه و تعداد ۵ نمونه خون با اطمینان از عدم رابطه خویشاوندی بین نمونه ها انتخاب گردید. نمونه های خون تا زمان استخراج در لوله های حاوی EDTA در فریزر در دمای -۲۰

با استفاده از رویه UPGMA توالی های هم ردیف شده، به کمک نرم افزار MEGA (Tamura *et al.*, 2011) ترسیم گردید. تعیین هاپلوتیپ ها از رویه Disparity Index Analysis نرم افزار MEGA5 استفاده گردید.

نتایج و بحث

استخراج DNA از تمام نمونه ها با موفقیت انجام گرفت. نتایج طیف سنجی نشان داد که DNA استخراج شده از کیفیت مناسبی برخوردار است. الکتروفورز محصولات تکثیر شده بر روی آگارز ۱ درصد نشان داد که آغازگرهای طراحی شده به خوبی فعالیت نموده و قطعه اختصاصی برای سیتوکروم b به طول ۸۵۸ جفت باز تکثیر نمودند (شکل ۱).

سازی اولیه در دمای ۹۴ درجه سانتیگراد برای ۵ دقیقه و یک مرحله تکثیر نهایی در دمای ۷۲ درجه برای ۱۰ دقیقه در ۳۵ سیکل تکثیر شد. الکتروفورز محصولات واکنش زنجیره ای پلیمراز بر روی ژل آگارز ۱ درصد و رنگ آمیزی ژل با اتیدیوم بروماید صورت گرفت. مقدار ۱۰۰ میکرولیتر از محصول واکنش زنجیره ای پلیمراز، خالص سازی شد و به همراه ۵۰ میکرولیتر از هر یک از آغازگرهای رفت و برگشت مورد استفاده با غلظت ۱۰ پیکامول به منظور تعیین توالی به شرکت MacroGen کره جنوبی ارسال گردید. این نمونه ها با استفاده از دستگاه ABI 3130 به روش اتوماتیک سانگر توالی یابی شدند. سپس با استفاده از ابزار قدرتمند BLAST و رویه blastn در پایگاه NCBI میزان همولوژی توالی های بدست آمده سنجیده شد. به منظور بررسی رابطه فیلورنیکی نژادهای مورد مطالعه، نمودار درختی



شکل ۱- الکتروفورز محصولات PCR به طول ۸۵۸ جفت باز روی ژل آگارز ۱ درصد.

Figure 1- Electrophoresis of 858 bp PCR Products on 1/5 % Agarose gel.

بسیار پایین کنار گذاشته شد و در آنالیز مورد استفاده قرار نگرفت. قطعه ۸۵۸ بدست آمده از توالی یابی، ویرایش و قطعه ۷۸۰ جفت بازی در

تعیین توالی قطعه ۸۵۸ جفت بازی سیتوکروم b برای هر پنج نمونه انجام گرفت، اما نتایج حاصل از یکی از نمونه ها به علت کیفیت

آمینه ای رخ نداده بود. همچنین، در مقایسه توالی مرغ لگهورن در این مطالعه با توالی مرغ لگهورن (شماره دسترسی AP003580) در دو جایگاه چندشکلی جانشینی و در دو جایگاه حذف و جایگزینی رخ داده است، که این تغییرات سبب تغییر اسیدآمینه ای نشده بودند و در مقایسه توالی مرغ لگهورن با پلیموت راک سفید ۳ جایگاه چندشکل جانشینی و ۳ جایگاه حذف و جایگزینی مشاهده گردید، که این تغییرات سبب تغییر جایگزینی در توالی اسیدآمینه شدند.

مقایسه توالی نوکلئوتید های ۴ نمونه مرغ Disparity Index Tamura *et al.*, (MEGA5 Analysis 2011) وجود ۲ هاپلوتیپ در جمعیت را نشان داد (شکل ۳).

با توجه به هاپلوتیپ های به دست آمده می توان توالی مورد توافق را محاسبه نمود. از آنجائیکه تعداد جایگاههای چند شکل وابسته به تعداد نمونه هستند، لذا از پارامتر دیگر یعنی تنوع نوکلئوتیدی (π) یا هتروزیگوستی در سطح نوکلئوتید استفاده گردید، که تحت تاثیر طول DNA و اندازه نمونه نیست و عبارت از متوسط تفاوت نوکلئوتیدی بین دو توالی در هر جایگاه می باشد (Nei and Kumar., 2000).

همه نمونه ها مورد استفاده قرار گرفتند. تعداد ۲ هاپلوتیپ از بین توالی های مورد بررسی تعیین شدند، که دارای ۲ جایگاه چند شکل (SNP) هستند. در یک جایگاه جهش جانشینی که حاصل تبدیل نوکلئوتید پورینی به پیریمیدینی^۱ است اتفاق افتاده بود و در جایگاه دیگر اضافه شدن نوکلئوتید^۲ رخ داده است که این اضافه شدن نوکلئوتید سبب جایگزینی اسید آمینه آسپارژین با گلاسین در توالی اسید آمینه ای ناحیه سیتوکروم b در مرغ بومی خراسان شده است (شکل ۲). در بررسی کامل ناحیه سیتوکروم در ۸ مرغ بومی (2002) Shen et al. Chunky و توالی یابی، ۱۱۴۰ نوکلئوتید گزارش کردند، که شامل ۴ جایگاه چند شکل می باشد که همه آنها از نوع جایگزینی هستند و دو تا از آنها در سومین موقعیت کدون قرار دارند. بنابراین، هیچ جایگزینی در توالی اسید آمینه رخ نداده و دو تای دیگر در اولین موقعیت کدون قرار داشتند، که سبب جایگزینی در توالی اسید آمینه شدند. همچنین، Nishibori *et al.* (2003) توالی کامل DNA میتوکندریالی در مرغان لگهورن سفید و پلیموت راک را توالی یابی کردند و گزارش کردند که توالی DNA میتوکندریالی مرغ لگهورن در مقایسه با توالی مرغ اهلی ثبت شده در NCBI ۴۲ جایگاه چند شکل جانشینی و ۱۵ جایگاه چند شکل حذف و جایگزینی نشان داد، که این تغییرات نوکلئوتیدی منجر به جانشینی ۲۰ اسید آمینه شده است و هیچ حذف و جایگزینی اسید

¹ transversion² Insertions

مرغ اهلی	451	ACA TTG GAC ACA CCC TAG TAG AGT GAG CCT GAG GGG	GAT	TTT CAG	495
مرغ اهلی	151	Thr Leu Asp Thr Pro End End Ser Glu Pro Gly	Asp	Phe Gln	165
مرغ خراسان	451	ACA TTG GAC ACA CCC TAG TAG AGT GAG CCT GAG GGG	GGA	TTT TCA	495
مرغ خراسان	151	Thr Leu Asp Thr Pro End End Ser Glu Pro Gly	Gly	Phe Ser	165

شکل ۲- مقایسه توالی اسید آمینه ای ناحیه سیتوکروم b در مرغ بومی خراسان و مرغ اهلی.

Figure 2- Comparison of the amino acid sequence of cytochrome b region in native chicken of Khorasan and domestic chicken.



شکل ۳- توالی نوکلئوتیدی ناحیه سیتوکروم b، به طول ۷۸۰ نوکلئوتید، برای چهار نمونه مرغ بومی خراسان.

Figure 3- The nucleotide sequences of cytochrome b for four native chicken of khorasan samples with length of 780.

خراسان به طول ۷۸۰ نوکلئوتید در جدول ۱ آورده شده است با درصد نوکلئوتیدها در این ناحیه از mtDNA مرغ اهلی ثبت شده در NCBI با شماره دسترسی X52392.1 توسط Desjardins & Morais که به عنوان اجداد مرغان اهلی امروزی مطرح می باشند، بسیار نزدیک است.

مقدار تنوع هاپلوتیپی در جمعیت حاضر ۵/ برآورد گردید، که بیانگر سطح تنوع پایین در جمعیت مرغ بومی خراسان می باشد. نتایج مطالعه اخیر دلالت بر این دارد، که ناحیه سیتوکروم b یک ناحیه کد کننده می باشد و میزان جهش و تنوع در آن پایین است (Eyre-walker & Awadalla., 2001). فراوانی نسبی نوکلئوتیدها در توالی مورد توافق سیتوکروم b مرغ بومی

جدول-۱- درصد فراوانی نسبی نوکلئوتیدها در ناحیه سیتوکروم b در مرغ بومی خراسان و مرغ اهلی

Table 1- Nucleotides relative frequency percentage in cytochrome b region in native chicken of khorasan and Domestic Chicken.


درصد فراوانی نوکلئوتیدی

Nucleotides frequency percentage

C	G	T	A	G+C	A+T	جمعیت Population
(284)	(106)	(186)	(205)	49.94	50.06	مرغ بومی خراسان
36.36	13.57	23.82	26.25			Khorasan Native Chicken
(284)	(105)	(186)	(205)	49.87	50.13	مرغ اهلی
36.41	13.46	23.85	26.28			Domestic Chicken

نتیجه گرفتند که بعضی از نژادهای بومی ژاپن از داخل ژاپن نشأت نگرفته اند و نژادهای سایر کشورها پایه مرغ های بومی ژاپنی را تشکیل دادند. نمودار فیلوژنی توالی ناحیه سیتوکروم b مرغ بومی خراسان و نژادهای مرغ موجود در NCBI نشان می دهد که توالی ناحیه سیتوکروم b در مرغ بومی خراسان با مرغ بومی چین، بومی لاوس و لگهورن سفید نزدیکی بیشتری دارد، که این امر ممکن است به دلیل قرابت ژنتیکی بسیار نزدیک مرغ بومی خراسان با نژادهای آسیایی باشد، اما با مرغ نیوهامپشایر هیچ شباهتی ندارند و در شاخه مجزا قرار گرفته است و بیشترین فاصله ژنتیکی را با نژاد نیوهامپشایر دارد.

در ادامه با استفاده از ابزار BLAST درصد تشابه توالی ناحیه سیتوکروم b مرغ بومی خراسان با توالی های ثبت شده در پایگاه NCBI تعیین شد. که اکثریت توالی ها در سطح ۱۰۰ درصد بیشترین تشابه را با توالی ناحیه سیتوکروم مرغ بومی خراسان داشتند که این نتایج بر این دلالت دارد که این ناحیه سیتوکروم b یک ناحیه حفاظت شده است و تغییرات نوکلئوتیدی در آن به ندرت (Eyre-walker and Awadalla., 2001) در پژوهش (Nishibori et al., 2001) به منظور بررسی منشأ مادری و تعیین روابط فیلوژنتیک ۲۰ نژاد بومی ژاپنی و مرغهای اندونزیایی چنین شباهت هایی وجود دارد، آنها



شکل ۴- نمودار فیلوجنی براساس توالی کلی مرغ بومی خراسان و برخی نژادهای مرغ موجود در بانک جهانی ژن به همراه کد دسترسی آنها.

Figure 4- Phylogenetic tree based on consensus sequences of Khorasan native chicken and other chicken breeds are taken from GenBank along with their accession numbers.

منابع

- Bellagamba F, Moretti VM, Comincini S, Valfare F (2001). Identification of species in animal Feedstuffs by polymerase chain reaction restriction fragment length polymorphism analysis of Mitochondrial DNA. Journal of Agricultural and Food Chemistry 49: 3775-3781.
- Crowe TM, Harley EH, Jakutowicz MB, Komen J, Crowe AA (1992). Phylogenetic, taxonomic and biogeographical implications of genetic, morphological, and behavioral variation in francolins (Phasianidae: Francolinus). The Auk. 109: 24.
- Desjardins P, Morais R (1990). Sequence and gene organization of the chicken mitochondrial genome. A novel gene order in higher vertebrates. Journal of Molecular Biology 212: 599-634.
- Eyre-walker A, Awadalla P (2001). Does human mtDNA recombine Journal of Molecular Evolution 53: 430- 435.
- Kornegay JR, Kocher TD, Williams LA, Wilson AC (1993). Pathway of lysozyme evolution inferred from the sequence of cytochrome b in birds. Journal of Molecular Biology, 37: 367-379.
- Lolai P (2001). Study of genetic diversity of Barbus capito fish in Mazandaran and Gilan Province. M.Sc. Thesis. University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran.
- Mohammadabadi MR, Nikbakhtib M, Mirzaee HR, Shandic A, Saghd DA, Romanove MN and Moiseyevaf IG (2010). Genetic variability in three native iranian chicken Populations of the khorasan province based On microsatellite markers Russian Journal of Genetics. Vol. 46, No. 4, pp. 1-5.
- Mohammadi Pestehbig F, Pirani N, shoja J, Mohammadhashemi A (2011). Determination the mtDNA D-loop Sequence in Marandi Native Chicken Population and Its Phylogenetic Relationships with Other Breeds. Research Journal of Animal Sciences 21(2): 1-9.
- Nei M, Kumar S (2000). Molecular Evolution and Phylogenetics. Oxford University Press, New York.
- Nishibori M, Hanazono M, Yamamoto Y, Tsudzuki M, Yasue H (2003). complete nucleotide sequence of mitochondrial DNA in White Leghorn and White Plymouth Rock chickens. Animal Science Journal. 74, 437-439.

- Nishibori M, Hayashi T, Tsudzuki M, Yamamoto Y and Yasue H (2001). complete sequence of the Japanese quail (*Coturnix Japonica*) mitochondrial genome and its genetic relationship with related species. *Animal Genetics* 32: 380-385.
- Pirani N, Mohammadhashemi A, Alijani S, Rezazadeh Goli R, Ghanbari S (2010). Molecular Analysis of Mazandrani native chicken population based on HVR-I region of Mitochondrial DNA. *Journal Agriculture Biotechnology* 1(2): 53- 60.
- Shen XJ, Ito S, Mizutani M (2002). Phylogenetic Analysis in Chicken Breeds Inferred From Complete Cytochrome b Gene Information. *Biochemical Genetics*. 40(3/4), 129-141.
- Silva P, Guan X, Ho-Shing O, Jones J, Xu J, Hui D, Notter D, Smith E (2008). Mitochondrial DNA-based analysis of genetic variation and relatedness among Sri Lankan indigenous chickens and the Ceylon jungle fowl (*Gallus lafayetti*). *Animal Genetics* 40: 1-9.
- Tamura K, Peterson D, Peterson N, Stecher G, Nei M, Kumar S (2011). MEGA5: Molecular Evolutionary Genetics Analysis using Maximum Likelihood, Evolutionary Distance, and Maximum Parsimony Methods. *Molecular Biology and Evolution*, 28: 2731-2739.

Genetic analysis of cytochrome b region in native chicken of Khorasan

Nassiri M.R.¹, Roudbari Z.^{2*}

¹Associate Professor, Animal Science Department and Institute of biotechnology, Ferdowsi University of Mashhad

²PhD Student, Animal Science Department, Ferdowsi University of Mashhad.

Abstract

Maintain genetic diversity in population of native chickens is very important. They are as a national investment and the small size of their populations. Studying cytochrome b region of mitochondrial genome in between or within breeds can give useful information about genetic diversity of the population to be studied. The purpose of current study was genetic and phylogenetic investigate cytochrome b region of mitochondrial genome in native chicken of Khorasan. In order to, blood samples were collected from 5 native chicken of Khorasan. After extracting DNA, fragment 858 bp of cytochrome b region genome mitochondrial amplified by primers was designed and fragment amplified after purification was sequenced. Two different haplotypes were determined based on two single nucleotide polymorphism sequence and the final sequences of each haplotype with length approximate 780 bp which includes 26/25 % adenine, 13/57 % guanine, 36/36 % cytosine and 23/82 % thymine. Using the UPGM phylogenetic test results showed that the native chicken of Khorasan is in group of Asia chicken and has the lowest genetic distance with native chicken of china.

Keyword: *Phylogeny, Cytochrome b, native chicken of Khorasan, Genome Mitochondrial.*

* Corresponding Author: Roudbari.Z.

Tel: 03482410841

Email: rodbari.zahra@gmail.com