



بررسی تنوع آللی ژنهای *VRN1* و *Ppd1* در ارقام مختلف گندم نان

محسن نظری^۱، علی ایزانلو^{۲*}، محمدقادر قادری^۳، زهره علیزاده^۴

^۱دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند.

^۲استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند.

^۳استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند.

^۴استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۰۴/۰۵، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۰۴/۰۸

چکیده

ژنهای مهم کنترل کننده زمان گلدهی شامل ژنهای پاسخ به بهاره‌سازی و فتوپریود نقش قابل توجهی در سازگاری جغرافیایی و عملکرد زراعی بالا و عملکرد بالقوه در غلات دارند. بررسی و درک تنوع آللی ژن‌های بهاره‌سازی و فتوپریود در برنامه‌های اصلاحی گندم و گزینش والدین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. لذا، هدف از این آزمایش بررسی تنوع آللی برای مکانهای ژنی *VRN1* و *Ppd1* با استفاده از نشانگرهای مولکولی کارکردی در ۳۸ رقم گندم نان بود. در این تحقیق فراوانی آلل‌های *Vrn-A1*، *Vrn-A1a* و *Vrn-A1b* در مکان ژنی *Vrn-A1* به ترتیب ۵۷/۹، ۳۹/۵ و ۲/۶ درصد بود. در مکان ژنی *Vrn-D1* آلل‌های *Vrn-D1* و *vrn-D1* به ترتیب دارای فراوانی ۷۳/۷ و ۲۶/۳ درصد بودند. در مکان ژنی *Vrn-B1* بیشترین فراوانی آللی مربوط به *Vrn-B1a* با ۴۴/۷ درصد بود، در حالیکه فراوانی آلل‌های *Vrn-B1b*، *Vrn-B1c* و *vrn-B1* در این مکان ژنی به ترتیب ۲۱/۰، ۱۸/۴ و ۱۳/۲ درصد بود. تنوع آللی برای ژنهای فتوپریود نیز در جمعیت مورد مطالعه یافت شد. بطوریکه در مکان ژنی *Ppd-D1* فراوانی آلل‌های *Ppd-D1a* و *Ppd-D1b* به ترتیب ۷۱/۰ و ۲۹/۰ درصد بود. در مکان ژنی *Ppd-B1*، ۱۸ ژنوتیپ *Ppd-B1a* و ۲۰ ژنوتیپ *ppd-B1b* را نشان دادند. بطور کلی فراوانی آلل *Ppd-D1a* بیشتر از بقیه بوده و به دنبال آن به ترتیب فراوانی آلل *Vrn-A1a*، *Vrn-D1*، *Vrn-B1a* و *Ppd-B1b* بیشتر بود. این نتایج نشان می‌دهد که فراوانی آلل غالب در مکان‌های ژنی *VRN1* و *Ppd-D* بیشتر بوده و بر این اساس، بیشتر ارقام بهاره و غیر حساس به فتوپریود می‌باشند. نتایج این تحقیق می‌تواند به بهنرادرگان در برنامه‌های اصلاحی گزینش به کمک نشانگر یاری نماید.

واژگان کلیدی: فتوپریود، نشانگر مولکولی، ژنوتیپ، بهاره‌سازی.

سرما است (Fowler *et al.*, 2001; Limin and Fowler, 2006). به طور کلی، نمو گیاه و انتقال از مرحله رویشی به زایشی در ابتدا توسط نیاز به بهاره سازی که ممکن است به صورت اثر متقابل با یک نظام طول روز همراه باشد، کنترل می شود (Wallace and Yan, 1998). سپس توسط نظام عکس العمل به طول روز بعد از بهاره سازی تحت تأثیر قرار می گیرد و در نهایت توسط ارتباط با نظام همیشه موثر دما، کنترل می شود. بنابراین، یکی از عواملی که با بررسی آن و تعیین وضعیت یک رقم تجاری از لحاظ ژنتیکی در درک و توصیف سازگاری عمومی و خصوصی اهمیت دارد، بدون شک نیاز به بهاره سازی و طول روز است. در این بین صفات زودرسی ذاتی و مقاومت به سرما یا یخبندان نیز که ممکن است در ترکیب با دو نظام طول روز و نیاز به بهاره سازی، باعث تأثیر گذاری بر نمو و فنولوژی گیاه شوند، نباید نادیده گرفته شوند (Snape, 1998; Snape *et al.*, 2001).

گندم بر اساس درجه حرارت و زمان گلدهی به دو عادت رشد زمستانه و بهاره تقسیم بندی می شود. گندم زمستانه نیاز به یک دوره سرما جهت گلدهی دارد، که معمولاً در پاییز کشت می شود و در سال بعد برداشت می شود، در حالی که گندم بهاره بدون گذراندن دوره سرمایی معمولاً در همان سالی که کاشته شد، برداشت می شود.

فرایند بهاره سازی باعث تسریع زمان گلدهی در غلات می شود که بوسیله دمای پایین صورت

گندم یکی از گسترده ترین گیاهان زراعی تحت کشت در جهان است که در دامنه وسیعی از عرضهای جغرافیایی (از ۶۰ درجه شمالی تا ۴۸ درجه جنوبی)، شرایط اقلیمی، و حاصلخیزی خاک کشت می شود. برای سازگاری با چنین عرصه های گوناگون طیف گسترده ای از تغییرات ژنتیکی در جایگاههای خاصی ضروری است. در سطح مولکولی سازگاری گندم عمدتاً بوسیله ۳ گروه از فاکتورهای ژنتیکی شامل؛ ژن های ورنالیزاسیون^۱ یا نیاز به بهاره سازی (VRN)، ژن های فتوپریود یا حساس به طول روز (Ppd) و ژن های کنترل کننده زودرسی ذاتی (Eps) کنترل می شوند (Zhang *et al.*, 2008). از میان این گروه های ژنی، ژن های بهاره سازی (Vrn) و فتوپریود (Ppd) تنظیم کننده های اصلی عادت رشدی گیاه می باشند که به ژن های عادت گلدهی نیز معروفند (Distelfeld *et al.*, 2009). ژن های فتوپریودی و بهاره سازی به تغییرات محیطی با تاخیر یا تسریع در زمان گلدهی واکنش نشان می دهند، بنابراین از در معرض قرارگرفتن آغازهای^۲ گل در درجه حرارت های بالای کشنده جلوگیری می نماید. همچنین سازوکار تحمل به سرما در گندم پاییزه ارتباطی بنیادین با نیاز بهاره سازی دارد، که این نیز سبب تأخیر در گذار از مرحله رویشی و ورود به مرحله زایشی شده و دستاورد آن پیشگیری از بروز خسارت

¹ Vernalization

² Primordia

Ala که قبلاً به ترتیب *Ppd1*، *Ppd2* و *Ppd3* نامیده می‌شدند) در این مکانهای ژنی باعث اعطای عدم حساسیت به فتوپریود و آل‌های مغلوب آنها (*ppd-D1b*، *ppd-B1b* و *ppd-A1b*) حساسیت به فتوپریود را موجب می‌شوند (Law *et al.*, 1978). بطور کلی، آل *Ppd-D1a* به عنوان قوی‌ترین آل در نظر گرفته می‌شود که به دنبال آن *Ppd-B1a* و بعد از آن *Ppd-A1a* می‌باشد (Scarth and Law, 1984)، هر چند که مطالعه اخیر Tanio and Kato (2007) نشان داد که *Ppd-B1a* می‌تواند اثر یکسانی همانند *Ppd-D1a* داشته باشد. مطالعات متعدد نشان داد که در تمام محیط‌ها، گندم‌های غیر حساس به فتوپریود تمایل به بلوغ زودتری نسبت به گندم‌های حساس به فتوپریود دارند (Kato and Yokoyama, 1992; Worland *et al.*, 1994; Worland, 1996; Worland and Sayers, 1996; Worland *et al.*, 1998; Cane *et al.*, 2013). با توجه به اهمیت و نقش بهاره‌سازی و فتوپریود در سازگاری گندم، بررسی و درک توزیع آلی ژن‌های کنترل‌کننده آنها و کاربرد اطلاعات بدست آمده از طریق گزینش به کمک نشانگر در برنامه‌های اصلاحی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چندین روش فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی در دسترس برای تشخیص ژن‌های بهاره‌سازی و فتوپریود در گندم و سایر غلات و حبوبات وجود دارد. با این حال، برخی از آنها وقت گیر و نیاز به کار فشرده دارد و تحت تأثیر شرایط محیطی نیز می‌باشد، در نتیجه برای استفاده در برنامه‌های اصلاحی بسیار دشوار است.

می‌گیرد. این فرایند زمانی انجام می‌شود که درجه حرارت هوا بین صفر تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد و به مدت چند هفته نوسان داشته باشد (Flood and Halloran, 1984). مطالعات فیزیولوژیکی نشان داد که مراکز واکنش به بهاره‌سازی در نوک ساقه قرار دارد (Amasino, 2004). عادت رشد زمستانه یا بهاره توسط ۳ آل در جایگاه‌های *Vrn-A1*، *Vrn-B1* و *Vrn-D1* که به ترتیب بر روی کروموزوم 5A، 5B و 5D واقع شده‌اند کنترل می‌شود (Law *et al.*, 1978; Galiba *et al.*, 1998; Dubcovsky *et al.*, 1995). در مجموع این ۳ ژن به عنوان جایگاه *Vrn1* شناخته می‌شوند، که جایگاه اصلی گلدهی می‌باشد. ژنتیک مولکولی مکانیسم‌های مورد نیاز برای بررسی بهاره‌سازی را در محصولات زراعی از جمله گندم بخوبی درک و مورد بررسی قرار داده است (Cockram *et al.*, 2007; Trevaskis *et al.*, 2007). حضور آل مغلوب در تمام این مکان‌ها باعث عادت رشد زمستانه می‌شود، در حالی‌که حضور یک آل غالب در این جایگاه‌ها باعث رشد بهاره می‌گردد (Stelmakh, 1992).

تفاوت در توزیع ژن‌های *Ppd* در ژرم پلاسما-های گندم به صورت کلاس‌های مختلف حساس به طول روز بلند و غیر حساس به طول روز تقسیم می‌شود. در گندم عکس‌العمل به طول روز توسط ۳ مکان ژنی که بر روی کروموزوم‌های 2A، 2B و 2D قرار دارند، کنترل می‌شود (Keim *et al.*, 1973; Welsh *et al.*, 1973). بطوریکه، آل‌های غالب (*Ppd-D1a*، *Ppd-B1a* و *Ppd-*

گیاهچه‌های ۲-۳ برگی مناسب برای استخراج DNA ژنومی بدست آمد. استخراج DNA ژنومی طبق روش Pallotta *et al.* (2003) با اندکی تغییر انجام شد. کمیت و کیفیت DNA نیز با استفاده از روش اسپکتروفوتومتری با استفاده از دستگاه نانودراپ Thermo و الکتروفورز ژل آگارز ۰/۸ درصد تعیین گردید.

در این تحقیق، از ترکیب ۱۶ آغازگر تشخیصی به منظور بررسی وضعیت آللی ژن‌های بهاره-ساز و فتوپریود مورد استفاده قرار گرفت (جدول ۱). واکنش زنجیره‌ای پلی مرز برای تکثیر جایگاه‌های نشانگرهای آلل اختصاصی در حجم ۲۰ میکرولیتر با اجزای ۱ میکرولیتر DNA الگو (۱۰۰ نانوگرم)، ۱ میکرولیتر از هر آغازگر (۰,۴ پیکومول) و ۱۰ میکرولیتر PCR MasterMix (تهیه شده از شرکت سیناکلون)، و تا حجم ۲۰ میکرولیتر آب دیونیزه دو بار تقطیر در دستگاه ترموسایکلر اپندورف انجام شد. چرخه‌های حرارتی برای هر ترکیب آغازگر در جدول ۱ آمده است. جداسازی محصولات تکثیری با استفاده از الکتروفورز ژل آگارز ۱/۵ درصد انجام و رنگ‌آمیزی با استفاده از اتیدیوم بروماید صورت گرفت. سپس با استفاده از دستگاه ژل داک عکس برداری از ژل انجام شد. اندازه نوارهای تکثیر شده برای آلل‌های مختلف مورد نظر با استفاده از DNA Ladder، ۱۰۰ bp تعیین شد.

پیشرفت‌های اخیر در ژنتیک مولکولی موجب شده تا همسانه سازی ژن‌های بهاره سازی (Yan *et al.*, 2003) و فتوپریود (Beales *et al.*, 2007) در گندم انجام شود، همچنین موجب تسهیل در توسعه‌ی نشانگرهای ژن و آلل اختصاصی (نشانگرهای تشخیصی) شده است. لذا، هدف از این آزمایش تعیین خصوصیت و بررسی تنوع آللی برای ژن‌های بزرگ اثر در ژن‌های بهاره سازی و فتوپریود در گندم‌های نان می‌باشد، که نقش مهمی در سازگاری و عملکرد بالقوه و عملکرد پتانسیل دانه در مناطق جغرافیایی مختلف دارند. آگاهی از مناسب ترین ترکیب آللی *VRN-1* و *Ppd-1* به بهترآدگران این اجازه را می‌دهد که از ژرم پلاسم‌های متنوع برای به حداکثر رساندن پتانسیل عملکرد دانه و مقاومت به خشکی و سرما در تلاقی‌ها استفاده کنند.

مواد و روش‌ها

مواد گیاهی مورد استفاده در این تحقیق ۳۸ رقم گندم نان رایج کشت در مناطق خشک و نیمه خشک شامل؛ الموت، الوند، آذر، بزوستایا، هیرمند، قدس، نیک‌نژاد، شعله، کرج ۳، داراب ۲، کویر، هامون، روشن، رسول، شاهپسند، پیشتاز، استار، وریناک، شیراز، اکبری، دز، شوری، ارگ، اوحدی، آنفام ۴، استورک، کاسکوژن ریژاو، اترک، کوه‌دشت، زرین، کراس سبلان، بک کراس روشن، کریم، بم، اکسکلیبر و گلا دیوس بودند. بذور ژنوتیپ‌های مورد نظر در گلخانه کشت و

جدول ۱- توالی آغازگرهای آلل اختصاصی برای ژن های بهاره سازی در مکان های ژنی VRN-1 و

Ppd-1

Table 1- Sequences of allele specific primers for vernalization and photoperiod genes at the VRN-1 and Ppd-1 loci.

ویژگی Trait	مکان locus	نام آغازگر Primer name	توالی آغازگر (3→5) Primer sequence	اندازه باند (bp) Band Size (bp)	آلل Allele	شرایط PCR PCR conditions
بهاره سازی Vernalization	VRN- A1	VRN1AF	GAAAGGAAAAATTCTGCTCG	965+876	<i>Vrn-A1a</i>	94° .3 min; (94° .30s; 66° .30s;
		VRN1- INT1R	GCAGGAAATCGAAATCGAAG	714	<i>Vrn-A1b</i>	72° .45s); for 35 cycles
		Intr1/A/F2	AGCCTCCACGGTTTGAAAGTAA	734 1170	<i>vrn-A1 or Vrn-A1c</i>	94° .3 min; (94° .45s;
		Intr1/A/R3	AAGTAAGACAACACGAATGTGAGA		<i>Vrn-A1c</i>	51° .45s; 72° .1 min); for 35 cycles
	VRN- D1	Intr1/D/F	GTTGTCTGCCTCATCAAATCC	997	<i>vrn-D1</i>	94° .4 min;
		Intr1/D/R3	GGTCACTGGTGGTCTGTGC	1671	<i>Vrn-D1</i>	(94° .45s; 61° .45s;
		Intr1/D/R4	AAATGAAAAGGAACGAGAGCG			72° .1 min); for 35 cycles
	VRN- B1	Ex1/B/F3	GAAGCGGATCGAGAACAAGA	709 + 1235	<i>Vrn-B1a</i>	94° .2 min;
		Intr1/B/F	CAAGTGGAACGGTTAGGACA	673 +1199	<i>Vrn-B1b</i>	(94° .30s;
		Intr1/B/R3	CTCATGCCAAAAATTGAAGATGA	849	<i>Vrn-B1c</i>	52° .30s;
Intr1/B/R4		CAAATGAAAAGGAATGAGAGCA	1149	<i>vrn-B1</i>	72° .90s); for 35 cycles	
فتوپریود photoperiod	Ppd- D1	Ppd-D1_F:	ACGCTCCCACTACACTG	414	<i>ppd-D1b</i>	94° .3 min;
		Ppd-D1_R1	GTTGGTTCAAACAGAGAGC			(94° .45s;
		Ppd-D1_R2:	CACTGGTGGTAGCTGAGATT	288	<i>Ppd-D1a</i>	54° .40s; 72° .60s); for 35 cycles
	Ppd- B1	TaPpd- B1proF1	ACACTAGGGCTGGTCAAGA	1600	<i>Ppd-B1a</i>	95° .3 min; (95° .30s;
		TaPpd- B1int1R1	CCGAGCCAGTGCAAATTAAC	1292	<i>ppd-B1b</i>	64° .60s; 72° .90s); for 35 cycles

نتایج و بحث

در این مطالعه به منظور بررسی تنوع آلی از جفت پرایمر اختصاصی VRN1AF و VRN1-INT1R توصیف شده توسط Yan et al. (2004) به منظور شناسایی آلل غالب بهاره *Vrn-A1* در تمام ارقام گندم نان استفاده شد. ۱۵ ژنوتیپ آلل غالب *Vrn-A1a* را تکثیر کردند (باند bp ۹۶۵-۸۷۶). تنها ژنوتیپ هیرمند آلل *Vrn-A1b* را با اندازه باند bp ۷۱۴ تکثیر کرد. ۲۲ ژنوتیپ باقی مانده، باند bp ۷۳۴ را تکثیر کردند که نشان داد این ارقام یا حامل آلل غالب *Vrn-A1c* هستند، یا آلل مغلوب *vrn-A1* را دارند (Zhang et al., 2008). به منظور تفکیک بین این دو آلل از یک جفت پرایمر *Intr1/A/R3* و *Intr1/A/F2* استفاده شد. بعد از تکثیر محصولات مشخص شد همه ۲۲ رقمی که باند bp ۷۳۴ را تکثیر کردند، آلل مغلوب *vrn-A1* را داشتند (شکل ۱ الف). بطور کلی، نتایج نشان داد که ۵۷/۹۰ درصد از ارقام (۲۲ رقم) مورد مطالعه آلل مغلوب *vrn-A1* را نشان دادند و ۳۹/۴۷ درصد آلل غالب *Vrn-A1a* و تنها ۲/۶۳ درصد نیز آلل *Vrn-A1b* را تکثیر کردند. در این مطالعه، آلل *Vrn-A1c* مشاهده نشد.

برای مکان ژنی *Vrn-B1*، از ترکیب پرایمری *Ex1/B/F3* و *Intr1/B/R3* و *Intr1/B/F* و *Intr1/B/R4* بصورت مولتی پلکس استفاده شد (Milec et al., 2012). ۱۷ ژنوتیپ (۴۴/۷ درصد) شامل آلل *Vrn-B1a* بودند، زیرا باند ۷۰۹bp را تکثیر کردند (شکل ۱ ب). عدم وجود

محصول حاصل از PCR در ژنوتیپ‌های گندم باقی مانده نشان می‌دهد که آنها حامل آلل مغلوب هستند. برای تایید آن از ترکیب پرایمری *Intr1/B/R4* و *Intr1/B/F* استفاده شد. باند bp ۱۱۴۹ در ۵ ژنوتیپ گندم نان حضور آلل مغلوب *vrn-B1* را نشان دادند. در مجموع، در مکان ژنی *Vrn-B1*، ۴۴/۷۳ درصد از ارقام آلل *Vrn-B1a* را با ترکیب بانندی ۷۰۹ و ۱۲۳۵ جفت بازی را نشان دادند، همچنین ۱۳/۱۵ درصد از ارقام آلل مغلوب *vrn-B1* را با اندازه باند bp ۱۱۴۹ تکثیر کردند و ۲۱/۱ درصد از ارقام دارای آلل *Vrn-B1b* با ترکیب بانندی bp ۶۷۳ و bp ۱۱۹۹ را نشان دادند. ۱۸/۴۲ درصد از ارقام آلل *Vrn-B1c* را با اندازه باند bp ۸۴۹ تکثیر کردند.

در جایگاه ژنی *Vrn-D1*، با استفاده از یک جفت پرایمر *Intr1/D/R3* و *Intr1/D/F*، ۱۰ ژنوتیپ باند bp ۱۶۷۱ را تکثیر کردند که آلل غالب *Vrn-D1* را نشان می‌دهد، همچنین باند bp ۹۹۷ در ۲۸ ژنوتیپ مشاهده شد، از ترکیب پرایمری *Intr1/D/R4* و *Intr1/D/F* استفاده شد که نشان دهنده آلل مغلوب *vrn-D1* بود (شکل ۱ ج). ۷۳/۶۸ درصد از ارقام آلل مغلوب *vrn-D1* را با اندازه باند bp ۹۹۷ تکثیر کردند در حالیکه آلل غالب *Vrn-D1* تنها در ۲۶/۳۲ درصد از ارقام مشاهده شد.

در جایگاه ژنی *Ppd-D1*، از ۳۸ رقم مورد مطالعه ۲۷ رقم قطعه bp ۴۱۴ را در PCR تکثیر کردند که نشان دهنده آلل *Ppd-D1a* می‌باشد، که غیر حساس به فتوپریود می‌باشد و تنها ۱۱ رقم

باند bp ۱۲۹۲ را تکثیر کردند. ۵۲/۶۳ درصد از ارقام آلل مغلوب غیر حساس به فتوپریود *Ppd-B1a* (باند ۱۶۰۰ جفت بازی) را نشان دادند.

فراوانی آلل *Vrn-A1a* در مجموعه گندم‌های مورد بررسی در مقایسه با مجموعه گندم‌های مختلف جهان پایین‌تر بودند. *Iqbal et al.* (2007) فراوانی آلل *Vrn-A1a* را در ژنوتیپ‌های گندم بهاره در کانادا ۸۵ درصد گزارش کردند، درحالی‌که آلل *Vrn-A1b* را تنها در یک رقم مشاهده کردند. آنها همچنین هیچ آلل *Vrn-A1c* را در مجموعه‌ی خود مشاهده نکردند که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد. در گندم‌های ترکیه نیز آلل *Vrn-A1c* گزارش نشد (*Andeden et al.*, 2011). فراوانی آلل *Vrn-A1a* در ژرم پلاسما گندم نواحی شمال غربی ایالات متحده آمریکا ۶۹ درصد (*Santra et al.*, 2009)، ۵۰ درصد در ارقام گندم بهاره آمریکا و آرژانتین (*Yan et al.*, 2004) و ۴۴ درصد در گندم‌های چینی (*Zhang et al.*, 2008) گزارش شد.

نتایج این تحقیق نشان داد که ترکیبات مختلف آلل‌های *Vrn* عادت رشدی بهاره را در گندم‌های مورد مطالعه کنترل می‌کنند. آلل *Vrn-A1a* تقریباً در ۳۹/۵ درصد ژنوتیپ‌های مورد مطالعه مشاهده شد. گندم‌های بهاره‌ای که دارای آلل *Vrn-A1a* باشند نیازی به بهاره‌سازی ندارند (*Shindo and Sasakuma*, 2002)، بنابراین نسبت به ژنوتیپ‌های دارای آلل‌های *Vrn-B1* یا *Vrn-D1* در شرایط بهاره‌سازی نشده زودتر گل می‌دهند.

آلل *ppd-D1b* را تکثیر کردند که حساس به فتوپریود می‌باشد. به طور کلی فراوانی آلل غالب *Ppd-D1a* در ارقام مورد مطالعه زیاد می‌باشد. که نشان می‌دهد ارقام ایرانی غیر حساس به فتوپریود می‌باشند. بنابراین باید اصلاح گران در اصلاح ژرم پلاسماها این موضوع را مد نظر قرار دهند. در این جایگاه ژنی، ۷۱/۰۵ درصد از ارقام آلل غالب *Ppd-D1a* را با اندازه باند bp ۲۸۸ تکثیر کردند و تقریباً در ۲۸/۹۵ درصد از ارقام آلل مغلوب *ppd-D1b* با اندازه باند bp ۴۱۴ مشاهده شد (شکل ۲ ب). آلل *Ppd-D1a* در ۶۰ درصد از ارقام ترکیه یافت شد (*Andeden et al.*, 2011). در تحقیقی *Zhang et al.* (2010) فراوانی این آلل را در ۹۲۹ رقم اصلاح شده و نژاد محلی گندم چین ۶۶ درصد گزارش کردند. اکثر واریته‌های گندم اصلاح شده مورد کشت در جنوب و مرکز اروپا به خاطر سازگاری گسترده تر آنها غیر حساس به فتوپریود هستند (*Foulkes et al.*, 2004).

اما در مکان ژنی *Ppd-B1* با استفاده از یک جفت آغازگر *TaPpd-B1proF1* و *TaPpd-B1int1R1* در PCR، از بین ۳۸ رقم ۲۰ ژنوتیپ باند bp ۱۲۹۲ را تکثیر کردند که آلل مغلوب و حساس به فتوپریود *ppd-B1b* را نشان می‌داد و ۱۸ رقم مابقی باند bp ۱۶۰۰ را تکثیر کردند که آلل غالب *Ppd-B1a* بودند که غیر حساس به فتوپریود می‌باشد (شکل ۲ الف). در مجموع، در این مکان ژنی ۴۷/۳۶ درصد از ارقام حاوی آلل مغلوب حساس به فتوپریود *ppd-B1b* بودند که


با آلل‌های *Vrn-A1* یا *Vrn-B1* بالاترین مقدار، در حالی که ارقام با هر ۳ آلل غالب همولوگوس در ژن *Vrn-1* کمترین عملکرد دانه را دارا بودند (Stelmakh, 1992). در مطالعه ای *Santra et al.* (2009) نتیجه گیری کردند که اگر درجه حرارت و تنش خشکی در طول پر شدن دانه اتفاق بیفتد، بالاترین عملکرد دانه برای گندم‌های غیرحساس به فتوپریود با آلل غالب *Vrn-D1* در ترکیب با آلل *Vrn-A1* یا *Vrn-B1* اتفاق می‌افتد. بنابراین، بهینه سازی ترکیب آللی در جایگاه *Vrn-1* با عدم حساسیت به فتوپریود می‌تواند فرصت را برای توسعه ارقام گندم با عملکرد بالقوه بالا و انطباق با طیف وسیع تری از شرایط آب و هوایی متفاوت را ممکن سازد.

اطلاعات درباره ژنوتیپ *Vrn* در پاسخ به مقاومت به سرما و دمای پایین در غلات مهم می‌باشد. وجود آلل هموزیگوت مغلوب در هر ۳ جایگاه ژنی *VRN-1* باعث عادت رشد زمستانه در گندم هگزاپلوئید می‌شود با این حال در برخی از موارد وجود آلل غالب *Vrn-B1* یا *Vrn-D1* برای تعیین عادت رشد بهاره کافی است. *Vrn-A1* آلل اصلی در تعیین عادت رشدی گندم محسوب می‌شود با توجه به جدول شماره ۲ ارقام الموت، الوند، آذر، آنفارم ۴، بم، پیشتاز، شاهپسند، شوری، بزوستایا، هیرمند و رسول با وجود غالب بودن در مکان ژنی *Vrn-D1* ولی دارای عادت رشدی زمستانه می‌باشد.

آلل *Vrn-B1a* بیشترین فراوانی (۴۴ درصد) را در گندم‌های مورد مطالعه داشت. در واریته‌های گندم ترکیه بیشترین فراوانی آللی مربوط به *Vrn-B1* گزارش شد (Andeden et al., 2011)، *Iqbal et al.* (۲۰۰۷) فراوانی این آلل را در لاینهای مورد مطالعه ۵۰ درصد گزارش نمودند. درحالیکه، فراوانی آلل غالب *Vrn-B1* در گندم‌های چینی کمتر (۲۶ درصد) گزارش شد (Zhang et al., 2008).


vrn-D1 دارای بیشترین فراوانی (۷۳/۷ درصد) در بین ارقام مورد مطالعه بود، و آلل غالب *Vrn-D1* کمترین فراوانی را داشت. آلل *Vrn-D1* در ۲۷ درصد از واریته‌های گندم ترکیه مشاهده شد (Andeden et al., 2011). این آلل همچنین به عنوان باوفورترین آلل در ارقام گندم استرالیایی گزارش شد، که دلیل آن استفاده از مواد اصلاحی سیمیت در توسعه ارقام استرالیایی بوده است (Eagles et al., 2009).

بهاره سازی و فتوپریود نقش مهمی در سازگاری جغرافیایی، عملکرد زراعی، کیفیت و عملکرد بالقوه محصولات در گندم را دارا می‌باشد. ژن‌های بهاره سازی و فتوپریود نقش مهمی در تغییرات زمان گلدهی و بلوغ برای فرار از خشکسالی و یا تنش حرارتی طی پر شدن دانه و یا آسیب از یخ زدگی در برخی از مناطق را دارند. بطوریکه، متوسط عملکرد دانه در هربوته در محیط‌های مختلف برای ژنوتیپ‌های گندم بهاره



شکل ۱- تکثیر قطعات حاصل از PCR برای نشانگرهای اختصاصی برای؛ الف) مکان ژنی *Vrn-A1*، ب) مکان ژنی *Vrn-B1* و ج) مکان ژنی *Vrn-D1*. شماره لین ها از ۱ تا ۱۹ به ترتیب ارقام الموت، الوند، آذر۲، بزوستایا، هیرمند، قدس، نیکنژاد، شعله، کرج ۳، داراب ۲، کویر، هامون، روشن، رسول، شاهپسند، پیشتاز، استار، وریناک و شیراز می باشند.

Figure 1- PCR amplification of specific markers for a) *Vrn-A1* locus, B) *Vrn-B1* locus, and c) *Vrn-D1* locus. Lane numbers from 1 to 19 are Alamoot, Alvand, Azar2, Bezostaja, Hirmand, Qouds, Niknejad, Shole, Karaj3, Darab2, Kavir, Hamoon, Rooshan, Rasool, Shahpasand, Pishtaz, Star, Verinak and Shiraz, respectively.



شکل ۲- تکثیر قطعات PCR برای آغازگرهای اختصاصی در مکان ژنی، الف) *Ppd-B1* و ب) *Ppd-D1* شماره لین ها از ۱ تا ۱۹ به ترتیب ارقام الموت، الوند، آذر۲، بزوستایا، هیرمند، قدس، نیکنژاد، شعله، کرج ۳، داراب ۲، کویر، هامون، روشن، رسول، شاهپسند، پیشتاز، استار، وریناک و شیراز می باشند.

Figure 2 - PCR amplification of allele specific primers for; a) *Ppd-B1* locus and b) *Ppd-D1* locus. Lane numbers from 1 to 19 are Alamoot, Alvand, Azar2, Bezostaja, Hirmand, Qouds, Niknejad, Shole, Karaj3, Darab2, Kavir, Hamoon, Rooshan, Rasool, Shahpasand, Pishtaz, Star, Verinak and Shiraz, respectively.

امکان را می‌دهد که هنگام معرفی یک رقم جدید صرفاً به روش‌های بیومتریک اکتفا نکنند و برای تعیین سازگاری عمومی و خصوصی ارقام با استفاده از روش‌های مولکولی ژنوتیپ‌های موثر را شناسایی کنند.

نتایج این تحقیق مبنایی را برای درک اساس ژنتیکی زمان گلدهی در گندم‌های ایرانی فراهم می‌کند. البته مطالعات بعدی جهت بررسی نقش سامانه‌های ژنتیکی دیگر کنترل‌کننده زمان گلدهی در گندم و سازگاری آنها در گندم‌های ایرانی ضروری است. با توجه به شرایط اقلیمی کشور و وجود نواحی اقلیمی گوناگون، درک اساس ژنتیکی زمان گلدهی و رسیدگی، توسعه ارقام جدید گندم با تنظیم دقیق زمان گلدهی که بتواند از تنش‌های زیستی و غیر زیستی فرار کند را تسهیل می‌نماید. بنابراین، گزینش برای عادت رشدی هدف خیلی مهمی در برنامه‌های اصلاحی شده است. نشانگرهای مولکولی کارکردی مرتبط با ژن‌های *Vrn-1* و *Ppd-1* می‌توانند جهت تسریع در توسعه ارقام گندم سازگار با پتانسیل عملکرد خوب برای محیط‌های هدف مورد استفاده قرار گیرند.

به طور کلی ارقام به دو گروه غیرحساس و حساس به فتوپریود طبقه‌بندی شدند. ۲۷ رقم آل غالب عدم حساسیت به فتوپریود را نشان دادند که شامل ارقام داراب ۲، کویر، روشن، استار، شیراز، الموت، الوند، آذر ۲، بزوستایا، هیرمند، قدس، شعله، کاسکوژن، ریژاو، رصد، اترک، کوهدشت، زرین، دز، اوحدی، استورک، کراس سبلان، بک کراس روشن، کریم، اکسکلیر، گلادیوس و کرج ۳ بودند. این ارقام به عنوان ارقام غیرحساس به فتوپریود شناسایی شدند. ۱۱ رقم شامل؛ هامون، رسول، شاهپسند، پیشتاز، نیک‌نژاد؛ اکبری، شوری، ارگ، آنفرم ۴، بم و وریناک آل مغلوب حساسیت به فتوپریود *ppd-D1b* و *Ppd-B1a* را داشتند، که از میان آنها ۵ رقم وریناک، نیک‌نژاد، اکبری، شوری و ارگ در هر دو مکان ژنی دارای آل‌های مغلوب حساسیت به فتوپریود (*ppd-D1b* و *ppd-B1b*) را نشان دادند. این نتایج نشان می‌دهد که اکثر ارقام مورد مطالعه غیرحساس به فتوپریود بوده و اصلاح ارقام در بیشتر برنامه‌های اصلاحی برای گزینش ارقام غیرحساس به طول روز بوده است. بطور کلی، با دانستن ترکیب آلی مناسب به اصلاح‌گران این

جدول ۲- ترکیب آلی ژن‌های بهاره سازی و فتوپریود در مکان‌های ژنی *VRN-1* و *Ppd-1*

Table 2- The allelic combinations of vernalization and photoperiod genes at the *VRN-1* and *Ppd-1* loci.

Allelic composition ترکیب آلی		ژنوتیپ
<i>VRN-1</i>	<i>Ppd-1</i>	Genotype
<i>vrn-A1, vrn-B1, Vrn-D1</i>	<i>Ppd-D1a, ppd-B1b</i>	الموت-الوند-آذر ۲ Allamot-Alvand-Azare2
<i>vrn-A1, Vrn-B1a, Vrn-D1</i>	<i>ppd-D1b, Ppd-B1a</i>	آنگارم ۴-بیم-پیش‌تاز-شاهپسند-شوری Akfarm4-Pishtaz-Shahpasand-Shori
<i>Vrn-A1a, Vrn-B1a, Vrn-D1</i>	<i>Ppd-D1a, Ppd-B1a</i>	داراب ۲-کوه‌دشت-کویر Darabe2-Kohdasht-Kavir
<i>Vrn-A1a, Vrn-B1a, Vrn-D1</i>	<i>Ppd-D1a, ppd-B1b</i>	شعله-قدس-کرج ۳ Shole-Qods-Karaje3
<i>Vrn-A1a, Vrn-B1a, vrn-D1,</i>	<i>Ppd-D1a, ppd-B1b</i>	اوحدی-بک کران-روشن-کران-سبلان-کریم Ohadi-Backcross Roshan-Cross Sabalan-Karim
<i>Vrn-A1a, Vrn-B1b, vrn-D1</i>	<i>Ppd-D1a, Ppd-B1a</i>	ریژاو-کاسکوژن Rizhav-Kaskogen
<i>Vrn-A1a, Vrn-B1c, vrn-D1</i>	<i>Ppd-D1a, Ppd-B1a</i>	اترک-استار Atrak-Star
<i>Vrn-A1a, Vrn-B1c, vrn-D1</i>	<i>Ppd-D1a, ppd-B1b</i>	استورک-دز Stork-Dez
<i>Vrn-A1a, vrn-B1, Vrn-D1</i>	<i>Ppd-D1a, ppd-B1b</i>	بزوستایا Bezostaya
<i>Vrn-A1a, vrn-B1, Vrn-D1</i>	<i>Ppd-D1a, ppd-B1b</i>	هیرمند Hirmand
<i>Vrn-A1a, Vrn-B1b, Vrn-D1a</i>	<i>Ppd-D1a, ppd-B1b</i>	روشن Roshan
<i>Vrn-A1a, Vrn-B1c, vrn-D1</i>	<i>Ppd-D1a, ppd-B1b</i>	زرین Zarin
<i>Vrn-A1a, Vrn-B1a, vrn-D1</i>	<i>ppd-D1b, ppd-B1b</i>	ارگ Arg
<i>Vrn-A1a, Vrn-B1a, Vrn-D1</i>	<i>ppd-D1b, ppd-B1b</i>	نیک نژاد Niknejad
<i>Vrn-A1a, Vrn-B1b, vrn-D1</i>	<i>Ppd-D1a, Ppd-B1a</i>	رصد Rasad
<i>Vrn-A1a, Vrn-B1b, Vrn-D1</i>	<i>Ppd-D1a, ppd-B1b</i>	اکسکلیبر Excalibur
<i>Vrn-A1a, Vrn-B1b, vrn-D1</i>	<i>Ppd-D1a, ppd-B1b</i>	گلا دیوس Gladious
<i>Vrn-A1a, Vrn-B1b, Vrn-D1</i>	<i>ppd-D1b, ppd-B1b</i>	اکبری Akbari
<i>Vrn-A1a, Vrn-B1c, Vrn-D1</i>	<i>Ppd-D1a, Ppd-B1a</i>	شیراز Shiraz
<i>Vrn-A1b, Vrn-B1b, Vrn-D1</i>	<i>ppd-D1b, Ppd-B1a</i>	وریناک Verinak
<i>Vrn-A1b, Vrn-B1b, Vrn-D1</i>	<i>ppd-D1b, Ppd-B1a</i>	هامون Hamon
<i>vrn-A1, نامشخص نامشخص</i>	<i>ppd-D1b, Ppd-B1a</i>	رسول Rasol

منابع

Amasino R (2004). Vernalization, competence, and the epigenetic memory of Winter. *Plant Cell* 16: 2553-2559

- Andeden EE, Yediay FE, Baloch FS, Shaaf S, Kilian B, Nachit M, Özkan H (2011). Distribution of Vernalization and Photoperiod Genes (*Vrn-A1*, *Vrn-B1*, *Vrn-D1*, *Vrn-B3*, *Ppd-D1*) in Turkish Bread Wheat Cultivars and Landraces. *Cereal Research Communications* 39: 352-364
- Beales J, Turner A, Griffiths S, Snape J, Laurie D (2007). A Pseudo-Response Regulator is misexpressed in the photoperiod insensitive *Ppd-D1a* mutant of wheat (*Triticum aestivum* L.). *Theoretical and Applied Genetics* 115: 721-733
- Cane K, Eagles HA, Laurie DA, Trevaskis B, Vallance N, Eastwood RF, Gororo NN, Kuchel H, Martin PJ (2013) *Ppd-B1* and *Ppd-D1* and their effects in southern Australian wheat. *Crop and Pasture Science* 64: 100-114
- Cockram J, Jones H, Leigh FJ, O'Sullivan D, Powell W, Laurie DA, Greenland AJ (2007). Control of flowering time in temperate cereals: genes, domestication, and sustainable productivity. *Journal of Experimental Botany* 58: 1231-1244
- Distelfeld A, Li C, Dubcovsky J (2009). Regulation of flowering in temperate cereals. *Current Opinion in Plant Biology* 12: 1-7
- Dubcovsky J, Lijavetzky D, Appendino L, GT (1998). Comparative RFLP mapping of *Triticum monococcum* genes controlling vernalization requirement. *Theoretical and Applied Genetics* 97: 968-975
- Eagles HA, Cane K, Vallance N (2009). The flow of alleles of important photoperiod and vernalisation genes through Australian wheat. *Crop and Pasture Science* 60: 646-657
- Flood RG, Halloran GM (1984). The nature and duration of gene action for vernalization response in wheat. *Annals of Botany* 53: 363-368
- Foulkes MJ, Sylvester-Bradley R, Worland AJ, Snape JW (2004). Effects of a photoperiod-response gene *Ppd-D1* on yield potential and drought resistance in UK winter wheat. *Euphytica* 135: 63-73
- Fowler DB, Breton G, Limin AE, Mahfoozi S, Sarhan F (2001). Photoperiod and temperature interactions regulate low-temperature-induced gene expression in barley. *Plant Physiology* 127: 1676-1681
- Galiba G, Quarrie SA, Sutka J, Morgounov A, Snape JW (1995). RFLP mapping of the vernalization (*Vrn1*) and frost-resistance (*Fr1*) genes on chromosome 5A of wheat. *Theoretical and Applied Genetics* 90: 1174-1179
- Iqbal M, Navabi A, Yang R-C, Salmon DF, Spaner D (2007). Molecular characterization of vernalization response genes in Canadian spring wheat. *Genome* 50: 511-516
- Kato K, Yokoyama H (1992). Geographical variation in heading characters among wheat landraces, *Triticum aestivum* L, and its implication for their adaptability. *Theoretical and Applied Genetics* 84: 259-265
- Keim DL, Welsh JR, McConnet RL (1973). Inheritance of photoperiodic heading response in winter and spring cultivars of bread wheat. *Canadian Journal of Plant Science* 53: 247-250
- Law CN, Sutka J, Worland AJ (1978). A genetic study of daylength response in wheat. *Heredity* 41: 575-585
- Limin AE, Fowler DB (2006). Low-temperature tolerance and genetic potential in wheat (*Triticum aestivum* L.): response to photoperiod, vernalization, and plant development. *Planta* 224: 360-366
- Milec Z, Tomkova L, Sumikova T, Pankova K (2012). A new multiplex PCR test for the determination of *Vrn-B1* alleles in bread wheat (*Triticum aestivum* L.). *Molecular Breeding* 30: 317-323
- Pallotta MA, Warner P, Fox RL, Kuchel H, Jefferies SJ, Langridge P (2003). Marker assisted wheat breeding in the southern region of Australia. *In Proceedings of the Tenth International Wheat Genetics Symposium Paestum, Italy*, pp 789-791

- Santra DK, Santra M, Allan RE, Campbell KG, Kidwell KK (2009). Genetic and molecular characterization of vernalization genes *Vrn-A1*, *Vrn-B1* and *Vrn-D1* in spring wheat germplasm from Pacific Northwest region of USA. *Plant Breeding* 128: 576-584
- Scarth R, Law CN (1984). The control of day-length response in wheat by the group 2 chromosomes. *Z Pflanzenzuchtung* 92: 140-150
- Shindo C, Sasakuma T (2002). Genes responding to vernalization in hexaploid wheat. *Theoretical and Applied Genetics* 104: 1003-1010
- Snape JW (1998). Golden calves or white elephants? Biotechnologies for wheat improvement. *Euphytica* 100: 207-217
- Snape JW, Butterworth K, Whitechurch E, Worland AJ (2001). Waiting for fine times: genetics of flowering time in wheat. *Euphytica* 119: 185
- Stelmakh AF (1992). Genetic effects of *Vrn* genes on heading date and agronomic traits in bread wheat. *Euphytica* 65: 53-60
- Tanio M, Kato K (2007). Development of near-isogenic lines for photoperiod-insensitive genes, *Ppd-B1* and *Ppd-D1*, carried by the Japanese wheat cultivars and their effect on apical development. *Breeding Science* 57: 65-72
- Trevaskis B, Hemming MN, Dennis ES, Peacock WJ (2007). The molecular basis of vernalization-induced flowering in cereals. *Trends in Plant Science* 12: 352-357
- Wallace DH, Yan W (1998) Plant breeding and whole-system crop physiology, improving crop maturity, adaptation and yield. CAB International, New York, USA.
- Welsh JR, Keim DL, Pirasteh B, Richards RD (1973). Genetic control of photoperiod response in wheat. *In Proceedings of the 4th International Wheat Genetics Symposium*. University of Missouri, Columbia, USA, pp 879–884
- Worland AJ (1996). The influence of flowering time genes on environmental adaptability in European wheats. *Euphytica* 89: 49-57
- Worland AJ, Appendino ML, Sayers EJ (1994). The distribution, in European winter wheats, of genes that influence ecoclimatic adaptability while determining photoperiodic insensitivity and plant height. *Euphytica* 80: 219-228
- Worland AJ, Börner A, Korzun V, Li WM, Petrović S, Sayers EJ (1998). The influence of photoperiod genes on the adaptability of European winter wheats. *Euphytica* 100: 385-394
- Worland AJ, Sayers E (1996). The influence of flowering time genes on environmental adaptability in European wheats. *Euphytica* 89: 49-57
- Yan L, Helguera M, Kato K, Fukuyama S, Sherman J, Dubcovsky J (2004). Allelic variation at the *VRN-1* promoter region in polyploid wheat. *Theoretical and Applied Genetics* 109: 1677-1686
- Yan L, Loukoianov A, Tranquilli G, Helguera M, Fahima T, Dubcovsky J (2003). Positional cloning of the wheat vernalization gene *VRN1*. *PNAS* 100: 6263-6268
- Zhang XK, Xiao YG, Zhang Y, Xia XC, Dubcovsky J, He ZH (2008). Allelic variation at the vernalization genes *Vrn-A1*, *Vrn-B1*, *Vrn-D1*, and *Vrn-B3* in Chinese wheat cultivars and their association with growth habit. *Crop Science* 48: 458-470.

Evaluation of allelic diversity of *VRN1* and *Ppd1* genes in different bread wheat cultivars

Nazari M.¹, Izanloo A.^{*2}, Ghaderi M.Gh.³, Alizade Z.⁴

¹MSc student in plant breeding, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Iran.

²Assistance professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Iran.

³Assistance professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Iran.

⁴Assistance professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Iran.

Abstract

Major flowering time genes including vernalization and photoperiod response play a crucial role in the geographical and agronomical adaptations, and potential yield in cereals. Assessment and understanding of the distribution of allelic variations for vernalization and photoperiod genes is of special importance in wheat breeding programs and parental selection. Therefore, the objective of this study was to evaluate 38 bread wheat varieties for allelic variations at the *VRN1* and *Ppd1* loci, using functional molecular markers. In this study, the frequency of *vrn-A1*, *Vrn-A1a* and *Vrn-A1b* alleles at the *Vrn-A1* locus were 57.9, 39.5 and 2.6 percent, respectively. At the *Vrn-D1* locus, *vrn-D1* and *Vrn-D1* alleles had the frequency of 73.7 and 26.3 percent, respectively. At the *Vrn-B1* locus, the most frequent allele was *Vrn-B1a* with 44.7 percent, while the frequencies of *Vrn-B1b*, *Vrn-B1c* and *vrn-B1* alleles were 21, 18.4 and 13.2 percent, respectively. Allelic variations at the *Ppd-1* gene were also detected in the studied population. As allelic frequencies of *Ppd-D1a* and *ppd-D1b* at the *Ppd-D1* locus were 71 and 29 percent, respectively. At the *Ppd-B1* locus, 18 genotypes had *Ppd-B1a* allele, while 20 others showed *ppd-B1b* allele. In general, *Ppd-D1* was the most frequent allele, followed by *Vrn-A1a*, *Vrn-D1*, *Ppd-B1b* and *Vrn-B1a*. These results indicate that the frequency of dominant allele at the *VRN1* and *Ppd1* genes was the highest. Therefore, according to these results, most genotypes can be considered as spring and insensitive to photoperiod.

Keywords: Photoperiod, Molecular markers, Genotype, Vernalization.

* Corresponding Author: Izanloo A.

Tel: 05612254041

Email: a.izanloo@birjand.ac.ir