

تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و مولیبدن محلول غذایی بر صفات کمی و کیفی و غلظت نیترات در خیار سبز در محیط آبکشت

سمیه بیگی^{*}، احمد گلچین و سعید شفیعی^۱

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۰/۳/۱۱؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۰/۵/۴)

چکیده

به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و مولیبدن بر صفات کمی و کیفی و تجمع نیترات در خیار سبز رقم "سلطان" یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی شامل سطوح مختلف نیتروژن (۲۲۸، ۳۱۰ و ۳۱۰ میلی گرم در لیتر) و مولیبدن (۰/۱۰، ۰/۱۰ و ۱ میلی گرم در لیتر) در سه تکرار در گلخانه دانشگاه زنجان در سال ۱۳۸۸ به صورت آبکشت به اجرا درآمد. نتایج نشان داد که اثر سطوح مختلف نیتروژن و مولیبدن بر عملکرد و شاخص‌های رشد گیاه شامل میانگین وزن، طول و قطر تک میوه و کلروفیل برگ در سطح احتمال ۱٪ معنی دار است. با افزایش میزان نیتروژن محلول غذایی، میزان کلروفیل برگ افزایش دارد و میانگین طول، وزن و قطر تک میوه کاهش یافت. افزایش سطح مولیبدن محلول غذایی باعث کاهش شاخص‌های رشد و عملکرد خیار سبز شد. به طوری که بیشترین عملکرد میوه از تیمار حاوی ۰/۰۱ میلی گرم مولیبدن در لیتر محلول غذایی بدست آمد که با تیمار ۰/۱ میلی گرم در لیتر تفاوت معنی داری نداشت. ولی در تیمار حاوی ۱ میلی گرم مولیبدن در لیتر، عملکرد به مقدار زیادی کاهش یافت. اثر سطوح مختلف نیتروژن و مولیبدن محلول غذایی بر غلظت نیترات میوه در سطح ۱٪ معنی دار بود. افزایش سطح نیتروژن محلول غذایی، غلظت نیترات را از ۱۳۵۶ به ۲۱۲۲ میلی گرم در کیلوگرم بافت خشک میوه خیار سبز افزایش داد که از حد مجاز آن (۱۵۰۰ میلی گرم در کیلوگرم بافت خشک میوه) بیشتر بود. افزایش سطح مولیبدن محلول غذایی از ۰/۰۱ به ۰/۰۱ میلی گرم در لیتر بدون تأثیر بر عملکرد، غلظت نیترات را از ۱۹۶۱ به ۱۷۰۳ میلی گرم در کیلوگرم بافت خشک میوه کاهش داد. افزایش غلظت نیتروژن محلول غذایی باعث افزایش معنی دار غلظت نیتروژن، پتابسیم و کلسیم و کاهش غلظت فسفر، منیزیم و مولیبدن میوه شد. هم‌چنین با افزایش غلظت مولیبدن محلول غذایی، غلظت آهن، منگنز و مولیبدن در میوه افزایش، ولی غلظت مس کاهش یافت. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که افزایش غلظت مولیبدن در محلول غذایی در محیط کشت آبکشت بدون کاهش عملکرد باعث کاهش غلظت نیترات در میوه خیار سبز می‌شود.

واژه‌های کلیدی: عناصر غذایی، تجمع نیترات، شاخص‌های رشد، خیار گلخانه‌ای

مقدمه

گوجه‌فرنگی، کلم و پیاز، میزان تولید جهانی خیار سبز در مقام چهارم قرار دارد و ایران بعد از چین و ترکیه سومین تولید کننده خیار سبز در جهان است (۱). طبق آخرین آمارنامه منتشره در سال ۱۳۸۳، سطح زیر کشت خیار سبز گلخانه‌ای ۲۰۰ هکتار

خیار سبز یکی از مهمترین محصولات گلخانه‌ای است که توسعه روش‌های نوین پرورش آن می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و تولید این محصول داشته باشد (۲). بعد از

۱. به ترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد، استاد و دانشجوی دکتری گروه خاک‌شناسی، دانشگاه زنجان

*: مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: s.beige1362@yahoo.com

نیتروژن در هکتار حاصل شد. هم‌چنین مصرف مولیبدن به مقدار $۰/۴$ کیلوگرم در هکتار باعث افزایش عملکرد و شاخص‌های رشد گیاه شد ولی با افزایش سطح آن به $۰/۸$ کیلوگرم در هکتار، عملکرد کاهش یافت. کاشکی و غیور باگبانی (۶) در بررسی تأثیر سطوح مختلف نیتروژن (صفر، ۵۰ ، ۱۰۰ ، ۱۵۰ و ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار) بر عملکرد و تجمع نیترات در گیاه خیار سبز مشاهده کردند که میزان نیترات میوه با افزایش مصرف نیتروژن افزایش یافت و در تیمار ۲۵۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار به بالاترین حد خود رسید. کاتسیراس و همکاران (۱۷) با بررسی تأثیر سطوح مختلف نیتروژن محلول غذایی (۱۰۰ ، ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی‌گرم در لیتر) بر عملکرد و کیفیت خیار سبز نشان دادند که بیشترین عملکرد از سطوح ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی‌گرم در لیتر محلول غذایی به دست آمد و با افزایش سطوح نیتروژن به بیشتر از ۲۰۰ میلی‌گرم در لیتر عملکرد، تعداد میوه و میانگین طول، قطر و وزن تک میوه کاهش یافت. بنابراین مصرف زیاد نیتروژن در محلول غذایی نه تنها عملکرد را کاهش می‌دهد، بلکه کیفیت محصولات کشاورزی مخصوصاً سبزی‌های گلخانه‌ای را کاهش می‌دهد، چون باعث تجمع نیترات در بافت‌های گیاه می‌شود. در مقابل، مصرف کافی مولیبدن در محلول‌های غذایی می‌تواند در احیاء نیترات و تبدیل آن به اسیدهای آمینه و نهایتاً پروتئین مؤثر واقع شده و از غلظت زیاد نیترات در بافت‌های گیاه بکاهد. ولی میزانی از نیتروژن که باعث تجمع غیر مجاز نیترات در خیار سبز می‌شود و یا سطحی از مولیبدن که بدون کاهش عملکرد باعث کاهش غلظت نیترات در میوه می‌شود مشخص نبوده و به‌همین دلیل این تحقیق با هدف بررسی تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و مولیبدن بر عملکرد و غلظت نیترات در میوه و بافت‌های خیار سبز اجرا گردید.

مواد و روش‌ها

به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و مولیبدن بر

با متوسط عملکرد ۱۵ کیلوگرم در متر مربع بوده است. ولی در سال‌های اخیر با تولید ۱۴ میلیون تن خیار گلخانه‌ای حدود $۳/۳$ درصد از تولید خیار سبز ایران در گلخانه صورت گرفته است که سطحی معادل ۸۰۰۰ هکتار را شامل می‌شود (۴) و (۱۱). عوامل مختلفی در عملکرد خیار سبز نقش دارند که از آن جمله می‌توان به تغذیه متعادل گیاه اشاره کرد. رشد گیاه بستگی به فراهم بودن نیتروژن در محیط کشت دارد، زیرا این عنصر در تشکیل آمینواسیدهای، پروتئین‌ها، اسیدهای نوکلئیک و دیگر ترکیبات سلولی نقش مهمی دارد (۸ و ۱۶). ولی مصرف بیش از اندازه کودهای شیمیایی نیتروژن در محلول‌های غذایی و خاک باعث برهم خوردن تعادل عناصر غذایی، آلودگی محیط‌زیست، افت کیفی محصول و هدر رفتن بخش عظیمی از سرمایه‌های ملی می‌شود. از طرف دیگر، مصرف بیش از حد کودهای نیتروژن برای تولید محصولات کشاورزی سلامت انسان را به مخاطره می‌اندازد، زیرا گیاه مقدار زیادی از نیتروژن را به صورت نیترات جذب می‌کند که می‌تواند سلطان‌زا باشد (۶).

زمانی که گیاه تحت تنش قرار می‌گیرد، یا دچار کمبود مولیبدن می‌شود، تبدیل نیترات به پروتئین کاهش یافته و نیترات در بافت‌های گیاه تجمع می‌یابد (۲۵). مولیبدن یکی از عناصر تشکیل‌دهنده آنزیم نیترات ردوکتاز بوده و در آسمیلاسیون نیترات نقش مهمی بازی می‌کند. به‌همین دلیل مقادیر جزئی آن تأثیر مثبت و معنی‌داری بر میزان پروتئین گیاه، افزایش رشد و کاهش ترکیبات نیتروژن محلول از جمله نیترات دارد (۱۰). هنگامی که نیترات بدون مولیبدن مصرف می‌شود، رشد گیاهان ضعیف، غلظت کلروفیل آنها اندک و نشانه‌های آشکار کمبود نیتروژن در برگ‌ها نمایان می‌شود (۱۹). رابی و همکاران (۲۲) در بررسی تأثیر سطوح مختلف نیتروژن (صفر، ۳۰ ، ۶۰ ، ۹۰ و ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار) و مولیبدن ($۰/۴$ و $۰/۸$ کیلوگرم در هکتار) بر رشد و عملکرد نخودفرنگی مشاهده کردند که بیشترین مقدار عملکرد و شاخص‌های رشد از مصرف ۹۰ کیلوگرم

جدول ۱. ترکیب شیمیایی محلول غذایی هوگلن

ترکیب	کم مصرف (محلول ذخیره)	محولهای غذایی حاوی عناصر پرمصرف و
	(محلول ذخیره)	نها
غلاشت محلول ذخیره	حجم محلول ذخیره در لیتر محلول	نها
	گرم در لیتر)	(میلی لیتر)
KCl	۷۴/۵	۶
Ca(NO ₃) ₂ .4H ₂ O	۲۳۶/۱۶	۲
KNO ₃	۱۰۱/۰۱	۱
KH ₂ PO ₄	۱۳۶/۰۹	۱
MgSO ₄ .7H ₂ O	۲۴۶/۵	۱
H ₃ BO ₃	۰/۶۱۸۴	
ZnSO ₄ .7H ₂ O	۰/۱۴۴	
MnSO ₄ .H ₂ O	۰/۰۸۵	۱
CL ₂ Ni.6H ₂ O	۰/۰۲۸۵۲	
CuSO ₄ .5H ₂ O	۰/۰۴۹۹	
Fe-EDTA	۶/۹۶۲	۱
NO ₃ NH ₄	۸۰/۰۴	۱ و ۵
۰/۰۱۸۴		۱
H ₂ 4MO ₇ N ₆ O ₂₄ .4H ₂ O	۰/۱۸۴	۱
۱/۸۴		۱

برای استقرار در محیط جدیدشان فرصت داشته باشند. محلول غذایی مورد استفاده در این آزمایش هوگلن بود که برای تهیه آن ابتدا محلول‌های I، II و III به طور جداگانه تحت عنوان محلول‌های غذایی ذخیره و با غلطت‌های ذکر شده در جدول ۱ تهیه شدند. از محلول‌های غذایی ذخیره به اندازه ذکر شده در جدول ۱ برداشته و با هم مخلوط و در نهایت حجم آنها به یک لیتر رسانیده شد تا محلول غذایی هوگلن پایه ساخته شود. با افزودن مقادیر مختلف نیترات آمونیوم و مولیبدات آمونیوم از محلول‌های IV و V به محلول غذایی هوگلن پایه، محلول‌های باسطوح مختلف نیتروژن و مولیبدن به عنوان تیمارهای آزمایش ساخته شدند. سطوح نیتروژن محلول‌های غذایی عبارت بودند از ۲۳۸ و ۳۱۰ میلی گرم در لیتر و میزان مولیبدن آنها در مقادیر ۰/۰۱، ۰/۱ و ۱ میلی گرم در لیتر تنظیم گردید. متوسط EC محلول‌های غذایی ۲ میلی موس برابر

صفات کمی و کیفی و تجمع نیترات در خیار سبز یک آزمایش گلدانی در گلخانه گروه خاک‌شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سال ۱۳۸۸ به اجرا درآمد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با شش تیمار و در سه تکرار انجام شد. رقم خیار سبز مورد استفاده "سلطان" بود که از شرکت فلات ایران تهیه گردید. ابتدا بذرهای این رقم به مدت ۳ روز در داخل یک پارچه تمیز خیسانده شدند تا جوانه بزنند. سپس بذرهای جوانه‌دار به گلدانهای حاوی ۴۵۰ گرم پرلیت انتقال داده شدند و گلدان‌ها تا رسیدن به رطوبت گنجایش زراعی با محلول غذایی آبیاری گردیدند. درصد وزنی رطوبت پرلیت در نقطه گنجایش زراعی به کمک دستگاه صفحات فشاری در مکش ۰/۳ بار اندازه‌گیری شد. زمان برای کاشت بذرها، عصر در نظر گرفته شد تا گیاهک‌ها تمام شب را قبل از این که گرمای خورشید در صبح روز بعد به آنها برسد،

جدول ۲. نتایج تجزیه واریانس تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و مولیبدن بر عملکرد و شاخص‌های رشد خیار سبز

منابع تغییرات	قرائت کلروفیل	سطح برگ	طول برگ	قطر میوه	وزن میوه	(گرم در بوته)	عملکرد
سطوح نیتروژن (N)	۴۰۴/۸۹**	۱۵۹۸/۰۰**	۰/۰۷**	۱۱/۶۸**	۳۲۹۸/۸۸**	۳۰۲۰۵۴۲**	۳۰۲۰۵۴۲**
سطوح مولیبدن (Mo)	۹۱/۴۵**	۳۲/۲۴ ns	۰/۲۵**	۷/۵**	۱۵۲/۳۸ ns	۲۱۱۵۳۵۹**	۲۱۱۵۳۵۹**
Mo×N	۶۶/۳۱**	۷۴۷۱/۱۸**	۰/۰۲**	۲/۱۹ ns	۴۵۱/۲۱**	۲۲۱۷۲ ns	۲۲۱۷۲ ns
خطا	۹/۷۶	۵۹/۸۴	۰/۰۰۶	۰/۹۳	۱۵۰/۰۴	۱۴۶۱۷/۳	۱۴۶۱۷/۳
(%) CV	۵/۳۹	۴/۹۶	۵/۹۹	۸/۳۳	۱۸/۴	۱/۵	۱/۵

** و * به ترتیب دارای اختلاف معنی‌دار در سطوح ۱٪ و ۵٪ و ns بدون اختلاف معنی‌دار

MSTATC استفاده شد. هم‌چنین از آزمون چند دامنه دانکن برای مقایسه میانگین‌ها و از نرم افزار Excel جهت مرتب کردن داده‌ها استفاده گردید.

نتایج و بحث

عملکرد و شاخص‌های رشد گیاه خیار سبز

عملکرد: نتایج به دست آمده از جدول تجزیه واریانس داده‌ها (جدول ۲) نشان می‌دهد که سطوح مختلف نیتروژن و مولیبدن تأثیر معنی‌داری در سطح احتمال ۱٪ بر میزان عملکرد خیار سبز دارد. افزایش مصرف نیتروژن باعث کاهش عملکرد میوه از ۱۸۰۴ به ۱۳۹۴ گرم در بوته شد (جدول ۳) که با نتایج کاتسیراس و همکاران (۲۱) مطابقت دارد. افزایش سطح نیتروژن محلول غذایی هم‌چنین باعث ضخیم شدن ساقه‌ها و ایجاد رنگ سبز تیره در برگ‌ها، افزایش تعداد پیچک‌ها و کاهش تعداد گل‌ها در بوته‌ها گردید. نقش نیتروژن بیشتر مشارکت در ساخت اندام‌های رویشی مثل برگ‌ها و شاخسارها است. به همین دلیل مصرف زیاد آن باعث تحریک رشد رویشی، افزایش سبزینگی برگ‌ها و به تعویق افتادن تشکیل گل و میوه می‌شود (۳). بنابراین یکی از دلایل کاهش عملکرد خیار سبز با افزایش سطح نیتروژن محلول غذایی را می‌توان کاهش تعداد گل و در نتیجه تعداد میوه در بوته نسبت داد. افزایش سطح مولیبدن محلول غذایی نیز باعث کاهش عملکرد خیار شد. بیشترین عملکرد میوه از تیمار حاوی ۰/۰۱ میلی‌گرم مولیبدن در لیتر

سانسی‌مترا و متوسط pH آنها ۵/۸ بود. در طول دوره رشد، گیاهان با محلول‌های غذایی حاوی سطوح مختلف نیتروژن و مولیبدن آبیاری شدند و در نور طبیعی، به مدت ۷۵ روز رشد کردند. در طول دوره داشت، میزان عملکرد هر بوته در مراحل مختلف برداشت با ترازوی دیجیتالی توزین و از مجموع توزین‌ها عملکرد نهایی هر بوته محاسبه گردید. شاخص‌های رشد گیاه شامل: شاخص کلروفیل برگ به کمک کلروفیل سنج MINOLTA SPAD-520 و سطح برگ با استفاده از دستگاه Leaf area meter و بر حسب سانسی‌مترا مربع در بوته، میانگین طول و قطر تک میوه به ترتیب با استفاده از خطکش و کولیس و میانگین وزن تر تک میوه با استفاده از ترازوی دیجیتالی و از مجموع اندازه‌گیری‌های مختلف محاسبه گردید. اندازه‌گیری نیترات به روش هامفریز و همکاران (۱۷) و با استفاده از ۰/۵ گرم ماده خشک میوه انجام گرفت. نیترات با فلزی سولفونیک اسید تولید رنگ زرد می‌کند که شدت رنگ حاصل از طریق رنگ‌سنجی با دستگاه اسپکتروفوتومتر مدل CECIEL Serie2 در طول موج ۴۰۸ نانومتر اندازه‌گیری شد و سپس میزان نیترات بر حسب میلی‌گرم در کیلوگرم ماده خشک محاسبه گردید. در نهایت، غلظت عناصر پرمصرف و کم‌صرف توسط روش‌های رایج آزمایشگاهی توصیه شده توسط مؤسسه تحقیقات خاک و آب، در ماده خشک میوه اندازه‌گیری شد (۱ و ۲). پس از به دست آوردن داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز، برای محاسبات آماری و تجزیه واریانس داده‌ها از نرم‌افزار آماری

جدول ۳. مقایسه میانگین‌های اثر سطوح مختلف نیتروژن و مولیبدن بر عملکرد و شاخص‌های رشد خیار سبز

تیمار	سطح	قرائت کلروفیل	سطح برگ (سانتی‌متر مربع)	طول برگ (سانتی‌متر)	قطر میوه (سانتی‌متر)	وزن میوه (گرم)	عملکرد (گرم در بوته)
نیتروژن	N_{238}	۵۵/۵۶ b	۱۵۱/۲۲ b	۱۲/۰۹ a	۱/۳۰ a	۷۳/۳۵ b	۱۸۰۴ a
	N_{310}	۶۰/۳۱ a	۱۶۰/۶۴ a	۱۱/۲۱ b	۱/۲۳ b	۵۹/۸۱ a	۱۳۹۴ b
	$Mo_{0.01}$	۵۹/۵۸ a	۱۵۷/۱ a	۱۲/۴۲ a	۱/۳۷ a	۶۷/۳۵ a	۱۶۷۸ a
	$Mo_{0.1}$	۵۸/۴۶ a	۱۰۵/۳ a	۱۱/۲۴ b	۱/۲۶ b	۶۸/۶۴ a	۱۶۲۵ a
	Mo_1	۵۵/۷۸ b	۱۵۵/۰ a	۱۱/۱۹ c	۱/۱۶ c	۶۳/۷۷ a	۱۴۹۴ b
	LSD	۲/۴۲	۵/۹۹	۰/۰۶	۱۵/۴۹	۱۰/۳۶	۹/۳۶
مولیبدن	$Mo_{0.01 \times N_{238}}$	۵۹/۰۱ ab	۱۳۲/۶ c	۱۱/۸۲ a	۱/۴۴ a	۷۸/۲۴ a	۱۶۶۵ a
	$Mo_{0.1 \times N_{238}}$	۵۵/۷۶ b	۱۴۹/۵ b	۱۱/۹۴ a	۱/۲۹ b	۷۵/۸۱ a	۱۶۵۱ a
	$Mo_{1 \times N_{238}}$	۵۱/۹۴ c	۱۷۰/۸ a	۱۱/۲۹ a	۱/۱۶ d	۶۶/۰۲ ab	۱۶۵۰ a
	$Mo_{0.01 \times N_{310}}$	۶۰/۱۵ a	۱۶۶/۷ a	۱۱/۰۲ a	۱/۳۰ b	۵۶/۴۶ b	۱۶۴۲ a
	$Mo_{0.1 \times N_{310}}$	۶۱/۱۶ a	۱۵۱/۵ b	۱۱/۵۶ a	۱/۲۳ c	۶۱/۴۶ b	۱۶۴۹ a
	$Mo_{1 \times N_{310}}$	۵۹/۶۳ a	۱۲۳/۷ c	۱۱/۰۰ a	۱/۱۲ d	۶۱/۵۳ b	۱۶۳۲ a
اثر مقابل نیتروژن × مولیبدن	LSD	۳/۴۲	۸/۴۷	۰/۰۸	۱۰/۰۶	۱۰/۰۶	۱/۳۲

میانگین‌هایی که در هر ستون یک حرف مشترک دارند، با هم اختلاف معنی‌داری در سطح ۱٪ ندارند.

۱۰۰ میلی‌گرم در لیتر مولیبدن در محلول غذایی اندازه‌گیری شد. کمترین عملکرد میوه به میزان ۱۶۳۲ گرم در بوته در تیمار حاوی ۳۱۰ میلی‌گرم در لیتر نیتروژن و ۱ میلی‌گرم در لیتر مولیبدن محلول غذایی اندازه‌گیری شد (جدول ۳).

شاخص کلروفیل برگ: نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس داده‌ها (جدول ۲) نشان می‌دهد که سطوح مختلف نیتروژن و مولیبدن تأثیر معنی‌داری در سطح احتمال ۱٪ بر شاخص کلروفیل برگ دارد. افزایش مصرف نیتروژن باعث افزایش شاخص کلروفیل برگ شد (جدول ۳). نیتروژن در ساختمان کلروفیل به کار رفته است، به طوری که هر مولکول کلروفیل دارای چهار اتم نیتروژن می‌باشد. بنابراین با افزایش مصرف نیتروژن، میزان کلروفیل در گیاه نیز افزایش می‌یابد. گالر و همکاران (۱۲) در تحقیق خود روی گیاه خیار سبز، نتایج مشابهی اعلام کردند. افزایش سطوح مولیبدن محلول غذایی باعث کاهش شاخص کلروفیل برگ از ۵۹/۵۸ به ۵۵/۷۸ شد (جدول ۳). آگاروالا و

محلول غذایی به دست آمد که با تیمار ۱۰۰ میلی‌گرم در لیتر تفاوت معنی‌داری نداشت. مولیبدن به مقدار خیلی کم برای گیاهان لازم می‌باشد و این عنصر با افزایش سریع فعالیت آنزیم نیترات‌ردوکتاز باعث متابولیسم نیترات و افزایش عملکرد محصول می‌شود. ولی مصرف بیش از حد کافیت آن تأثیری در افزایش عملکرد ندارد (۵). در غلظت ۱ میلی‌گرم مولیبدن در لیتر محلول غذایی، عملکرد به مقدار زیادی کاهش یافت (جدول ۳) که احتمالاً به دلیل ایجاد سمیت در بافت‌های گیاه باشد. اگر چه اثرات سمی مولیبدن در بخش هوایی گیاه مشاهده نشد، با این حال به نظر می‌رسد برخی اختلالات متابولیک در گیاه باعث کاهش عملکرد شده باشد. کاهش عملکرد هم‌چنین می‌تواند ناشی از اثرات منفی مولیبدن بر شاخص کلروفیل برگ باشد (۳). اثر مقابل نیتروژن و مولیبدن بر عملکرد خیار سبز معنی‌دار نشد (جدول ۲)، ولی بیشترین عملکرد میوه به میزان ۱۶۶۵ گرم در بوته در تیمار حاوی ۲۳۸ میلی‌گرم نیتروژن و

میانگین طول، قطر و وزن تک میوه: نتایج به دست آمده از جدول ۲ نشان می‌دهد که تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و مولیبدن بر میانگین طول، قطر و وزن تک میوه در سطح احتمال ۱٪ معنی دار است. افزایش غلظت نیتروژن محلول غذایی باعث کاهش میانگین طول، قطر و وزن تک میوه شد (جدول ۳) که احتمالاً به دلیل تحریک رشد رویشی و اختصاص مواد فتوستراتی بیشتر به برگ‌ها و شاخساره‌ها و مقدار کمتری به میوه است. کاتسیراس و همکاران (۲۱) با بررسی اثر نیتروژن بر عملکرد و کیفیت خیار سبز نتایج مشابهی را گزارش کردند. افزایش غلظت مولیبدن در محلول غذایی نیز میانگین طول، قطر و وزن تک میوه را کاهش داد (جدول ۳). اثر متقابل نیتروژن و مولیبدن بر میانگین قطر تک میوه در سطح احتمال ۱٪ معنی دار شد، ولی بر میانگین طول تک میوه معنی دار نبود (جدول ۲). بیشترین میانگین طول میوه (۱۱/۹۴ سانتی‌متر) مربوط به تیمار حاوی ۲۳۸ میلی‌گرم نیتروژن و ۱۰٪ میلی‌گرم مولیبدن در لیتر محلول غذایی و کمترین میانگین طول تک میوه (۱۱ سانتی‌متر) مربوط به تیمار حاوی ۳۱۰ میلی‌گرم نیتروژن و ۱ میلی‌گرم مولیبدن در لیتر محلول غذایی بود که با تیمارهای دیگر تفاوت معنی داری نداشتند (جدول ۲). بیشترین میانگین قطر تک میوه به میزان ۱/۴۴ سانتی‌متر مربوط به تیمار حاوی ۱/۱۲ میلی‌گرم نیتروژن و ۱۰٪ میلی‌گرم مولیبدن در لیتر محلول غذایی و کمترین میانگین قطر تک میوه به میزان ۱/۱۲ سانتی‌متر از تیمار حاوی ۳۱۰ میلی‌گرم نیتروژن و ۱۰٪ میلی‌گرم مولیبدن در لیتر محلول غذایی به دست آمد (جدول ۳). اثر متقابل نیتروژن و مولیبدن بر میانگین وزن تک میوه در سطح احتمال ۱٪ معنی دار شد (جدول ۲). بیشترین میانگین وزن تک میوه (۷۸/۲۴ گرم) مربوط به تیمار حاوی ۳۱۰ میلی‌گرم نیتروژن و ۱۰٪ میلی‌گرم مولیبدن در لیتر محلول غذایی و کمترین میانگین وزن تک میوه (۵۶/۴۶ گرم) مربوط به تیمار حاوی ۲۳۸ میلی‌گرم نیتروژن و ۱۰٪ میلی‌گرم مولیبدن در لیتر محلول غذایی بود (جدول ۳). مولیبدن به مقدار خیلی کم و به میزان ۰٪ میلی‌گرم در لیتر تأثیر مشتبه بر رشد و شاخص‌های رشد گیاه داشت و بیشترین

همکاران (۹) در گیاه ذرت و هویت و همکاران (۱۳) در گیاه برنج نتایج مشابهی را گزارش کردند. اثر متقابل نیتروژن و مولیبدن بر میزان کلروفیل برگ در سطح احتمال ۱٪ معنی دار شد (جدول ۲). بیشترین شاخص کلروفیل برگ به مقدار ۶۱/۱۵ در تیمار حاوی ۳۱۰ میلی‌گرم در لیتر نیتروژن و ۱۰٪ میلی‌گرم در لیتر مولیبدن محلول غذایی اندازه‌گیری شد که تفاوت معنی داری با تیمار حاوی ۳۱۰ میلی‌گرم در لیتر نیتروژن و ۱۰٪ میلی‌گرم در لیتر مولیبدن محلول غذایی نداشت. کمترین مقدار شاخص کلروفیل برگ به مقدار ۵۱/۹۴ در تیمار حاوی ۲۳۸ میلی‌گرم در لیتر نیتروژن و ۱ میلی‌گرم در لیتر مولیبدن محلول غذایی اندازه‌گیری شد (جدول ۳)، مولیبدن در ساختار آنزیمهای گیاهی، از جمله نیترات‌ردوکتاز، نقش دارد و کمبود آن به علت جلوگیری از احیاء نیترات و تشکیل پروتئین باعث بروز کمبود کلروفیل در گیاه می‌شود که خود نوعی پروتئین است. مولیبدن در غلظت‌های سمی نیز به دلیل ایجاد اختلالات متابولیک در گیاه و بر هم زدن تعادل عناصر غذایی باعث کاهش میزان کلروفیل برگ می‌شود (۲۲).

سطح برگ: نتایج ارائه شده در جدول ۲ نشان می‌دهند که سطوح مختلف نیتروژن تأثیر معنی داری در سطح احتمال ۱٪ بر میزان سطح برگ دارد و افزایش مصرف نیتروژن سبب افزایش سطح برگ در بوته شد. در سطوح بالای نیتروژن، به علت تولید بیشتر کلروفیل و افزایش میزان فتوسترات، سطح برگ افزایش می‌یابد (۵). نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس داده‌ها (جدول ۲) و نیز مقایسه میانگین‌ها (جدول ۳) نشان می‌دهد که سطوح مختلف مولیبدن تأثیر معنی داری بر میزان سطح برگ در بوته ندارد. اثر متقابل نیتروژن و مولیبدن بر سطح برگ در سطح احتمال ۱٪ معنی دار شد (جدول ۲) و بیشترین مقدار سطح برگ (۱۷۰/۸۰ سانتی‌متر مربع در بوته) از تیمار حاوی ۲۳۸ میلی‌گرم نیتروژن و ۱۰٪ میلی‌گرم مولیبدن در لیتر محلول غذایی و کمترین مقدار سطح برگ (۱۳۳/۷ سانتی‌متر مربع در بوته) از تیمار حاوی ۳۱۰ میلی‌گرم نیتروژن و ۱۰٪ میلی‌گرم مولیبدن در لیتر محلول غذایی به دست آمد (جدول ۳).

جدول ۴. نتایج تجزیه واریانس سطوح مختلف نیتروژن و مولیبدن بر غلظت نیترات میوه خیار سبز (میلی‌گرم در کیلوگرم بافت خشک)

نیترات میوه	منابع تغییرات
۱۰۵۴۸۱۸۴/۷۳**	سطوح نیتروژن (N)
۱۰۱۰۴۱۵/۱۸**	سطوح مولیبدن (Mo)
۴۴۶۵۶/۸۹**	Mo×N
۳۷/۹۹	خطا
۰/۳۵	(%) CV

** دارای اختلاف معنی دار در سطح ۱٪

در گیاه آزو لا گزارش نموده اند. اثرات متقابل سطوح نیتروژن و مولیبدن بر غلظت نیترات میوه خیار سبز در سطح احتمال ۱٪ معنی دار شد (جدول ۴). حداکثر غلظت نیترات میوه به میزان ۲۳۹۳ میلی‌گرم در کیلوگرم بافت خشک در تیمار حاوی ۳۱۰ میلی‌گرم نیتروژن و ۰/۰۱ میلی‌گرم مولیبدن در لیتر محلول غذایی اندازه‌گیری شد و حداقل غلظت نیترات میوه به میزان ۱۲۰۰ میلی‌گرم در کیلوگرم بافت خشک میوه از تیمار حاوی ۲۳۸ میلی‌گرم نیتروژن و ۱ میلی‌گرم مولیبدن در لیتر محلول غذایی به دست آمد (جدول ۵). تجمع نیترات در گیاهان یک پدیده طبیعی بوده و هنگامی رخ می‌دهد که سرعت جذب نیترات در گیاه بیشتر از سرعت احیاء و متابولیسم آن باشد. متابولیسم نیترات در گیاهان تحت تأثیر فعالیت آنزیم نیترات‌ردوکتاز بوده و فعالیت این آنزیم نیز تحت تأثیر مواد معدنی و به ویژه مولیبدن است. وقتی کمبود مولیبدن وجود داشته باشد، تبدیل نیترات به اسیدهای آمینه و پروتئین نقصان یافته و نیترات و نیتریت در بافت‌های گیاه تجمع می‌یابند (۱۰).

غلظت عناصر غذایی در میوه خیار سبز

نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس داده‌ها نشان می‌دهد نیترات سطوح نیتروژن بر غلظت عناصر پر مصرف میوه در سطح احتمال ۱٪ معنی دار است (جدول ۶). افزایش سطح نیتروژن

میانگین طول، قطر و وزن تک میوه از این سطح مولیبدن حاصل شد. با ثابت نگهداشت نیترات نیتروژن محلول غذایی در سطح ۰/۱ میلی‌گرم در لیتر و افزایش سطح مولیبدن آن به ۰/۱ میلی‌گرم در لیتر محلول غذایی، تغییر چندانی در شاخص‌های رشد گیاه به وجود نیامد. ولی زمانی که میزان نیتروژن و مولیبدن محلول غذایی هم زمان به بالاترین سطوح خود ($N_{310} \times Mo_{0.1}$) افزایش یافتند آثار منفی و سمیت آنها تشید گردید و کاهش شدیدی در عملکرد و شاخص‌های رشد خیار سبز مشاهده شد (۱۰ و ۲۲).

غلظت نیترات میوه خیار سبز

نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس داده‌ها نشان می‌دهد که اثر سطوح نیتروژن و مولیبدن بر غلظت نیترات میوه در سطح احتمال ۱٪ معنی دار است (جدول ۴). افزایش میزان نیتروژن مصرفی سبب افزایش غلظت نیترات میوه از ۱۳۵۶ به ۲۱۲۲ میلی‌گرم در کیلوگرم بافت خشک شد. از آنجا که حداکثر غلظت مجاز نیترات ۱۵۰۰ میلی‌گرم در کیلوگرم بافت خشک میوه می‌باشد (۲۶)، بنابراین کاربرد ۳۱۰ میلی‌گرم نیتروژن در لیتر محلول غذایی باعث تجمع زیانبار نیترات در میوه خیار رقم سلطان می‌گردد. کاتسیراس و همکاران (۲۰) و کاشکی و غیور باغبانی (۱۳۸۳) نتایج مشابهی را در میوه خیار سبز و آنبوسلوی و همکاران (۱۰)

جدول ۵. مقایسه میانگین‌های تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و مولیدن بر غلظت نیترات میوه خیار سبز (میلی‌گرم در کیلوگرم بافت خشک)

نیترات میوه	سطح	تیمار
۱۳۵۶b	N ₂₃₈	نیتروژن
۲۱۲۲a	N ₃₁₀	
۱۹۶۱a	Mo _{0.01}	مولیدن
۱۷۰۳b	Mo _{0.1}	
۱۵۵۶c	Mo ₁	
۴/۷۶	LSD	
۱۵۲۸d	Mo _{0.01×N₂₃₈}	
۱۳۴۴e	Mo _{0.1×N₂₃₈}	اثر متقابل مولیدن × نیتروژن
۱۲۰۰f	Mo _{1×N₂₃₈}	
۲۲۹۳a	Mo _{0.01×N₃₁₀}	
۲۰۶۳b	Mo _{0.1×N₃₁₀}	
۱۹۱۱c	Mo _{1×N₃₁₀}	
۴/۷۴	LSD	

میانگین‌هایی که در هر ستون یک حرف مشترک دارند، با هم اختلاف معنی‌داری در سطح ۱٪ ندارند.

جدول ۶. نتایج تجزیه واریانس اثر سطوح مختلف نیتروژن و مولیدن بر غلظت عناصر پرمصرف در میوه خیار سبز

منیزیم	کلسیم	پتاسیم	فسفر	نیتروژن	منابع تغییرات
درصد					
۰/۰۶۵**	۰/۰۱**	۱/۴۵۰**	۰/۰۰۴**	۵/۹۹۰**	سطوح نیتروژن (N)
۰/۰۲۴**	۰/۰۱۴**	۱/۶۲۰*	۰/۰۰۲**	۶/۸۱۶**	سطوح مولیدن (Mo)
۰/۰۰۱**	۰/۰۰۰۱ns	۰/۰۳۸ns	۰/۰۰۰۱ns	۰/۰۶۱**	Mo×N
۰/۰۰۰۴	۰/۰۰۰۱	۰/۴۳۹	۰/۰۰۰۱	۰/۰۱۱	خطا
۵/۷۷	۵/۷۰	۱۳/۱۳	۲/۸۲	۱/۹۴	(/.) CV

** و * به ترتیب دارای اختلاف معنی‌دار در سطوح ۱٪ و ۵٪ و ns بدون اختلاف معنی‌دار

رابطه آنتاگونیستی بین این یون‌ها و یون آمونیوم از یک طرف و یون پتاسیم از طرف دیگر باشد که توسط خوزه و ویلوکس (۱۸) نیز گزارش شده است. کاتیون پتاسیم به عنوان یون مقابل آنیون نیترات و برای ایجاد تعادل بار در گیاه توسط ریشه جذب می‌گردد. به دلیل رابطه آنتاگونیستی بین یون‌های

محلول غذایی باعث افزایش معنی‌دار غلظت نیتروژن بافت خشک میوه از ۵/۱۴ به ۵/۷۱ درصد شد. غلظت پتاسیم میوه نیز با افزایش غلظت نیتروژن محلول غذایی افزایش یافت، ولی غلظت‌های کلسیم، منیزیم و فسفر میوه کاهش یافته (جدول ۷). کاهش غلظت کلسیم و منیزیم میوه می‌تواند حاکی از وجود

جدول ۷. مقایسه میانگین‌های سطوح مختلف نیتروژن و مولیبدن بر غلظت عناصر پرمصرف در میوه خیار سبز

تیمارها	نیتروژن	فسفر	پتاسیم	کلسیم	منیزیم
درصد					
نیتروژن	N ₂₃₈	۰/۱۴ b	۴/۹۰ b	۰/۲۱ a	۰/۳۸ a
	N ₃₁₀	۵/۷۱ a	۰/۱۵ b	۰/۱۸ b	۰/۳۱ b
	Mo _{0.01}	۴/۸۹ c	۴/۷۹ b	۰/۲۲ a	۰/۳۸ a
	Mo _{0.1}	۵/۴۴ b	۵/۰۲ ab	۰/۱۹ b	۰/۳۳ b
	Mo ₁	۵/۹۵ a	۵/۳۱ a	۰/۱۷ c	۰/۳۱ c
	LSD	۰/۱۳	۰/۸۳	۰/۰۰۹	۰/۰۱
	Mo _{0.01×N₂₃₈}	۴/۶۳d	۴/۶۹b	۰/۲۱ a	۰/۴۱a
	Mo _{0.1×N₂₃₈}	۵/۱۰c	۴/۸۸b	۰/۱۸ a	۰/۳۶b
	Mo _{1×N₂₃₈}	۵/۶۹b	۵/۱۳ab	۰/۱۵ a	۰/۳۵b
	Mo _{0.01×N₃₁₀}	۵/۱۴c	۴/۸۹b	۰/۲۳a	۰/۳۵b
نیتروژن و مولیبدن	Mo _{0.1×N₃₁₀}	۵/۷۹b	۵/۱۶ab	۰/۲۰a	۰/۳۱c
	Mo _{1×N₃₁₀}	۶/۲۱a	۵/۴۹a	۰/۱۹a	۰/۲۸d
	LSD	۰/۱۱	۰/۰۴	۰/۰۱	۰/۰۰۹

میانگین‌هایی که در هر ستون یک حرف مشترک دارند، با هم اختلاف معنی‌داری در سطح ۱٪ ندارند.

که اثر سطوح مولیبدن محلول غذایی بر غلظت عناصر پرمصرف میوه در سطح احتمال ۱٪ معنی‌دار است (جدول ۶). با افزایش غلظت مولیبدن محلول غذایی، غلظت نیتروژن و منیزیم میوه افزایش ولی غلظت فسفر، پتاسیم و کلسیم آن کاهش یافت (جدول ۷). افزایش غلظت نیتروژن میوه با افزایش غلظت مولیبدن محلول غذایی احتمالاً به دلیل متابولیسم بهتر نیتروژن در گیاه و احیاء نیترات و مشارکت آن در ساخت پروتئین باشد. ولی بالا رفتن غلظت آنیون مولیبدات در محلول غذایی می‌تواند جذب فسفات را به دلیل رقابت یونی کاهش دهد. کاهش غلظت کلسیم و پتاسیم میوه، با افزایش غلظت نیتروژن محلول غذایی، می‌تواند به دلیل افزایش غلظت منیزیم میوه و رقابت این یون‌ها در جذب باشد. اثر مولیبدن بر غلظت مولیبدن، مس، آهن و روی میوه در سطح احتمال ۱٪ و بر غلظت منگنز در سطح احتمال ۰.۵٪ معنی‌دار است. با افزایش غلظت نیتروژن محلول غذایی، غلظت‌های مس و مولیبدن میوه به‌طور معنی‌داری کاهش یافته (جدول ۹) ولی غلظت‌های بقیه عناصر کم‌صرف شامل آهن، روی و منگنز تحت تأثیر قرار نگرفته (جدول ۷). این نتایج با نتایج کاتسیراس و همکاران (۲۱)، خوزه و ویلوکس (۱۸) و هویت و تاتام (۱۴) مطابقت دارد. نتایج به‌دست آمده از تجزیه واریانس داده‌ها نشان می‌دهد

پتاسیم، کلسیم و منیزیم در جذب، با افزایش جذب پتاسیم توسط گیاه، جذب کلسیم و منیزیم کاهش می‌یابد. کاهش غلظت فسفر میوه با افزایش غلظت نیتروژن در محلول غذایی نیز می‌تواند به دلیل رقابت آنیون‌های فسفات و نیترات در جذب، و یا مسمومیت گیاه با نیتروژن زیاد و کاهش جذب فسفر توسط آن باشد. نتایج به دست آمده از جدول ۸ نشان می‌دهد که اثر سطوح نیتروژن بر غلظت مولیبدن، مس و روی میوه در سطح احتمال ۱٪ و بر غلظت منگنز و آهن میوه در سطح احتمال ۰.۵٪ معنی‌دار است. با افزایش غلظت نیتروژن محلول غذایی، غلظت‌های مس و مولیبدن میوه به‌طور معنی‌داری کاهش یافته (جدول ۹) ولی غلظت‌های بقیه عناصر کم‌صرف شامل آهن، روی و منگنز تحت تأثیر قرار نگرفته (جدول ۷). این نتایج با نتایج کاتسیراس و همکاران (۲۱)، خوزه و ویلوکس (۱۸) و هویت و تاتام (۱۴) مطابقت دارد.

جدول ۸. نتایج تجزیه واریانس اثر سطوح مختلف نیتروژن و مولیبدن بر غلظت عناصر کم مصرف در میوه خیار سبز

میانگین مریعات						منابع تغییرات
منگنز	روی	آهن	مس	مولیبدن		
میلی‌گرم بر کیلوگرم						
۲۶/۰/۵۶ ns	۹/۵۹ ns	۱/۸۸ ns	۱۷/۶۰ **	۵۳۵۲۲/۵ **	(N)	سطوح نیتروژن
۷/۰۷**	۵۹/۲۰ **	۳۴۱۲/۱۹*	۹/۳۲ **	۶۳۹۴/۸۵ **	(Mo)	سطوح مولیبدن
۰/۱۱**	۱۶۵۳/۹۱ ns	۲۹/۹۸ **	۰/۳۷ **	۳۵۲/۸۵ **	Mo × N	
۰/۰۲	۹/۶۲	۵/۰۶	۰/۰۴	۴/۸۲		خطا
۰/۷۲	۴/۹۴	۱/۴۸	۵/۶۳	۹/۹۳		(CV)

* دارای اختلاف معنی‌دار در سطح٪ ۱ و ns بدون اختلاف معنی‌دار

جدول ۹. مقایسه میانگین‌های اثر سطوح مختلف نیتروژن و مولیبدن بر غلظت عناصر کم مصرف در میوه خیار سبز

منگنز	روی	آهن	مس	مولیبدن	تیمار
میلی‌گرم بر کیلوگرم					
۱۷/۷۰a	۶۲/۴۳a	۱۵۲/۱۸a	۱۹/۴۸a	۴۰/۶۳a	N ₂₃₈
۲۱/۵۱a	۶۳/۱۶a	۱۵۱/۸۶a	۱۷/۶۴b	۲۸/۰۹ b	N ₃₁₀
۱۹/۰۶c	۶۴/۵۰ a	۱۴۱/۹۰c	۱۷/۱۷b	۹۲/۸۱c	Mo _{0.01}
۱۹/۶۱b	۶۲/۵۰ ab	۱۴۹/۱۰b	۱۸/۶۹ab	۱۱۴/۰b	Mo _{0.1}
۲۰/۱۵a	۶۱/۴۰ c	۱۶۵/۱۰a	۱۹/۷۸a	۱۲۴/۱a	Mo ₁
۰/۱۱	۲/۴	۱/۴۷	۰/۴۸	۸/۴۹	LSD
۱۷/۱۰f	۶۲/۸۸a	۱۴۰/۰d	۲۱/۰۳b	۱۱۵/۶b	Mo _{0.01} × N ₂₃₈
۱۷/۶۹e	۶۴/۶۱a	۱۵۰/۳b	۱۹/۰۵a	۱۴۳/۵a	Mo _{0.1} × N ₂₃₈
۱۸/۳۲d	۶۵/۸۲a	۱۶۴/۲a	۲۱/۳۷ab	۱۵۴/۳a	Mo ₁ × N ₂₃₈
۲۱/۰۳c	۶۶/۱۲a	۱۴۱/۷d	۱۷/۳۹c	۶۹/۹۷d	Mo _{0.01} × N ₃₁₀
۲۱/۵۲b	۶۳/۳۹a	۱۴۷/۸c	۱۸/۳۴ab	۸۴/۴۱c	Mo _{0.1} × N ₃₁₀
۲۱/۹۸a	۶۲/۹۸a	۱۶۶/۱a	۱۷/۱۹d	۹۵/۵۲c	Mo ₁ × N ₃₁₀
۰/۱۵	۳/۳۹	۲/۴۶	۰/۵۱	۱۲/۰۲	LSD

میانگین‌هایی که در هرستون یک حرف مشترک دارند، با هم اختلاف معنی‌داری در سطح٪ ۱ ندارند.

عناصر روی، کلسیم و پتاسیم میوه باشد که با افزایش مولیبدن محلول غذایی حادث شده است. اثر متقابل سطوح مختلف مولیبدن و نیتروژن محلول غذایی بر غلظت عناصر نیتروژن و مینزیم میوه در سطح احتمال٪ ۱ معنی‌دار است (جدول ۶). بیشترین غلظت نیتروژن میوه در تیمار حاوی ۳۱۰ میلی‌گرم

غلظت روی کاهش یافت (جدول ۹). مطالعات مختلف نشان می‌دهد که مولیبدن با مس و منگنز اثر متقابل منفی دارند و باعث کاهش غلظت آنها در گیاه می‌شود (۵)، ولی نتایج این آزمایش عکس این مطلب را نشان می‌دهد. افزایش غلظت عناصر مس و منگنز میوه شاید به دلیل رقابت یونی و در پاسخ به کاهش غلظت

نیتروژن محلول غذایی از ۲۳۸ به ۳۱۰ میلی‌گرم در لیتر نه تنها باعث افزایش عملکرد خیار سبز در محیط آبکشت نشد، بلکه باعث افزایش غلظت نیترات در میوه‌ها شد که می‌تواند سلامت مصرف کننده را به مخاطره اندازد. نتایج همچنین نشان می‌دهد که افزایش سطح مولیبدن محلول غذایی از ۰/۱ به ۰/۱۰ میلی‌گرم در لیتر تأثیر معنی‌داری بر عملکرد گیاه نداشت، ولی در غلظت‌های بیشتر (۱ میلی‌گرم در لیتر)، عملکرد خیار سبز به طور معنی‌داری کاهش یافت. افزایش غلظت مولیبدن محلول غذایی باعث کاهش غلظت نیترات در میوه خیار سبز شد. به نظر می‌رسد که می‌توان با افزایش غلظت مولیبدن محلول غذایی تا سطح ۰/۱ میلی‌گرم در لیتر، بدون کاهش عملکرد، باعث کاهش غلظت نیترات در میوه خیار سبز شد. با توجه به این که غلظت‌های بالای مولیبدن در محلول غذایی باعث کاهش معنی‌دار رشد و عملکرد خیار سبز می‌شود باید در استفاده از آن برای کاهش غلظت نیترات میوه دقت لازم به عمل آید.

نیتروژن و ۱ میلی‌گرم مولیبدن در لیتر محلول غذایی اندازه‌گیری شد و بیشترین غلظت منیزیم از تیمار حاوی ۲۳۸ میلی‌گرم نیتروژن و ۰/۱۰ میلی‌گرم مولیبدن در لیتر محلول غذایی به دست آمد (جدول ۷). اثر متقابل مولیبدن و نیتروژن بر غلظت عناصر فسفر، پتاسیم و کلسیم میوه معنی‌دار نشد (جدول ۶). اثر متقابل مولیبدن و نیتروژن بر غلظت عناصر مس و آهن میوه در سطح احتمال ۱٪ و بر غلظت منگنز در سطح احتمال ۵٪ معنی‌دار شد (جدول ۸). بیشترین غلظت مس و آهن میوه در تیمار حاوی ۲۳۸ میلی‌گرم نیتروژن و ۰/۱ میلی‌گرم مولیبدن در لیتر محلول غذایی اندازه‌گیری شد. ولی بیشترین غلظت منگنز از تیمار حاوی ۳۱۰ میلی‌گرم نیتروژن و ۱ میلی‌گرم مولیبدن در لیتر محلول غذایی به دست آمد (جدول ۹). اثر متقابل مولیبدن و نیتروژن بر غلظت مولیبدن و روی در میوه معنی‌دار نشد (جدول ۷).

نتیجه‌گیری

نتایج حاصل از این آزمایش نشان می‌هد که افزایش سطح

منابع مورد استفاده

۱. احیایی، م. و ع. ا. بهبهانی‌زاده. ۱۳۷۲. شرح روش‌های تجزیه شیمیایی خاک. نشریه فنی شماره ۸۹۳ مؤسسه تحقیقات خاک و آب تهران.
۲. امامی، ع. ۱۳۷۵. شرح روش‌های تجزیه گیاه، جلد اول، نشریه فنی شماره ۹۸۲، مؤسسه تحقیقات خاک و آب تهران.
۳. بصیرت، م. ۱۳۹۰. آشنایی با ناهنجاری‌های تغذیه‌ای سبزیجات گلخانه‌ای (خیار، گوجه‌فرنگی و فلفل). مؤسسه تحقیقات خاک و آب، تهران.
۴. بی‌نام، ۱۳۸۳. آمارنامه محصولات زراعی و باغبانی سال ۱۳۸۲-۱۳۸۳. دفتر فناوری و آمار وزارت جهاد کشاورزی، تهران.
۵. خلدبرین، ب. و ط. اسلام‌زاده. ۱۳۸۰. تغذیه معدنی گیاهان عالی (ترجمه). انتشارات دانشگاه شیراز.
۶. کاشکی، ع. و س. م. غیور باغبانی. ۱۳۸۳. بررسی اثر نیتروژن بر رشد، عملکرد و تجمع نیترات در خیار. پایگاه اطلاعات علمی ایران (۴): ۲۱۲-۲۰۳.
۷. کافی، م. ۱۳۷۹. فیزیولوژی گیاهی. جلد دوم (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی.
۸. ملکوتی، م. ج. و م. همایی. ۱۳۸۳. حاصلخیزی خاک‌های مناطق خشک "مشکلات و راه حل‌ها". چاپ دوم با بازنگری کامل، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
9. Agarwala, S. C., C. P. Sharma, S. Farooq and C. Chatterjee. 1978. Effect of molybdenum deficiency on the growth and metabolism of corn plants raised in sand culture. Canadian J. Bot. 56: 1905-1909.
10. Anbuselvi S., M. Sathish Kumar, M. Vikram and P. Debi Prasad. 2011. Effect of molybdenum on nitrogen fixing

- enzymes of blackgram using *Anabaena Azollae* Sp treated coir waste manure under drought stress. *Aust. J. Basic and Appl. Sci.* 5(4): 252-256.
11. FAOSTAT data. 2005. Agricultural production. Last updated February 2004, FAO, Rome, Italy.
12. Guler, S., H. Hayriye Ibrikci and G. Buyuk. 2006. Effects of different nitrogen rates on yield and leaf nutrient contents of drip-fertilized and greenhouse-grown cucumber. *Asian J. Plant Sci.* 5(4): 657-662.
13. Hewitt, E. J. and E. W. Bolle-Jones. 1952. Molybdenum as a plant nutrient. I. The influence of molybdenum on growth of some *Brassica* crops in sand culture. *Hort. Sci.* 27: 245-256.
14. Hewitt, E. J. and P. Tatham. 1960. Interaction of mineral deficiency and nitrogen source on acid phosphatase activity in leaf extracts. *Exper. Bot.* 11(3): 367-376.
15. Hewitt, E. J. and C. S. Gundry. 1970. The molybdenum requirement of plants in relation to nitrogen supply. *J. Hort. Sci. Biotechnol.* 45(4): 351-358.
16. Hillel, D., G. L. Hatfield, D. S. Powelson, C. Rosenzweig, K. M. Scow, M. J. Singer and D. Sparks. 2005. *Encyclopediea of Soils in the Environment*. Elsevier Academic Press, Oxford, UK, 2200 p.
17. Humphries, E. C., K. Peach and M. V. Tracy. 1956. Mineral components and ash analysis. PP 468-502. In: K. Peach and M. V. Tracey (Eds.), *Modern Methods of Plant Analysis*, Springer Verlag, Berlin.
18. Jose, R. M. and G. E. Wilcox. 1984. Growth, free amino acid, and mineral composition of tomato plant in relation to nitrogen form and growing media. *Amer. Soc. Hort. Sci.* 109(3): 406-411.
19. Kaiser, B. N., K. Gridley, J. N. Brady, T. Philips and S. D. Tyerman. 2005. The role of molybdenum in agricultural plant production. *Annals of Bot.* 96: 745-754.
20. Kotsiras, A., C. M. Olympios, J. Drosopoulos and H. C. Passam. 2002. Effects of nitrogen form and concentration on the distribution of ions within cucumber fruits. *Sci. Hort.* 95: 175-183.
21. Kotsiras, A., C. M. Olympios and H. C. Passam. 2005. Effects of nitrogen form and concentration on yield and quality of cucumbers grown on rockwool during spring and winter in southern Greece. *Plant Nutr.* 28: 2027-2035.
22. Rabbi, A. K. M. Z., A. K. Paul and J. R. Sarker. 2011. Effect of nitrogen and molybdenum on the growth and yield of garden pea (*Pisum sativum* L.). *Plant Resour. Manage.* 2(2): 230-235.
23. Ruiz, J. M. and L. Romero. 1999. Cucumber yield and nitrogen metabolism in response to nitrogen supply. *Sci. Hort.* 82: 309-316.
24. Santamaria, P. 2006. Nitrate in vegetables: Toxicity, content, intake and EC regulation. *J. Sci. Food Agric.* 86: 10-17.
25. Tüzel, I. H., Y. Tüze, A. Güll, M. K. Meriç, Ö. Yavu and R. Z. Eltez. 2001. Comparison of open and closed systems on yield, water and nutrient consumption and their environmental impact. *Acta Hort.* 554: 221-228.
26. WHO. 1978. Nitrates, Nitrites and N-nitrozo Compounds. International Programme on Chemical Safety, Environmental Health Criteria 5. Available at: <http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc005.htm>.