

اثر بسترهای مختلف کشت بر میزان عناصر غذایی، عملکرد و خصوصیات کیفی توت فرنگی رقم سلوا در کشت بدون خاک

محمد رضا دیلمقانی حسنلوی^{*} و سیاوش همتی^۱

(تاریخ دریافت: ۱۳۸۹/۶/۲۲؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۰/۵/۹)

چکیده

در سیستم کشت هیدروپونیک، گیاهان در تمام مراحل رشد نیاز به تأمین عناصر غذایی کافی دارند که باید در بستر کشت مهیا باشند. این پژوهش با هدف بررسی اثر بسترهای مختلف کشت بر جذب عناصر غذایی و عملکرد کمی و کیفی توت فرنگی گلخانه‌ای صورت گرفت. آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با پنج تیمار در چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی و آموزشی مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان غربی اجرا شد. پنج تیمار شامل پرلیت-کوکوپیت در نسبت‌های حجمی ۱۰۰-۷۵-۵۰ و ۱۰۰-۷۵-۲۵-۵۰-۵۰ بودند. ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و غلظت عناصر غذایی، علاوه بر عملکرد میوه، اندازه‌گیری شد. مقایسه تیمارهای بستر کشت نشان داد که بیشترین تعداد گل و میوه در بستر مخلوط پرلیت-کوکوپیت با نسبت حجمی ۷۵-۲۵ به دست آمد. بیشترین عملکرد میوه در تیمارهای پرلیت-کوکوپیت به نسبت حجمی ۷۵-۲۵-۵۰ به دست آمد. ارزیابی خصوصیات کیفی میوه نشان داد که بیشترین مقدار وزن خشک و TSS میوه‌ها در پرلیت-کوکوپیت (به نسبت حجمی ۱۰۰-۵۰) بود. بیشترین غلظت نیتروژن و پتاسیم میوه در تیمار پرلیت-کوکوپیت (به نسبت حجمی ۱۰۰-۵۰) بود. میوه‌های رشد کرده در بستر پرلیت-کوکوپیت (به نسبت حجمی ۱۰۰-۵۰) بیشترین غلظت کلسیم و منیزیم را در مقایسه با سایر تیمارها داشتند. نتیجه‌گیری کلی نشان می‌دهد که بیشتر خصوصیات کمی و کیفی میوه توت فرنگی در کشت هیدروپونیک به ترکیب بستر آن بستگی داشته، به طوری که بهترین خصوصیات کمی و کیفی میوه از بستر مخلوط پرلیت-کوکوپیت با نسبت‌های حجمی ۷۵-۲۵ و ۵۰-۵۰ به دست آمده است.

واژه‌های کلیدی: هیدروپونیک، کوکوپیت، پرلیت، توت فرنگی گلخانه‌ای، تغذیه گیاه

مقدمه

نظیر کترل تغذیه گیاه، کاهش بیماری‌ها و آفات و افزایش کمیت و کیفیت محصول نسبت به کشت خاکی در حال گسترش است. خصوصیات مواد مختلف مورد استفاده به عنوان بستر کشت به‌طور مستقیم و غیر مستقیم بر رشد گیاه و تولید محصول اثر دارد (۲۸). بنابراین یکی از مهمترین عوامل در ایجاد یک سیستم کشت بدون خاک، انتخاب بستر کشت مناسب می‌باشد (۲۳).

طبق آخرین آمار دفتر امور سبزی، گیاهان زیستی و دارویی وزارت کشاورزی در آخر سال ۱۳۸۸ ایران با سطح زیر کشت ۷۷۱۰/۳ هکتار و تولید ۱۵/۵ میلیون تن محصولات گلخانه‌ای یکی از کشورهای در حال توسعه در این زمینه از کشاورزی بهشمار می‌آید. در این میان، پرورش گیاهان در بسترهای کشت به دلیل مزایای متعدد

۱. کارشناس ارشد پژوهش جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان غربی

*: مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: mrdh1970@gmail.com

استفاده از بسترهای کشت در گلخانه‌ها، پژوهش حاضر با هدف مطالعه اثر بسترهای مختلف کشت بر عملکرد کمی و کیفی و جذب عناصر غذایی توسط توت فرنگی رقم سلوا در کشت بدون خاک صورت گرفت.

مواد و روش‌ها

این تحقیق در قالب طرح کامل تصادفی با پنج تیمار در چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان غربی در یک دوره کشت شش ماهه اجرا شد. متوسط دمای گلخانه ۲۷ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ۴۰ درصد بود. بسترهای کشت شامل پرلیت - کوکوپیت به نسبت‌های حجمی ۰-۱۰۰، ۲۵-۷۵، ۵۰-۵۰، ۷۵-۲۵ و ۱۰۰-۰ درصد بودند. بلوك‌های فشرده شده کوکوپیت قبل از استفاده با آب خیسانده شدند تا کاملاً باز و حجمی شوند. روی بستر کشت پرلیت هیچگونه عملیاتی صورت نگرفت. برای کشت از گلدان‌های سفید یونولیت به ابعاد ۲۰ سانتی متر در ۲۰ سانتی متر و گنجایش ۸ لیتر استفاده شد. گلدان‌ها با نسبت‌های ذکر شده بستر کشت پر شده و به صورت سیستم عمودی یا طبقاتی روی هم قرار گرفتند. در تاریخ اول آبان سال ۱۳۸۸ نشاهای توت فرنگی ضدعفونی شده به وسیله قارچ کش به طور مستقیم در گوشه گلدان‌ها کاشته شدند و در داخل هر گلدان از یک قطره چکان به منظور تزریق محلول غذایی به داخل بستر کشت استفاده گردید. دور آبیاری، دمای محیط و رطوبت اشباع برای گلخانه ثابت در نظر گرفته شد. آب و محلول غذایی مورد نیاز تیمارها در تانکر ۱۰۰۰۰ لیتری تهیه و همزمان با آبیاری سایر بوته‌ها در اختیار بوته‌ها قرار می‌گرفت (جدول ۱). در اندازه‌گیری خصوصیات فیزیکوشیمیابی مواد استفاده شده در بستر (جدول ۲) برای وزن مخصوص ظاهری از روش سیلندر یا روش حلقه، برای وزن مخصوص حقیقی از روش پیکنومتر، برای CEC از استات آمونیوم و اتانول و با استفاده از دستگاه فلیم فتومتر و برای تخلخل کل از رابطه بین وزن مخصوص ظاهری و حقیقی استفاده گردید. نمونه برداری از میوه

کوکوپیت یک ترکیب حاصل از فرایندسازی پوسته میوه نارگیل می‌باشد که از نظر فیزیکی ماده‌ای اسفنجی و شبیه پیت ماس بوده، از نسبت‌های مساوی لیگنین و سلولز تشکیل شده و در سال‌های اخیر به مقدار زیادی در صنعت باغبانی در اروپا، استرالیا، آمریکا و کانادا مورد استفاده قرار گرفته است (۱۵، ۲۱ و ۲۲).

پرلیت، آلومینوسیلیکات با منشأ آتشفسانی بوده و دارای ظرفیت تبادل کاتیونی زیادی نمی‌باشد (۲). پرلیت باعث افزایش زهکشی بستر کشت و بهبود تهווیه آن می‌شود (۱۸). برای تولید موفق محصولات در کشت بدون خاک در گلخانه‌ها احتیاج به ذخیره کافی از مواد غذایی در بسترهای مختلف کشت در هر مرحله از رشد گیاه می‌باشد (۸).

توت فرنگی یکی از محصولات خوب گلخانه‌ای در ایران محسوب می‌شود که رشد مناسب آن به حفظ تعادل مطلوب تغذیه‌ای در مراحل مختلف رشد رویشی و زایشی بستگی دارد. نیاز این گیاه به عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و عناصر ریزمغذی زیاد است. نیتروژن از مواد اصلی مورد نیاز گیاه می‌باشد و بیشتر از سایر عناصر در تغذیه گیاهی مصرف می‌شود. پتاسیم به مقدار زیاد برای رشد مناسب و عملکرد بالا و کیفیت مطلوب مورد نیاز می‌باشد (۵). آباد و همکاران (۷) اظهار داشتند که فسفر و پتاسیم قابل جذب در کوکوپیت به ترتیب از ۰/۲۸ تا ۰/۲۱ مول در متر مکعب و ۲/۹۷ تا ۵۲/۶۶ مول در متر مکعب متغیر بوده که نسبت به بستر کشت پیت ماس بسیار بیشتر است. صابری (۴) نشان داد که کوکوپیت و پرلیت باعث افزایش غاظلت پتاسیم و منیزیم در شاخصاره و میوه گوجه‌فرنگی شدند. هم‌چنین جذب پتاسیم و منیزیم از بستر حاوی کوکوپیت و بسترهای حاوی زئولیت افزایش می‌یابد. فتوحی و همکاران (۱۲) در ارزیابی اثر بسترهای زئولیت و پرلیت و مخلوطی از این دو بر عملکرد و کیفیت توت فرنگی در کشت بدون خاک به این نتیجه رسیدند که تعداد گل و میوه، وزن میوه و عملکرد در هر گیاه در بستر پرلیت - زئولیت به نسبت حجمی ۱ به ۳ کاهش یافت (۱۲ و ۱۳).

با توجه به گسترش روزافزون کشت‌های گلخانه‌ای و

جدول ۱. فرمول غذائي مورد استفاده در هفته‌های مختلف رشد در سیستم کود آبیاری (mg/L)

B	Mo	Cu	Zn	Mn	Fe	Mg	Ca	K	P	N	هفته
۰/۷	۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۲۵	۲	۵	۳۸	۱۵۵	۲۸۹	۵۵	۲۰۷	اول تا هفته سوم
۰/۷	۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۲۵	۲	۵	۴۰	۱۰۴	۲۱۱	۵۸	۱۲۸	سوم تا انتهاء

جدول ۲. ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی مواد استفاده شده در تهیه بسترهاي كشت

بستر کشت	pH	EC (dS/m)	CEC (cmole/kg)	وزن مخصوص ظاهري (g/cm ³)	تخلخل كل (%)	ظرفیت نگهداری رطوبت (%)
پرلیت: کوکوپیت (۰-۱۰۰)	۶/۴	۱/۳۴	۴	۰/۰۷	۹۲	۵۶
پرلیت: کوکوپیت (۲۵-۷۵)	۶/۷	۱/۴۰	۷۵	۰/۲۳	۸۲	۶۶
پرلیت: کوکوپیت (۵۰-۵۰)	۷/۳	۱/۸۱	۱۲۰	۰/۴۷	۷۱	۷۵
پرلیت: کوکوپیت (۷۵-۲۵)	۷/۷	۲/۹۰	۱۴۸	۰/۷۵	۶۵	۸۴
پرلیت: کوکوپیت (۱۰۰-۰)	۸/۱	۳/۰۱	۱۷۰	۱/۱۲	۵۸	۸۷

جدول ۳. غلظت عناصر غذائي بسترها قبل از کاشت

Zn	Mn	Cu	Fe	Mg	Ca	K	P	N	بسترهاي کشت
(mg/kg)								%	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرلیت: کوکوپیت (۰-۱۰۰)
۱۰۱	۱۲/۵	۰/۲۴	۱۱۴	۵۹۲	۸۳۵	۱۹۲۲	۳۳۰	۰/۳۷	پرلیت: کوکوپیت (۲۵-۷۵)
۱۲۱	۱۶/۶	۰/۳۳	۱۰۶	۶۸۴	۸۹۱	۲۶۶۸	۳۳۴	۰/۴۵	پرلیت: کوکوپیت (۵۰-۵۰)
۱۵۱	۲۴/۷	۰/۵۱	۹۹	۸۹۸	۱۰۵۳	۴۲۰۴	۳۶۵	۰/۴۶	پرلیت: کوکوپیت (۷۵-۲۵)
۲۴۴	۵۷/۴	۱/۲۲	۲۲۴	۱۹۶۰	۱۸۰۰	۹۸۳۴	۵۰۸	۰/۷۰	پرلیت: کوکوپیت (۱۰۰-۰)

تیتراسیون (هیدروکسید سدیم ۱٪ نرمال و فنل فتالین ۱٪)، مواد جامد محلول به وسیله رفرکتومتر (مدل Topcon)، pH (Eutech 6500 bench-top pH متر (مدل Eutech Instruments, USA) به وسیله کنداکтомتر (مدل Perkin Elmer Lambda 12)، پتاسیم، کلسیم، میزیم و آندازه‌گیری قرار گرفتند. داده‌های جمع‌آوری شده در این تحقیق با استفاده از نرمافزار آماری EXCEL و آنالیز MSTATC با استفاده از نرمافزار آماری LSD و میانگینها به روش دانکن یا LSD مورد مقایسه قرار گرفتند.


توت فرنگی در سه مقطع زمانی به فاصله یک ماه از یکدیگر انجام شد و غلظت نیتروژن با استفاده از روش نقطیر کجلدال، فسفر به روش اولسن و با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر (مدل PG 990)، در نمونه‌های بستر و میوه توت فرنگی تعیین گردید. همچنین وزن محصول توت فرنگی، و پس از تهیه عصاره میوه‌ها خصوصیات کیفی میوه اسیدیته به وسیله

جدول ۴. اثر بسترهای مختلف کاشت بر اجزای عملکرد میوه توت فرنگی

بستر کشت	تعداد گل در هر بوته	تعداد میوه در هر بوته	وزن میوه (گرم)
پرلیت: کوکوپیت (۰-۱۰۰)	۳۰ b**	۱۵ b **	۱۰/۱۵bc**
پرلیت: کوکوپیت (۲۵-۷۵)	۳۶a	۱۷ ab	۱۱/۴۱ ab
پرلیت: کوکوپیت (۵۰-۵۰)	۳۵ a	۱۹ a	۱۱/۵۲ a
پرلیت: کوکوپیت (۷۵-۲۵)	۲۴ c	۱۲ c	۸/۸۴ cd
پرلیت: کوکوپیت (۱۰۰-۰)	۲۰ c	۷ d	۸/۰۶ d

در هر ستون حروف مشابه نشان دهنده عدم اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال ۱٪ می‌باشد.

محلول (TSS) و اسیدیته قابل تیر (TA) تحت تأثیر تیمارها قرار گرفته و تفاوت آنها معنی‌دار بود. به‌طوری که بیشترین درصد ماده خشک میوه و نسبت مواد جامد محلول در تیمار پرلیت- کوکوپیت به نسبت حجمی ۰-۱۰۰ و اسیدیته قابل تیر بجز فسفر برای سایر عناصر در پرلیت- کوکوپیت به نسبت حجمی ۰-۱۰۰ بود. مقایسه میانگین عناصر غذایی موجود در میوه نشان داد که اختلاف معنی‌دار بین تیمارها در سطح ۱٪ وجود دارد. بیشترین مقدار نیتروژن (N) و پتاسیم (K) میوه در تیمار پرلیت- کوکوپیت با نسبت حجمی ۰-۱۰۰ و کمترین مقدار آنها در تیمار پرلیت- کوکوپیت با نسبت حجمی ۰-۱۰۰ بود. میوه‌های رشد کرده در بستر پرلیت- کوکوپیت با نسبت حجمی ۰-۱۰۰ بیشترین میزان کلسیم و منیزیم را در مقایسه با سایر تیمارها داشتند.



شکل ۱. اثر بسترهای مختلف کاشت بر عملکرد میوه توت فرنگی.

علامت p مخفف پیت و co مخفف کوکوپیت می‌باشد.

(حروف مشابه نشان دهنده عدم وجود اختلاف معنی‌دار در سطح ۰.۵٪ می‌باشد)

نتایج

مقایسه بسترهای مختلف کاشت نشان داد که بیشترین تعداد گل و میوه در بسترهای پرلیت- کوکوپیت با نسبت حجمی ۷۵-۲۵ و ۵۰-۵۰ به‌دست آمد که با سایر ترکیبات تفاوت معنی‌داری داشتند. کمترین تعداد آنها در پرلیت- کوکوپیت با نسبت حجمی ۰-۱۰۰ بود. بیشترین عملکرد میوه در تیمار پرلیت- کوکوپیت به نسبت‌های حجمی ۷۵-۲۵ و ۵۰-۵۰ بود. آنالیز کیفی میوه‌ها نشان داد که اثر بستر بر میزان pH و EC میوه‌ها معنی‌دار نبود (جدول ۵). سایر خصوصیات کیفی میوه نظیر وزن خشک میوه، مواد جامد

بحث

اندازه یا وزن میوه با مقدار آب موجود در بستر کاشت ارتباط مستقیمی دارد. لذا قدرت میوه در جذب آب و مواد مغذی از بسترهایی که قابلیت ذخیره آب کمتری دارند به شدت کاهش می‌یابد. علاوه بر این، در EC زیاد در منطقه ریشه، آب قابل دسترس گیاه محدود خواهد شد. لذا با کاهش سطح کربوهیدرات و آب در گیاه تعداد برگ، سطح برگ، وزن و اندازه میوه تحت تأثیر قرار می‌گیرد (۱۰). کوکوپیت به دلیل

جدول ۵. اثر بسترهای مختلف کاشت بر خصوصیات کیفی میوه توت فرنگی

بستر کاشت	EC (dS/m)	pH	TSS (°Brix)	اسیدیته قابل تیتر (میلی گرم در ۱۰۰ گرم میوه تازه)	درصد ماده خشک
پرلیت: کوکوپیت (۰-۱۰۰)	۵/۰۰ ^a	۳/۷۰ ^a	۸/۸۷ ^a	۰/۸۴ ^{b*}	۱۲/۲۰ ^{a**}
پرلیت: کوکوپیت (۲۵-۷۵)	۴/۷۲ ^a	۳/۶۸ ^b	۸/۳۸ ^b	۰/۸۵ ^b	۹/۸۶ ^c
پرلیت: کوکوپیت (۵۰-۵۰)	۴/۱۱ ^a	۳/۶۴ ^a	۷/۶۳ ^c	۰/۹۴ ^{ab}	۹/۷۴ ^c
پرلیت: کوکوپیت (۷۵-۲۵)	۴/۵۶ ^a	۳/۶۳ ^a	۷/۴۳ ^d	۱/۰۸ ^a	۱۰/۲۴ ^{bc}
پرلیت: کوکوپیت (۱۰۰-۰)	۴/۵۱ ^a	۳/۶۲ ^a	۷/۴۲ ^d	۱/۱۴ ^a	۱۰/۷۷ ^b

در هر ستون، حروف مشابه نشان دهنده عدم اختلاف معنی دار به ترتیب در سطح احتمال ۱٪ (**)، ۵٪ (*) و ۰٪ (**) می باشد.

جدول ۶. اثر بسترهای مختلف کاشت بر غلظت عناصر غذایی (درصد) میوه توت فرنگی

بسترهای کاشت	N	P	K	Ca	Mg
پرلیت: کوکوپیت (۰-۱۰۰)	۱/۷۰ ^{a**}	۱/۴۲ ^a	۰/۴۵ ^{a**}	۰/۰۹ ^{c**}	۰/۱۳۵ ^{c**}
پرلیت: کوکوپیت (۲۵-۷۵)	۱/۶۰ ^a	۱/۳۶ ^a	۰/۳۴ ^{ab}	۰/۱۳ ^b	۰/۱۴۵ ^c
پرلیت: کوکوپیت (۵۰-۵۰)	۱/۴۰ ^b	۱/۲۹ ^a	۰/۲۶ ^{bc}	۰/۱۵ ^b	۰/۱۶۷ ^{bc}
پرلیت: کوکوپیت (۷۵-۲۵)	۱/۲۰ ^c	۱/۲۲ ^a	۰/۱۸ ^c	۰/۲۱ ^a	۰/۱۹۲ ^{ab}
پرلیت: کوکوپیت (۱۰۰-۰)	۱/۱۵ ^c	۱/۱۴ ^a	۰/۱۳ ^d	۰/۲۱ ^a	۰/۲۰۹ ^a

در هر ستون حروف مشابه نشان دهنده عدم اختلاف معنی دار در سطح احتمال ۱٪ می باشد.

فرنگی است که به مقدار آب در گیاه بستگی دارد. علاوه بر آن، بین غلظت قند و مقدار نیتروژن میوه ها ارتباط مستقیم وجود دارد (۱۷). کاهش آب در پرلیت سطح آب گیاه را کاهش داده و باعث افزایش درصد ماده خشک میوه می شود. در این آزمایش نیز مقدار ماده خشک میوه در بستر پرلیت خالص در مقایسه با سایر تیمارها زیاد بود (جدول ۵) که علت آن نگهداری آب کمتر در این تیمار می باشد. اسیدیته بالا در محیط کاشت به نسبت بالای کوکوپیت به پرلیت بستگی دارد. دلیل اسیدیته بیشتر در بستر کاشت با EC بالا در نتیجه جذب کم نیتروژن و پتابیم و جذب بهتر کلسیم و سدیم در مقایسه با آئیون ها نظری سولفات گزارش شده است. افزایش مقدار قند با بهبود طعم میوه مرتبط می باشد (۱۴). در واقع، پرلیت خالص و نسبت

داشتن CEC بالا، ذخیره و پخشیدگی مواد مغذی را تسهیل و مدیریت آب را در کاشت بدون خاک بهبود می بخشد. پرلیت نیز تهويه را در بستر کاشت بهبود می بخشد. بنابراین در این مطالعه دو تیمار پرلیت - کوکوپیت به نسبت حجمی ۲۵-۷۵ و ۵۰-۵۰ دارای ذخیره متوسط آب، تهويه مناسب و شدت شوری پایین بوده (جدول ۲) و محدودیتی برای توت فرنگی وجود نداشت و به این لحاظ موجب افزایش عملکرد و سایر صفات مربوطه شده اند (جدول ۴). به طور مشابه، عملکرد بالا در کاشت هیدروپونیک گوجه فرنگی (۱۱)، خیار (۱۶)، ژربرا (۱۹) و رز (۱۹) در بستر کاشت مخلوطی از کوکوپیت و پرلیت مشاهده شده است.

درصد ماده خشک میوه یک فاکتور مهم در کیفیت توت

رشد کرده در بستر حاوی کوکوپیت بیشتر از سایر تیمارها بود. کلسیم نقش مهمی در حفاظت سلول از خسارت ناشی از EC بالای محیط رشد دارد.

نتیجه‌گیری

اثر بسترهای مختلف کشت بر جذب عناصر غذایی و عملکرد کمی و کیفی توت فرنگی گلخانه‌ای در گلخانه تحقیقاتی و آموزشی مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان غربی بررسی شد. نتیجه‌گیری کلی نشان می‌دهد که بیشتر خصوصیات کمی و کیفی میوه توت فرنگی در کشت هیدروپونیک به ترکیب بستر آن بستگی داشته، به طوری که بهترین خصوصیات کمی و کیفی میوه از بستر مخلوط پرلیت-کوکوپیت با نسبت‌های حجمی ۲۵-۷۵ و ۵۰-۵۰ بدست آمده است

حجمی ۲۵-۷۵ پرلیت-کوکوپیت بیشترین غلظت قند و کمترین اسیدیته را نشان دادند. کوکوپیت می‌تواند به آسانی آمونیوم و پتاسیم را جذب نماید (۲۰). علاوه بر این، کوکوپیت pH بستر کشت را تغییر داده و جذب عناصر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. pH بهینه بستر کشت برای رشد توت فرنگی در محدوده ۶/۰-۶/۵ گزارش شده است. پرلیت و مخلوطی از پرلیت-کوکوپیت به نسبت حجمی ۲۵-۷۵ pH مطلوب را فراهم کردند. جذب کمتر نیتروژن و پتاسیم در بسترهایی با کوکوپیت زیاد اتفاق افتاد. جذب پتاسیم به وسیله کوکوپیت سطح آن را در محلول غذایی کاهش می‌دهد (۲۴). جذب کلسیم و حرکت آن در گیاه به میزان آب در محیط کشت بستکی دارد. در این آزمایش، افزایش کوکوپیت نگهداری آب و کلسیم را افزایش داد. غلظت کلسیم و منزیم در میوه بوته‌های

منابع مورد استفاده

- اداره کل آمار و اطلاعات. ۱۳۸۸. آمارنامه کشاورزی سال زراعی ۱۳۸۷-۱۳۸۸. معاونت برنامه‌ریزی و پشتیبانی، وزارت جهاد کشاورزی، تهران.
- بتنون جونز، ج. ۱۳۸۵. هیدروپونیک (آبکشتی). ترجمه عبدالجبار رونقی و منوچهر مفتون، انتشارات دانشگاه شیراز، ۲۷۳ صفحه.
- پاپادوپولوس، آ. ۱۳۸۶. پرورش سبزی‌های گلخانه‌ای در کشت خاکی و بدون خاک. ترجمه غلامعلی پیوست و رحیم بزرگر، انتشارات دانش پذیر، ۲۲۵ صفحه.
- صابری، ز. ۱۳۸۵. کاربرد زئولیت، میکا و بعضی مواد بی‌اثر به عنوان بستر رشد گوجه‌فرنگی به روش هیدروپونیک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد خاک‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
- شکوهیان، ع. ا. ۱۳۸۴. پرورش خیارهای گلخانه‌ای در خاک و محیط‌های کشت بدون خاک. مؤسسه فرهنگی انتشارات یاوریان، ۲۱۸ صفحه.
- لنو، ا. چ. ت. ۱۳۸۶. راهنمای آبکشت. ترجمه غلامرضا رفیعی و آرش اکبرزاده، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۵۹ صفحه.
- Abad, M., P. Noguera, R. Puchades, R. Maquieira and A. Noguera. 2002. Physico-chemical and chemical properties of some coconut coir dusts for use as a peat substitute for containerized ornamental plants. Bioresource Technol. 82: 241-245.
- Bohme, M. 1994. Effects of hydroponics on the development of cucumber growing in ecologically suitable substrates. Acta Hort. 361: 133-140.
- Bunt, A. C. 1988. Media and Mixes for Container-Grown Plants. 20th Ed., Unwin Hyman Ltd., London, UK.
- Cantliffe, D., J. N. Shaw, E. Jovicich, J. C. Rodriguez, I. Secker and Z. Karchi. 2001. Passive ventilated high-roof greenhouse production of vegetables in a humid mild winter climate. Acta. Hort. 559: 515-20.
- Djedidi, M., D. Grasopoulos and E. Maloupa. 1997. The effect of different substrates on the quality of f. Carmello tomatoes (*Lycopersicon esculentum* MILL) grown under protection in a hydroponic system. Ciheam-Options Méditerranéennes 31: 379-83.
- Fotouhi Ghazvini, R., G. Payvast and H. Azarian. 2007. Effect of clinoptilolitic-zeolite and perlite mixtures on the

- yield and quality of strawberry in soilless culture. International J. Agric. Biol. 15(6): 8530-09-6-885-888.
13. Gul, A., D. Erogual and A. R. Ongum. 2005. Comparison of the use of zeolite and perlite as substrate for crisp-head lettuce. Sci. Hort. 106: 464-471.
14. Hancock, J. F. 1999. Strawberries. CABI Publishing, pp. 190-212.
15. Handreck, K. A. 1993. Properties of coir dust and its use in the formulation of soilless potting media. Comm. Soil Sci. Plant Anal. 24: 348-363.
16. Kanazirska, V., H. R. Simidtchiev and K. Chakalov. 1997. Effect of zeolite on yield and fruit quality of glasshouse cucumbers. Proc. Natural Zeolites Conf., Sofia, Italy, pp. 109-110.
17. Lacertosa, G., V. Lateana, N. Montemurro, D. Palazzo, and S. Vanadia. 1999. Soil fertility and plant nutrition status of strawberry in the Basilicata region, southern Italy. Developments in Plant and Soil Sci. 86(4): 159-62.
18. Maloupa, E., I. Mitsios, P. F. Martinez and S. Bladenopoulou. 1992. Study of substrate use in gerbera soilless culture grown in plastic greenhouse. Acta Hort. 323: 139-144.
19. Maloupa, E., C. Samartzidis, P. Couloumbis and A. Komnin. 1999. Yield quality and photosynthetic activity of greenhouse-grown "Madelom" roses on perlite-zeolite substrate mixtures. Acta. Hort., 481: 97-99.
20. Mumpton, F. A. 1999. Uses of natural zeolites in agriculture and industry. Proc. Natl. Acad. Sci. ,U.S.A., 96: 3463-3470.
21. Noguera, P., M. Abad, V. Noguera, R. Puchades and E. Maquieira. 2000. Coconut coir waste, a new and ecologically-friendly peat substitute. Acta Hort. 517: 279-286.
22. Olympios, C. M. 1992. Soilless media under protected cultivation rockwool, peat, perlite and other substrates. Acta Hort. 401: 443-451.
23. Olympios, C. M. 1995. Overview of soilless culture: Advantages, constraints and perspectives for its use in Mediterranean countries. Ciheam-Options Mediterraneennes 31: 307-324.
24. Savvas, D., K. Samantouros, D. Paralemos, G. Vlachakos, M. Stamatakis and C. Vassilatos. 2004. Yield and nutrient status in the root environment of tomatoes grown on chemically active and inactive inorganic substrates. Acta. Hort. 644: 377-383.
25. Savithri, P. and H. H. Khan. 1993. Characteristics of coconut coir peat and its utilization in agriculture. J. Plant Crop 22: 1-18.
26. Traka-Marrona, E., D. Gerasopoulou, T. Pritsa and E. Maloupa. 2005. Growth, fruit yield and quality of tomato in relation to substrate and nutrient source in a soilless culture system. Acta Hort. 548: 173-179.
27. Turhan, E. and E. Atilla. 2004. Effect of chloride application and different growth media on ionic composition in strawberry plant. J. Plant Nutr. 27: 1653-1665.
28. Verdonck, O., D. De Vleeschauwer and M. De Boodt. 1982. The influence of the substrates to plant growth. Acta Hort. 126: 251-258.