

## اثر عصاره پروتئینی تریتیکاله روی فعالیت آلفا آمیلاز گوارشی کرم غوزه *Helicoverpa armigera*

مهدى دسترنج<sup>۱</sup> و علیرضا بندانی<sup>۲\*</sup>

۱ و ۲ به ترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی و استاد گروه گیاه‌پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

(تاریخ دریافت: ۹۱/۳/۱۰) (تاریخ پذیرش: ۹۱/۴/۱۴)

### چکیده

کرم غوزه (*Helicoverpa armigera* (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae)) یک آفت همه‌جایی و چندین خوار است که به بسیاری از گونه‌های گیاهی حمله می‌کند. مهم‌ترین روش کاهش خسارت کنترل شیمیایی است، اما صدمه به محیط زیست و بروز مقاومت در حشرات آفت موجب شده است که راه‌های جایگزین برای کنترل آفات به جای استفاده از آفت کش‌های شیمیایی در نظر گرفته شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر عصاره پروتئینی تریتیکاله روی فعالیت آلفا آمیلاز کرم غوزه می‌باشد. برای این منظور لاروهای سن چهار حشره تشریح شده و پس از جداسازی دستگاه گوارش آنزیم آلفا آمیلاز استخراج شد. عصاره پروتئینی تریتیکاله هم با استفاده از کلرید سدیم ۱٪ مولار استخراج شد. بررسی تاثیر عصاره پروتئینی روی فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز به دو روش سنجش آنزیمی و سنجش در ژل زایموگرام انجام شد. نتایج نشان داد که روند مهار کنندگی وابسته به غلظت بود. در بالاترین (۱۷ میکرو گرم پروتئین) و پایین ترین غلظت (۱/۰۶۲۵ میکرو گرم) عصاره پروتئینی تریتیکاله به ترتیب حدود ۷۰ درصد و ۳۰ درصد مهار آنزیم آمیلاز مشاهده شد. پیشترین فعالیت مهار کنندگی در اسیدیته ۸ مشاهده شد. در بررسی اثر مهار کننده در ژل نیز روند مهار به صورت وابسته به دز دیده شد. در بالاترین غلظت مهار کننده دو باند فعالیت آنزیم به طور کامل حذف شدند در حالی که از شدت باند اصلی کاسته شد. در پایین ترین دز استفاده شده دو باند ذکر شده حذف شدند ولی شدت باند اصلی همچنان زیاد بود.

**واژه‌های کلیدی:** کرم غوزه، آنزیم آلفا آمیلاز، عصاره تریتیکاله، مهار کنندگی

\* نویسنده مسئول: [abandani@ut.ac.ir](mailto:abandani@ut.ac.ir)

انتقال داد تا مقاومت آن‌ها در برابر آفات و قارچ‌ها افزایش پیدا کند (Franco *et al.*, 2002; Medina *et al.*, 1993). کرم غوزه جهت تغذیه از بافت‌های گیاهی به ویژه هضم ناشسته به آنزیم‌های آلفا-آمیلاز وابسته می‌باشد. بنابراین آنزیم آلفا-آمیلاز این حشره پتانسیل کنترل حشرات را دارد. مهار کننده‌های پروتئینی آلفا-آمیلاز در گیاهان زیادی وجود داشته و در درجه‌ی اول در دانه‌ها و ریشه‌های ذخیره کننده‌ی ناشسته یافت می‌شوند و از این مواد علاوه بر مهار آلفا-آمیلازهای بذرگزad، به عنوان استراتژی دفاعی در مقابل گیاه‌خواران استفاده می‌کنند. با توجه به این که گیاه‌خواران برای تغذیه روی گونه‌های خاص سازش پیدا کرده‌اند، لذا مهار کننده‌های یک گونه‌ی گیاهی خاص، اغلب در برابر حشراتی که به آن گونه‌ی گیاهی حمله می‌کنند، مؤثر نیستند. مهار کننده‌های بسیار خوبی در گیاهانی نظری لوپیای معمولی، گندم و تاج خروس یافت شده‌اند که در برابر آلفا-آمیلازهای Titarenko and Chrispeels, 2000 موجود در دانه‌ها و قسمت‌های سبز گیاهان، در تنظیم برخی رفتارهای تغذیه‌ای حشرات گیاه‌خوار دخالت دارند (Bandani, 2005). این مهار کننده‌های آلفا-آمیلاز از منابع مختلف مانند گندم، جو، تریتیکاله و چاودار استخراج شده است. مهار کننده‌های پروتئینی آلفا-آمیلاز بر اساس ساختمان نوع سوم پروتئینی خود، به شش گروه تقسیم می‌شوند که می‌توان از ۱- Lectin-like (از لوپیای معمولی)، ۲- Knotin-like (از تاج خروس)، ۳- Cereal-type (از گندم، جو و برنج)، ۴- Kunitz-like (از سورگوم) و ۵-  $\gamma$ -purothionin (از سورگوم) و ۶- Franco *et al.*, 2002 (از ذرت) نام برد (Valencia *et al.*, 2000). یک مهار کننده برای مؤثر بودن باید دو ویژگی مهم داشته باشد، اول اینکه مهار کننده بایستی در یک غلظت به حد کافی پایین و در اسیدیته‌های که در معده و یا غدد بزاقی حشره یافت می‌شود، فعالیت آنزیم حشره را به میزان قابل توجهی مهار کند و ویژگی دیگر اینکه، مهار کننده باید در برابر حمله‌ی پروتئازهای معده و غدد بزاقی حشره مقاوم باشد (Gatehouse and Gatehouse, 1998).

## مقدمه

*Helicoverpa armigera* Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) در آفریقا، خاورمیانه، جنوب اروپا، هند، آسیای مرکزی و جنوب شرقی آسیا، شرق و شمال استرالیا، نیوزیلند و بسیاری از جزایر اقیانوس آرام شرقی خسارت می‌زند (Fitt, 1989). این آفت چندین خوار بوده و به بسیاری از گونه‌های گیاهی حمله می‌کند اما برخی از میزبان‌ها را ترجیح می‌دهد. بقا و زندگانی لارو به رژیم غذایی و دما بستگی دارد. توانایی دیاپوز اختیاری، مهاجرت، تحرک بالا و ترکیبی از باروری زیاد و طول مدت کوتاه هر نسل به بقا این آفت در زیستگاه‌های ناپایدار کمک می‌کند. کنترل شیمیایی این آفت به دلیل ظهور مقاومت به حشره کش‌ها خیلی موثر نیست (Kotkar, 2009).

اثرات منفی آفت کش‌های شیمیایی موجب شده است که راههای جایگزین از آفت کش‌های شیمیایی جهت کنترل آفات در نظر گرفته شود (Isman, 2006) در سال‌های اخیر تحقیقات گسترشده‌ای در مورد ترکیبات یا ژن‌های به دست آمده از میکروب‌ها و گیاهان انجام شده است تا شاید بتوان جایگزین مناسبی برای کنترل آفات پیدا کرد. بنابراین ترکیبات مانند مهار کننده‌های آنزیم‌های گوارشی شامل آنزیم‌های آمیلاز و پروتئاز، لکتین‌های به دست آمده از گیاهان و قارچ‌ها، دلتا اندو توکسین باکتری‌ها دارای پتانسیل خوبی هستند که در کنترل آفات استفاده شوند (Franco *et al.*, 2002). تعداد زیادی ژن از گیاهان و میکروب‌ها شناسایی شده‌اند که این پتانسیل را دارند تا به گیاهان منتقل شده که محصول این ژن/ ژن‌ها برای حشرات گیاه‌خوار سمی بوده و باعث مقاومت یا حفاظت گیاهان به حشرات گیاه‌خوار می‌شود (Mehrabadi *et al.*, 2012).

دانه‌ها و اندام‌های رویشی گیاهان عالی حاوی مهار کننده‌های پروتئینی مختلفی هستند که با متصل شدن به جایگاه فعل آنزیم هدف، از فعالیت پروتئازها و آمیلازهای حشرات، میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا، قارچ‌ها و پستانداران جلوگیری می‌کند اما روی آنزیم‌های خود گیاهان بسیار تأثیر نداشته (Gatehouse and Gatehouse, 1998).

(Mehrabadi *et al.*, 2010) با مقداری تغییرات عمل شد. به صورت خلاصه، مقدار ۳۰ گرم بذر تریتیکاله آرد و در ۱۰۰ میلی لیتر بافر NaCl با مولاریته‌ی ۱/۰، مخلوط شد. و به مدت ۹۰ دقیقه در دمای اتاق همزده شد. مخلوط حاصله در دمای چهار درجه‌ی سلسیوس به مدت ۳۰ دقیقه با سرعت  $\times 800$  سانتریفیوژ شدند. به منظور رسوب‌دهی پروتئین با سولفات آمونیوم ۷۰ درصد اشباع مخلوط شد. مخلوط حاصل به مدت ۴۵ دقیقه در دمای چهار درجه‌ی سلسیوس به آرامی هم زده شد. مخلوط سولفات آمونیوم-پروتئین، به مدت ۳۰ دقیقه در دمای چهار درجه‌ی سلسیوس با سرعت  $\times 8000$  سانتریفیوژ شدند و رسوبات حاصله با دو میلی لیتر بافر Tris-HCl (۰/۰۲ مولار، اسیدیته ۷)، به صورت سوپسانسیون درآمد و به مدت ۲۰ ساعت در درون آب مقطر، دیالیز شد و در نهایت به مدت ۱۰ دقیقه در دمای ۷۵ درجه سلسیوس داخل حمام آب گرم قرار داده شد به منظور اینکه آمیلازهای داخلی غیرفعال شوند. مخلوط حاصل به مدت ۱۵ دقیقه در دمای ۱۴ درجه سلسیوس و با سرعت  $\times 7500$  سانتریفیوژ شد. مایع رونشین جمع‌آوری و در دمای ۲۰ درجه سلسیوس نگهداری شد.

### بررسی اثر عصاره پروتئینی استخراج شده از تریتیکاله روی فعالیت آلفا آمیلاز

برای بررسی اثر عصاره پروتئینی تریتیکاله روی فعالیت آلفا آمیلاز از غلظت‌های ۱۷، ۸.۵، ۴.۲۵، ۲.۱۲۵، ۰.۶۲۵ میکرو گرم پروتئین تریتیکاله استفاده شد. غلظت‌های مختلف تریتیکاله با عصاره آنزیمی به مدت ۳۰ دقیقه اینکویه شد. سپس فعالیت آمیلویتکی با استفاده از روش برنفلد (Baker, 1955)، (Bernfeld, 1987) با اندکی تغییرات انجام شد. به این صورت که از نشاسته یک درصد به عنوان سوبسترا استفاده شد. واکنش در محیط بافر Glycine-NaOH) در دمای ۳۵ درجه انجام شد. سپس معرف DNS به مجموعه اضافه شد و برای مدت ۱۰ دقیقه در آب جوش قرار گرفت. بعد از سرد شدن میزان ۲۰۰ میکرو لیتر از نمونه توسط دستگاه الایزا ریدر (ELX 808) در طول موج ۵۴۰ نانومتر خوانده شد.

حال هیچگونه گزارشی در مورد اثر مهارکننده‌های آنزیم‌های آلفا آمیلاز کرم غوزه وجود ندارد هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر عصاره پروتئینی استخراج شده از تریتیکاله روی فعالیت آنزیم‌های گوارشی آلفا آمیلاز کرم غوزه می‌باشد.

## مواد و روش‌ها

### پرورش حشره

برای پرورش *H. armigera* از غذای مصنوعی شامل لویا ۲۰۵ گرم پودر لویا چشم بلبلی، ۳۰ گرم پودر جوانه گندم، ۳۵ گرم مخمر، ۱۲ گرم آگار، ۳/۵ گرم اسید آسکوربیک، ۲.۲ گرم نپاژین، ۱/۱ گرم اسید سوربیک، ۲/۵ میلی لیتر فرمالدهید، ۵ میلی لیتر روغن آفتاب گردان و ۸۵۰ میلی لیتر آب مقطر) استفاده شد. این حشرات در دمای ۲۶ درجه سلسیوس، رطوبت نسبی ۵۰ درصد و دوره نوری ۸:۱۶ (روشنایی: تاریکی نگهداری شدند (Shorey and Hale, 1965).

### تشریح و جداسازی اندام گوارشی

برای جداسازی لوله‌ی گوارشی لارو *H. armigera* پس از این که لاروهای سن چهارم حشره‌ی مورد نظر روی یخ بی‌حس شدند، سطح شکمی بدن لارو با قیچی بریده شد و لوله گوارش با استفاده از پنس جدا شد. تعداد ۵ عدد لوله گوارش داخل یک میکروتیوب‌های با حجم ۱/۵ میلی لیتر حاوی پانصد میکرولیتر آب دوبار مقطر سرد قرار گرفتند.

## استخراج آنزیم

برای استخراج آنزیم نمونه‌ها داخل میکروتیوب هموژناز شدند. برای این منظور از یک هموژنازر دستی استفاده شد. سپس نمونه‌ها در دمای چهار درجه سلسیوس با سرعت  $\times 15000$  به مدت ۱۵ دقیقه سانتریفیوژ شدند. بعد از این مرحله، بخش بالایی نمونه‌ها (سوب) جدا شده و به عنوان منع آنزیمی در دمای ۲۰ درجه سلسیوس نگهداری شدند.

### استخراج مهارکننده تریتیکاله

برای استخراج بازدارنده‌ها، طبق روش بیکر (Baker, 1983) و ملو و همکاران (Melo *et al.*, 1999) و مهرآبادی

## نتایج و بحث

### اثر مهارکننده تریتیکاله بر آنزیم آلفا آمیلاز

سنجهش فعالیت آمیلازی در حضور غلظت‌های مختلف از مهارکننده به این صورت بود که روند مهارکننده‌گی وابسته به غلظت بود. غلظت‌های ۱/۷، ۰/۵، ۰/۴، ۰/۳ و ۰/۲ میکروگرم پروتئین تریتیکاله مورد استفاده قرار گرفت. میزان مهار آنزیم آلفا آمیلاز با استفاده از غلظت‌های ۱/۷، ۰/۵، ۰/۴، ۰/۳ و ۰/۲ میکروگرم پروتئین مهارکننده به ترتیب برابر با ۴۵/۲، ۵۵/۹، ۷۱/۶، ۴۱/۲ و ۳۵/۵ شد (شکل ۱). نتایج بدست آمده با داده‌های سایر محققین هم تطابق دارد. برای مثال، والنسیا و همکاران (Valencia *et al.*, 2000) گزارش دادند که عصاره پروتئینی *Amaranthus cruentus* با غلظت ۱/۵ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر باعث مهار ۸۰ درصدی فعالیت آلفا آمیلاز *Hypothenemus hamper* شد، در حالی که عصاره پروتئینی *Amaranthus hybrid*، باعث مهار فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز حشره مذکور به میزان حدود ۴۰ درصد شد. Mehrabadi *et al.*, 2009) اثر مهارکننده آمیلاز تریتیکاله روی آمیلاز سن گندم بررسی کردند. آنها دریافتند که اثر این مهارکننده روی فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز سن گندم به صورت وابسته به دز است و در دز پایین (۰/۲۵ میلی‌گرم) تقریباً باعث حدود ۱۰ درصد مهار فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز سن گندم گردید در حالی که در دز بالا (۱/۵ mg) باعث مهار حدود ۸۰ درصد فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز سن گندم شد.

### تأثیر اسیدیته بر مهارکننده‌گی تریتیکاله

برای بررسی تأثیر اسیدیته روی اثر عصاره پروتئینی روی فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز از اسیدیته برابر ۶ تا ۱۱ استفاده شد. همانطور که در شکل ۲ دیده می‌شود میزان مهارکننده‌گی عصاره پروتئینی در اسیدیته‌های مختلف تغییر می‌کند. بیشترین فعالیت مهارکننده‌گی در اسیدیته ۸ مشاهده شد که پس از آن در اسیدیته‌های ۹ و ۷ مهارکننده‌گی بیشتری نسبت به بقیه اسیدیته‌ها دیده شد. اگرچه بین اسیدیته ۸ و ۹ تفاوت معنی داری مشاهده نشد. در اسیدیته بالاتر و پایین تر از این

### بررسی اثر اسیدیته روی فعالیت مهارکننده‌گی آلفا آمیلاز تریتیکاله

به منظور سنجهش تأثیر اسیدیته مختلف بر فعالیت مهارکننده‌گی تریتیکاله از بافر بونیورسال (گلایسین، مس ۲-۰۰۲ morpholinoethan sulfonic acid (Hosseinkhani and Nemat Gorgani, 2003) مولار) با اسیدیته ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ استفاده شد. میزان مهار فعالیت آمیلازی بعد از ۳۰ دقیقه اینکوبه با مهارکننده تریتیکاله محاسبه شد. نمونه کنترل در هر اسیدیته تنها با حضور عصاره آنزیمی و بدون افزودن مهارکننده در نظر گرفته شد.

### سنجهش مهارکننده در ژل

زایموگرام فعالیت آمیلویتیکی با استفاده از روش ژل الکتروفورز (Lamml, 1970) انجام شد. به این صورت که از پلی اکریل آمید ۱۰٪ برای ژل جداکننده و ۴٪ برای ژل متراکم کننده استفاده شد. الکتروفورز در ولتاژ ۹۰ برای ۲ ساعت انجام شد. پس از رسیدن رنگ به انتهای ژل از شیشه جدا شده و به مدت ۱۵ دقیقه در محلول ۱٪ تریتون X100 قرار گرفت. سپس برای مدت ۱/۵ ساعت در بافر گلیسین ۰/۰۲ مولار (Glycin-NaOH) اسیدیته ۹ حاوی ۲ میلی مولار CaCl<sub>2</sub> و ۱۰ میلی مولار NaCl و ۱٪ نشاسته قرار گرفت و در پایان ژل با آب مقطر شسته شد و به مدت ۱۰ دقیقه در محلول لگول (۳٪ KI و ۱.۳٪ I<sub>2</sub>) قرار گرفت. باندهای فعالیت آلفا آمیلازی در زمینه تیره به صورت روشن دیده می‌شوند.

### سنجهش میزان پروتئین

تعیین میزان پروتئین بر اساس روش برادفورد (Bradford, 1976) با استفاده از سرم آلبومین گاوی (BSA) به عنوان استاندارد انجام شد.

### تجزیه و تحلیل داده‌ها

تجزیه و تحلیل داده‌های اساس طرح کاملاً تصادفی با استفاده از نرم افزار SAS انجام شد. گروه‌بندی داده‌ها با استفاده از آزمون دانکن بررسی شد.

شدند ولی شدت باند اصلی همچنان زیاد بود. گزارش شده است که حضور تعدادی ایزوفرم آمیلاز در حشرات آفت راهکار کارا برای فائق آمدن حشرات بر مهارکنندهای آمیلاز تولید شده در گیاهان است. در این حشره هم همچنانکه در شکل دیده می‌شود سه ایزوآنزیم مختلف دیده می‌شود. سیواکومار و همکاران (۲۰۰۶) مهار شدن آمیلاز

*Sitophilus oryzae* (L.) (Coleoptera: Curculionidae), *Tribolium castaneum* (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae), *Callosobruchus chinensis* (Linnaeus) (Coleoptera: Bruchidae), *Corcyra cephalonica* (Stainton) (Lepidoptera: Galleriidae), *Spodoptera litura* (Fabricius) (Lepidoptera: Noctuidae), *Plutella xylostella* (Linnaeus) (Lepidoptera: Plutellidae), *Helicoverpa armigera* (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae), *Achaea janata* (Linnaeus) (Lepidoptera: Noctuidae) را توسط مهارکنندهای ارزن به روش سنجش در ژل بررسی کردند. مطالعه زایموگرام نشان داد که تعداد ایزوژایم‌های آنزیم از یک تا هشت عدد متغیر بودند. *C. S. litura*, *H. armigera*, *C. cephalonica* و *C. chinensis* نشان دادند و در حالی که سایرین دارای یک تا چهار ایزوژایم بودند. مطالعه الکتروفورز مهارکننده ارزن نشان داد که این مهارکننده قادر به کاهش فعالیت آمیلاز *H. armigera*, *S. litura*, *P. xylostella* و *H. armigera*

است. در *T. castaneum* میزان مهار کمی دیده شد و دادهای مشابهی در مورد *A. janata* به دست آمد. در *S. oryzae* منجر به حذف دو آمیلاز شد. مهارکننده آمیلاز ارزن به صورت معنی‌داری فعالیت آمیلازی *A. janata*, *C. cephalonica*, *S. oryzae*, *C. chinensis* را کاهش داد، که نشان‌دهنده این است که این مهارکنندهای آمیلاز می‌تواند بر علیه آفات محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.

### سپاسگزاری

نویسنده‌گان این مقاله از معاون پژوهشی دانشگاه تهران جهت فراهم نمودن هزینه‌های این پژوهش قدردانی می‌کنند.


محدوده تغییر معنی‌داری در فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز بین اسیدیته‌های مختلف مشاهده شد به این صورت که کمترین مهار در اسیدیته ۶ مشاهده شد.

گزارش‌های متعددی مبنی بر وابستگی خاصیت مهارکننده‌گی عصاره‌های گیاهی روی فعالیت آلفا آمیلاز وجود دارد. برای مثال، مهرآبادی (Mehrabadi et al., 2010) مشاهده کرد که شدت مهارکننده‌گی آلفا-آمیلاز توسط مهارکننده‌ی تریتیکاله، با مقادیر مختلف اسیدیته تغییر کرد. یکی از شرایط بسیار تأثیرگذار در برهم کنش بین آنزیم‌های گوارشی کربوهیدرات حشرات با مهارکننده‌های گیاهی، شرایط لومن حشره، به خصوص اسیدیته لومن حشره است. شرایط لومن در لارو پروانه‌ها، بازی (آلکالینی) گزارش شده است. علاوه بر آن نشان داده است که آلفا-آمیلاز این حشره نیز در همین شرایط (یعنی اسیدیته بازی)، دارای فعالیت بهینه است (Kotkar et al., 2009). بنابراین می‌توان چنین انتظار داشت که در شرایط لومن معده‌ی کرم غوزه، اگر غلاظت مناسبی از این مهارکننده‌ها وجود داشته باشد، میزان مهارکننده‌گی قابل قبولی حاصل شود. همخوانی و تطابق اسیدیته بهینه در لومن حشره، اسیدیته بهینه برای فعالیت آلفا-آمیلاز حشره و همچنین اسیدیته بهینه برای فعالیت مهارکننده، در دیگر مطالعات نیز گزارش شده است (Biggs and


McGregor, 1996; Valencia et al., 2000)

### سنجش مهارکننده‌گی در ژل

با توجه به سنجش فعالیت مهارکننده با روش طیف سنجی (الیزاریدر) و اثرات مهارکننده‌گی تریتیکاله روی آمیلاز گوارشی کرم غوزه، خاصیت مهارکننده‌گی در ژل نیز مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور غلاظت‌های مختلف مهارکننده با آنزیم انکوبه شدند. سپس زایموگرام توسط ژل پلی اکریل آمید مورد بررسی قرار گرفت. همچنانکه در شکل ۳ دیده می‌شود روند مهار وابسته به دز است. به این صورت که در بالا ترین غلاظت مهارکننده ۱۷ میکروگرم پروتئین) دو باند فعالیت آنزیم (یعنی باندهای A2 و A3) به صورت کامل حذف شدند در حالی که باند A1 هم از شدت باند کاسته شد. در پایین ترین دز، دو باند ذکر شده حذف




شکل ۱- اثر غلظت‌های مختلف تریتیکاله بر میزان مهارکنندگی آنزیم آلفا‌آمیلاز کرم غوزه.

Figure 1. The effect of different concentrations of triticale extract on inhibition of the bollworm  $\alpha$ -amylase activity

شکل ۲- اثر اسیدیته‌های مختلف بر فعالیت مهارکنندگی تریتیکاله بر روی آنزیم آلفا‌آمیلاز کرم غوزه.

Figure 2. The effect of different pHs on the inhibition of the bollworm  $\alpha$ -amylase activity



شکل ۳- بررسی اثر مهار کنندگی تریتیکاله بر روی آمیلاز گوارشی در ژل مهار کننده با عصاره آن زیمی به مدت یک ساعت انکوبه شدن و سپس در ژل بارگذاری شدن. تیمار کنترل در سنجش آمیلاز گوارشی ستون اول از سمت راست می باشد. با افزایش غلظت مهار کننده، میزان فعالیت مشاهده شده کاهش یافت. غلظت های مهار کننده به ترتیب ۱۷ میکرو گرم پروتئین (۱)، ۸.۵ میکرو گرم پروتئین (۲)، ۴.۲۵ میکرو گرم پروتئین (۳)، ۲.۱۲۵ میکرو گرم پروتئین (۴)، ۱.۰۶۲۵ میکرو گرم پروتئین (۵) و کنترل بدون مهار کننده (۶)

Figure 3. In gel assay of the effect of triticale extract on the bollworm  $\alpha$ -amylase activity. The extract was pre-incubated with enzyme for an hour, and then loaded in the gel. First column of the right hand side shows control. With increasing the inhibitor concentrations the amount of the enzyme activity decreases. 17  $\mu$ g protein (1), 8.5  $\mu$ g protein (2), 4.25  $\mu$ g protein (3), 2.125  $\mu$ g protein (4), 1.0625  $\mu$ g protein (5) and control without inhibitor (6).

## منابع

- Baker, J. E.** 1983. Properties of amylases from midguts of larvae of *Sitophilus zeamais* and *Sitophilus granaries*. **Insect Biochemistry** 13: 421-428.
- Baker, J. E.** 1987. Purification of isoamylases from the rice weevil, *Sitophilus orizae* L. by HPLC and their interaction with partially purified amylase inhibitor from wheat **Insect Biochemistry** 17: 37-44.
- Bandani, A. R.**, 2005. Effect of plant  $\alpha$ -amylase inhibitors on sunn pest, *Eurygaster integriceps* Puton.  $\alpha$ -amylase activity. **Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences** 70(4): 869-873.
- Bernfeld P.**, 1955. Amylases,  $\alpha$  and  $\beta$ . **Methods in Enzymology** 1: 149-158.
- Biggs D. R. and McGregor P. G.**, 1996. Gut pH and amylase and protease activity in larvae of the New Zealand grass grub (*Costelytra zealandica*; Coleoptera: Carabidae) as a basis for selecting inhibitors. **Insect Biochemistry and Molecular Biology** 26: 69-75
- Bradford, M. M.** 1976. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. **Analytical Biochemistry** 72: 248-254.
- Fitt, G. P.** 1989. The ecology of *Heliothis* species in relation to agroecosystems. **Annual Review of Entomology** 34: 17-52.
- Franco, O. L., Rigden, D.J., Melo, F. R. and Grossi-de-Sa, M. F.** 2002. Plant  $\alpha$ -amylase inhibitors and their interaction with insect  $\alpha$ -amylases: Structure, function and potential for crop protection. **European Journal of Biochemistry** 269: 397-412.
- Gatehouse, A. M. R. and Gatehouse, J. A.** 1998. Identifying proteins with insecticidal activity: use of encoding genes to produce insect-resistant transgenic crops. **Pesticide Science** 52: 165-175.
- Hosseinkhani, S. and Nemat-Gorgani, M.** 2003. Partial unfolding of carbonic anhydrase provides a method for its immobilization on hydrophobic adsorbents and protects it against irreversible thermoinactivation. **Enzyme and Microbial Technology** 33: 179-184.

- Isman, M. B.** 2006. Botanical Insecticides, Deterrents, and Repellents In Modern Agriculture and an Increasingly Regulated World. *Annual Review of Entomology* 51: 45–66.
- Kotkar, H. M., Sarate, P. J., Tamhane, V. A., Gupta, V. S. and Giri, A. P.** 2009. Responses of midgut amylases of *Helicoverpa armigerata* feeding on various host plants. *Journal of Insect Physiology* 55: 663-670.
- Lammlj, U. K.** 1970. Cleavage of structural proteins during the assembly of bacteriophage T4. *Nature* 227: 680–685.
- Melo, F. R., Sales, M. P., Silva, L. S., Franco, O. L., Bloch, J. R. C. and Ary, M. B.** 1999.  $\alpha$ -amylase inhibitors from cowpea seeds. *Protein and Peptide Letter* 6: 387-392.
- Medina, J., Hueros, G., and Carbonero, P.** 1993. Cloning of cDNA, Expression, and chromosomal location of genes encoding the three of subunits of the barley tetrameric inhibitor of insect  $\alpha$ -amylase. *Plant Molecular Biology* 23: 535-542.
- Mehrabadi, M., Bandani, A. R., Saadati, F. and Ravan, S.** 2009. Sunn pest, *Eurygaster integriceps* Puton (Hemiptera: Scutelleridae), digestive  $\alpha$ -amylase,  $\alpha$ -glucosidase and  $\beta$ -glucosidase. *Journal of Asia-Pacific Entomology* 12: 79-83.
- Mehrabadi, M., Bandani A. R. and Saadati, F.** 2010. Inhibition of Sunn pest, *Eurygaster integriceps*,  $\alpha$ -amylases by  $\alpha$ -amylase inhibitors (T-  $\alpha$ AI) from Triticale. *Journal of Insect science* 10:179 available online: insectscience.org/10.179.
- Mehrabadi, M., Bandani, A. R., Mehrabadi, R. and Alizadeh, H.** 2012. Inhibitory activity of proteinaceous  $\alpha$ -amylase inhibitors from Triticale seeds against *Eurygaster integriceps* salivary  $\alpha$ -amylases: Interaction of the inhibitors and the insect digestive enzymes. *Pesticide Biochemistry and Physiology* 102: 220-228.
- Sivakumar, S., Mohan, M., Franco, O. L. and Thayumanavan, B.** 2006. Inhibition of insect pest  $\alpha$ -amylases by little and finger millet inhibitors. *Pesticide Biochemistry and Physiology* 85: 155-160.
- Shorey, H. H. and Hale, R .L.** 1965. Mass-rearing of the larvae of nine noctuid species on a simple artificial medium. *Journal of Economic Entomology* 58: 522-524.
- Titarenko, E. and Chrispeels M. J.** 2000. C DNA cloning, biochemical characterization and inhibition by plant inhibitors of the  $\alpha$ -amylase of the western corn rootworm, *Diabrotica virgifera*. *Insect Biochemistry and Molecular Biology* 30: 979–990.
- Valencia, A., Bustillo, A. E., Ossa, G. E. and Chrispeels, M. J.** 2000.  $\alpha$ -amylase of the coffee berry borer (*Hypothenemus hampei*) and their inhibition by two plant amylase inhibitors. *Insect Biochemistry and Molecular Biology* 30: 207-213.

## **Effect of proteinaceous extract of triticale seed extract on $\alpha$ -amylase activity of *Helicoverpa armigera***

**M. Dastjerdi<sup>1</sup>, A. Bandani\*<sup>2</sup>**

1, 2. MSc Student and Professor, respectively, Department of Plant Protection, College of Agricultural and Natural Resources, University of Tehran

---

(Received: May 30, 2012- Accepted: July 4, 2012)

---

### **Abstract**

Boll worm, *Helicoverpa armigera* (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) is a cosmopolitan and polyphagous pest that attacks many plant species. The most important control method is based on the use of pesticides which is a concern to environment as well as insects' resistance, thus alternative ways to chemical ones are required. The aim of the current study is to investigate the effect of protein extract of triticale against boll worm amylase. To do so, fourth instar larvae were dissected, their gut removed and their amylase were extracted. Protein of triticale was extracted using 0.1 M NaCl. Effect of proteinaceous extracts on amylase activity in both enzymatic assay and in gel assay using zymogram was performed. Results showed that the inhibitory process was dose dependant. The highest (17 µg protein) and the lowest concentration (1.0625 µg protein) of triticale extracts produced 70 and 30% inhibition activity, respectively. The highest inhibitory activity was observed at pH 8. Dose dependant manner of inhibition also was observed in gel assay. At the highest concentration of the inhibitor, two bands were completely eliminated while the intensity of major band was reduced. When the lowest dose was used two bands was removed but intensity of major band was still high.

**Key words:** Boll worm, Alpha amylase, Triticale extract, Inhibition

---

\*Corresponding author: [abandani@ut.ac.ir](mailto:abandani@ut.ac.ir)