

علمی پژوهشی

## کارآیی حشره کشی اختلاط ایمیداکلوپرید با برخی از کنه کش ها علیه شته جالیز *Aphis gossypii* (Hem.: Aphididae) در شرایط آزمایشگاهی

مطلب آذربو، محمد قدمیاری\*، جلیل حاجی زاده و الهه شفیعی علویجه

گروه گیاه پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۴/۱۹ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۷/۲۷)

### چکیده

استفاده از مخلوط آفت کش ها، یکی از راه های مؤثر در کاهش هزینه های سم پاشی، کاهش مصرف آن ها و جلوگیری از توسعه مقاومت در جمعیت آفات است. این در حالی است که با توجه به مخاطرات احتمالی، قبل از هر گونه توصیه به اختلاط آفت کش ها، می بایست لزوم اختلاط و سازگاری های فیزیکی و شیمیایی آن مورد بررسی دقیق قرار گیرد. در این مطالعه با توجه به هم زمانی کنترل شته جالیز و کنه های آفت گیاهی، کارآیی حشره کشی ایمیداکلوپرید (SC, 35%) در اختلاط با هر یک از کنه کش های فن پیروکسیمیت (SC, 5%)، اسپیرودیکلوفن (SC, 24%) و اتوکسازول (EC, 10%) روی پوره های سن سه شته ی جالیز مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین، سطح فعالیت آنزیم های سم زدای استراز و گلوکاتیون اس-ترانسفراز در حشرات تیمار شده با ترکیب آفت کش ها اندازه گیری شد. آزمایش های زیست سنجی با استفاده از برج پاشش انجام گرفت. میزان LC<sub>50</sub> حشره کش ایمیداکلوپرید به تنهایی و در ترکیب با هر یک از کنه کش های فن پیروکسیمیت، اسپیرودیکلوفن و اتوکسازول به ترتیب ۴۵/۴۱، ۴۴/۶۵ و ۴۸/۹۴ میلی گرم بر لیتر محاسبه شد. هم چنین، برآورد شاخص ترکیب (Combination Index) نشان دهنده اثر سینرژیستی هر کدام از کنه کش های اختلاط شده با ایمیداکلوپرید در کارآیی حشره کشی آن بود. بالاترین فعالیت سینرژیستی در غلظت های بالاتر از LC<sub>30</sub> گزارش شد و با افزایش غلظت آفت کش ها در تیمارهای مخلوط، مقدار شاخص CI کاهش یافت. مقایسه فعالیت آنزیم های سم زدای مورد بررسی نشان داد که میزان فعالیت این آنزیم ها در تیمارهای مخلوط ایمیداکلوپرید: فن-پیروکسیمیت و ایمیداکلوپرید: اسپیرودیکلوفن بالاتر از تیمارهای ایمیداکلوپرید به تنهایی و مخلوط ایمیداکلوپرید: اتوکسازول بود. کم ترین شاخص CI در غلظت LC<sub>50</sub>، مربوط به مخلوط های ایمیداکلوپرید: اتوکسازول (۰/۵۲۹) و ایمیداکلوپرید: اسپیرودیکلوفن (۰/۵۴۵) بود که نشان از اثر سینرژیستی بیش تر داشت. نتایج این پژوهش نشان داد که کارآیی فرمولاسیون SC ایمیداکلوپرید در اختلاط با هر یک از کنه کش های مورد آزمایش برای کنترل شته جالیز افزایش یافته است. این در حالی است که مخلوط ایمیداکلوپرید: اتوکسازول بیش ترین افزایش کارآیی حشره کشی را نشان داده است.

**واژه های کلیدی:** اتوکسازول، فن پیروکسیمیت، اسپیرودیکلوفن، شاخص ترکیب، آنزیم های سم زدای

## مقدمه

شته جالیز یا شته پنبه *Aphis gossypii* Glover (Hemiptera: Aphididae)، حشره‌ای چندخوار و یکی از مهم‌ترین شته‌های خسارت‌زا در مزرعه و گلخانه است که به دلیل پراکنش گسترده و دامنه میزبانی وسیع، دارای اهمیت اقتصادی زیادی است (Blackman and Eastop, 2000). این آفت علاوه بر خسارت مستقیم از طریق تغذیه از شیره گیاهی، که منجر به پژمردگی، کوتولگی و ریزش برگ‌ها می‌شود، به صورت غیر مستقیم نیز از طریق ترشح عسلک و انتقال ویروس‌های گیاهی خسارت قابل ملاحظه‌ای به گیاهان میزبان وارد می‌کند (Irshaid and Hasan, 2011). عواملی نظیر سم‌پاشی‌های بی‌رویه، پیدایش جمعیت‌های مقاوم (Kerns and Gaylor, 1992) و از بین رفتن دشمنان طبیعی، باعث افزایش جمعیت شته‌ی جالیز و تبدیل آن به یک آفت مهم شده است (Cisneros and Godfrey, 2001). در سراسر جهان، کنترل شیمیایی به دلیل تأثیر سریع و قاطع و ضریب اطمینان بالا، یکی از ابزارهای اصلی مورد کاربرد کشاورزان برای کاهش خسارت ناشی از آفات است (Shi et al., 2011). یکی از ترکیبات مؤثر برای کنترل آفات مکنده و به‌ویژه شته‌ها، آفت کش ایمیداکلوپرید است.

ایمیداکلوپرید از حشره‌کش‌های گروه نتونیکوتینوئیدها است که به صورت تماسی و گوارشی روی حشرات مکنده تأثیر می‌گذارد و به دلیل دارا بودن خاصیت سیستمیک از راه ریشه، شاخه و برگ نیز جذب گیاه می‌شود. این حشره‌کش از پرمصرف‌ترین ترکیبات توصیه شده توسط سازمان حفظ نباتات برای کنترل برخی از آفات سبزی و جالیز است (Sheikhi-Garjan et al., 2009).

امروزه مخلوط آفت‌کش‌ها در مخزن سم‌پاش، یکی از راه‌کارهای کنترلی مورد استفاده به‌منظور افزایش کارآیی، کاهش هزینه، جلوگیری از توسعه‌ی مقاومت آفات به آفت-کش‌ها و کاهش ورود آفت‌کش‌ها به محیط زیست است

6. Amitraz

7. Esterase

8. Cytochrome P450 monooxygenases

9. Glutathione S-Transferase (GSTs)

1. Imidacloprid

2. Pyrethroid

3. Bifenthrin

4. Chlorpyrifos-methyl

5. Permethrin

(Yuya et al., 2009). کاربرد مخلوط آفت‌کش‌ها در جهت کاهش مقاومت و افزایش کارآیی کنترل شته‌ی جالیز در ایتوبی توصیه شده است (Shonga et al., 2013). مخلوط ترکیبات پایرتروئیدی و فسفره آلی روی کرم غوزه پنبه، *Helicoverpa armigera* Hubner موجب اثر سینرژیستی و جلوگیری از توسعه مقاومت به حشره‌کش‌ها شده است (Martin et al., 2000). نتایج حاصل از بررسی مخلوط دوتایی حشره‌کش‌های بی‌فترین<sup>۳</sup> (پایرتروئیدی) و کلرپایرفوس متیل<sup>۴</sup> (فسفره آلی) روی سویه حساس و مقاوم پشه آنوفل *Anopheles gambiae* Giles به بی‌فترین<sup>۳</sup>، نشان داده است که در اختلاط دو ترکیب با دزهای بالا، اثر سینرژیستی روی هر دو سویه حساس ( $0.3 < CI < 0.7$ ) و مقاوم به بی‌فترین<sup>۳</sup> ( $0.7 < CI < 0.9$ ) وجود دارد. این نتایج بیان می‌کند که مخلوط حشره‌کش‌ها ممکن است یک راه‌برد جایگزینی برای کنترل مقاومت، به‌ویژه در مناطقی که پشه‌ها مقاوم به پایرتروئیدها شده‌اند، باشد (Bonnet et al., 2004). تأثیر سمیت هم‌زمان پرمترین<sup>۸</sup> و آمیتراز<sup>۶</sup> روی کنه‌ی دامی، *Boophilus microplus* Canestrini به صورت هم‌افزایی گزارش شده است (Li et al., 2007). سازوکار مقاومت در سوسری آلمانی مقاوم به شش گروه از آفت-کش‌ها، آنزیم‌های سم‌زدا استراز و مونواکسیژناز بود و کاربرد هم‌زمان آفت‌کش‌ها موجب اثر سینرژیستی و شکست کامل مقاومت به این آفت‌کش‌ها شده است (Chai and Lee, 2010).

بررسی متابولیسم آفت‌کش‌ها نقش مهمی در تأثیر انتخابی آفت‌کش‌ها برای آفات هدف دارد که به‌وسیله گروه متعددی از آنزیم‌ها شامل آنزیم‌های استراز<sup>۷</sup>، مونواکسیژنازهای وابسته به سیتوکروم<sup>۸</sup> P450 و آنزیم گلوکوتایون اس-ترانسفرا<sup>۹</sup> صورت می‌گیرد (Hemingway et al., 1995). هم‌چنین، در مخلوط آفت-کش‌ها بسته به نوع برهم‌کنش، پاسخ‌های فیزیولوژیکی

حشره کشی دو آفت کش می تواند نتایج مفیدی در برنامه های مدیریت تلفیقی آفات در پی داشته باشد برای این منظور پژوهش حاضر، با هدف بررسی کارایی اختلاط ایمیداکلوپرید با فن پیروکسیمیت، اسپیرودیکلوفن و اتوکسازول در کنترل شته جالیز، برآورد شاخص ترکیب اختلاط های مورد آزمایش و اندازه گیری فعالیت آنزیم های سم زدا در تیمارها انجام گرفت.

## مواد و روش ها

### مواد

در این تحقیق از آفت کش های ایمیداکلوپرید با فرمولاسیون تجاری (Confidor®; SC, 35%)، فن پیروکسیمیت با فرمولاسیون تجاری (Ortus®; SC, 5%)، اسپیرودیکلوفن با فرمولاسیون تجاری (Envidor®; SC, 24%) و اتوکسازول با فرمولاسیون تجاری (Baroque®; EC, 10%) از محصولات شرکت آریا شیمی استفاده شد. آلفا- و بتا- نفتیل استات<sup>۴</sup> از شرکت سیگما، گلو تاتیون احیا شده و<sup>۵</sup> CDNB از شرکت مرک و نمک فست بلو آر آر از شرکت فلوکا خریداری شد.

### جمع آوری و پرورش کلنی شته جالیز

شته جالیز از مزارع اطراف دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان جمع آوری و پس از شناسایی، جهت انجام آزمایش ها به گلخانه حشره شناسی گروه گیاه پزشکی دانشگاه گیلان منتقل شد. به منظور پرورش و ایجاد کلنی شته جالیز از بوته های خیار (۴-۵ برگگی) استفاده شد، به این ترتیب که بذر رقم نگین (Negin) داخل گلدان های پلاستیکی به قطر دهانه ۱۲ و ارتفاع ۱۵ سانتی متری حاوی مخلوطی از خاک مزرعه، پیت ماس و کوکوپیت کاشته شد. به منظور جلوگیری از آلوده شدن جمعیت شته به سایر حشرات و به ویژه پارازیتوئیدها، کلنی داخل قفس های توری با ابعاد ۱×۱×۱ متر و در شرایط گلخانه ای (دمای ۲۵±۳ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ۶۰±۱۰ درصد) نگهداری شد.

متفاوتی مشاهده می شود (Zhu et al., 2017). بنابراین شناسایی دقیق آنزیم های درگیر در سم زدایی حشره کش ها از اهمیت ویژه ای در توسعه گروه های جدید آفت کش ها برای استفاده در مدیریت مقاومت به حشره کش ها و انتخاب آفت-کش های مناسب برخوردار است. در زنجیرک قهوه ای، *Nilaparvata lugens* Stal مخلوط پایریترئیدها و ترکیبات فسفره آلی فعالیت آنزیم های سم زدا را کاهش داده است. از نظر تئوری، اثر سینرژیستی یکی از حشره کش ها در مخلوط، با مسیر سم زدایی متابولیکی حشره کش دیگر تداخل داشته و بدین صورت سمیت حشره کش دیگر را تشدید خواهد کرد. به طور کلی سموم فسفره توسط سامانه اکسیداسیون سمی تر می شوند، در حالی که ترکیبات پایریترئیدی توسط این سامانه سم زدایی می شوند. هنگامی که مخلوط این ترکیبات با هم استفاده می شوند، بخشی از سامانه اکسیداسیون (که مسؤل سم زدایی پایریترئیدها است)، درگیر اکسیداسیون ترکیب فسفره شده؛ بنابراین سمیت مخلوط افزایش می یابد (Yu and Ting, 2019).

کشاورزان برای کنترل چند آفت به طور همزمان از مخلوط آفت کش ها استفاده می کنند. امروزه شته جالیز و کنه تارتن دو لکه ای (*Tetranychus urticae* Koch) از آفات مهم و مسئله ساز گیاهان زراعی، باغی، سبزی و جالیز و هم-چنین گلخانه ای هستند. این آفات به طور همزمان باعث خسارت به محصولات کشاورزی می شوند. از آنجا که ایمیداکلوپرید خاصیت کنه کشی نداشته و از ترکیبات رایج و پر مصرف برای کنترل شته ها است و اتوکسازول، اسپیرودیکلوفن<sup>۲</sup> و فن پیروکسیمیت<sup>۳</sup> دارای خاصیت کنه کشی به ویژه روی کنه دو لکه ای هستند (Noorbakhsh et al., 2016) و با توجه به هم پوشانی زمان کنترل شته و کنه های زیان آور محصولات کشاورزی، برخی از بهره برداران برای کاهش هزینه های سم پاشی اقدام به اختلاط ترکیبات حشره کش و کنه کش در مخزن سم پاش در جهت کنترل همزمان شته ها و کنه ها می نمایند. مطالعه ای کارآیی

4.  $\alpha$ - and  $\beta$ - Naphthyl acetate

5. 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene (CDNB)

6. Fast blue RR salt

1. Etoxazole

2. Spirodiclofen

3. Fenprothiopyrate

### هم‌سن‌سازی شته جالیز

برای هم‌سن کردن شته‌ها، تعدادی از حشرات کامل بکرزای بی‌بال روی گیاهان سالم انتقال داده و به آن‌ها اجازه داده شد که به مدت ۲۴ ساعت پوره‌زایی داشته باشند. پس از ۲۴ ساعت حشرات کامل حذف و به پوره‌ها امکان داده شد تا رشد و نمو خود را سپری کرده و به مرحله سنی مورد نظر برسند (Ebert and Cartwright, 1997).

### آزمون‌های زیست‌سنجی

به منظور تعیین محدوده‌ی غلظت‌های مؤثر آفت‌کش ایمیداکلوپرید روی شته‌ی مورد مطالعه، ابتدا آزمون‌های مقدماتی زیست‌سنجی در جهت تعیین غلظت‌های با حداکثر تلفات (حدود ۸۵ درصد) و حداقل تلفات (حدود ۲۰ درصد) طراحی و انجام شد. سپس، پنج غلظت از آفت‌کش ایمیداکلوپرید با استفاده از فاصله لگاریتمی، تعیین و در آزمون نهایی زیست‌سنجی مورد استفاده قرار گرفت. تیمارها با هر یک از غلظت‌ها در چهار تکرار انجام شد. قبل از تیمار ابتدا دیسک‌های برگی (به قطر ۴ سانتی‌متر) از برگ‌های خیار تهیه و برگ‌ها از سطح رویی در ظروف پتری حاوی پنبه مرطوب قرار داده شد. هر تشتک پتری حاوی برگ خیار با مقدار ۲ میلی‌لیتر از محلول رقیق شده آفت‌کش مورد نظر با فرمولاسیون سوسپانسیون یا امولسیون با استفاده از دستگاه برج پاشش تیمار شد (شاهد با آب مقطر تیمار شد). فشار دستگاه طوری تنظیم شد تا با پاشیدن ۲ میلی‌لیتر محلول، به ازای هر سانتی‌متر مربع یک میلی‌گرم محلول سمی به سطح تیمار شده برسد. تشتک‌های پتری بعد از تیمار به مدت نیم ساعت در دمای اتاق قرار داده و پس از خشک شدن قطرات محلول سمی، ۱۰ عدد پوره‌ی سن سوم هم‌سن روی هر دیسک (پشت برگ) منتقل شد. شته‌ها در انکوباتور با دمای  $25 \pm 2$  درجه سلسیوس، رطوبت نسبی  $60 \pm 10$  درصد و دوره‌ی نوری  $16:8$  ساعت (تاریکی: روشنایی) نگهداری شدند. میزان تلفات ۷۲ ساعت بعد از تیمار ارزیابی شد. شته‌هایی که پس از تحریک با قلم‌مو قادر به حرکت به اندازه‌ی طول بدن

خود نبودند، مرده در نظر گرفته شدند (Khajehali et al., 2010; Amini Jam et al., 2014).

هم‌چنین به منظور بررسی برهم‌کنش بین آفت‌کش‌ها، این ترکیبات به نسبت ۱:۱ با هم مخلوط شدند. سپس، میزان  $LC_{50}$  مخلوط آن‌ها روی شته‌ها بر اساس روش ذکر شده در بالا اندازه‌گیری شد.

### آزمون‌های بیوشیمیایی

اثر  $LC_{50}$  ایمیداکلوپرید و مخلوط دو به دوی آن با کنه-کش‌های اتوکسازول، اسپیرودیکلوفن و فنپیروکسیمیت روی آنزیم‌های سم‌زدای شته جالیز به شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفت.

### اندازه‌گیری میزان فعالیت آلفا- و بتا- استرازی

فعالیت استرازهای عمومی مطابق روش وان اسپرن<sup>۴</sup> (۱۹۶۲) اندازه‌گیری شد. در این آزمون از زیرنهشت‌های آلفا- نفتیل استات و بتا- نفتیل استات برای اندازه‌گیری فعالیت استراز استفاده شد. برای تهیه نمونه آنزیمی، ۱۵ عدد پوره‌ی سن سوم هم‌سن در ۸۰ میکرولیتر بافر فسفات (۰/۱ مولار، pH=7) حاوی ۰/۱ درصد تریتون X-100<sup>۵</sup> روی یخ هموژنایز شد. سپس، محلول هموژنایز شده در سانتریفیوژ با سرعت ۱۱۵۰۰ دور بر دقیقه (rpm) به مدت ۱۵ دقیقه در ۴ درجه سلسیوس سانتریفیوژ و محلول رویی (سوپرناتانت<sup>۵</sup>) به عنوان نمونه آنزیمی استفاده شد. ۱۲/۵ میکرولیتر از محلول رونشین با ۱۱۲/۵ میکرولیتر بافر فسفات، ۲۵ میکرولیتر سویسترا و ۵۰ میکرولیتر معرف رنگی فست بلو آر آر درون چاهک‌های پلیت الیزاریخته شد. جذب محلول رنگی ایجاد شده هر دو دقیقه یک بار به وسیله دستگاه میکروپلیت ریدر (Awareness Stat Pax 3200®) در طول موج ۴۵۰ نانومتر برای زیرنهشت آلفا- نفتیل استات و ۵۴۰ نانومتر برای زیرنهشت بتا- نفتیل استات خوانده شد. منحنی استاندارد با استفاده از خوانش جذب غلظت‌های مختلف نفوتول ترسیم

4. Triton X-100

5. Supernatant

1. Bracketing

2. Potter Spray Tower

3. Van Asperen

برای مقایسه میانگین داده‌ها در سطح احتمال آماری ۵٪ استفاده شد. نیکویی برازش خط غلظت-پاسخ با استفاده از نرم افزار SAS برآورد شد.

### نتایج

#### زیست‌سنجی

نتایج حاصل از آزمون‌های زیست‌سنجی در جدول شماره ۱ آمده است. میزان LC<sub>50</sub> حشره کش ایمیداکلوپرید روی پوره‌های سن سوم *A. gossypii* به تنهایی و در ترکیب با هر یک از کنه‌کش‌های فن‌پیروکسیمیت، اسپیرودیگلوفن و اتوکسازول با نسبت ۱:۱ به ترتیب ۴۵/۴۱، ۸۴/۹۱، ۴۴/۶۵ و ۴۸/۹۴ میلی‌گرم بر لیتر به دست آمد. هم‌چنین با برآورد CI (شاخص ترکیب) مشخص شد که در ترکیب ایمیداکلوپرید با هر یک از کنه‌کش‌های مذکور اثر سینرژیستی وجود دارد و بهترین اثر سینرژیستی برای مخلوط ایمیداکلوپرید و اتوکسازول در غلظت LC<sub>50</sub> به دست آمد.

#### نسبت سمیت

نسبت‌های غلظت کشندگی ۵۰ درصد مخلوط دوتایی آفت‌کش‌های ایمیداکلوپرید، اتوکسازول، اسپیرودیگلوفن و فن‌پیروکسیمیت روی سن سوم پورگی شته جالیز با حدود اطمینان ۹۵٪ در جدول شماره ۲ آورده شده است. براساس نسبت سمیت، LC<sub>50</sub> مخلوط ایمیداکلوپرید: فن‌پیروکسیمیت با LC<sub>50</sub> مخلوط ایمیداکلوپرید: اتوکسازول از نظر آماری در سطح ۹۵٪ اختلاف معنی‌داری داشته و مخلوط ایمیداکلوپرید: اتوکسازول ۲/۷۳ برابر سمی‌تر از مخلوط ایمیداکلوپرید: فن‌پیروکسیمیت می‌باشد. LC<sub>50</sub> مخلوط ایمیداکلوپرید: اتوکسازول با LC<sub>50</sub> مخلوط ایمیداکلوپرید: اسپیرودیگلوفن اختلاف معنی‌داری در سطح ۹۵٪ ندارند.

شد و فعالیت آنزیم به صورت نانومول بر دقیقه بر میلی‌گرم پروتئین محاسبه شد (Van Asperen, 1962).

### اندازه‌گیری میزان فعالیت گلوکاتایون اس-ترانسفراز

برای اندازه‌گیری فعالیت آنزیم گلوکاتایون اس-ترانسفراز، ۱۵ میکرولیتر محلول آنزیمی (۱۵ عدد پوره‌ی سن سوم هم‌سن در ۸۰ میکرولیتر بافر فسفات (۰/۱ مولار، pH=7) هموژنایز و با سرعت ۱۱۵۰۰ دور بر دقیقه (rpm) به مدت ۱۵ دقیقه در چهار درجه سلسیوس سانتریفیوژ شد، ۱۰۰ میکرولیتر CDNB (۱/۲ میلی‌مولار) و ۱۰۰ میکرولیتر گلوکاتایون احیاء شده (۱۰ میلی‌مولار) در پلیت الایزا ریخته شد. جذب نمونه در ۳۴۰ نانومتر به وسیله دستگاه میکروپلیت ریدر هر ۳۰ ثانیه یک بار خوانده شد (Habig et al., 1974).

### اندازه‌گیری غلظت پروتئین کل

به منظور تعیین غلظت پروتئین منبع آنزیمی از روش بردفورد<sup>۲</sup> (۱۹۷۶) استفاده شد. منحنی استاندارد پروتئین با استفاده از غلظت‌های مختلف آلومین سرم گاوی ترسیم شد (Bradford, 1976).

### تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها

برای محاسبه LC<sub>50</sub>، LC<sub>90</sub> و نسبت سمیت حاصل از آزمون زیست‌سنجی از نرم افزار POLO-PLUS استفاده شد و مقایسه دو به دو سمیت نسبی با نرم افزار POLO-PC انجام شد. محاسبه شاخص CI با استفاده از نرم‌افزار Compusyn (Chou and Talalay, 1984) و داده‌های به دست آمده از آزمون‌های بیوشیمیایی با استفاده از نرم‌افزار SAS 9.1 (2002) تجزیه و تحلیل شدند. از آزمون توکی

<sup>3</sup>. Relative potency

<sup>1</sup>. Reduced glutathione

<sup>2</sup>. Bradford

جدول ۱- نتایج تجزیه پروبیت زیست‌سنجی ایمیداکلوپرید به تنهایی و در ترکیب با فن‌پروکسیمیت، اسپیرودیگلوفن و اتوکسازول با نسبت ۱:۱ روی پوره سن سوم شته جالیز *Aphis gossypii* پس از ۷۲ ساعت

Table 1. Results of probit analysis of imidacloprid bioassay alone and in combination with fenpyroximate, spiroticlofen and etoxazole with 1:1 ratio on third instar of melon aphid, *Aphis gossypii* after 72 h

Pesticides	Lethal concentration (95% CL <sup>a</sup> ) (mg. L <sup>-1</sup> or nanogram per cm <sup>2</sup> )		Slope ± SE	X <sup>2</sup> (df)	CI	P-Value <sup>b</sup>
	LC <sub>50</sub>	LC <sub>90</sub>				
Imidacloprid	45.41 (28.19-67.03)	434.14 (239.56-1295.45)	1.38 ± 0.22	0.55(3)*	-	0.9007
Imidacloprid: Fenpyroximate (1:1)	84.91 (36.90- 158.85)	547.95 (260.27-3826.31)	1.58 ± 0.21	7.93(4)*	0.807	0.0373
Imidacloprid: Spiroticlofen (1:1)	44.65 (31.93- 61.44)	352.93 (208.08-870.17)	1.42 ± 0.21	2.25(3)*	0.545	0.4916
Imidacloprid: Etoxazole (1:1)	48.94 (35.56- 66.21)	310.14 (193.99-674.51)	1.59 ± 0.23	1.58(3)*	0.529	0.5833

<sup>a</sup> Confidence limits

\* The obtained value of  $\chi^2$  is lower than tubular  $\chi^2$ , p=0.05

<sup>b</sup> Goodness-of-fit tests (Pearson chi-square)

جدول ۲- نسبت سمیت غلظت کشندگی ۵۰ درصد مخلوط دوتایی ترکیبات مورد آزمایش روی پوره سن سوم شته جالیز *Aphis gossypii*

Table 2. Relative potencies of 50% lethal concentration of the binary mixture of the tested compounds on third instar of melon aphid, *Aphis gossypii*

Pesticides	Relative potencies	95% Confidence limits (lower-upper)
(Imidacloprid: Fenpyroximate) / (Imidacloprid: Etoxazole)	2.73	(1.51-4.93)*
(Imidacloprid: Fenpyroximate) / (Imidacloprid: Spiroticlofen)	3.02	(1.69-5.38)*
(Imidacloprid: Fenpyroximate) / (Imidacloprid)	2.99	(1.56-5.73)*
(Imidacloprid: Etoxazole) / (Imidacloprid: Spiroticlofen)	1.10	(0.63-1.91)
(Imidacloprid: Etoxazole) / (Imidacloprid)	1.09	(0.58-2.04)
(Imidacloprid) / (Imidacloprid: Spiroticlofen)	1	(0.54-1.86)

\*The differences between LC<sub>50</sub> values were supposed to be statistically significant when the 95% confidence intervals of the ratios did not include the value of 1.

جدول شماره ۳ نشان داده شده است. شاخص CI مساوی یک (CI=1)، کوچکتر از یک (CI<1) و بزرگتر از یک (CI >1) به ترتیب نشان‌دهنده اثر هم‌افزایی، اثر سینرژیست و اثر آنتاگونیسم است. بر اساس شاخص CI اثر مخلوط ایمیداکلوپرید با کنه‌کش‌های مورد آزمایش روی پوره سن سوم شته جالیز از نوع سینرژیسم (حالت تشدید اثر)

بررسی روابط برهم‌کنش مخلوط ایمیداکلوپرید با کنه‌کش‌های مورد آزمایش

به‌منظور تعیین نوع برهم‌کنش بین ترکیبات، شاخص (CI) مطابق روش چو وتلالی با استفاده از نرم‌افزار Compusyn محاسبه شد. مقادیر CI به‌دست آمده از مخلوط ایمیداکلوپرید با کنه‌کش‌های مورد آزمایش در

و در غلظت‌های بالاتر از نوع سینرژسم است. به‌طور کلی، در مخلوط ایمیداکلوپرید با کنه‌کش‌ها هرچه غلظت افزایش می‌یابد، شاخص CI کاهش پیدا می‌کند (جدول ۳).

است و بالاترین فعالیت سینرژستی بین ایمیداکلوپرید با کنه‌کش‌های مورد آزمایش در غلظت‌های بالاتر از LC<sub>30</sub> اتفاق افتاد. در غلظت‌های پایین یعنی LC<sub>10</sub> و LC<sub>20</sub> برهم‌کنش مخلوط ایمیداکلوپرید با فن‌پیروکسیمیت از نوع آنتاگونیستی

جدول ۳- شاخص ترکیبی (CI) مخلوط ایمیداکلوپرید با کنه‌کش‌های مورد آزمایش (در نسبت ۱:۱) روی پوره سن سوم شته

جالیز *Aphis gossypii*

Table 3. Combination index (CI) of the imidacloprid mixture with the tested acaricides (at 1:1 ratio) on third instar of melon aphid, *Aphis gossypii*

Effect levels <sup>a</sup> %	Imidacloprid: Fenpyroximate (1:1)		Imidacloprid: Etoxazole (1:1)		Imidacloprid: Spirodiclofen (1:1)	
	Mixture concentration(m g/L or nanogram/cm <sup>2</sup> )	CI	Mixture concentration(m g/L or nanogram/cm <sup>2</sup> )	CI	Mixture concentration(m g/L or nanogram/cm <sup>2</sup> )	CI
10	7.29	1.18	5.28	0.77	4.71	0.69
20	15.47	1.02	11.07	0.67	10.27	0.63
30	25.51	0.93	18.12	0.61	17.24	0.59
40	38.44	0.86	27.13	0.56	26.35	0.56
50	55.99	0.80	39.30	0.52	38.89	0.54
60	81.54	0.75	56.92	0.49	57.40	0.52
70	122.84	0.69	85.22	0.46	87.74	0.50
80	202.51	0.63	139.44	0.42	147.21	0.48
85	279.73	0.59	191.67	0.40	205.68	0.47

<sup>a</sup> Indicate the percentage of mortality rate associated with different concentrations

در این تیمار به ترتیب برابر ۱۴/۵۳ و ۱۸/۲۰ (نانومول/دقیقه/میلی‌گرم پروتئین) برآورد شد (جدول ۴).

#### فعالیت گلوکوتایون اس-ترانسفراز (GST)

اندازه‌گیری فعالیت آنزیم گلوکوتایون اس-ترانسفراز (GST) با استفاده از زیرنهشت CDNB نشان‌دهنده اختلاف معنی‌دار میزان فعالیت این آنزیم بین تیمارها بود ( $F=25/81$ ،  $df=3$ ،  $P<0/0002$ ). در این بررسی بیش‌ترین فعالیت مربوط به تیمار مخلوط ایمیداکلوپرید و فن‌پیروکسیمیت بود که مقدار آن ۰/۲۳۸ (نانومول/دقیقه/میلی‌گرم پروتئین) محاسبه شد (جدول ۴)

#### نتایج آزمون‌های بیوشیمیایی

##### فعالیت استرازی

فعالیت استرازی شته جالیز با استفاده از زیرنهشت‌های آلفا-نفتیل استات ( $\alpha$ -NA) و بتا-نفتیل استات ( $\beta$ -NA) اندازه‌گیری شد. نتایج حاصل از سنجش استرازهای عمومی نشان‌دهنده وجود اختلاف معنی‌دار در سطح ۵٪ با استفاده از زیرنهشت  $\alpha$ -NA ( $F=224/73$ ،  $df=3$ ،  $P<0/0001$ ) و  $\beta$ -NA ( $F=50/22$ ،  $df=3$ ،  $P<0/0001$ ) بود. هم‌چنین اختلاف معنی‌دار بین تیمارها در هر دو سویسترا مشاهده شد و بالاترین فعالیت استرازی مربوط به مخلوط ایمیداکلوپرید و فن‌پیروکسیمیت بود که میزان فعالیت آلفا- و بتا-استرازی

جدول ۴- میانگین ( $\pm$  خطای معیار) فعالیت استرازی (سوبستراهای آلفا-نفتیل استات و بتا-نفتیل استات) و گلو تاتیون اس - ترانسفراز در شته جالیز *Aphis gossypii* تیمار شده با غلظت  $LC_{50}$  ایمیداکلوپرید و ترکیب آن با فن پیروکسیمیت، اسپیرودیکلوفن و اتوکسازول پس از ۷۲ ساعت

Table 4. The mean  $\pm$  SE of esterase activity ( $\alpha$ -naphthyl acetate and  $\beta$ -naphthyl acetate substrates) and glutathione-s-transfer in melon aphid *Aphis gossypii* treated with  $LC_{50}$  concentration of imidacloprid and its combination with fenpyroximate, spiroticlofen and etoxazole after 72 h

Pesticides	$\alpha$ -NA (nmol.min <sup>-1</sup> mg protein <sup>-1</sup> ) $\pm$ SE	$\beta$ -NA (nmol.min <sup>-1</sup> mg protein <sup>-1</sup> ) $\pm$ SE	GST (CDNB) (nmol.min <sup>-1</sup> mg protein <sup>-1</sup> ) $\pm$ SE
Imidacloprid	5.36 $\pm$ 0.13 <sup>c</sup>	7.66 $\pm$ 0.29 <sup>c</sup>	0.049 $\pm$ 0.004 <sup>c</sup>
Imidacloprid: Fenpyroximate	14.53 $\pm$ 0.20 <sup>a</sup>	18.20 $\pm$ 0.37 <sup>a</sup>	0.238 $\pm$ 0.023 <sup>a</sup>
Imidacloprid: Spiroticlofen	8.46 $\pm$ 0.56 <sup>b</sup>	11.20 $\pm$ 0.36 <sup>b</sup>	0.083 $\pm$ 0.016 <sup>cb</sup>
Imidacloprid: Etoxazole	4.26 $\pm$ 0.06 <sup>c</sup>	6.73 $\pm$ 0.18 <sup>c</sup>	0.142 $\pm$ 0.014 <sup>b</sup>

Means with different letters in each column are significantly different at 5% level (tuekey's test)

## بحث

سینرژیستی داده است (Taillebois and Thany, 2016). هم چنین، برهم کنش آنتاگونیستی بین پرمترین و پروپوکسور<sup>۴</sup> روی لارو پشه *Culex quinquefasciatus* Say مقاوم به پروپوکسور در غلظت های  $LC_{10}$  گزارش شده است (Corbel *et al.*, 2004). در تحقیق حاضر نیز، در غلظت  $LC_{10}$  مخلوط ایمیداکلوپرید با فن پیروکسیمیت، مقدار CI برابر ۱/۱۸ بود که نشان دهنده ناسازگاری شیمیایی این دو ترکیب در غلظت های پایین است. اما با این وجود در مورد همه مخلوط ها، برهم کنش در غلظت های بالا از نوع سینرژیستی بوده که باعث افزایش کارآیی کنترل می شود. نکته ای که در مورد اختلاط سموم مطرح است، مسئله به تأخیر انداختن و برگشت مقاومت است. کاربرد مخلوط آفت کش ها روی سویه های مقاوم مگس میوه *Bacterocera dorsalis* Hendel نشان داد که مخلوط آفت کش ها قادر به کاهش نسبت مقاومت به سموم است (Hsu *et al.*, 2004).

برخی از پژوهش ها نشان دهنده اثر سینرژیستی مخلوط آفت کش ها در کنترل آفات است. به عنوان مثال مخلوط حشره کش اسپینوزاد<sup>۵</sup> و کنه کش آبامکتین روی کنه ی تارتین دولکه ای منجر به مرگ و میر بیش تر جمعیت آفت نسبت به

بر آورد CI (شاخص ترکیب) مشخص نمود که در ترکیب ایمیداکلوپرید با هر یک از کنه کش ها، بهترین اثر سینرژیستی برای مخلوط ایمیداکلوپرید: اتوکسازول و ایمیداکلوپرید: اسپیرودیکلوفن در غلظت  $LC_{50}$  به دست آمد. نتایج حاصل از مطالعه روابط برهم کنش حشره کش ایمیداکلوپرید با هر یک از کنه کش های رایج فن-پیروکسیمیت، اسپیرودیکلوفن و اتوکسازول، حالت سینرژسم را نشان داد و بالاترین فعالیت سینرژیستی بین ایمیداکلوپرید با کنه کش های مورد آزمایش در غلظت های بالاتر از  $LC_{30}$  اتفاق افتاد. در مورد اختلاط ایمیداکلوپرید با فن پیروکسیمیت این نکته حائز اهمیت است که در غلظت های پایین، شاخص CI بیش تر از یک بوده، بنابراین در این غلظت ها، حالت آنتاگونیستی بین این ترکیبات وجود دارد. در تحقیقی مشابه، اثرات مخلوط چهار حشره کش استامی-پرید<sup>۱</sup>، کلرپایریفوس<sup>۲</sup>، دلتامترین و فیپرونیل<sup>۳</sup> در غلظت  $LC_{10}$  روی پورهی شته نخود فرنگی *Acyrtosiphon pisum* Harris نشان داد که برهم کنش بین این ترکیبات در تمام حالت ها، غیر از مخلوط سه تایی دلتامترین، کلرپایریفوس و فیپرونیل که از نوع آنتاگونیستی بود، اثر

<sup>5</sup>. Spinosad

<sup>1</sup>. Acetamidrid  
<sup>2</sup>. Chlorpyrifos  
<sup>3</sup>. Fipronil  
<sup>4</sup>. Propoxur



و برآورد شاخص ترکیب (CI) فعالیت سینرژستی کم‌تری را در مقایسه با دو تیمار مخلوط دیگر به خود اختصاص داده بود. این نتایج حاکی از آن است که افزایش فعالیت آنزیم‌های سم‌زدا سبب کاهش میزان خاصیت سینرژستی بین دو ترکیب شده است. به عبارتی حالت سینرژسیم با غیرفعال کردن آنزیم‌های مؤثر در سم‌زدایی یا به علت فعال شدن یکی از آفت‌کش‌های موجود در مخلوط حاصل می‌شود (Ahmad *et al.*, 2009). در مطالعه مشابه، اثر سینرژستی آمیتراز در ترکیب با ایمیداکلوپرید و مالاتیون روی شته جالیز، به واسطه‌ی کاهش سطح فعالیت آنزیم گلوکاتایون اس-ترانسفراز اتفاق افتاده است (Shojaei *et al.*, 2018). آفت-کش‌ها بسته به ساختار شیمیایی و چگونگی تأثیرشان باعث افزایش یا کاهش فعالیت آنزیم‌های سم‌زدا می‌شوند. فعالیت استرازهای عمومی و گلوکاتایون اس-ترانسفراز در جمعیتی از کنه شکارگر *Phytoseiulus persimilis* Athias-Henriot که تحت تأثیر اتوکسازول قرار گرفته به ترتیب ۲/۷۱ و ۳/۰۹ برابر افزایش یافت (Yorulmaz Salman *et al.*, 2014). در مطالعه حاضر مخلوط ایمیداکلوپرید و فن-پیروکسیمیت بیش‌ترین شاخص CI و کم‌ترین میزان سینرژستی را نشان داد، در حالی که میزان بیان آنزیم‌های سم‌زدا در این حالت بالاتر از بقیه تیمارها بود. بنابراین، می‌توان نتیجه‌گیری نمود که افزایش فعالیت آنزیم‌ها در مخلوط ایمیداکلوپرید و فن‌پیروکسیمیت منجر به کاهش اثر سینرژستی در مقایسه با بقیه تیمارها شده است. افزایش فعالیت آنزیم گلوکاتایون اس-ترانسفراز در لاروهای *Spodoptera litura* Boisduval تیمار شده با ایندوکساکارب نشان‌دهنده نقش مهم این آنزیم در مکانسیم سم‌زدایی حشره بوده است (Gamil *et al.*, 2011). نتایج حاصل از بررسی اثرات فوکسیم، متومیل، دیکلروس و مخلوط دوتایی این ترکیبات روی فعالیت آنزیم گلوکاتایون

کاربرد جداگانه هر دو آفت‌کش شده است (Ismail *et al.*, 2007). هم‌چنین، مخلوط ایمیداکلوپرید با آمیتراز اثر سینرژستی در کنترل پشه *A. aegypti* داشته است (Ahmed and Matsumura, 2012). با بررسی تأثیر اختلاط دستراکسین و سه حشره‌کش گیاهی آزادایراختین، روتون و پانتولوم روی شته‌ی جالیز، حالت سینرژسیم در بسیاری از نسبت‌های اختلاط مشاهده شده و بیش‌ترین اثر سینرژستی در مخلوط دستراکسین و روتون به نسبت ۱:۹ به-دست آمده است (Yi *et al.*, 2012). نتایج حاصل از مطالعه روابط برهم‌کنش آمیتراز با ایمیداکلوپرید و مالاتیون روی شته جالیز *A. gossypii* نشان داد که بالاترین نسبت سینرژستی بین آمیتراز و ایمیداکلوپرید مربوط به کم‌ترین غلظت (LC<sub>10</sub>) ایمیداکلوپرید بوده که مناسب برای کاهش هزینه کنترل است، در حالی که این نسبت برای مالاتیون در غلظت‌های بالاتر از LC<sub>30</sub> اتفاق افتاده است (Shojaei *et al.*, 2018). اما در پژوهش حاضر، مخلوط ایمیداکلوپرید با فن‌پیروکسیمیت در غلظت‌های پایین (LC<sub>10</sub> و LC<sub>20</sub>) اثر آنتاگونستی روی شته جالیز داشت. بر اساس نتایج حاصل از بررسی، اثر اختلاط ایمیداکلوپرید و پی‌متروزیل روی شته جالیز، سمیت هم‌زمان این دو ترکیب با نسبت اختلاط ۵:۵ بیش‌ترین خاصیت سینرژستی را داشته و برای کنترل مؤثر شته‌ی جالیز توصیه شده است (Olfati Soomar, 2017).

آنزیم‌های متابولیک حشرات (اکسیژنازها، استرازاها و گلوکاتایون اس-ترانسفراز) که در متابولیسم کردن مواد سمی نقش دارند، با نحوه‌ی تأثیر آفت‌کش‌ها و مقاومت حشرات مرتبط هستند (Sadek, 2003). در سنجش سطح فعالیت آنزیم‌های سم‌زدا در این مطالعه مشخص شد که بیش‌ترین فعالیت استرازهای عمومی و گلوکاتایون اس-ترانسفراز در تیمار مخلوط ایمیداکلوپرید و فن‌پیروکسیمیت وجود دارد. این تیمار بر اساس نتایج حاصل از آزمون‌های زیست‌سنجی

7. Indoxacarb

8. Phoxim

9. Methomyl

1. Destruxins

2. Azadirachtin

3. Rotenone

4. Paeonolum

5. Malathion

6. Pymetrozine

جمعیت‌های آفت، از مخلوط حشره‌کش-کنه‌کش‌ها به عنوان یک راه کار مناسب برای کنترل هم‌زمان آفات استفاده می‌کنند (Yu, 2014). در این تحقیق، بیش‌ترین برهم‌کنش سینرژیستی در مخلوط ایمیداکلوپرید: اتوکسازول و ایمیداکلوپرید: اسپیرودایکلوفن مشاهده شد که به این ترتیب می‌توان ضمن کاهش میزان مصرف ایمیداکلوپرید در کنترل شته جالیز، کنه‌های آفت را نیز کنترل نمود. هم‌چنین با اندازه‌گیری فعالیت آنزیم‌های سم‌زدا مشخص شد که در مخلوط آفت‌کش‌ها، متناسب با افزایش یا کاهش میزان فعالیت آنزیم‌ها، اثر سینرژیستی نیز افزایش یا کاهش پیدا می‌کند و ممکن است اثر سینرژیستی بین دو ترکیب در نتیجه‌ی کاهش سطح فعالیت آنزیم‌های متابولیک ایجاد شده باشد. نتایج این تحقیق نشان‌دهنده اثر سینرژیستی اختلاط‌های مورد بررسی در غلظت‌ها و فرمولاسیون‌های مورد آزمایش ایمیداکلوپرید با اتوکسازول و ایمیداکلوپرید با اسپیرودایکلوفن است. این در حالی است که اثر سینرژیستی اختلاط ایمیداکلوپرید و فن‌پیروکسیمیت وابسته به غلظت است و بهترین اثر سینرژیستی نیز در اختلاط حاصل از ایمیداکلوپرید و اتوکسازول به‌دست آمد. فرمولاسیون‌های ترکیبات مورد استفاده در این تحقیق از لحاظ فیزیکی در غلظت‌های مورد آزمون سازگاری فیزیکی داشتند. پیشنهاد می‌شود قبل از اختلاط این ترکیبات با هم، سازگاری فیزیکی در غلظت‌های توصیه شده نیز مدنظر قرار گیرد.

### سپاسگزاری

بدین وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان به منظور فراهم کردن امکانات لازم برای انجام این تحقیق تشکر و قدردانی می‌شود.

### References

- Ahmad, M. A. I. and Matsumura, F. 2012. Synergistic actions of formamidine insecticides on the activity of pyrethroids and neonicotinoids against *Aedes aegypti* (Diptera: Culicidae). **Journal of Medical Entomology** 49: 1405-1410.
- Ahmad, M., Saleem, M. A. and Sayyed, A. H. 2009. Efficacy of insecticide mixtures against pyrethroid- and organophosphate-resistant populations of *Spodoptera litura* (Lepidoptera: Noctuidae). **Pest Management Science** 65: 266-274.

اس-ترانسفراز (GST) در *Helicoverpa armigera* Hubner نشان داد که بیش‌ترین فعالیت GST در حشرات تیمار شده با فوکسیم مشاهده شده است (Wang et al., 2011). بررسی روی کنه شکارگر *Amblyseius swirskii* تغذیه شده با کنه‌های تارتن دو لکه‌ای که ۷۲ ساعت از تیمار شدنشان با فن‌پیروکسیمیت، تیاکلوپرید<sup>۱</sup> و مخلوط دوتایی آن‌ها می‌گذرد، نشان از افزایش میزان فعالیت آنزیم‌های گلوکوتایون اس-ترانسفراز و استرازهای عمومی در کنه‌ی شکارگر تغذیه شده با کنه‌ی تارتن دو لکه‌ای تحت تیمار با مخلوط دوتایی آفت‌کش‌ها داشته است (Ghasemzadeh, 2016). این نتایج بیان می‌کند حتی در صورت وجود سینرژیسم بین مخلوط دو آفت‌کش، میزان فعالیت آنزیم‌های متابولیکی در حالت مخلوط بیش از آفت‌کش‌ها به‌طور جداگانه است که پژوهش حاضر نیز این نتایج را تأیید می‌کند. در این مطالعه نشان داده شد که سمیت ایمیداکلوپرید در ترکیب با هر یک از کنه‌کش‌های فن‌پیروکسیمیت، اسپیرودایکلوفن و اتوکسازول روی شته جالیز افزایش یافته و حالت سینرژیستی در غلظت‌های بیش‌تر قابل مشاهده است. حضور هم‌زمان کنه‌های آفت و شته‌ها در گلخانه و مزرعه، باعث می‌شود تا کشاورزان از حشره‌کش‌ها و کنه‌کش‌ها برای کنترل این آفات استفاده کنند. با توجه به اینکه حشره‌کش‌های گروه نئونیکوتینوئیدی به‌خصوص ایمیداکلوپرید به‌طور گسترده برای کنترل آفات مکنده نظیر شته جالیز مورد استفاده قرار می‌گیرند (Seyedebrahimi et al., 2016)، گزارش‌های متعددی از مقاومت این آفت به ایمیداکلوپرید از سراسر جهان ارائه شده است (Chen et al., 2017). با وجود این، کشاورزان برای افزایش کارآیی کنترل آفات، کاهش مصرف آفت‌کش‌ها، کاهش هزینه‌های سم‌پاشی و هم‌چنین جلوگیری از توسعه مقاومت در

<sup>1</sup>. Thiacloprid

- Amini Jam, N., Kocheili, F., Mossadegh, M. S., Rasekh, A. and Saber, M.** 2014. Lethal and sublethal effects of imidacloprid and pirimicarb on the melon aphid, *Aphis gossypii* Glover (Hemiptera: Aphididae) under laboratory conditions. **Journal of Crop Protection** 3(1): 89-98.
- Blackman, R. L. and Eastop, V. F.** 2000. Aphids on the world's crops: an identification and information guide (2nd ed.), Wiley, London, United Kingdom.
- Bonnet, J., Corbel, V., Darriet, F., Chandre, F. and Hougard, J. M.** 2004. Topical applications of pyrethroid and organophosphate mixtures revealed positive interactions against pyrethroid-resistant *Anopheles gambiae*. **Journal of the American Mosquito Control Association** 20(4): 438-443.
- Bradford, M. M.** 1976. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. **Analytical Biochemistry** 72: 248-254
- Chai, R. and Lee, C.** 2010. Insecticide resistance profiles and synergism in field populations of the German cockroach (Dictyoptera: Blattellidae) from Singapore. **Journal of Economic Entomology** 103(2): 460-471.
- Chen, X., F. Li, A. Chen, K. Ma, P. Liang, Y. Liu, D. Song and Gao, X.** 2017. Both point mutations and low expression levels of the nicotinic acetylcholine receptor  $\beta 1$  subunit are associated with imidacloprid resistance in an *Aphis gossypii* (Glover). **Pesticide Biochemistry and Physiology** 141: 1-8.
- Chou, T. C. and Talaly, P.** 1984. Quantitative analysis of dose-effect relationships: the combined effects of multiple drugs or enzyme inhibitors. **Advances in Enzyme Regulation** 22: 27-57.
- Cisneros, J. J. and Godfrey, L. D.** 2001. Midseason pest status of the cotton aphid (Homoptera: Aphididae) in California cotton: is nitrogen a key factor? **Environmental Entomology** 30: 501-510.
- Cloyd, R. A., Galle, C. L. and Keith, S. R.** 2007. Greenhouse pesticide mixtures for control of silver leaf whitefly (Homoptera: Aleyrodidae) and twos potted spider mite (Acari: Tetranychidae). **Journal of Entomological Science** 42: 375-382.
- Corbel, V., Raymond, M., Chandre, F., Darriet, F. and Hougard, J. M.** 2004. Efficacy of insecticide mixtures against larvae of *Culex quinquefasciatus* (Say) (Diptera: Culicidae) resistant to pyrethroids and carbamates. **Pest Management Science** 60(4): 375-380.
- Ebert, T.A. and Cartwright, B.** 1997. Biology and ecology of *Aphis gossypii* Glover (Homoptera: Aphididae). **Southwestern Entomologist** 22(1): 116-153.
- Gamil, W. E., Mariy, F. M., Youssef, L. A. and Abdel Halim, S. M.** 2011. Effect of indoxacarb on some biological and biochemical aspects of *Spodoptera litura* (Boisduval) larvae. **Annals of Agricultural Science** 56(2): 121-126.
- Ghasemzadeh, S.** 2016. Effects of fenpyroximate and thiacloprid on biological parameters and some biochemical characteristics of the predatory mite *Amblyseius swirskii* Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae) under laboratory conditions using applied non-linear programming. PhD. Thesis. The University of Urmia (In Persian).
- Habig, W. H., Pabst, M. J. and Jakoby, W. B.** 1974. Glutathione S- transferase, the first step in mercapturic acid formation. **Journal of Biological Chemistry** 249: 7130-7139.
- Hemingway, J. G., Small, J., Lindsay, S. and Collins, F. H.** 1995. Combined use of biochemical, immunological and molecular assays for infection, and species identification and resistance detection in field populations of *Anopheles* (Diptera: Tephritidae). In Symondson, Lydell, W.O.C.E. (eds.). *The Ecology of Agricultural Pests: Biochemical Approaches*. Chapman and Hall, London.
- Hsu, J., Feng, H. and Wu, W.** 2004. Resistance and synergistic effects of insecticides in *Bactrocera dorsalis* (Diptera: Tephritidae) in Taiwan. **Journal of Economic Entomology** 97(5): 1682-1688.
- Irshaid, Y. B. and Hasan, H. S.** 2011. Bioresidual effect of two insecticides on melon Aphid, *Aphis gossypii* Glover (Hemiptera: Aphididae) and its parasitoid *Aphidius colemani* Verick (Hymenoptera: Brachonidae). **Journal of Agricultural and Environmental Science** 11(2): 228-236.
- Ismail, M. S., Soliman, M. F., El Naggari, M. H. and Ghallab, M. M.** 2007. Acaricidal activity of spinosad and abamectin against two-spotted spider mites. **Experimental and Applied Acarology** 43(2): 129-135.
- Kerns, D. L. and Gaylor, M. J.** 1992. Insecticide resistance in field populations of the cotton aphid (Homoptera: Aphididae). **Journal of Economic Entomology** 85(1): 1-8.
- Khajehali, J., Van Leeuwen, T., Grispou, M., Morou, E., Alout, H., Weill, M., Tirry, L., Vontas, J. and Tsagkarakou, A.** 2010. Acetylcholinesterase point mutations in European strains of

- Tetranychus urticae* (Acari: Tetranychidae) resistant to organophosphates. **Pest Management Science** 66(2): 220-228.
- Kim, Y. J., Lee, S. H., Lee, S. W. and Ahn, Y. J.** 2004. Fenpyroximate resistance in *Tetranychus urticae* (Acari: Tetranychidae): cross-resistance and biochemical resistance mechanisms. **Pest Management Science** 60(10): 1001-1006.
- Li, A. Y., Chen, A. C., Miller, R. J., Davey, R. B. and George, J. E.** 2007. Acaricide resistance and synergism between permethrin and amitraz against susceptible and resistant strains of *Boophilus microplus* (Acari: Ixodidae). **Pest Management Science** 63: 882-889.
- Lin, H., Chuan-hua, X., Jin-jun, W., Ming, L., Wen-cai, L. and Zhi-mo, Z.** 2009. Resistance selection and biochemical mechanism of resistance to two Acaricides in *Tetranychus cinnabarinus* (Boiduval). **Pesticide Biochemistry and Physiology** 93(1): 47-52.
- Martin, T., Ochou, G. O., Hala-NKlo, F., Vassal, J. M. and Vaissayre, M.** 2000. Pyrethroid resistance in the cotton bollworm, *Helicoverpa armigera* Hubner, in West Africa. **Pest Management Science: formerly Pesticide Science** 56(6): 549-554.
- Noorbakhsh, S., Sahraian, H., Soroosh, M. J., Rezaii, V. and Fotoohi, A. R.** 2016. List of pests, diseases and weeds of major agricultural products and the recommended methods for their control. Iranian Plant Protection Organization [in Persian]. Ministry of Jihade-Agriculture.
- Olfati-Soomar, R., Zamani, A. A. and Alizadeh, M.** 2019. Joint action toxicity of imidacloprid and pymetrozine on the melon aphid, *Aphis gossypii*. **Journal of Crop Protection** 124: 104-850.
- Sadek, M. M.** 2003. Antifeedant and toxic activity of *Adhatoda vasica* leaf extract against *Spodoptera littoralis*. **Journal of Applied Entomology** 127: 396-404.
- SAS 9.1.3.** 2002. SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.
- Seyedebrahimi, S. S., Talebi Jahromi, K., Imani, S., Hosseini Naveh, V. and Hesami, S.** 2016. Resistance to imidacloprid in different field populations of *Aphis gossypii* Glover (Hemiptera: Aphididae) in South of Iran. **Journal of Entomological and Acarological Research** 48: 6-10.
- Sheikhi-Garjan, A., Najafi, H., Abbasi, S., Saber, F. and Rashid, M.** 2009. The pesticide guide of iran. Capital Book Press.
- Shi, X., Jiang, L., Wang, H., Qiao, K., Wang, D. and Wang, K.** 2011. Toxicities and sublethal effects of seven neonicotinoid insecticides on survival, growth and reproduction of imidacloprid resistant cotton aphid, *Aphis gossypii*. **Pest Management Science** 67: 1528-1533.
- Shojaei, A., Talebi Jahromi, K., Hosseininaveh, V. and Sabahi, G.** 2018. Synergistic effects of amitraz on imidacloprid and malathion against cotton aphid, *Aphis gossypii* (Hemiptera: Aphididae). **Journal of Agricultural Science and Technology** 20(2): 299-308.
- Shonga, E., Ali, K. and Azrefegne, F.** 2013. Effect of Insecticide Rotation and Mixtures Use for Resistance Management on Cotton Aphid, *Aphis gossypii* Glover (Hemiptera: Aphididae) in Middle Awash Areas of Ethiopia. **Greener Journal of Agricultural Science** 3: 569-578.
- Taillebois, E. and Thany, S. H.** 2016. The differential effect of low-dose mixtures of four pesticides on the pea aphid *Acyrtosiphon pisum*. **Insects** 7(4): 53.
- Van Asperen, K.** 1962. A study of housefly esterases by means of a sensitive colorimetric method. **Journal of Insect Physiology** 8: 401-416.
- Wang, L. H., Wu, S. H. and Gao, X. W.** 2011. Inhibition of insecticide mixtures on Glutathion S-transferase in *Helicoverpa armigera* (Hubner), *Musca domestica* (L.) and *Tropoderma variabile* (Ballion). **International Journal of Integrative Biology** 12(1): 6-10.
- Ye, S.D., Dun, Y. H and Feng, M. G.** 2005. Time and concentration dependent interactions of *Beauveria bassiana* with sublethal rates of imidacloprid against the aphid pests *Macrosiphoniella sanborni* and *Myzus persicae*. **Annals of Applied Biology** 146(4): 459-468.
- Yi, F., Zou, C., Hu, Q. and Hu, M.** 2012. The joint action of destruxins and botanical insecticides (Rotenone, Azadirachtin and Paeonolum) against the cotton aphid, *Aphis gossypii* Glover. **Molecular Ecology** 17: 7533-7542.
- Yu, S. J.** 2014. The toxicology and biochemistry of insecticides. CRC press. P297.
- Yu, Y. Y. and Ting, L. C.** 2019. Synergistic effect and field control efficacy of the binary mixture of permethrin and chlorpyrifos to brown planthopper (*Nilaparvata lugens*). **Journal of Asia-Pacific Entomology** 22: 67-76.

- Yorulmaz Salman, S., Aydinli, F. and Ay, R.** 2014. Etoxazole resistance in predatory mite *Phytoseiulus persimilis* (Acari: Phytoseiidae): Cross-resistance, inheritance and biochemical resistance mechanisms. **Pesticide Biochemistry and Physiology** 122: 96-102.
- Yuya, A. I., Tadesse, A., Azerefegne, F. and Tefera, T.** 2009. Efficacy of combining Niger seed oil with malathion 5% dust formulation on maize against the maize weevil, *Sitophilus zeamais* (Coleoptera: Curculionidae). **Journal of Stored Products Research** 45(1): 67-70.
- Zhu, Y. C., Yao, J., Adamczyk, J. and Luttrell, R.** 2017. Synergistic toxicity and physiological impact of imidacloprid alone and binary mixtures with seven representative pesticides on honey bee (*Apis mellifera*). **Journal of PloS One** 12(5): p. e0176837.

---

Plant Pest Research  
2020- 10(3): 35-48

---

Research paper

## **Efficacy of imidacloprid mixture with some acaricides in control of melon aphid, *Aphis gossypii* (Hem.: Aphididae) under laboratory conditions**

**M. Azarbou, M. Ghadamyari\*, J. Hajizadeh and E. Shafiei Alavijeh**

Department of Plant Protection, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran

(Received: July 9, 2020- Accepted: October 18, 2020)

---

### **Abstract**

The use of pesticide mixtures is one of the effective ways to reduce spraying costs, reduce their consumption and prevent resistance development in the pest's population. However, due to the potential hazards, before any recommendation to mix pesticides, the need for mixing and its physical and chemical compatibility should be carefully considered. In this study, due to the synchronicity of aphid control with acari pests, the insecticidal performance of mixtures of imidacloprid (SC 35%) with fenpyroximate (SC 5%), spiroticlofen (SC 24%) and etoxazole (EC 10%) were investigated on third instar nymphs of melon aphid, *A. gossypii*. Furthermore, the activity levels of detoxifying enzymes esterase and glutathione S-transferase was measured in treated insects with these compounds. Bioassay tests were performed with a Potter spray tower method.  $LC_{50}$  value of the imidacloprid alone and in combination with each of the acaricides of fenpyroximate, spiroticlofen and etoxazole were 45.41, 84.91, 44.65 and 48.94 mg/l, respectively. In addition, by estimating the Combination Index (CI), a synergistic effect was observed in the mixture of imidacloprid with each of the acaricides and the highest synergistic activity occurred at concentrations higher than  $LC_{30}$ . In mixed treatments, the CI index decreased with increasing concentration. The results of detoxifying enzyme activities showed that the activity levels in mixture of imidacloprid: fenpyroximate and imidacloprid: spiroticlofen were higher than that of imidacloprid alone and mixture of imidacloprid: etoxazol. In this study, the lowest CI index at  $LC_{50}$  concentration, were for binary mixture of imidacloprid: etoxazol (0.529) and imidacloprid: spiroticlofen (0.545) that exhibited high synergistic effect. The results of this study showed that the effectiveness of imidacloprid (SC) was increased for control melon aphid, when mixed with the tested acaricides. However, the mixture of imidacloprid: etoxazole showed the highest insecticidal performance.

**Key words:** Etoxazol, Fenpyroximate, Spiroticlofen, Combination index, Detoxifying enzymes

---

\* Corresponding author: mghadamyari@gmail.com