



مطالعه اثرات آنتیاکسیدانی و کاهنده‌گی چربی خون توسط جلبک دریایی گراسیلاریوپسیز پرسیکا در بلدرچین ژاپنی

بهنام عباس پور^۱ و سید داود شریفی^۲

۱- دانشجوی دکتری، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

۲- دانشیار، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، (نویسنده مسؤول: sdsharifi@ut.ac.ir) تاریخ پذیرش: ۹۲/۰۴/۱۷

چکیده

این آزمایش با هدف ارزیابی آنتیاکسیدانی و کاهنده‌گی چربی خون جلبک دریایی گراسیلاریوپسیز پرسیکا با استفاده از ۱۱۲ قطعه بلدرچین ژاپنی با چهار تیمار و چهار تکرار به مدت ۱۲ هفته در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا شد. جلبک گراسیلاریوپسیز پرسیکا در سطوح صفر، یک، سه و پنج درصد در جیره‌های غذائی وارد شد. به منظور تعیین حساسیت زرده تخم به آکسیداسیون، غلظت مالون دی‌آلدئید در زمان‌های صفر، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ دقیقه بعد از القاء آکسیداسیون با سولفات آهن، اندازه‌گیری شد. غلظت کلسترونول تام، تری‌گلیسرید، VLDL، LDL در پایان آزمایش (۱۲ هفتگی) اندازه‌گیری شد. غلظت مالون دی‌آلدئید زرده تخم برندگانی که در جیره خود جلبک دریافت کردند کمتر از گروه شاهد بود ($P < 0.05$) و این پرندگان کلسترونول و LDL کمتری در سرم خود در مقایسه با شاهد داشتند ($P < 0.05$). نتایج نشان داد جلبک دریایی گراسیلاریوپسیز پرسیکا اثرات آنتیاکسیدانی و کاهش دهنده‌گی کلسترونول را دارا می‌باشد و می‌تواند به عنوان یک افزودنی جدید در نظر گرفته شود.

واژه‌های کلیدی: آنتیاکسیدان، بلدرچین، کلسترونول، گراسیلاریوپسیز پرسیکا

بسته می‌شوند محصول قبل توجهی را می‌توان تولید نمود (۲۵).

ترکیبات فنولیک گیاهی به عنوان جذب‌کننده آکسیژن واکنشگر (ROS)، کلاتنه کننده‌های فلزات و تغییردهنده آنزیم‌ها و جلوگیری از پراکسیداسیون چربی‌ها عمل می‌کنند (۲۸). جلبک‌ها حاوی کاروتونوئیدها و ترکیبات فنولیک با خاصیت آنتیاکسیدانی هستند. از جلبک‌ها ترکیباتی نظیر فیلوفوئاتین، فیوکاکسانتین^۱ استخراج می‌کنند که می‌تواند باعث افزایش فعالیت آنتیاکسیدانی در گیاهان و گانوران شود (۱۵). جلبک‌های قهوه‌ای و سبز نسبت به جلبک قرمز ترکیبات فنولیک بیشتری دارند (۲۱). جلبک قهوه‌ای اکلونیا دارای ترکیبات زیست فعال به ویژه فلوراتانن‌ها است که به عنوان آنتیاکسیدان قوی عمل می‌کند (۱۵).

به طور کلی میزان فیبر در جلبک‌های دریایی بالا می‌باشد (۷۵-۲۵ درصد ماده خشک). کربوهیدرات شاخص در واریته‌های جلبک قرمز شامل نشاسته (1,4-binding glucan) سلولز، زایلان و مانان تشکیل شده است. بخش فیبر محلول در آب شامل گالاكتان‌های حاوی سولفور مانند آگار و کاراژینان می‌باشد (۳۵، ۱۲). فیبر جیره به صورت

مقدمه

جلبک‌ها گروه بزرگی از جانداران هستند که در اثر عمل فتوسنتر و جذب دی‌اکسیدکربن، اکسیژن آزاد می‌کنند. جلبک‌ها غنی از پروتئین، پلی‌ساقاریدهای غیرنشاسته‌ای، آنتیاکسیدان‌ها، مواد معدنی و ویتامین‌ها می‌باشند (۱۹، ۴). ترکیبات شیمیایی جلبک‌ها با توجه به فصل، سن، عوامل آب و هوایی و محیطی، توزیع جغرافیایی و تنوع فیژیولوژیکی آنها متغیر است (۱). امروز صنعت استفاده از جلبک، بسیار توسعه یافته است و استفاده از جلبک‌ها به عنوان یکی از راه حل‌های پیش روی بشر در مبارزه با کمبود مواد غذایی، انرژی و ... مطرح شده است (۱).

جنس گراسیلاریوپسیز (*Gracilariopsis*) در نواحی استوایی و آبهای گرم رشد می‌کند. گونه گراسیلاریوپسیز پرسیکا (*Gracilariopsis persica*) اولین بار بر اساس آنالیز سلولی و ملکولی معرفی شد (۲). این جلبک دریایی در ساحل جنوبی کشور و در محدوده چهار منطقه شامل سواحل بندرلنگه، سواحل بندرعباس، سواحل قشم و لارک رشد می‌یابد. رشد این گونه روی بسترها مصنوعی موجود در سواحل ماسه‌ای بسیار چشمگیر است و با استقرار طناب‌های طولی که مقادیر کمی از بخش‌های رویشی گونه به آن

1- Phylophophytin

2- Fucoxantine

رابطه بین غلظت لیپیدهای سرم تری‌گلیسریدها، کلسترول، LDL (لیپوپروتئین با دانسیته پائین)، VLDL (لیپوپروتئین با دانسیته بسیار پائین)، HDL (لیپو پروتئین با دانسیته بالا) و بیمارهای قلبی عروقی در انسان به اثبات رسیده است. افزایش غلظت LDL خون (کلسترول بد) موجب افزایش بیماری انسداد عروق و سخت شدن دیواره سرخرگ‌ها می‌شود. همچنین افزایش غلظت تری‌گلیسریدهای سرم احتمال بروز بیماری‌های قلبی را بالا می‌برد. در همین رابطه گزارش شده است که کاهش غلظت VLDL خون موجب کاهش چربی شکمی و همچنین کل چربی بدن می‌شود (۳۷). این تحقیق به منظور بررسی مقایسه‌ای اثرات استفاده از سه سطح جلبک گراسیلاریوپسیز پرسیکا (یک، سه و پنج درصد) در جیره بر غلظت مالون دی‌آلدئید زرده تخم و لیپیدهای سرم انجام شد.

مواد و روش‌ها

در این آزمایش از تعداد ۱۱۲ قطعه بلدرچین ماده در سن هفت هفتگی در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار (جیره‌های حاوی سطوح صفر، یک، سه و پنج درصد جلبک) و چهار تکرار و ۷ پرونده در هر تکرار، به مدت ۱۲ هفته (۷ تا ۱۸ هفتگی)، در سیستم قفس انجام شد. دما و نور سالن به ترتیب به میزان ۲۵ درجه سانتی‌گراد و ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی تأمین شد. جیره‌هایی غذایی بر اساس توصیه‌های لیسون و سامر (۱۷) برای دوره تخم‌گذاری بلدرچین ژاپنی تنظیم شد (در جدول ۱ و ۲ به ترتیب اجزای خوراک و ترکیب شیمیایی جلبک گراسیلاریوپسیز پرسیکا ارایه شده است).

بخش غیرقابل هضم شامل الیگوساکاریدها و نشاسته‌های مقاوم، پروتئین‌های مقاوم و ترکیبات مرتبط با آنها مانند پلی فلی‌ها تعریف شده است (۵). به تازگی گزارش شده است که گراسیلاریوپسیز پرسیکا حاوی استرول‌های فعال مختلف از قبیل فوکو استرول، استیگما استرول و بتا سیتوسترول است که به طور مؤثر می‌تواند کلسترول پلاسماء، قند خون و التهاب را کاهش دهد (۳۹). جلبک‌های دریابی قادر به کاهش کلسترول می‌باشند که این عمل از طریق فعالیت استرول‌ها (ارگوسترول، فوکوسترول، سیتوسترول، کامپ استرول) و پلی‌ساقاریدها (آلزینیک اسید، فوکوئیدان، سلولز، رامنوز، زایلوز و گلوكورونیک اسید) صورت می‌گیرد (۱۲).

آنتی‌اکسیدان‌ها ترکیباتی هستند که به طور مؤثر و به طرق مختلف از واکنش رادیکال‌های آزاد به شکل اکسیژن و نیتروژن فعال با بیومولکول‌هایی نظیر پروتئین، آمینواسید، لیپید و DNA، جلوگیری کرده و منجر به کاهش آسیب و یا مرگ سلولی، بیماری قلبی-عروقی و سرطان می‌شوند (۳۲). در کنار نقش آنها در سامانه‌های زیستی، در مواد غذایی سرشار از چربی‌ها نیز از کاهش کیفیت تغذیه‌ای، اینمنی، بد طعمی و بی‌رنگ شدن به علت ترکیبات سی‌جلوگیری می‌کنند. آنتی‌اکسیدان‌ها به دو دسته شیمیایی و طبیعی تقسیم‌بندی می‌شوند (۳۳). آنتی‌اکسیدان‌های شیمیایی که بیشترین استفاده را در صنعت غذا دارند، شامل TBHQ، BHT و پروپیل‌گالات بوده که سرطان‌زاکی و اثرات منفی این ترکیبات بر سلامت انسان مشخص شده است (۲۴، ۱۴). استفاده از گروه وسیعی از گیاهان دارویی و ترکیبات آروماتیک آنها به عنوان منابع طبیعی که دارای خاصیت آنتی‌اکسیدانتی هستند، مورد توجه محققین قرار گرفته است (۱۶).

جدول ۱- ترکیب جیره‌های آزمایش بلدرچین زاپنی در دوره تخم‌گذاری

جلبک (درصد)				اجزای خوراک (درصد)
پنجه	سده	پک	شاهد	
۶۱/۳	۶۲/۹	۶۴/۵	۶۵/۳	ذرت
۱۷/۵	۱۸/۱	۱۸/۷	۱۹/۰۰	کچاله سویا (۴۸ درصد)
۷/۱۰	۷/۱۴	۷/۲	۷/۲	پودر صدف
۵/۰۰	۵/۰۰	۵/۰۰	۵/۰۰	گلوتن ذرت
۱/۴۱	۱/۴۱	۱/۴۰	۱/۴۰	دی‌کلسیم فسفات
۱/۵۵	۱/۳۲	۱/۱۰	۱/۰۰	روغن سویا
۵/۰۰	۳/۰۰	۱/۰۰	-	جلبک گراسیلاریوپسیز پرسیکا
۰/۳۲	۰/۳۲	۰/۳۰	۰/۳۱	دی- ال متیونین ^۱
۰/۲۵	۰/۲۵	۰/۲۵	۰/۲۵	مکمل معدنی ^۲
۰/۲۵	۰/۲۵	۰/۲۵	۰/۲۵	مکمل ویتامین ^۲
۰/۲۰	۰/۲۰	۰/۲۰	۰/۲۰	نمک
۰/۱۲	۰/۱۱	۰/۱۰	۰/۰۹	ال- لیزین
ترکیبات شیمیابی محاسبه شده				
۲۹۵۰	۲۹۵۰	۲۹۵۰	۲۹۵۰	انرژی قابل متابولیسم (کیلوکالری بر کیلوگرم)
۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	پروتئین (درصد)
۳/۱۰	۳/۱۰	۳/۱۰	۳/۱۰	کلسیم (درصد)
۰/۴۵	۰/۴۵	۰/۴۵	۰/۴۵	فسفر قابل دسترس (درصد)
۰/۸۵	۰/۸۵	۰/۸۵	۰/۸۵	لیزین (درصد)
۰/۵۲	۰/۵۲	۰/۵۲	۰/۵۲	متیونین (درصد)
۰/۸۲	۰/۸۲	۰/۸۲	۰/۸۲	متیونین- سیستین
۰/۱۸	۰/۱۸	۰/۱۸	۰/۱۸	سدیم (درصد)

۱- در هر کیلوگرم مکمل معدنی به میزان: ۵۰ میلی‌گرم آهن، ۱۰۰ میلی‌گرم سولفات‌من، ۱۰۰ میلی‌گرم منگنز، ۱ میلی‌گرم ید، ۰/۰۲ میلی‌گرم سلنیوم موجود بود.

۲- در هر کیلوگرم مکمل ویتامین به میزان: ۱۱۰۰۰ IU، ۲۳۰۰ A، ۱۲۱ D3، ۰/۰۰۰ E، ۰/۰۰۰ B1، ۰/۰۰۰ B6، ۰/۰۰۰ B2، ۰/۰۰۰ K3، ۰/۰۰۰ B12، ۰/۰۰۰ B1، ۰/۰۰۰ B6، ۰/۰۰۰ B2، ۰/۰۰۰ K3، ۰/۰۰۰ اسید فولیک، ۰/۰۰۰ میلی‌گرم کوبین کلرايد، ۰/۱۲۵ میلی‌گرم آنتی اکسیدان، ۰/۰۰۳ میلی‌گرم بیوتین و ۰/۰۰۲ میلی‌گرم B12 موجود بود.

جدول ۲- ترکیبات شیمیابی و انرژی قابل متابولیسم جلبک گراسیلاریوپسیز پرسیکا

مقدار	ترکیب شیمیابی
۲۱۹۵/۷	انرژی قابل متابولیسم (کیلوکالری بر کیلوگرم)
۹۶/۴	ماده خشک (درصد)
۳۳/۰۵	پروتئین خام (درصد)
۷/۲	فیبر خام (درصد)
۰/۱	چربی (درصد)
۰/۹	کلسیم (درصد)
۰/۳۴	فسفر (درصد)

۱- وثوق شریفی و همکاران (۳۷).

آزمایش محتوی محلول و نمونه در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد برای زمان‌های صفر، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ دقیقه داخل انکوباتور قرار داده شد. یکی از لوله‌ها (فاقد محلول القاء‌کننده اکسیداسیون) به عنوان شاهد (زمان صفر) مورد آزمایش مالون دی‌آلدئید قرار گرفت. بعد از طی مدت انکوباسیون نمونه تحت آزمایش مالون‌آلدئید قرار گرفت (۳).

در پایان آزمایش (دوازده هفتگی) بعد از اعمال دو ساعت گرسنگی، از هر تکرار دو پرنده (در مجموع ۸ پرنده از هر تیمار) با وزن نزدیک به میانگین انتخاب و مقدار ۴ سی سی خون از طریق سیاهرگ بال هر پرنده گرفته شد. سرم نمونه‌ها پس از ارسال به آزمایشگاه، به کمک سانتریفیوژ با دور ۳۰۰۰ در دقیقه به مدت ۲۵

برای بررسی میزان حساسیت به اکسیداسیون، تخم‌های جمع‌آوری شده (۷ تخم به ازای هر تکرار) در هفته آخر آزمایش به مدت دو هفته در یخچال نگهداری شدند. سپس زرده آنها جدا شده و به منظور اطمینان از هیدروپر اکسیدهای چربی با سولفات‌آهن القاء تجزیه شد. سپس میزان مالون دی‌آلدئید (محصول اصلی تولید شده به کمک رنگ سنجی اندازه‌گیری شد. به طور خلاصه، نمونه‌ی زرد به خوبی هموژنیزه شد، سپس چهار نمونه یک گرمی از نمونه‌ی مورد نظر به دقت وزن و در لوله‌های آزمایش ۵۰ میلی‌لیتری ریخته شد. به هر لوله به میزان ۱/۵ میلی‌لیتر محلول حاوی ۱/۱۳۸ میلی‌مولا ر سولفات‌آهن و ۰/۳۶۸ میلی‌مول اسید اسکوربیک اضافه شد. لوله‌ی

نشانگر فساد اکسیداتیو چربی از آن استفاده می‌شود. با اندازه‌گیری مالون دی آلدئید میزان پراکسیداسیون چربی زرده تخم اندازه‌گیری می‌شود. لذا پایین بودن غلظت مالون دی آلدئید در زرده تخم می‌تواند نشانه‌ای از وجود مواد آنتی اکسیداسیون در آن باشند.

کاهش غلظت MDA در زرده تخم بعد از القاء اکسیداسیون در زمان‌های مختلف در تیمارهای حاوی جلبک، بیانگر وجود ترکیبات آنتی اکسیدانت در این ماده است که به زرده منتقل شده‌اند. گزارش شده است که جلبک قرمز غنی از ترکیبات شیمیایی با فعالیت آنتی اکسیدان هستند که می‌تواند به زرده منتقل شود (۱۸). جلبک‌ها حاوی ترکیبات کاروتونیدی نظیر بتا کاروتون (۱۱) و ترکیبات فنولی با خاصیت آنتی اکسیدانی هستند. فیلوفوفایتین، فیوکاکسانین از جلبک‌ها به منظور فعالیت آنتی اکسیدانی قوی استخراج می‌شوند (۱۵). آنتی اکسیدان بدبست آمده از جلبک‌ها نسبت به آنتی اکسیدان‌های سنتیک عوارض جانبی کمتری دارند (۲۲). آنتی اکسیدان‌های سنتیک (اتوکسی کوئین، بوتیلیتید هیدروکسی تولوئن (BHT)، بوتیلیتید هیدروکسی آنیزول (BHA) در پر اکسیداسیون داخلی سلول نقشی ندارد و فقط در حفاظت از خوارک نقش دارد.

دقیقه جدا شد. میزان کلسترول، تری گلیسرید، HDL و LDL سرم به کمک کیت‌های تجاری پارس آزمون و به روش آنزیمی-کلریمتري اندازه‌گیری شد (۲۸). داده‌های حاصل با استفاده از نرم‌افزار Excel برداش و به کمک نرم‌افزار آماری SAS مطابق مدل آماری زیر تجزیه شدند (۳۱):

$$\mu_{ij} = \mu + T_i + e_{ij}$$

در این رابطه μ : مقدار عددی هر یک از مشاهدات در آزمایش، T_i : میانگین جامعه، e_{ij} : اثر تیمار و μ : خطای آزمایشی می‌باشد.

نتایج و بحث

اکسیداسیون

در زمان صفر القاء اکسیداسیون، اثر تیمارهای آزمایشی بر مقدار مالون دی آلدئید (MDA) زرده معنی‌دار نبود ولی داده‌ها نشان دادند که با تغذیه جیره‌های حاوی جلبک، غلظت مالون دی آلدئید در زرده کاهش یافت. در زمان‌های ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ دقیقه بعد از القاء اکسیداسیون، تمام سطوح تغذیه‌ای جلبک موجب کاهش معنی‌دار غلظت مالون دی آلدئید زرده نسبت به شاهد شد (جدول ۳).

مالون دی آلدئید یک ترکیب آلی است که به عنوان

جدول ۳- اثر سطوح مختلف جلبک گراسیلاریوپسیکا بر غلظت مالون دی آلدئید در زرده تخم بلدرچین ژاپنی (میکروگرم بر گرم)

P-value	SEM	پنج	سه	یک	شاهد	زمان دقیقه
۰/۱۰۹	۰/۱۵۰	۰/۶۸۱	۰/۷۹۹	۰/۹۴۳	۱/۲۴۱	صفر
۰/۰۲۳	۰/۱۴۹	۰/۶۳۰ ^b	۰/۸۶۱ ^b	۱/۱۰۰ ^b	۲/۰۶۳ ^a	۵۰
۰/۰۰۴	۰/۱۶۰	۱/۱۳۸ ^c	۱/۱۵۹ ^c	۱/۵۷۵ ^{bc}	۲/۶۰۹ ^a	۱۰۰
۰/۰۱۸	۰/۱۵۴	۱/۴۰۶ ^b	۱/۴۱۳ ^b	۱/۶۰۴ ^b	۲/۶۴۹ ^a	۱۵۰

در هر ردیف اعداد با حروف غیر مشابه دارای اختلاف معنی‌داری می‌باشند ($P < 0.05$). SEM: خطای استاندارد میانگین‌ها.

غلظت سرمی کلسترول و LDL کمتری در مقایسه با شاهد داشتند ($P < 0.05$). با افزایش سطح جلبک در جیره، غلظت سرمی کلسترول کاهش یافت. به طوری که پرندگان تغذیه شده با جیره‌های حاوی پنج درصد جلبک در مقایسه با تیمارهای شاهد غلظت کلسترول در سرم کاهش یافت ($P < 0.05$). تغذیه جیره‌های حاوی جلبک اثری بر مقدار HDL در سرم نداشت (مقایسه با شاهد) ولی کمترین مقدار HDL با تغذیه پنج درصد جلبک مشاهده شد.

صفات بیوشیمیایی خون

اثر تیمارهای آزمایش بر لیپیدی‌های سرم (تری گلیسرید، کلسترول، VLDL، LDL و HDL) پرندگان در (جدول ۴) ارایه شده است. میزان تری گلیسرید و VLDL سرم تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت ولی داده‌ها بیانگر کاهش میزان تری گلیسرید و VLDL سرم با تغذیه جیره‌های جلبک بود. بطوری که با افزایش سطح جلبک در جیره، میزان تری گلیسرید و VLDL خون کاهش یافت (جدول ۴). پرندگانی که در جیره خود جلبک دریافت نمودند،

جدول ۴- اثرات سطوح جلبک گراسیلاریوپسیز پرسیکا بر غلظت تری گلیسرید، کلسترول، کلسترول، LDL، VLDL و HDL سرم خون در بلدرچین ژاپنی (میلی گرم در دسی لیتر)

جلبک (درصد)							صفات
P-value	SEM	پنج	سه	یک	شاهد		
.۰۲۱۸	۲۶/۱۱	۱۰۳۸/۲۵	۱۰۵۶/۷۵	۱۱۲۳/۷۵	۱۱۸۴/۰۰	تری گلیسرید	
.۰۰۱۱	۱۵/۳۹	۱۴۳/۷۵ ^c	۱۹۹/۷۵ ^{bc}	۲۰۸/۷۵ ^{bc}	۲۹۴/۲۵ ^a	کلسترول	
.۰۱۹۴	۵/۱۵	۷۵/۲۵	۷۸/۷۵	۸۰/۰۰	۱۰۹/۲۵	VLDL	
.۰۰۰۱	۸/۹۵	۳۰/۵ ^c	۶۳/۲۵ ^{cd}	۷۱/۰ ^{cd}	۱۲۹/۷۵ ^a	LDL	
.۰۰۲۱	۴/۸۴	۳۸/۰ ^b	۵۵/۲۵ ^{ab}	۵۷/۷۵ ^{ab}	۵۷/۷۵ ^{ab}	HDL	
.۰۰۰۱	۰/۱۵	۱/۷۵ ^a	۰/۷۶ ^{bc}	۰/۷۱ ^{bc}	۰/۴۸ ^c	HDL/LDL	

در هر ردیف اعداد با حروف غیر مشابه دارای اختلاف معنی دار می باشند ($P < 0.05$). SEM: خطای استاندارد میانگین ها.

که افزودن ۱۰ درصد پودر جلبک به جیره مرغان تخم گذار، تا ۲۸ درصدی غلظت کلسترول سرم را کاهش می دهد. نتایج این مطالعه با گزارش های فوق همخوانی دارد.

با افزایش سطوح جلبک در جیره نسبت HDL افزایش یافت. کاهش در سهم HDL با توجه با کاهش غلظت کلسترول منطقی به نظر می رسد. با افزایش سطوح جلبک، غلظت LDL با شیب بیشتری نسبت به HDL کاهش یافت، از این رو نسبت HDL/LDL افزایش یافت. در توافق با این آزمایش، ال دیک و بریکا (۹) گزارش دادند استفاده از دو درصد جلبک قوهای در جیره جوجه های گوشتشی به طور معنی داری کلسترول را کاهش می دهد. دویر و همکاران (۸) با استفاده از بیوماس جلبک قرمز در تغذیه موش، افزایش در نسبت HDL/LDL را مشاهده کردند.

با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون القای اکسیداسیون زرده تخم بلدرچین می توان گفت که سطح پنج درصد جلبک به دلیل غلظت بیشتر فوکواسترول، استیگما استرول، بتا سیستوسترول و عنصر ید می تواند به عنوان آنتی اکسیدان طبیعی، توانایی واکنش با رادیکال های حاصل از اکسیداسیون لیپیدها را داشته و موجب کاهش سرعت اکسیداسیون شود. همچنین جلبک مورد نظر در سطح پنج درصد باعث کاهش کلسترول و LDL سرم شد که در نهایت باعث کاهش کلسترول زرده تخم بلدرچین شد. این مساله از جنبه کیفی تخم های تولیدی و حفظ سلامتی مصرف کننده حائز اهمیت است. مطالعات بیشتر درخصوص کاربرد جلبک دریایی گراسیلاریوپسیز پرسیکا مورد مطالعه به عنوان یک ترکیب دارای اثرات آنتی اکسیدانی و به منظور افزایش کمی و کیفی محصولات تولیدی در صنعت پرورش دام و طیور توصیه می شود.

در این آزمایش علی رغم عدم تفاوت معنی دار در غلظت تری گلیسرید سرم، این ترکیب غلظت نسبتاً بالایی را نشان داد. در همین رابطه گزارش شده است که در طی تخم گذاری غلظت تری گلیسرید در حال گردش دو تا ۱۰ برابر افزایش می یابد (۲۷). میزان تری گلیسرید موجود در سرم در زمان تخم گذاری نیز در حدود ۱۹۵۲ میلی گرم در دسی لیتر سرم گزارش شده است (۲۳). علت بالا بودن میزان تری گلیسرید در خون پرندگان تخم گذار، نیاز برای ساخت زرده تخم می باشد تا به عنوان منبع انرژی برای جنبین استفاده شود. دویر و همکاران (۸) با استفاده از جیره حاوی جلبک قرمز پورفیریدیوم در تغذیه موش ها، کاهش غیر معنی دار غلظت تری گلیسرید سرم را گزارش نمودند. گزارش شده است که فیبرهای محلول در روده، توده غذایی را به قسمت های بالایی روده آورده و در آنجا اسیدهای صفراء تو سط باكتراها تخریب شده و درنتیجه ترشح اسیدهای صفراء را افزایش و کلسترول را کاهش می دهد (۲۰، ۱۳). همچنین تغذیه جلبک میزان کوله سیستوکینین در پلاسمما را افزایش می دهد. این افزایش سبب ترشح بالای اسیدهای صفراء شده و درنتیجه جذب کلسترول افزایش می یابد که در نهایت آنزیم کلیدی هیدروکسی متیل رودکتاز (COA-HMG) فعال و تولید کلسترول را در بدن مهار می کند (۳۵، ۲۶). جلبک ها دارای ۱۷ اسید آمینه آزاد بوده که تورین از آن جمله می باشد. تورین و گلایسین از اسیدهای آمینه های موجود در اسیدهای صفراء است که تولید اسیدهای صفراء را افزایش داده و با کاهش غلظت کلسترول خون کمک می نماید (۳۰). همچنین دویر و همکاران (۷) کاهش غلظت کلسترول خون موش را با تغذیه آنها با جلبک دریایی گزارش کردند. جینزبرگ و همکاران (۱۰) گزارش کردند

منابع

- Aguilera-Morales, M., M. Casas-Valdez, S. Carrillo-Domínguez, B. González-Acosta and F. Pérez-Gil. 2005. Chemical composition and microbiological assays of marine algae *Enteromorpha* spp. as a potential food source. *Journal of Food Composition and Analysis*, 18: 79-88.
- Bellorin, A.M., A. Burriyo, J. Sohrabipour, M.C. Oliveira and E.C. Oliveira. 2008. *Gracilariaopsis mclachlanii* sp. nov. and *Gracilariaopsis persica* sp. Nov. of the *Gracilariceae* (*Gracilariales, rhodophyceae*) from the Indian ocean. *Journal of Phycology*, 44: 1022-1032.
- Botsoglou N.A., P. Florou-Paneri, E. Christaki, D.G. Fletouris and A.B. Spais. 2002. Effect of dietary oregano essential oil on performance of chickens and on iron-induced lipid oxidation of breast, thigh and abdominal fat tissues. *British Poultry Sciences*, 43: 223-230.
- Darcy-Vrillon, B. 1993. Nutritional aspects of the developing use of marine macroalgae for the human food industry. *International Journal of Food Sciences and Nutrition*, 44: 23-35.
- Davidson, M.H. and M.C. Donald. 1998. Fiber: Forms and functions. *Nutrition Research*, 18: 6714.
- Dawczynski, C., R. Schubert and G. Jahreis. 2007. Amino acids, fatty acids and dietary fibre in edible seaweed products. *Food Chemistry*, 103: 891-899.
- Dvir, I., R. Chayoth, U. Sod-Moriah, S. Shany, A.H. Stark, Z. Madar and S. Malis Arad. 2000. Soluble polysaccharide and biomass of red *microalga porphyridium* sp. alter intestinal morphology and reduce serum cholesterol in rats. *British Journal of Nutrition*, 84: 469-476.
- Dvir, I., A.H. Stark, R. Chayoth, Z. Madar and S. Malis Arad. 2009. Hypocholesterolemic effects of nutraceuticals produced from the red microalga *porphyridium* sp. in rats. I: 156-167.
- El-Deek, A.A. and M.A. Brikha. 2009. Nutritional and biological evalution of marine seaweed as a feedstuff and as a pellet binder in poultry diet. *International Journal of Poultry Sciences*, 8: 875-881.
- Ginzberg, A., M. Cohen, U.A. Sod-Moriah, S. Shany, A. Rosenshtrauch and S. Arad (Malis). 2000. Chickens fed with biomass of the red microalga *porphyridium* sp. Have reduced blood cholesterol level and modified fatty acid composition in egg yolk. *Journal of Applied Phycology*, 12: 325-330.
- Herber-McNeill, S.M. and M.E. Van Elswyk. 1998. Dietary marine algae maintains egg consumer acceptability while enhancing yolk color. *Poultry Sciences*, 77: 493-496.
- Jimenez, E.A. and I.C. Goni. 1999. Evaluacion nutricional y efectos fisiologicos de macroalgas marinas comestibles. *Archivos Latinoamericanos de Nutrición*, 49: 114-120.
- Jimenez-Escrig, A. and F.J. Sanchez-Muniz. 2000. Dietary fibre from edible seaweeds: Chemical structure, physicochemical properties and effects on cholesterol metabolism. *Nutrition Research*, 20: 585-598.
- Kahl, R. and H. Kappus. 1993. Toxicity of synthetic antioxidants BHT and BHA in comparison with natural antioxidants vitamin E. *Zeitschrift für Lebensmittel-Untersuchung und Forschung*, 196: 329-38.
- Kuda, T., M. Tsunekawa and H. Goto. 2005. Antioxidant properties of four edible algae harvested in the Noto Peninsula, Japan. *Journal of Food Composition and Analysis*, 18: 625-633.
- Kulusic, T., A. Radonic and V. Katalinic. 2004. Use of different methods for testing antioxidative of oregano essential oil. *Food Chemistry*, 85: 633-640.
- Leeson, S. and J.D. Summers. 2008. *Commercial Poultry Nutrition*. Fourth ed., Nottingham University Press, UK, pp: 413.
- Li, Y.X. and S.K. Kim. 2011. Utilization of seaweed derived ingredients as potential antioxidants and functional ingredients in the food industry: An Overview. *Food Science and Biotechnology*, 20: 1461-1466.
- Mabeau, S.J. and J. Fleurence. 1993. Seaweed in food products: Biochemical and nutritional aspects. *Trends Food Science and Technology*, 4: 103-107.
- Marlett, J. 2001. *Handbook of Dietary Fibers*; Cho S. S., Dreher M. D., Eds; Marcel Dekker, Inc: New York, NY, USA, pp: 17-30.
- Matanjun, P. and S. Mohamed, N.M. Mustapha, K. Muhammad and C.H. Ming. 2008. Antioxidant activities and phenolic content of eight species of seaweeds from north Borneo. *Journal of Applied Phycology*, 20: 367-373.
- Meenakshi, S., G.D. Manicka, M.S. Tamil, M. Arumugam and T. Balasubramanian. 2009. Total flavonoid and in vitro antioxidant activity of two seaweeds of rameshwaram coast. *Global Journal of Pharmacology*, 3: 59-62.
- Mojabi, A. *Veterinary Clinical Pharmacology*. 2000. Nourbakhsh publications. 192 pp.
- Namiki, M. 1990. Antioxidants, antimutagens in food. *Critical Rev. Food Science and Nutrition*, 6: 273-300.
- Office of Marine Fisheries and Aquatic shrimp. 1389. Cultivation instructions, care and harvesting seaweed *Gracilariaopsis persica*.
- Qureshi, A.A., Z. Din, N. Abuirmileh, W.C. Burger, Y. Ahmad and C. Elson. 1983. Suppression of avian hepatic lipid metabolism by solvent extracts of garlic: Impact on serum lipids. *Journal of Nutrition*, 113: 1746-55.
- Rahimi S.H. 2003. *The Comparative feeding poultry* (Translation). Tarbiat Modares University press.
- Rodrigo, R. and C. Bosco. 2006. Oxidative stress and protective effects of polyphenols: Comparative studies in human and rodent kidney. A review. *Comparative Biochemistry and Physiology*, 142: 317-327.
- Saeidnia, S., P. Permeh, A.R. Gohari and A. Moradi. 2012. *Gracilariaopsis persica* from Persian Gulf contains bioactive sterols. *Iranian Journal of Pharmaceutical Research*, 11: 845-849. (In Persian)
- Sahoo, D., X. Tang and C.P. Yarish. 2002. *Orphrya*-the economic seaweed as a new experimental system, *Scientific Corresponding*, 83: 11, 13-1316.

31. SAS. Institute, SAS user's Guide: Statistics Version 9.2. SAS Institute Inc, Cary, NC. 2004.
32. Shrififar, F., M.H. Moshafi and S.H. Mansouri. 2007. In vitro evaluation of antibacterial and antioxidant of the essential oil and methanol extract of endemic Zataria multifloraBoiss. Food Control, 18: 800-805.
33. Singh, G., S. Maurya and M.P. Delampasona. 2007. A comparison of chemical antioxidant and antimicrobial studies of cinnamon leaf and bark volatile oils, oleoresins and their constituents. Food and Chemical Toxicology, 45: 1650-61.
34. Stark, A., A. Nyska and Z.M. Madar. 1996. Metabolic and morphometric changes in small and large intestine in rats fed high-fiber diets. Toxicologic Pathology, 24: 166-171.
35. Van den Hoek, C., H. Jahns and D.G. Mann. 1993. Algen. Georg Thieme Verlag Stuttgart, New York. 3. neubearbeitete Auflage., 42:135-136.
36. Vosough Sharifi, O., A. Yaghoubfar, S.D. Sharifi, G. Mirzadeh and F. Askari. 2011. Study on the possibility of *Gracilariaopsis persica* utilization in layer diets. Journal of Animal Production. 14: 1-10. (Persian)
37. Whitehead, D.C. and H.D. Grifin. 1984. Development of divergent lines of lean and fat broiler using plasma very low density lipoprotein concentration as selection criterion: The first three generation. British Poultry Sciences, 25: 579-82.

Archive of SID

A Study on the Antioxidants and Hypolipidemic Effects of *Gracilaropsis Persica* Seaweed in Japanese Quail

Behnam Abbaspour¹ and Seyed Davood Sharifi²

1- PhD Student, College of Abouraihan, University of Tehran

2- Associate Professor, College of Abouraihan, University of Tehran

(Corresponding author: sdsharifi@ut.ac.ir)

Received: July 8, 2013 Accepted: February 23, 2014

Abstract

This experiment aimed to evaluate the antioxidant and hypolipidemic effects of *Gracilaropsis persica* seaweed using 112 Japanese quail with four treatments and four replications in a completely randomized design for 12 weeks. The seaweed *Gracilaropsis persica* was added to diets in levels of 0, 1, 3, 5 percent. MDA concentration was measured in the yolk as oxidation index after zero, 50, 100 concentration and 150 min iron-induced oxidation. Serum cholesterol, triglycerides, VLDL, HDL and LDL were determined at the end of the experiment (12 weeks). Malondialdehyde concentrations in egg yolk of birds fed diets containing *Gracilaropsis persica* were lower than the control group ($P < 0.05$). Also, the birds fed on *Gracilaropsis persica* diets had lower LDL and cholesterol in their serum compared with control group ($P < 0.05$). The results showed that *Gracilaropsis persica* have antioxidant and cholesterol-lowering effects and can be considered as a new feed additive.

Keywords: Antioxidant, Cholesterol, *Gracilaropsis persica*, Quail