



تاثیر مکمل روغن کنجد (Sesamum indicum L.) و یا آلفا-توکوفریل استات خوراک بر عملکرد، ریخت‌شناسی روده و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی

محمد جواد آگاه^۱، ابوالقاسم گلیان^۲، حسن نصیری مقدم^۳، احمد رضا راجی^۳، اصغر زربان^۳ و رضا فرهوش^۴

۱- استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس، (نویسنده مسؤول: mjagah@yahoo.com)

۲- استاد و دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد

۴- دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی بیرون

تاریخ دریافت: ۹۲/۱۰/۲۸ تاریخ پذیرش: ۹۲/۱۰/۲۸

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثر روغن کنجد به عنوان افزودنی خوراکی حاوی ترکیبات آنتی‌اکسیدانی طبیعی و یا آلفا-توکوفریل استات بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و ریخت‌شناسی روده کوچک جوجه‌های گوشتی انجام شد. یک صدقه قطعه جوجه نر گوشتی سویه راس ۳۰۸ در سن ۷ روزگی به صورت تصادفی به چهار تیمار آزمایشی تقسیم و در هر تیمار آزمایشی، پنج تکرار با ۵ پرنده در هر قفس، تا سن ۲۸ روزگی تغذیه شدند. تیمارها شامل، یک گروه کنترل منفی تغذیه شده با جیره پایه حاوی روغن خام ذرت و بدون افزودن آلفا-توکوفریل استات، یک گروه کنترل مثبت تغذیه شده با جیره پایه و با افزودن ۲۵۰ میلی‌گرم در کیلوگرم آلفا-توکوفریل استات به آن و دو گروه آزمایشی تغذیه شده با جیره پایه و با جایگزینی ۵۰ و ۱۰۰ درصد روغن خام ذرت با روغن کنجد، بودند. جوجه‌های تغذیه شده با ۵۰ درصد جایگزینی روغن خام ذرت با روغن کنجد، بیشترین میانگین افزایش وزن روزانه را نشان دادند ($P<0.05$). جایگزینی روغن کنجد در جیره تأثیر معنی‌داری بر مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی نداشت. بیشترین درصد لاشه را به ترتیب جوجه‌های تغذیه شده با جیره کنترل مثبت و کنترل - منفی داشتند ($P<0.05$). گنجاندن روغن کنجد به جای روغن خام ذرت در جیره پایه باعث افزایش معنی‌دار طول، عرض و سطح جذبی پر ز در مقایسه با جیره کنترل منفی گردید ($P<0.05$). جوجه‌های تغذیه شده با جیره حاوی ۵۰ درصد روغن کنجد کمترین غلظت گلوكز و تری‌گلیسرید سرم خون را نشان دادند ($P<0.05$). استفاده از روغن کنجد به دلیل داشتن ترکیبات آنتی‌اکسیدانی قوی در جیره جوجه‌های گوشتی، همانند استفاده از آلفا-توکوفریل استات می‌تواند اثرات مثبتی بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های خونی و سلامت دستگاه گوارش در هفته‌های نخست دوره پرورش داشته باشد.

واژه‌های کلیدی: روغن کنجد، عملکرد، ریخت‌شناسی روده، فراسنجه‌های خونی، جوجه‌گوشتی

آنٹی‌اکسیدان‌های طبیعی (توکوفرول‌ها و اسیداسکوربیک) به دلیل ساختار غیرشیمیایی آنها برای مصرف کنندگان قابل پذیرش‌تر است (۲). تحقیقات نشان داد گنجاندن آلفا-توکوفریل استات در جیره‌های حیوانی با ایجاد اختلال در واکنش‌های زنجیره‌ای اکسیداسیون چربی‌غشای سلولی از تشکیل هیدروپراکسیدها ممانعت کرده و باعث افزایش مدت زمان ماندگاری محصولات تولیدی می‌شود (۱۴). با این حال، آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی به اندازه آنتی‌اکسیدان‌های مصنوعی مؤثر نبوده و دارای هزینه ساخت نسبتاً بالایی می‌باشند. بنابراین، توجه پژوهشگران بر شناسایی، جداسازی، توصیف ویژگی‌ها و استفاده از تولیدات آنتی‌اکسیدانی طبیعی، مؤثر و ارزان‌تر معطوف شده است (۲۵).

بسیاری از گیاهان دارای ترکیبات با خواص آنتی‌اکسیدانی هستند که می‌توانند پایداری اکسیداتیو گوشت و تخم مرغ را بهبود بخشیده و در نتیجه ماندگاری این محصولات را افزایش دهند (۱۰). در بین

مقدمه

در چند سال گذشته دست کاری چربی جیره طیور با هدف تغییر در ترکیب اسیدهای چرب گوشت مرغ، به عنوان یک توصیه رایج بهداشتی برای سلامتی انسان، منجر به افزایش تمایل برای جایگزینی منابع چربی حیوانی با برخی روغن‌های گیاهی سرشار از اسیدهای چرب غیراشبع در جیره شده است. اما این روغن‌ها در مقایسه با اسیدهای چرب اشباع، بیشتر در معرض فساد اکسیداسیونی هستند (۲۰). محصولات اکسیداسیون از طریق واکنش با پروتئین‌ها، چربی‌ها و ویتامین‌های محلول در چربی موجود در جیره‌گذایی، منجر به کاهش محتوی مواد مغذی جیره نیز می‌شوند. برخی از این ترکیبات اکسید شده به دلیل سمی بودن، اثرات مضاری بر سلول‌های مخاطی سطح پر ز روده داشته و منجر به کاهش عملکرد پرنده می‌شوند (۲۰).

گرچه افزودن ترکیبات آنتی‌اکسیدانی مصنوعی معمول در جیره می‌تواند به عنوان راهکاری برای بهبود عملکرد پرنده و کیفیت گوشت طیور باشد، اما کاربرد

جیره‌های آزمایشی در هر دوره پرورشی (جدول ۱) از نظر انرژی و پروتئین مشابه بوده و در قالب چهار تیمار زیر و بر پایه ذرت و کنجاله سویا تهیه شدند: ۱- جیره‌پایه بدون افزودن الfa-توکوفریل استات که ۱۰۰ درصد سهم روغن آن را روغن خام ذرت تأمین شد (کنترل منفی)، ۲- جیره‌پایه با افزودن ۲۵۰ میلی‌گرم در کیلوگرم الfa-توکوفریل استات که ۱۰۰ درصد سهم روغن آن را روغن خام ذرت تأمین شد (کنترل مثبت)، ۳- جیره‌پایه با جایگزینی ۵۰ درصد روغن خام ذرت با روغن کنجد (به عنوان یک روغن حاوی ترکیبات آنتی‌اسیدان طبیعی) و ۴- جیره‌پایه با جایگزینی ۱۰۰ درصد روغن خام ذرت با روغن کنجد.

روغن خام ذرت (روغن ذرت بدون افزودن آنتی‌اسیدان در کارخانه پس از مراحل مختلف روغن‌کشی و تصفیه) از کارخانه گلکوزان قزوین تهیه شد. روغن کنجد از یک کارگاه روغن‌کشی شهرستان مشهد خریداری شد. جیره‌های فوق در طول دوره آزمایش (۷ تا ۲۸ روزگی) به مدت ۳ هفته به جوجه‌ها تغذیه شدند.

ترکیب اسید چرب روغن جیره

ترکیب اسیدهای چرب روغن ذرت و کنجد مورد استفاده در جیره (جدول ۲) در آزمایشگاه آزمون‌گستر شیازار و بوسیله آنالیز متیل استرات‌های اسیدچرب با دستگاه گاز کروماتوگرافی^۱ ساخت کشور آمریکا مجهز به ستون مویینی سیلیکائی^۲ با طول ۱۲۰ متر و قطر داخلی ۰/۲۵ میلی‌متر تعیین گردید.

محتوی فتل کل و قدرت آنتی‌اسیدانی روغن جیره
میزان فتل کل روغن ذرت و کنجد به کارفته در جیره با استفاده از اسیدگالیک به عنوان استاندارد و با معرف فولین سیوکالچو و مطابق روش توصیف شده کاپانسی و همکاران (۶) تعیین شد. نتایج بر حسب میلی‌گرم بر گرم معادل اسیدگالیک در نمونه روغن بیان شد.

قدرت آنتی‌اسیدانی روغن‌ها به کمک آزمون اندازه‌گیری قدرت مهار کنندگی رادیکال آزاد استاندارد ۱-دی‌فنیل-۲-پیکرل هیدرازیل^۳ و با روش توصیف شده سیجر و همکاران (۳۷) تعیین شد. پس از ترسیم نمودار درصد مهار کنندگی رادیکال آزاد در برابر غلظت ترکیب آنتی‌اسیدانی، منحنی مناسب روی داده‌ها برآشش داده شد و سپس غلظتی را که در آن ترکیب آنتی‌اسیدانی قادر به مهار کردن ۵۰ درصد رادیکال‌های آزاد است، تحت عنوان IS₅₀ محاسبه گردید.

شرایط پرورش و صفات مورد بررسی

در تمام طول دوره آزمایش جوجه‌ها به آب و غذا دسترسی آزاد داشته و سیستم نوردهی یک ساعت تاریکی و ۲۳ ساعت روشناهی برای آنها فراهم شد. دمای

روغن‌های گیاهی، روغن کنجد به دلیل دارا بودن میزان بالای آنتی‌اسیدان‌های طبیعی به عنوان روغن مناسب جهت افزایش پایداری اسیداتیو سایر روغن‌های خوراکی که حاوی مقادیر زیادی اسیدچرب غیراشبع می‌باشند، به کار می‌رود (۱۵،۴).

روغن کنجد شامل یک دسته به نظیر از ترکیبات شناخته شده تحت عنوان لیگنان‌ها می‌باشد. لیگنان‌های کنجد شامل سیزامین، سیزامولین و مقادیر کمی سیزامول بوده و وظایف فیزیولوژیکی متنوعی از جمله: کاهش چربی خون، کاهش سطح آراسیدونیک اسید، افزایش توانایی آنتی‌اسیدانی، افزایش قابلیت زیست فراهامی گاما-توکوفرول و فراهم کردن وظایف ضلالتها بی را دارا می‌باشند (۲۰). از طرفی مهارگونه‌های اکسیژن فعال توسط لیگنان‌های کنجد، می‌تواند سلول‌های بدن را از صدمات رادیکال‌های آزاد محافظت کند (۲۳). روغن کنجد قادر است سه‌زدایی کند از مواد شیمیایی و میزان ترکیبات آنتی‌اسیدانی آنزیمی و غیرآنزیمی را افزایش داده و نقش حفاظتی در برابر استرس اسیداتیو داشته باشد (۲۴،۲۰). در تحقیق драгاجی و همکاران (۳) استفاده از روغن کنجد در سطوح ۰/۵ و ۱ درصد و دانه کنجد در سطوح ۱ و ۲ درصد در جیره بلدرچین تخم‌گذار تأثیر معنی‌داری بر وزن بدن و خوراک مصرفی نداشت. گرچه مکمل کردن دانه و روغن کنجد در جیره منجر به افزایش معنی‌دار وزن و تعداد تخم، درصد تولید، گرم تخم تولیدی روزانه و بهبود ضریب تبدیل غذایی در مقایسه با جیره شاهد (فاقد دانه و روغن کنجد) گردید.

این پژوهش با هدف بررسی اثر روغن کنجد به عنوان افزودنی خوراکی حاوی ترکیبات آنتی‌اسیدانی طبیعی و یا الfa-توکوفریل استات بر شاخص‌های عملکردی، فراسنجه‌های خونی و ریخت‌شناسی روده کوچک جوجه‌های گوشتشی انجام شد.

مواد و روش‌ها

جیره‌ها و طرح آزمایشی

در این پژوهش ۱۰۰ قطعه جوجه گوشتشی نر یک روزه سویه راس ۳۰۸ به مدت ۶ روز روی بستر با تراشه چوب با عمق ۱۰ سانتی‌متر پرورش یافتند. در این مدت کلیه جوجه‌ها با یک جیره پایه، بر اساس حداقل مقادیر مواد مغذی پیشنهاد شده احتیاجات سویه تجاری راس ۳۰۸ سال ۲۰۰۷ تعیین شدند. در سن ۷ روزگی کلیه پرنده‌ها پس از وزن‌کشی انفرادی در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با ۴ تیمار در بیست واحد آزمایشی (پن) هر کدام با ۵ قطعه جوجه با میانگین وزن مشابه و در ۵۰×۹۰ سانتی‌متر قرار گرفتند.

روزانه هر قفس در طول دوره توزین، ثبت و برای تصحیح رکورد تلفات مورد استفاده قرار گرفت. شاخص تولید با استفاده از فرمول زیر (۲۸) محاسبه شد.

$$\text{شاخص} = \frac{\text{(میانگین وزن زنده} \times \text{درصد ماندگاری)}}{\text{(ضریب تبدیل غذایی} \times \text{طول دوره پرورش)}} \quad \text{تولید}$$

اوایله سالن ۳۲ درجه سانتی گراد بود که بر اساس راهنمای شرکت راس به ازای هر روز ۰/۵ درجه سانتی گراد کاسته شد تا در سن ۲۱ روزگی به ۲۱ درجه رسید و از آن پس ثابت ماند. میانگین خوارک در روز و افزایش وزن بر حسب گرم به ازای هر پرندۀ در روز و ضریب تبدیل غذایی برای هر گروه از جوچه‌ها برای سن ۷ تا ۲۸ روزگی به صورت جداگانه محاسبه شد. تلفات

جدول ۱- درصد ترکیبات و مواد مغذی جیره پایه بر اساس کاتالوگ سویه راس ۳۰۸

جزای خوارکی جیره*	۱۱ تا ۲۴ روزگی	۱۰ تا ۲۵ روزگی	۷ تا ۲۸ روزگی
ذرت	۵۴/۱۲	۵۳/۰۵	۵۲/۵۵
کنجاله سویا	۳۴/۸۶	۳۴/۶۷	۳۴
گلوتون ذرت	۱/۵	۳	۵/۶۳
سنگ آهک	۱/۰۴	۱/۰۸	۱/۳۲
دی کلسیم فسفات	۱/۴	۱/۵۵	۱/۷۶
نمک	۰/۴۲	۰/۴۷	۰/۳۶
ترؤونین	.	۰/۰۶	۰/۱
لیزین	.	۰/۲	۰/۴۲
متیونین	۰/۱۹	۰/۲۵	۰/۳۳
روغن ^۱	۵/۹۷	۵/۱۷	۷/۰۴
مکمل ویتامینی و معدنی ^۲	۰/۵	۰/۵	۰/۵
ترکیب محاسباتی			
انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری (kcal/kg)	۳۲۰۰	۳۱۵۰	۳۰۲۵
پروتئین خام (%)	۲۱	۲۲	۲۳/۵۲
کلسیم (%)	۰/۸۵	۰/۹	۱/۰۵
فسفرقابل دسترس (%)	۰/۴۲	۰/۴۵	۰/۵
متیونین+ سیستین (%)	۰/۸۶	۰/۹۵	۱/۰۷
متیونین (%)	۰/۵۳	۰/۶۰	۰/۷۲
لیزین (%)	۱/۰۹	۱/۲۵	۱/۴۴
سدیم (%)	۰/۱۸	۰/۲	۰/۱۶

* چهار جیره غذایی تهیه شده در هر دوره پرورشی عبارت بودند از: ۱) کنترل منفی، جیره پایه حاوی روغن خام ذرت و بدن افزودن آلفا-توکوفریل استات.

۲) کنترل مثبت، جیره پایه حاوی روغن خام ذرت و با افزودن ۲۵۰ میلی گرم بر کیلوگرم آلفا-توکوفریل استات. ۳) جیره پایه با جایگزین کردن ۵۰ درصد روغن خام ذرت آن با روغن کنجد. ۴) جیره پایه با جایگزین کردن ۱۰۰ درصد روغن خام ذرت با روغن کنجد.

۱- از روغن خام ذرت در جیره‌های ۱ و ۲، از مخلوط ۵۰٪ روغن خام ذرت و ۵۰٪ روغن کنجد در جیره ۳ و از روغن کنجد در جیره ۴ مطابق درصدهای ذکر شده در جدول استفاده شد.

۲- هر کیلوگرم جیره حاوی: ویتامین A: ۱۱۰۰۰ میلی گرم، ویتامین E: ۱۲۰۰ میلی گرم، بین المللی، واحد بین المللی، ویتامین K3: ۲، K3: ۰/۰۲ میلی گرم، ویتامین B12: ۰/۰۲ میلی گرم، تیامین: ۴ میلی گرم، ریبوفلاوین: ۴ میلی گرم، اسید فویکی: ۱ میلی گرم، بیوتین: ۰/۰۳ میلی گرم، پیروودوکسین: ۴ میلی گرم، کولین: کلرايد: ۸۴۰ میلی گرم، اتوکسی کوئین: ۱۰۰ میلی گرم، سولفات منگنز: ۱۰۰ میلی گرم، سلیوم (سلنات سدیم): ۰/۰۲ میلی گرم، سولفات مس: ۱۰۰ میلی گرم، آهن: ۵۰ میلی گرم بود.

جدول ۲- ترکیب اسید چرب روغن کنجد و روغن ذرت (بر حسب درصد)

ترکیب اسیدهای چرب	روغن کنجد	روغن ذرت	ترکیب اسیدهای چرب
۱۰/۰۷	۸/۶۲	(C16:0)	پالمیتیک
۰/۰۸	۰/۰۷	(C16:1)	پالمیتوئنیک
۲۲۲	۵/۲۵	(C18:0)	استناریک
۳۲/۴۷	۴۵/۱۸	(C18:1)	اوئنیک
۵۲/۲۱	۳۹/۶	(C18:2)	لینولئیک
۰/۵۷	۰/۶۷	(C18:3)	لینولنیک
۰/۸۴	۰/۵۸	(C20:4)	آراشیدونیک (4)
۰/۱۴	۰/۲۳	(C20:1)	ایکوزنیک
۱۲/۱۳	۱۴/۴۵		اسیدهای چرب اشباع
۳۲/۵۹	۴۵/۴۸		اسیدهای چرب با یک پیوند دوگانه
۵۲/۷۸	۴۰/۲۷		اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه

وریدبال در سرنگ‌های فاقد ماده ضد انعقاد اخذ شده و پس از جداسازی سرم در میکروتیوب‌های ۰/۵ سی سی

به منظور اندازه‌گیری فرانسنجه‌های خونی در پایان دوره (سن ۲۸ روزگی) از هر تکرار یک نمونه خون از

از محلول ثابت کننده اضافی سه مرحله، ۱- آبگیری، با قراردادن نمونه‌ها در محلول الكل اتیلیک با درجات صعودی، ۲- شفافسازی با قراردادن نمونه‌ها در محلول زایلان و ۳- پارافینه کردن با قراردادن نمونه‌ها داخل پارافین مایع به منظور اشباع‌سازی نمونه با پارافین انجام شد. سپس نمونه‌ها از دستگاه خارج و به کمک دستگاه ذوب پارافین و قالب لوكهارت بلوكهای پارافینی تهیه شد. نمونه‌های بافت روده با ضخامت ۵ میکرومتر با استفاده از میکروتوم نیمه اتومات^۵ بر روی اسلامی شیشه‌ای قرار گرفتند و با هماتوکسیلین- ائورین^۶ رنگ آمیزی شدند^(۵). جهت بررسی ریخت‌شناسی نمونه‌های بافتی روده از میکروسکوپ نوری المپیوس^۷ استفاده گردید. اندازه‌گیری‌های ریخت‌شناسی پرزهای روده بر روی ۱۰ پرز سالم انتخاب شده از هر نمونه انجام شد. شاخص‌های مورد بررسی شامل طول پرز^۸ (از نوک پرز تا محل اتصال کریبت)، عرض پرز (متوسط عرض پرز در ابتداء، وسط و انتهای پرز)، عمق کریبت^۹ (از پایه پرز تا لایه زیر مخاط) اندازه‌گیری شدند و سطح جذبی پرزها نیز با استفاده از فرمول ساکامتو و همکاران^(۳۲) به شرح ذیل محاسبه شد.

$$\text{میانگین طول پرز} \times 2 = \text{سطح جذبی پرزها}$$

$$(\text{میانگین عرض پرز}) \times 2 = \text{سطح جذبی پرزها}$$

تجزیه و تحلیل آماری

داده‌های مربوط به هر عامل توسط نرم‌افزار SAS^(۳۵) و با استفاده از روش GLM در قالب طرح کاملاً تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای تعیین تفاوت‌های معنی‌دار بین میانگین از آزمون چنددالمنهای دانکن در سطح احتمال ۰/۰۵ استفاده شد.

نتایج و بحث

ترکیب اسید چرب روغن جیره

مطابق جدول ۲ عمدۀ ترکیب اسیدهای چرب هر دو روغن ذرت و کنجد (در حدود ۸۵ درصد) را مجموع دو اسید چرب اولنیک و لیونلیک اسید تشکیل می‌دهند که با نتایج تحقیقات کوه^(۲۱) مطابقت دارد.

محتوی فتل کل و قدرت آتی‌اسیدانی روغن جیره
محتوی فتل کل موجود در روغن کنجد و ذرت به ترتیب ۰/۷۸۸ و ۰/۳۷۶ میلی‌گرم بر گرم معادل اسید‌گالیک نمونه روغن محاسبه شد. اندازه‌گیری قدرت آتی‌اسیدانی این روغن‌ها به کمک آزمون DPPH نشان داد که غلظت IC₅₀ دو روغن کنجد و ذرت به ترتیب ۷/۵۱ و ۴۹/۹ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر می‌باشد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد روغن کنجد در مقایسه با روغن خام ذرت از محتوی فتل کل بالاتر و قدرت مهار رادیکال آزاد بیشتری برخوردار است. سیگر و همکاران^(۳۷) نیز

تا زمان آتالیز در دمای ۲۰ درجه نگهداری شد. مقدار گلوکز، کلسیترول، تری‌گلیسرید، پروتئین کل، آلبومین و گلوبولین نمونه‌های سرم خون پس از بین‌گشایی، توسط دستگاه اتوانالیز^۱ و با استفاده از کیت‌های تجاری زیست‌شیمی^۲ اندازه‌گیری شد. غلظت مالون دی‌آلدئید سرم با روش توصیف شده در اپر و همکاران^(۹) و براساس واکنش مواد با تیوباربیتوريک اسید^۳ اندازه‌گیری شد. به طور خلاصه، ۳ میلی‌لیتر از محلول آماده به کار ۷/۵ گرم تری‌کلرواستیک، ۱۸۷ میلی‌گرم ۲-تیوباربیتوريک اسید و ۶/۲۵ میلی‌لیتر اسید‌کلریدریک ۲ نانومول بر لیتر را با ۳۰۰ میکرولیتر از پلاسمـا داخل لوله آزمایش در در ریخته و به مدت ۲۰ دقیقه در حمام آب گرم با دمای ۹۰ درجه سانتی‌گراد قرار دادیم. سپس بلافالصله لوله‌ها را با آب سرد خنک کرده و به هر لوله آزمایش ۲ میلی‌لیتر ایزو بوتانول اضافه نموده و به مدت ۲۰ ثانیه با شیکر مخلوط کردیم. در نهایت پس از سانتریفیوژ کردن به مدت ۱۰ دقیقه با سرعت ۲۵۰۰ دور در دقیقه، چگالی نوری با دستگاه اسپکتروفوتومتر در طول موج ۵۲۲ نانومتر برای اندازه‌گیری غلظت مالون دی‌آلدئید به عنوان شاخص اکسیداسیون چربی خوانده شد.

در سن ۲۸ روزگی دوره پرورش، یک پرندۀ از هر واحد آزمایشی با میانگین وزن همان واحد آزمایشی جهت تفکیک لاشه کشتار شد. پس از تفکیک لاشه اندام‌های لنفاوی: تیموس، بورس فابریسیوس و طحال، اندام‌های گوارشی از جمله: سنگدان، روده کوچک، روده کور، لوزالمعده، کبد و بخش‌های مختلف لاشه شامل: ماهیچه‌سینه، ران‌ها، قسمت پشت و گردن و بال‌ها و چربی حفره بطني جدا شده و توزیز گردید. همچنین طول قسمت‌های مختلف روده کوچک دئودنوم (از سنگدان تا ناحیه اتصال مجاري صفواوي-لوزالمعده)، ژرونوم (از ناحیه اتصال مجاري صفواوي-لوزالمعده تا زائده مکل)، ایلکوم (از زائده مکل تا محل اتصال ایلکوم به روده کور) اندازه‌گیری و بر حسب سانتی‌متر به ازای ۱۰۰ گرم وزن زنده محاسبه شد.

ریخت‌شناسی روده کوچک

به منظور بررسی ریخت‌شناسی ژرونوم جوجه‌ها در سن ۲۸ روزگی، به‌ازای هر تکرار یک جوجه با میانگین وزن همان واحد آزمایشی انتخاب و پس از کشتار، محتويات داخل بدن تخلیه و روده کوچک جدا شد. از نقطه میانی ژرونوم یک نمونه بافتی به ابعاد ۰/۵×۰/۵ سانتی‌متر تهیه شد و با محلول سالین ۰/۹٪ برای حذف بقاياي مواد غذائي شسته و در فرماليين ۱۰ درصد برای مطالعه بافت تثبيت شد. نمونه‌های بافتی سپس در دستگاه آماده‌سازی خودکار بافت^۴ قرار گرفتند و با عبور

1- Model Selectra E, Vitalab, Spain 2- Ziest Chem Diagnostic, Tehran, Iran 3- Thiobarbituric acid-reactive substances (TBARS)
4- Model KP110, Tehran, Iran 5- Model Leica RM 2145 6- Hematoxylin and Eosin
7- Model U- TV0.5 XC-2, Olympus corporation, BX41 8- Villi 9- Crypts of lieberkuhn

به گونه‌ای که ترکیبات حاصل از اکسیداسیون چربی‌ها از جمله آلدیدها، کتون‌ها، استرها و روغن‌های پلیمریزه ممکن است با کاهش اباقی چربی و مقدار انرژی جیره، در نهایت منتهی به کاهش وزن بدن شوند (۸). در پژوهش حاضر نیز به نظر می‌رسد یکی از دلایل کاهش اضافه وزن روزانه جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با تیمار کنترل منفی اثرات منفی یاد شده ناشی از اکسیداسیون چربی‌های غیراشباع بالای موجود در این جیره بر عملکرد جوجه‌ها باشد.

از طرفی تحقیقات نشان داد اثرات منفی اکسیداسیون چربی‌ها می‌تواند با افزودن آنتی‌اکسیدان‌های مصنوعی به جیره جوجه‌های گوشتی کاهش یابد، که دلیل آن ممانعت ترکیبات آنتی‌اکسیدانی از صدمات بیشتر به سایر اجزای جیره می‌باشد (۸). در تأیید نتایج فوق توارز و همکاران (۴۰) گزارش کردن مکمل کردن جیره حاوی روغن گیاهی سویا با ترکیبات آنتی‌اکسیدانی (اتوکسی‌کوئین و پروپیل‌گالات) باعث افزایش خوارک مصرفی و افزایش وزن جوجه‌های گوشتی شد، اما تأثیر معنی‌داری بر ضریب تبدیل غذایی آنها نداشت.

در پژوهش حاضر نیز احتمالاً بخشی از اثرات بهبود عملکرد جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با روغن کنجد را می‌توان به اثرات آنتی‌اکسیدانی موجود در لیگنان‌های روغن کنجد، در کاهش اثرات منفی اکسیداسیون چربی‌ها و در نتیجه مهار گونه‌های اکسیژن فعال توسط لیگنان‌های کنجد، که می‌تواند سلول‌های بدن را از صدمات رادیکال‌های آزاد محافظت کند (۲۳) ارتباط داد. از طرفی دیگر به نظر می‌رسد حفاظت چربی‌ها از اکسیداسیون بیشتر، با افزایش طول و سطح پرزاها بر مورفولوژی روده کوچک اثرگذار بوده و در نهایت منجر به بهبود عملکرد طیور شده باشد (۸).

صفات لاشه

نتایج ارائه شده در جدول ۴ نشان داد که اثر جایگزینی سطوح مختلف روغن کنجد به عنوان یک ماده خوارکی طبیعی حاوی ترکیبات مختلف آنتی‌اکسیدانی با بخشی از روغن خام ذرت در جیره جوجه‌های گوشتی بر درصد لاشه بدون پوست و طول دئودنوم جوجه‌ها معنی‌دار بود ($P < 0.05$). کمترین و بیشترین درصد لاشه ($58/83$ در برابر $62/98$) به ترتیب در جوجه‌های تغذیه شده با تیمارهای کنترل منفی و مثبت مشاهده شد. میانگین درصد لاشه جوجه‌های تغذیه شده با جیره‌های حاوی سطوح 50 و 100 درصد جایگزینی روغن خام ذرت با روغن کنجد، از نظر عددی بین دو تیمار کنترل منفی و مثبت قرار گرفتند.

همبستگی مثبت معنی‌داری بین محتوی فتل کل موجود در نمونه روغن‌های گیاهی مختلف و میزان مهار رادیکال آزاد استاندارد DPPH مشاهده کردند.

پارامترهای عملکردی و خصوصیات لاشه

اثرات آنتی‌اکسیدانی روغن کنجد بر پارامترهای عملکردی در جدول ۳ نشان داده شده است. خوارک مصرفی پرنده‌گان تحت تأثیر افزودن منابع مختلف آنتی‌اکسیدانی به جیره قرار نگرفت. جوجه‌های تغذیه شده با جیره‌های حاوی سطوح 50 و 100 درصد جایگزینی روغن خام ذرت با روغن کنجد و نیز جیره کنترل مثبت در مقایسه با جیره کنترل منفی افزایش وزن بالاتری را نشان دادند، به طوری که بیشترین افزایش وزن $51/49$ گرم/پرنده/روز) را جوجه‌های تغذیه شده با 50 درصد جایگزینی روغن خام ذرت با روغن کنجد و کمترین افزایش وزن $46/15$ گرم/پرنده/روز) را جوجه‌های تغذیه شده با جیره کنترل منفی نشان دادند ($P < 0.05$).

اختلاف معنی‌داری بین ضریب تبدیل غذایی و شاخص تولیدی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های حاوی روغن کنجد و تیمارهای کنترل مشاهده نشد. میانگین درصد تلفات پرنده‌گان در تیمارهای آزمایشی در کل دوره آزمایشی تفاوت معنی‌داری نشان نداد و به طور متوسط برابر با 3 درصد در کل دوره (7 تا 28 روزگی) بود.

این مشاهدات با نتایج الدراجی و همکاران (۳) همخوانی دارد. آنها نیز با جایگزینی سطوح مختلف روغن گیاهی هیدروژنه با روغن و یا دانه کنجد در جیره بلدرچین تخم‌گذار در مقایسه با جیره کنترل، تأثیر معنی‌داری بر مقدار خوارک مصرفی پرنده‌ها در طول دوره آزمایش مشاهده نکردند. اما صفات عملکردی شامل درصد تولید تخم، گرم تخم تولیدی روزانه و ضریب تبدیل غذایی بهبود یافت. در تحقیق نجل و همکاران (۲۶) نیز میانگین خوارک مصرفی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های حاوی 5 و 10 درصد دانه کنجد خام و برشته در سن 1 تا 4 هفتگی اختلاف معنی‌داری نشان نداد. این نتایج با یافته‌های پژوهش حاضر در مورد اثر جایگزینی روغن خام ذرت با روغن کنجد در جیره جوجه‌های گوشتی بر بهبود عملکرد پرورشی مطابقت دارد. همچنین محققان ثابت کردند که با جایگزینی چربی‌های حیوانی با روغن‌های گیاهی در تغذیه طیور میزان اسیدهای چرب غیراشباع چندگانه^۱ (PUFA) در جیره و محصولات تولیدی (لاشه و تخم) افزایش می‌یابد. این امر علی‌رغم اثرات مثبت بر سلامت محصولات تولیدی، می‌تواند منجر به افزایش تخریب اکسیداتیو و اکسیداسیون این چربی‌ها شود (۳۰، ۳۱).

جدول ۳- تاثیر آنتی اکسیدانی روغن کنجد و آلفا-توکوفریل استات در جیره بر مصرف خوارک، افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی و شاخص تولیدی در سن ۷ تا ۲۸ روزگی

P-value	SEM	تیمارهای غذایی				صفات مورد بررسی
		%۱۰۰ روغن کنجد	%۵۰ روغن کنجد	جایگزینی روغن کنجد	جایگزینی روغن کنجد	
۰/۰۰	۱/۱۹	۷۶/۸۵	۷۴/۷۰	۷۵/۷۳	۷۳/۴۳	خوارک مصرفی (گرم/ پرنده/ روز)
۰/۰۲	۰/۷۷	۵۰/۴۹ ^b	۵۱/۴۹ ^a	۴۷/۹۰ ^{ab}	۴۶/۱۵ ^b	افزایش وزن (گرم/ پرنده/ روز)
۰/۰۰	۰/۰۳	۱/۵۳	۱/۴۶	۱/۵۹	۱/۶۰	ضریب تبدیل غذایی
۰/۱۹	۱۲/۹۰	۳۶۸/۸	۳۹۵/۴	۳۲۵/۶	۳۱۸/۸	شاخص تولید
میانگین‌های هر ردیف که دارای حرف مشترک نمی‌باشد دارای اختلاف معنی‌دار هستند ($P < 0/05$)						

جدول ۴- تاثیر آنتی اکسیدانی روغن کنجد و آلفا-توکوفریل استات در جیره بر خصوصیات لاشه و طول سن بخش‌های مختلف روده کوچک در سن ۲۸ روزگی (%)

P-value	SEM	تیمارهای غذایی				صفات لاشه
		%۱۰۰ روغن کنجد	%۵۰ روغن کنجد	جایگزینی روغن کنجد	آلفا- توکوفریل استات	
۰/۰۵	۰/۵۹	۶۱/۰۳ ^{ab}	۶۰/۵۸ ^{ab}	۶۲/۹۸ ^a	۵۸/۸۳ ^b	لاشه خالی بدون پوست
۰/۰۷	۰/۳۱	۲۱/۳۵ ^{ab}	۲۱/۰ ^{ab}	۲۲/۴۵ ^a	۲۰/۱۹ ^b	سینه
۰/۰۶	۰/۱۷	۱۸/۸۲ ^{ab}	۱۸/۸۴ ^{ab}	۱۹/۷۷ ^a	۱۸/۵۸ ^b	ران
۰/۶۹	۰/۳۷	۱۸/۱۲	۱۷/۴۶	۱۷/۶۵	۱۷/۲۰	پشت و گردن
۰/۱۸	۰/۱۰	۳/۲۱	۳/۵۷	۳/۵۹	۳/۵۱	سنگدان
۰/۴۶	۰/۰۶	۰/۹۳	۰/۸۸	۱/۱۲	۰/۹۸	چربی حفره بطنی
۰/۶۷	۰/۰۵	۰/۶۷	۰/۷۹	۰/۸۹	۰/۷۸	سکوم
۰/۰۹	۰/۰۳	۰/۷۳	۰/۶۵	۰/۷۸	۰/۸۰	قلب
۰/۲۹	۰/۰۰۸	۰/۳۲	۰/۳۰	۰/۳۰	۰/۳۲	لوزالمعده
۰/۵۹	۰/۱۴	۲/۴۴	۲/۳۵	۲/۳۲	۲/۵۷	کبد
۰/۸۰	۰/۰۴	۰/۸۸	۰/۹۱	۰/۹۵	۰/۸۵	تیموس
۰/۸۳	۰/۰۲	۰/۲۰	۰/۲۴	۰/۲۷	۰/۲۲	بوس
۰/۴۴	۰/۰۱	۰/۱۱	۰/۱۱	۰/۱۱	۰/۱۲	طحال
میانگین‌های هر ردیف که دارای حرف مشترک نمی‌باشد دارای اختلاف معنی‌دار هستند ($P < 0/05$)						
۰/۰۴	۰/۱۱	۲/۲۳ ^{ab}	۲/۲۹ ^b	۲/۳۱ ^{ab}	۳/۰۶ ^a	طول نسبی دئونوم
۰/۷۶	۰/۱۹	۵/۳۱	۴/۹۲	۴/۸۴	۵/۳۵	طول نسبی ژرونوم
۰/۶۱	۰/۲	۴/۸۴	۵/۰۶	۴/۸۳	۵/۵۴	طول نسبی ایلیوم
میانگین‌های هر ردیف که دارای حرف مشترک نمی‌باشد دارای اختلاف معنی‌دار هستند ($P < 0/05$)						

گوشته بیانگر اثرات مثبت آنها بر صفات لاشه جوجه‌ها بود. از جمله در تحقیق یوسیلیگ و همکاران (۴۳) درصد لاشه جوجه‌های گوشته تغذیه شده با انسان‌روغنی گیاه رزماری در مقایسه با گروه کنترل منفی (حاوی سطح پایین ۵۰ میلی‌گرم در کیلوگرم آلفا-توکوفریل استات) افزایش معنی‌داری نشان داد ($P < 0/05$). در تحقیقی دیگر استفاده از مخلوط انسان‌روغنی گیاه میخک و دارچین موجب افزایش معنی‌دار درصد سینه در مقایسه با گروه کنترل گردید ($P < 0/05$). بهبود سلامتی دستگاه گوارش و افزایش مقاومت جوجه‌ها در مقابل تنفس‌های محیطی متفاوت و افزایش جذب مواد غذایی منجر به رشد و افزایش درصد لاشه به‌ویژه درصد سینه شد (۱۹). این نتایج با یافته‌های پژوهش حاضر در مورد تأثیر مثبت افزودن

گرچه درصد سینه و ران پرندگان تحت تأثیر افزودن منابع مختلف آنتی اکسیدانی به جیره قرار نگرفت. اما کمترین و بیشترین درصد سینه ۲۰/۱۹ در برابر ۲۲/۴۵ (۲۲/۴۵) و ران ۱۸/۵۸ (۱۸/۷۷) را به ترتیب جوجه‌های تغذیه شده با تیمارهای کنترل منفی و مثبت داشتند ($P = 0/07$).

در تحقیق نجیدا و همکاران (۲۷) نیز درصد لاشه خرگوش‌های تغذیه شده با سطوح مختلف دانه کنجد در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت. این در حالی است که اختلاف معنی‌داری بین درصد قلب، کبد و کلیه تیمارهای تغذیه شده با دانه کنجد و تیمار شاهد مشاهده نشد. همچنین نتیجه برخی از تحقیقات انجام شده در مورد استفاده از ترکیبات و انسان‌های روغنی گیاهی دارای خاصیت آنتی اکسیدانی در جیره جوجه‌های

خصوصیات ریخت‌شناسی روده مشاهده نشد. اما گزارشات متعددی در مورد اثر سایر افزودنی‌های گیاهی با خصوصیات آنتی‌اکسیدانی و یا آنتی‌باتکتیال در جیره بر بافت شناسی روده وجود دارد. از جمله حسن پور و همکاران (۱۶) افزایش طول و سطح پرز و ضخامت لایه ماهیچه‌ای در بخش‌های دئونوم و ژئونوم روده کوچک جوجه‌های گوشته‌ی تغذیه شده با ۲ و ۴ درصد چای سبز را گزارش کردند که می‌تواند بینگر اثرات آنتی‌اکسیدانی چای سبز بر مورفولوژی روده و احتمالاً مربوط به اثر این عصاره گیاهی برعلیه سرگ سلولی و افزایش رشد سلول‌های اپیتلیال باشد. دکانسکی و همکاران (۷) نیز گزارش کردند که خصوصیات آنتی‌اکسیدانی ترکیبات مختلف موجود در عصاره برگ زیتون در مهار رادیکال‌های آزاد و حفاظت از پراکسیداسیون چربی، با افزایش فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی سوپراکسیدیسموتاز و کاتالاز، منجر به تنظیم تعادل اکسیداتیو و حفاظت از بافت مخاط معده موش‌های صحرایی تحت استرس گردید. علاوه بر آن فوایدی از قبیل اثرات مفید بر قابلیت هضم و جذب مواد مغذی و ریخت‌شناسی روده و تثبیت جمعیت میکروبی روده توسط ویندیچ و همکاران (۴۲) نیز گزارش شده است. این نتایج با یافته‌های پژوهش حاضر در مورد اثرات مثبت جایگزینی روغن خام ذرت با روغن کنجد در جیره جوجه‌های گوشته‌ی بر ریخت‌شناسی ژئونوم مطابقت دارد.

فراسنجه‌های خونی

تأثیر جایگزینی روغن خام ذرت جیره با روغن کنجد حاوی ترکیبات آنتی‌اکسیدانی طبیعی بر فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشته‌ی در سن ۲۸ روزگی قبل از کشتار در جدول ۶ نشان داده شده است. جایگزینی ۵۰ درصد روغن ذرت جیره با روغن کنجد کمترین و جیره فاقد روغن ذرت جیره با روغن کنجد مثبت (کنترل منفی) بیشترین مقدار گللوکز و تری‌گلیسرید سرم خون در جوجه‌های گوشته‌ی تغذیه شده با این تیمارها را نشان داد (P=۰/۰۸). با جایگزینی روغن ذرت در جیره با روغن کنجد تمایل به کاهش در مقدار کلسترول سرم خون جوجه‌های گوشته‌ی مشاهده شد (P=۰/۰۹). کمترین و بیشترین غلظت مالون دی‌آلدئید به ترتیب ۲/۶۳ (P=۰/۰۵) نانومول بر میلی‌لیتر) در سرم خون جوجه‌های تغذیه شده با جیره‌های کنترل مثبت و منفی مشاهده شد.

غلظت مالون دی‌آلدئید سرم خون جوجه‌هایی که ۵۰ و ۱۰۰ درصد روغن خام ذرت در جیره آنها با روغن کنجد جایگزین شد، از نظر عددی بین دو تیمار کنترل مشبت و منفی قرار گرفتند. استفاده از روغن کنجد در جیره تأثیر معنی‌داری بر میزان پروتئین کل، آلبومین و

آلفا-توکوفریل استات و روغن کنجد به عنوان یک منبع گیاهی حاوی آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی در جیره بر درصد لاشه جوجه‌های گوشته مطابقت دارد. جایگزینی روغن خام ذرت با روغن کنجد و نیز استفاده از آلفا-توکوفریل استات به عنوان منابع آنتی‌اکسیدانی در جیره موجب کاهش معنی‌دار طول نسبی دئونوم در مقایسه با جوجه‌های تغذیه شده با جیره فاقد روغن کنجد و آلفا-توکوفریل استات (کنترل منفی) گردید (P<۰/۰۵). به طور مشابه ساریکا و همکاران (۳۴) نیز کاهش معنی‌دار طول روده در جیره‌های مکمل شده با آنتی‌بیوتیک و یا عصاره آویشن به عنوان یک افزودنی خوارکی گیاهی را گزارش کردند (P<۰/۰۵).

ریخت‌شناسی روده کوچک

مطابق نتایج جدول ۵، استفاده از روغن کنجد در جیره جوجه‌های گوشته به عنوان یک منبع ترکیبات آنتی‌اکسیدانی گیاهی باعث افزایش معنی‌دار طول پرز، عرض پرز، سطح پرز و ضخامت لایه موکوسی و زیرموکوسی در مقایسه با جیره کنترل منفی شد (P<۰/۰۵). گرچه عمق کریپت تحت تأثیر افزودن منابع مختلف آنتی‌اکسیدانی به جیره قرار نگرفت (P=۰/۰۶). ولجیک و همکاران (۴۱) گزارش کردند مصرف ناکافی آنتی‌اکسیدان‌ها، مصرف بالای پراکسیدان‌ها و یا هر دو ممکن است منجر به بروز استرس اکسیداتیو در پرنده شوند. در این شرایط عوامل استرس‌زا با ایجاد آشفتگی در جمعیت میکروب‌های همزیست روده، کاهش مکانیزم‌های حفاظتی ذاتی و افزایش پتانسیل عوامل بیماری‌زا ای نظیر سالمونلا برای اتصال به بافت پوششی را موجب می‌شوند، که نهایتاً منجر به کاهش سلامت بافت پوششی روده خواهد شد. تحقیقات انجام شده توسط بورخوردل و همکاران (۵) در مورد تأثیر عوامل استرس‌زا تغذیه‌ای بر ریخت‌شناسی روده نیز نشان‌دهنده اثرات مخرب این استرس‌ها بر کاهش ارتفاع بافت پوششی روده بود، که منجر به کاهش ارتفاع پرزها و عمق کریپت‌ها گردید. اما هسو و همکاران (۱۸) گزارش کردند که روغن کنجد به نحو مؤثری توانایی کاهش تحریک استرس اکسیداتیو به وسیله اندوتوكسین لیپوپلی‌ساکاریدها در موش‌ها را دارا می‌باشد. اگرچه مکانیزم دقیقی که استفاده از روغن کنجد در جیره منجر به کاهش استرس اکسیداتیو می‌شود به خوبی روشن نیست، اما باور قوی بر این است که اثرات حفاظتی ناشی از حضور لیگنان‌ها (سیزامین، سیزامول و سیزامولین) و ویتامین E در این رابطه موثر بوده است (۱).

بر اساس بررسی‌های ما گزارشی در مورد اثر جایگزینی روغن کنجد در جیره انواع طیور بر

گلوبولین نداشت. ساهین و همکاران (۳۱) نیز کاهش معنی‌دار غلظت گلوکز و تری‌گلیسرید سرم خون در ۲۵۰ جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره پایه حاوی (P<۰/۰۵) که با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد.

جدول ۵- تاثیر آنتی‌اکسیدانی روغن کنجد و آلفا-توکوفریل استات در جیره بر ریخت‌شناسی روده کوچک جوجه‌های گوشتی در سن ۲۸ روزگی

P-value	SEM	تیمارهای غذایی				صفات مورد بررسی
		%۱۰۰ جایگزینی روغن جیره با روغن کنجد	%۵۰ جایگزینی روغن جیره با روغن کنجد	۲۵۰ mg/kg توکوفریل استات (کنترل مثبت)	چیره پایه (کنترل منفی)	
μm						
۰/۰۱	۲۴/۷	۱۵۴۸ ^a	۱۳۵۲ ^b	۱۳۹۴ ^b	۱۰۹۷ ^c	طول پرز
۰/۰۴	۱/۵۹	۱۱۱/۶ ^a	۱۰۷/۶ ^{ab}	۱۰۰/۳ ^{bc}	۹۵/۰ ^c	عرض پرز
۰/۰۶	۱۰/۶۳	۲۹۶/۸ ^a	۳۰۴/۴ ^a	۲۹۴/۴ ^a	۲۲۶/۰ ^b	عمق کریپت
۰/۰۳	۱/۴۷	۴۴/۰ ^{ab}	۵۱/۰ ^a	۴۰/۰ ^b	۳۷/۳ ^b	ضخامت اپیتاپیوم
۰/۸۱	۱۹/۱۲	۳۷۸/۰	۳۸۷/۲	۳۹۷/۴	۳۴۶/۴	ضخامت لایه ماهیچه‌ای
۰/۰۱	۲۷/۷۸	۱۸۴۵ ^a	۱۶۵۷ ^b	۱۶۸۹ ^{ab}	۱۳۳۳ ^c	ضخامت لایه موکوسی و زیر موکوسی
μm ²						
۰/۰۱	۱۰۳۸۳	۵۴۱۹۳۷ ^a	۴۵۶۲۱۳ ^b	۴۳۹۲۵۰ ^b	۳۲۲۶۹۶ ^c	سطح پرز
۰/۵۹	۰/۱۶	۵/۲۴	۴/۶۰	۴/۸۴	۴/۸۸	نسبت طول پرز به عمق کریپت

میانگین‌های هر ردیف که دارای حرف مشترک نمی‌باشند دارای اختلاف معنی‌دار هستند (P<۰/۰۵).

جدول ۶- اثرات آنتی‌اکسیدانی روغن کنجد و آلفا-توکوفریل استات در جیره بر فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی در سن ۲۸ روزگی

P-value	SEM	تیمارهای غذایی				صفات مورد بررسی
		%۱۰۰ جایگزینی روغن جیره با روغن کنجد	%۵۰ جایگزینی روغن جیره با روغن کنجد	۲۵۰ mg/kg توکوفریل استات (کنترل مثبت)	چیره پایه (کنترل منفی)	
mg/dl						
۰/۰۸	۵/۱۹	۱۲۸/۵۰ ^{ab}	۱۰۲/۷۵ ^b	۱۳۵/۷۵ ^{ab}	۱۴۳/۲۵ ^a	گلوکز
۰/۰۹	۱/۳۶	۱۲۲/۵۰ ^b	۱۲۷/۲۵ ^{ab}	۱۳۲/۵۰ ^a	۱۳۱/۲۵ ^{ab}	کلسترول
۰/۰۶	۰/۷۵	۴۸/۲۵ ^{ab}	۴۵/۰۰ ^b	۴۹/۵۰ ^{ab}	۵۱/۲۵ ^a	تری‌گلیسرید
g/dl						
۰/۷۶	۰/۰۸	۳/۴۳	۳/۴۳	۳/۵۵	۳/۳۰	پروتئین کل
۰/۲۲	۰/۰۴	۱/۶۰	۱/۶۸	۱/۸۳	۱/۸۰	آلبومین
۰/۴۱	۰/۰۷	۱/۸۳	۱/۷۵	۱/۷۳	۱/۵۰	گلوبولین
nmol/ml						
۰/۰۶	۰/۰۵	۲/۹۳ ^{ab}	۲/۷۸ ^{ab}	۲/۶۳ ^b	۳/۰۵ ^a	مالون دی آلدیید

میانگین‌های هر ردیف که دارای حرف مشترک نمی‌باشند دارای اختلاف معنی‌دار هستند (P<۰/۰۵).

قابل مقایسه دو نوع روغن کنجد و ذرت، تمایل به کاهش سطوح کلسترول سرم خون در مosh صحرایی تغذیه شده با روغن کنجد در مقایسه با روغن ذرت وجود داشت (۲۱). در تحقیق هیروس و همکاران (۱۷) نیز کلسترول سرم و کبد در مosh‌ها با تغذیه جیره حاوی ۰/۵ درصد سیزامین کاهش یافت (P<۰/۰۵)، که حداقل بخشی از فعالیت هیپوکلسترتمیک درمورد سیزامین می‌تواند بوسیله ممانعت از جذب کلسترول، درنتیجه بازتاب کاهش معنی‌دار در میزان کلسترول جریان لف صدری و یک کاهش معنی‌دار در میزان فعالیت ۳-هیدروکسی-۳-متیل گلوتاریل کوانزیم A (دوکتاز میکروزوم کبد (آنزیم محدود کننده سرعت بیوسنتر کلسترول) توضیح داده شود. از طرفی اسیداولئیک

گرچه در مورد اثر ترکیبات آنتی‌اکسیدانی روغن کنجد در جیره بر میزان کلسترول، سایر لیپیدهای سرمی و پارامترهای خونی جوجه‌های گوشتی در طیور تاکنون گزارشی ارائه نشده است. اما تحقیقات زیادی در این مورد روی سایر حیوانات آزمایشگاهی انجام شده است. در تحقیق نجیدا و همکاران (۲۷) با افزودن سطوح ۴، ۸ و ۱۲ درصد دانه کنجد در جیره خرگوش‌ها تأثیر معنی‌داری در میزان آلبومین و پروتئین تام سرم خون مشاهده نشد. در حالی که مقادیر به دست آمده برای آلبومین و پروتئین تام در حد نرمال بود، که مشخص کننده کفایت تغذیه‌ای پروتئین جیره می‌باشد. نتایج این تحقیق با یافته‌های پروتئین تام در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره پایه مطابقت داشت. مشاهدات نشان داد که به رغم ترکیب اسیدهای چرب

دیابتی روغن کنجد در انسان، موش صحرایی و خرگوش انجام شده است. اما تاکنون گزارشی از تأثیر مصرف روغن کنجد بر سطح چربی و قند خون جوجه‌های گوشتی ارائه نشده است. نتایج تحقیق رامش و همکاران (۲۹) نیز تأیید کننده کاهش معنی‌دار سطح قند خون با مصرف روغن کنجد در موش‌های صحرایی دیابتی (از ۳۲۲/۶۱ به ۲۲۲/۰۲) و موش‌های سالم (از ۸۸/۰۹ به ۷۶/۱۸) میلی‌گرم بر دسی لیتر سرم بود ($P < 0.05$). محققین استفاده از رژیم‌های خوارکی حاوی اسیدهای چرب با یک پیوند دوگانه با مقدار زیاد را دلیل کاهش سطح گلوکز پلاسمای مدانند و با توجه به آن که روغن کنجد حاوی ۴۰ درصد اسیدهای چرب با یک پیوند دوگانه می‌باشد، بنابراین استفاده از آن در جیره ممکن است یکی از فاکتورهای موثر در کاهش گلوکز پلاسما باشد (۲۹). این نتایج با یافته‌های پژوهش حاضر درمورد تأثیر کاهندگی گلوکز سرم خون جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف روغن کنجد مطابقت داشت. در پژوهش حاضر غلظت مالون دی‌آلدئید سرم خون جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با تیمارهای آزمایشی حاوی روغن کنجد در مقایسه با تیمار کنترل منفی تمایل به کاهش داشت ($P = 0.06$). میزان مالون دی‌آلدئید تولیدی حاصل از پراکسیداسیون چربی سلولی مدهاست که به عنوان شاخص ترشیدگی اکسیداتیو در نظر گرفته می‌شود. محققان گزارش کردند با استفاده از ترکیبات آنتی‌اکسیدانی مختلف از جمله آلفا-توکوفریل استات در جیره می‌توان تا حد زیادی بر اثرات منفی اکسیداسیون چربی‌ها غلبه کرد (۴۳، ۴۱). مشابه نتایج پژوهش حاضر، گوانی و همکاران (۱۲) نیز با افزودن ۲۰۰ میلی‌گرم در کیلوگرم آلفا-توکوفریل استات و یا سطوح ۵، ۱۵ و ۳۰ گرم در کیلوگرم تفاله‌انگور به عنوان منبع پلی‌فنل‌ها با طرفیت آنتی‌اکسیدانی قوی در جیره جوجه‌های گوشتی کاهش معنی‌دار میزان مالون دی‌آلدئید در بافت سینه و ران جوجه‌ها را در مقایسه با جیره کنترل مشاهده کردند (۲۹) ($P < 0.05$). همچنین در تحقیق رامش و همکاران (۲۹) مقدار مالون دی‌آلدئید پلاسمای در موش‌های صحرایی سالم و دیابتی تغذیه شده با روغن کنجد در مقایسه با گروه‌های کنترل کاهش یافت، اما این کاهش تنها در موش‌های دیابتی در مقایسه با گروه کنترل معنی‌دار بود ($P < 0.05$). همچنین کاهش معنی‌داری در میزان مالون دی‌آلدئید پلاسمای خون افراد بالغ با فشار خون بالا با مصرف روزانه ۳۵ گرم روغن کنجد به مدت ۴۵ روز گزارش شد (۳۳). سوتاج و همکاران (۳۹) گزارش کردند سیزامین به عنوان لیگنان موجود در روغن کنجد می‌تواند پراکسیداسیون چربی در موش‌ها را کاهش دهد. از طرفی سیزامین و سیزامولین اثر آنتی‌اکسیدانی

موجود در روغن کنجد نیز با افزایش لیپوپروتئین با دانسیته بالا، باعث جذب و انتقال هرچه بیشتر کلسترول خون می‌شود (۱۳). همچنین لستین موجود در روغن کنجد می‌تواند با تحریک فعالیت‌های آنزیمی کلسترول استراز و لیپوپروتئین لیپاز و مهار تری‌گلیسرید سنتراز در کبد، موجب کاهش کلسترول شود (۱۱). از آن‌جا که جذب چربی‌ها به محلولیت میسلی لیپیدهای داخل لومنی بستگی دارد. روغن کنجد محلولیت میسلی را مختلط نموده و باعث تغییر در زیست‌فرآهمی چربی می‌شود، در نتیجه انتقال میسل‌های حاوی ذرات چربی و آگزوسیتوز لیپیدها به لنف و خون تقلیل یافته که سبب کاهش سطح چربی‌های خون می‌شود (۳۶). نتایج به دست آمده از آزمایشات فوق با یافته‌های پژوهش حاضر در مورد کاهش سطح کلسترول سرم خون در جوجه‌های گوشتی تعذیه شده با سطوح مختلف روغن کنجد مطابقت دارد. در پژوهش حاضر جایگزینی روغن خام ذرت با روغن کنجد منجر به کاهش مقدار تری‌گلیسرید سرم خون در جوجه‌های گوشتی شد. نتایج تحقیقات سیراتو-یاسوموتو و همکاران (۳۸) نیز بیانگر کاهش غلظت تری‌گلیسرید سرم در موش‌های صحرایی تعذیه شده با جیره حاوی دانه کنجد بود. این محققین پیشنهاد کردند که تعذیه دانه کنجد ممکن است اثر کاهش تری‌گلیسرید را از طریق افزایش اکسیداسیون اسید‌چرب و کاهش بیوسنتز اسید‌چرب در کبد اعمال کند. کاشهای و همکاران (۲۲) بیان کردند که سیزامین تا حد زیادی نرخ اکسیداسیون اسید‌چرب کبدی را افزایش می‌دهد. فعالیت و بیان‌زن آنزیم‌های اکسیداسیون اسید‌چرب کبدی (آسیل کوانزیم A اکسیداز، کارتنتین پالمیتویل ترانس‌فاراز، ۳-هیدروکسی آسیل-کوازنزیم A دی هیدروژناز و ۳-کتوآسیل-کوازنزیم A تیولاز) احتمالاً از طریق فعل سازی یک رسپتور کلیدی در گیر در این پروسه به نام پروکسیزوم برولیفراتور-اکتیواتور رسپتور آلفا^۱ صورت می‌گیرد. در مقابل سیزامین موجود در دانه کنجد فعالیت و بیان‌زن آنزیم‌های در گیر در سنتز اسیدهای چرب از جمله: FA-سنتراز، پیروات کیناز و آنزیم‌های لیپوژنیک آنها را کاهش داده و موجب کاهش سنتز اسید‌چرب کبدی می‌شود. این نتایج بیانگر نحوه عملکرد روغن کنجد در کاهش سطح تری‌گلیسرید سرم بوده و با یافته‌های پژوهش حاضر مطابقت دارد. در پژوهش حاضر جایگزینی روغن خام ذرت در دو سطح ۵۰ و ۱۰۰ درصد با روغن کنجد حاوی ترکیبات آنتی‌اکسیدانی طبیعی در مقایسه با تیمار کنترل منفی منجر به کاهش مقدار گلوکز سرم خون در جوجه‌های گوشتی شد. گرچه مطالعات زیادی در مورد نقش ضد

جایگرین کردن روغن کنجد بهدلیل داشتن ترکیبات آنتی اکسیدانی قوی در جیره جوجه‌های گوشته همانند استفاده از آلفا-توکوفریل استات می‌تواند اثرات مثبتی بر ش در هفت عملکرد رشدی، فراسنجه‌های خونی و سلامت دستگاه گواردهای در هفته‌های نخست دوره پرورش داشته باشد.

ویتامین E را تقویت کرده و خودشان نیز به عنوان آنتی اکسیدان عمل می‌کنند، که به نوبه خود می‌توانند پراکسیداسیون چربی‌ها را کاهش دهند. سیزامین همچنین با ممانعت از کاتابولیسم گاما-توکوفرول قابلیت زیست فراهمی آن را در مطالعات انسانی و حیوانی افزایش می‌دهد (۲۴).

منابع

- Ahmad, S., S. Yousuf, T. Ishrat, M.B. Khan, K. Bhatia, I.S. Fazli, J.S. Khan, N.H. Ansari and F. Islam. 2006. Effect of dietary sesame oil as antioxidant on brain hippocampus of rat in focal cerebral ischemia. *Life Science*. 79: 1921-1928.
- Ajum, M.I., I.H. Mirza, A.G. Khan and A. Azim. 2004. Effect of fresh versus oxidized soybean oil on growth performance, organ weights and meat quality of broiler chicks. *Pakistan Veterinary Journal*. 24: 173-178.
- Al-Daraji, H.J., H.A. Al-Mashadani and W.K. Al-Hayani. 2010. Effect of feeding diets containing sesame oil or seeds on productive and reproductive performance of laying quail. *Al-Anbar Journal of Veterinary Sciences*. 1: 56-67.
- Bendich, A. and P.E. Brock. 1996. Rationale for the introduction of long chain polyunsaturated fatty acid and for concomitant increase in the level of vitamin E in infant formulas. *International Journal for Vitamin and Nutrition Research*. 67: 13-31.
- Burkholder, K.M., K.L. Thompson, M.E. Einstein, T.J. Applegate and J.A. Patterson. 2008. Influence of stressors on normal intestinal microbiota, intestinal morphology, and susceptibility to salmonella enteritidis colonization in broilers. *Poultry Science*. 87: 1734-1741.
- Capannesi, C., I. Palchetti, M. Mascini and A. Parenti. 2000. Electrochemical sensor and biosensor for polyphenols detection in olive oils. *Food Chemistry*. 71: 553-562.
- Dekanski, D., S. Risti and D.M. Mitrovi . 2009. Antioxidant effect of dry olive (*Olea europaea L.*) leaf extracton ethanol-induced gastric lesions in rats. *Mediterr. Journal of Nutrition and Metabolism*. 2: 205-211.
- Dibner, J.J., M.L. Kitchell, C.A. Atwell and F.J. Ivey. 1996. The effect of dietary ingredients and age on the microscopic structure of the gastrointestinal tract in poultry. *The Journal of Applied Poultry Research*. 5: 70-77.
- Draper, H.H. and M. Hadley. 1990. MDA determination as index of lipid peroxidation. *Methods Enzymol*. 186: 421-430.
- Durape, N.M. 2007. Phytochemicals improve semen quality and fertility. *World Poultry magazine*. 23: 18-20.
- Galeone, F.S., F. Salvadorini and E. Pagliai. 1978. Effects of soybean polyunsaturated phosphatidylcholine (Lipostabil) on hyperlipoproteinemia. *Current Therapeutic Research*. 24: 299-305.
- Goni, I., A. Brenes, C. Centeno, A. Viveros, F. Saura-Calixto, A. Rebole, I. Arija and R. Estevez. 2007. Effect of dietary grape pomace and vitamin E on growth performance, nutrient digestibility and susceptibility to meat lipid oxidation in chickens. *Poultry Science*. 86: 508-516.
- Grundy, S.M. and M.A. Denke. 1990. Dietary influences on serum lipids and Lipoproteins. *Journal of Lipid Research*. 31: 1149-72.
- Haak, L., K. Raes, S. Van Dyck and S. De Smet. 2008. Effect of dietary rosemary and -tocopherol acetate on the oxidative stability of raw and cooked pork following oxidized linseed oil administration. *Meat Science*. 78: 239-247.
- Hassanien, M.M. and A.G. Abdel-Razek. 2012. Improving the stability of edible oils by blending with roasted sesame seed oil as a source of natural antioxidants. *The Journal of Applied Poultry Research*. 8: 4074-4083.
- Hassanpour, H., A.K. Zamani Moghaddam, A. Yazdani and M. Cheraghchi Bashi. 2010. Evaluation of intestinal morphology and nitric oxide metabolites in broiler chickens supplemented by green tea. *Comparative Clinical Pathology*. 19: 43-47.
- Hirose, N., T. Inoue, K. Nishihara, M. Sugano, K. Akimoto, S. Shimizu and S. Yamada. 1991. Inhibition of cholesterol absorption and synthesis in rats by sesamin. *Journal of Lipid Research*. 32: 629-638.
- Hsu, D.Z. and M.Y. Liu. 2002. Sesame oil attenuates multiple organ failure and increases survival rate during endotoxemia in rats. *Critical Care Medicine*. 30: 1859-1862.
- Isabel, B. and Y. Santos. 2009. Effects of dietary organic acids and essential oils on growth performance and carcass characteristics of broiler chickens. *The Journal of Applied Poultry Research*. 18: 472-476.
- Kanu, P.J., J.Z. Bahsoon, J.B. Kanu and J.B.A. Kandeh. 2010. Nutraceutical importance of sesame seed and oil: a review of the contribution of their lignans. *Sierra Leone Journal of Biomedical Research*. 2: 4-16.
- Koh, E.T. 1987. Comparison of hypolipemic effects of corn oil, sesame oil, and soybean oil in rats. *Nutrition Reports International*. 36: 903-917.

22. Kushiro, M., T. Masaoka, S. Hageshita, Y. Takahashi, T. Ide and M. Sugano. 2002. Comparative effect of sesamin and episesamin on the activity and gene expression of enzymes in fatty acid oxidation and synthesis in rat liver. *Journal of Nutritional Biochemistry*. 13: 289-295.
23. Lee, J., Y. Lee and E. Choe. 2008. Effects of sesamol, sesamin and sesamolin extracted from roasted sesame oil on the thermal Eunok oxidation of methyl linoleate. *LWT - Food Science and Technology*. 41: 1871-1875.
24. Miyahara, Y., H. Hibasami, H. Katsuzaki, K. Imai and T. Komiya. 2001. Sesamolin from sesame seed inhibits proliferation by inducing apoptosis in human lymphoid leukemia molt 4b cells. *International Journal of Molecular Medicine*. 7: 369-371.
25. Moure, A., J.M. Cruz, D. Franco, J.M. Dominquez, J. Sinerio, H. Dominquez and M.J. Numez. 2001. Natural antioxidants from residual sources- A review. *Food Chemistry*. 72: 145-171.
26. Ngele, G.T., E.O. Oyawoye and U.D. Doma. 2011. Performance of broiler chickens fed raw and toasted sesame seed (*Sesamum indicum*, L) as a source of methionine. *Continental Journal of Agricultural Science*. 5: 33-38.
27. Njidda, A.A. and C.E. Isidahomen. 2011. Hematological parameters and carcass characteristics of weanling rabbits fed sesame seed meal (*Sesamum indicum*) in a semi-arid region. *Pakistan Veterinary Journal*. 3: 35-39.
28. Pavlovski, Z., Z. Škrbi , M. Luki , V. Petri evi and S. Trenkovski. 2009. The effect of genotype and housing system on production results of fattening chickens. *Biotechnology in Animal Husbandry*. 25: 221-229.
29. Ramesh, B., R. Saravanan and K.V. Pugalendi. 2005. Influence of sesame oil on blood glucose, lipid peroxidation and antioxidants' status in streptozotocin diabetic rats. *Journal of Medicinal Food*. 8: 377-381.
30. Rey, A.I., C.J. Lopez-Bote, J.P. Kerry, P.B. Lynch, D.J. Buckley and P.A. Morrissey. 2004. Modification of lipid composition and oxidation in porcine muscle and muscle microsomes as affected by dietary supplementation of n-3 with either n-9 or n-6 fatty acids and -tocopheryl acetate. *Animal Feed Science and Technology*. 113: 223-238.
31. Sahin, N., K. Sahin and O. Kucuk. 2001. Effects of vitamin E and vitamin A supplementation on performance, thyroid status and serum concentrations of some metabolites and minerals in broilers reared under heat stress (32°C). *Vet. Med. Czec.* 46: 286-292.
32. Sakamoto, K., H. Hirose, A. Onizuka, M. Hayashi, N. Futamura, Y. Kawamura and T. Ezaki. 2000. Quantitative study of changes in intestinal morphology and mucus gel on total parenteral nutrition in rats. *Journal of Surgical Research*. 94: 99-106.
33. Sankar, D., M. Ramakrishna Rao, G. Sambandam and K.V. Pugalendil. 2006. Effect of sesame oil on diuretics or β -blockers in the modulation of blood pressure, anthropometry and lipid profile and redox status. *Yale Journal of Biology and Medicine*. 79: 19-26.
34. Sarica, S., A. Ciftci, E. Demir, K. Kilinc and Y. Yildirim. 2005. Use of an antibiotic growth promoter and two herbal natural feed additives with and without exogenous enzymes in wheat based broiler diets. *South African Journal of Animal Science*. 35: 61-72.
35. SAS Institute. 2008. SAS Stat User's Guide. Version 9.2 ed. SAS Inst. Inc., Cary, NC.
36. Satchithanandam, S., R. Chanderbhan, A.T. Kharroubi, R.J. Calvert, D. Klurfeld, S.A. Tepper and D. Kritchevsky. 1996. Effect of sesame oil on serum and liver lipid profiles in the rat. *International Journal for Vitamin and Nutrition Research*. 66: 386-92.
37. Siger, A., M. Nogala-Kaluka and E. Lampart-Szczapa. 2008. The content and antioxidant activity of phenolic compounds in cold-pressed plant oils. *Journal of Food Lipids*. 15: 137-149.
38. Sirato-Yasumoto, S., M. Katsuta, Y. Okuyama, Y. Takahashi and T. Ide. 2001. Effect of sesame seeds rich in sesamin and sesamolin on fatty acid oxidation in rat liver. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*. 49: 2647-2651.
39. Sontag, T.J. and R.S. Parker. 2002. Cytochrome P450 -hydroxylase pathway of tocopherol catabolism. *Biological Chemistry*. 277: 25290-25296.
40. Tavarez, M.A., D.D. Boler, K.N. Bess, J. Zhao, F. Yan, A.C. Dilger, F.K. McKeith and J. Killefer. 2011. Effect of antioxidant inclusion and oil quality on broiler performance, meat quality and lipid oxidation. *Poultry Science*. 90: 922-930.
41. Volj , M., T. Franki , A. Levart, M. Nemec and J. Salobir. 2011. Evaluation of different vitamin E recommendations and bioactivity of -tocopherol isomers in broiler nutrition by measuring oxidative stress in vivo and the oxidative stability of meat. *Poultry Science*. 90: 1478-1488.
42. Windisch, W., K. Schedle, C. Plitzner and A. Kroismayr. 2008. Use of phytogenic products as feed additives for swine and poultry. *Journal of Animal Science*. 86: E140-E148.
43. Yesilbag, D., M. Eren, H. Agel, A. Kovancikaya and F. Balci. 2011. Effects of dietary rosemary, rosemary volatile oil and vitamin E on broiler performance, meat quality and serum SOD activity. *British Poultry Science*. 4: 472-482.

Effect of Dietary Supplementation of Sesame (*Sesamum Indicum L.*) Oil and/or -Tocopheryl Acetate on Performance, Intestinal Morphology and Blood Metabolites in Male Broiler Chickens

Mohammad Javad Agah¹, Abolghasem Golian², Hassan Nassiri-moghaddam², Ahmad Reza Raji³, Asghar Zarban⁴ and Reza Farhosh²

1- Assistant Professor, Agriculture and Natural Resources Research Center of Fars Province
(Corresponding author: mjagah@yahoo.com)

2 and 3- Professor and Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad
4- Associate Professor, Birjand University of Medical Science

Received: May 20, 2013

Accepted: January 18, 2014

Abstract

This experiment was conducted to investigate the effects of dietary sesame oil contains natural antioxidant and/or -tocopheryl acetate on growth performance, blood metabolites and small intestinal morphology of male broilers. A total of 100 Ross male broilers with 7 days of age, were randomly divided into four dietary treatments. Each diet was randomly fed to five replicates of 5 chicks each. The treatments including: a corn soybean meal based diet with added crude corn oil and without feed additive supplementation (negative control diet, NC), a NC diet with 250 mg of -tocopheryl acetate/kg (positive control, PC) and two test diets, one with 50 and other with 100 percent of crude corn oil in NC diet replaced with sesame oil. Chicks fed with diet in which 50 percent of corn oil replaced with sesame oil, had the highest average daily gains ($P<0.05$). Sesame oil replacement in the diet had not any significant effect on feed intake and feed conversion ratios. Chicks fed with positive and negative control diets, had the highest and lowest dressing percentages, respectively ($P<0.05$). Replacing of sesame oil for corn oil in diet significantly increased the length, width and apical surface absorption as compared with those fed the negative control diet ($P<0.05$). Chickens fed diet containing 50 percent sesame oil had the lowest serum glucose and triglyceride concentrations ($P<0.05$). Using of sesame oil in diet like supplementation with -tocopheryl acetate could have positive effects on growth performance, blood metabolites concentrations and gastrointestinal health of young broiler chickens, due to its strong antioxidant compounds in first weeks of age.

Keywords: Sesame oil, Performance, Intestinal morphology, Blood metabolites, Broiler chicken