

گزارش علمی کوتاه

اولین گزارش زنبور Dolichomitus kriechbaumeri (Hymenoptera: Ichneumonidae) پارازیتوبید لارو سوسک شاخک‌بلند Cerambyx dux در ایران

حبيب عباسی‌پور^۱، غلام‌حسین حسن‌شاهی^۱ و ریجیو جوسیلا^۱

۱- گروه گیاه‌پزشکی دانشگاه شاهد- تهران

۲- موزه جانورشناسی- دانشگاه تورکو- فنلاند

مسئول مکاتبات: حبيب عباسی‌پور habbasipour@yahoo.com

تاریخ پذیرش: ۹۱/۱۱/۱۶

۱ (۱) ۱۰۵-۱۰۳

تاریخ دریافت: ۹۱/۷/۲

چکیده

طی نمونه‌برداری‌هایی که از باغ‌های زردآلوی مناطق شمالی استان فارس انجام گرفت یک پارازیتوبید لاروی سوسک شاخک‌بلند روزاسه شناسایی شد. این گونه با نام علمی Dolichomitus kriechbaumeri (Hym.: Ichneumonidae: Pimplinae: Ephialtini) تاکنون از ایران گزارش نشده است و برای اولین بار از ایران از روی این آفت گزارش می‌گردد.

واژه‌های کلیدی: سوسک شاخک‌بلند، ایران *Dolichomitus kriechbaumeri* پارازیتوبید، ایران

شد. این نمونه از شهرستان‌های بوتان و خرم‌بید و در بهمن و اسفند ماه سال ۱۳۹۰ از لاروهای زمستان‌گذران *Cerambyx dux* جمع‌آوری شد. این گونه توسط نگارنده‌ی سوم، دکتر جوسیلا از موزه‌ی جانورشناسی بخش تنوع زیستی و علوم زیست‌محیطی دانشگاه تورکو کشور فنلاند شناسایی شد.

گونه‌ی *D. kriechbaumeri* پارازیتوبید داخلي (Endoparasitoid) لاروی می‌باشد که از روی لارو چندین (Buprestidae) گونه از سخت‌بالپوشان (خصوصاً خانواده‌ی *Anthaxia*، *Sphenoptera tappesi* Marseul شامل *Anthaxia caucasica manca* L. و برخی گونه‌های دیگر (Bolu, 2008; Aubert, 1969; Kalashyan, 1984; Cinar et al., 2004). هم‌چنین به عنوان پارازیتوبید لاروی شب‌پره *Cydia molesta* (Busck.) (Lep.: Olethreutidae) شده است (Altay, 1966). این گونه متعلق به زیرخانواده‌ی Cheloninae می‌باشد.

به منظور شناسایی پارازیتوبیدهای لاروی سوسک شاخک‌بلند *Cerambyx dux* Fald. (Col.: Cerambycidae) در مناطق شمالی استان فارس، نمونه‌برداری از باغ‌های زردآلوی این مناطق در سال ۱۳۹۰ صورت گرفت. شاخه‌های آلوده به لارو آفت به آزمایشگاه انتقال داده شده و در شرایط آزمایشگاهی نگهداری شدند. شاخه‌های حاوی لارو آفت در ظروف پلاستیکی استوانه‌ای شکل که در آن با توری ارگانزا پوشیده شده بود، قرار گرفت و در شرایط دمایی 25 ± 2 درجه‌ی سلسیوس، رطوبت نسبی 65 ± 2 درصد و ۱۴ ساعت روشناختی تا زمان خروج حشرات کامل پارازیتوبیدهای احتمالی نگهداری شدند. این نمونه‌ها به صورت روزانه برای جمع‌آوری پارازیتوبیدها بررسی و زنبورهای خارج شده در الکل ۷۵ درصد نگهداری شدند. پس از خروج پارازیتوبیدها و شناسایی مقدماتی، به منظور شناسایی نهایی برای محققین خارج از کشور ارسال شد. در میان نمونه‌ها گونه‌ی *Dolichomitus kriechbaumeri* (Schulz, 1906) (Ichneumonidae: Pimplinae: Ephialtini) برای اولین بار از ایران گزارش

کامل با یک شیب قوی در خط میانی (Occipital carina) است. غلاف تخمریز به طول ۱۸ میلی‌متر است. نوک تیغه‌ی پائینی تخمریز دارای لبه پشتی که تا حدودی در میان نوک تیغه‌ی بالایی قرار می‌گیرد (Sheng & Sun, 2002).

این زنبور از نواحی پالارکتیک و از کشورهای اتریش، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، قبرس، چکسلواکی، مصر، فلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایتالیا، هلند، لهستان، رومانی، روسیه، اسپانیا، سویس، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان و صربستان گزارش شده است (Oehlke, 1967; Townes, 1969).

آن به تعداد ۴ عدد از جنس ماده در آزمایشگاه حشره‌شناسی دانشگاه شاهد (تهران) نگهداری می‌شود.

برخی از مشخصات شکل‌شناسی این زنبور به این شرح می‌باشد: در حشرات ماده بدن به طول ۱۲ میلی‌متر، بالهای جلو به طول ۱۰ میلی‌متر، سلول Areolet کمی پهن، دومین رگبال بالای در قاعده‌ی سلول آرئولت قرار دارد. رگبال عرضی سلول میانی در بال عقبی (Nervellus) نزدیک یا در بالای بخش میانی قرار دارد. اولین ترثیت بلند، تقریباً به بلندی ترثیت دوم است. ترثیت دوم با یک شیار مورب آشکار در هر طرف که از قسمت قاعده، در نزدیکی خط وسط، به سمت سوراخ تنفسی قرار دارد. ترثیت‌های سوم و چهارم تقریباً همیشه دارای برآمدگی‌های گره مانند ریز انتهایی و میانی هستند. قطعه‌ی زیرپیشانی (Clupeus) سیاه تا سفید متمایل به زرد، بخش فوقانی آن با یک شکاف عمیق متوسط است و به ندرت دارای برآمدگی‌های گره مانند ریز انتهایی و میانی است. شیار ۳ شکل پس‌سری

References

- Altay, M. 1966.** Investigations on Biology and Control of *Laspeyresia molesta* Busck in Bursa Province and Marmara region. Istanbul.
- Aubert, J. F. 1969.** Les Ichneumonides Ouest-Palearctiques et leurs hôtes , Tome, 2. Pimplinae, Xoridinae et Acaenitinae. Laboratoire d'Evolution des Etres Organises. Paris.
- Bolu, H. 2008.** A New host *Sphenoptera tappesi* Marseul (Coleoptera: Buprestidae) for *Dolichomitus kriechbaumeri* (Schulz) (Hymenoptera: Ichneumonidae) from Turkey. Turkish Journal of Zoology. 32: 225-226.
- Cinar, M., Cimen, I. & Bolu, H. 2004.** Elazığ ve Mardin İlleri kiraz agaclarında zararlı olan turler, doğal duflımları ve onemlileri üzerindeki gözlemler. Turkish Journal of Entomology. 28: 1-11.
- Kalashyan, M. Yu. 1984.** Species of parasites of Armenian metallic wood-borers (Coleoptera, Buprestidae). Biological Journal of Armenia. 37: 986-987.
- Oehlke, J. 1967.** Westpaläarktische Ichneumonidae, Ephialtinae Hymenopterorum Catalogus (new edition). 2: 1-49.
- Sheng, M. L. & Sun, S. P. 2002.** The Genus *Dolichomitus* Smith (Hymenoptera: Ichneumonidae) from North China. Linzer Biologische Beiträge. 34(1): 475-483.
- Townes, H. T. 1969.** Genera of Ichneumonidae, Part 1 (Ephialtinae (Pimplinae), Tryphoninae, Labiinae, Adelognathinae, Xoridinae, Agriotypinae). Memories of the American Entomological Institute. 11: 1-300.

Short Report

First record of *Dolichomitus kriechbaumeri* (Hymenoptera: Ichneumonidae), a larval parasitoid of long horned beetle, *Cerambyx dux* in Iran

Habib Abbasipour¹, Gholamhosein Hasanshahi¹ and Reijo Jussila²

1- Plant Protection Department, College of Agricultural Sciences, Shahed University, Tehran

2- Zoological Museum, Section of Biodiversity and Environmental Sciences, FIN-20014, University of Turku, Finland

Corresponding Author: Habib Abbasipour, habbasipour@yahoo.com

Received: Sep.22. 2012

1 (1) 103-105

Accepted: Feb.17.2013

Abstract

During sampling of Apricot branches in several locations in Fars province (in Bavanat and Khorram-Bid) (Iran) at February and March 2012, a larval parasitoid of long horned beetle *Cerambyx dux* (Col.: Cerambycidae) was found. The ichneumonid parasitoid, *Dolichomitus kriechbaumeri* (syn. *subglabratus*), was reared from the larvae of *Cerambyx dux*, which infests the trunks and twigs of apricot in orchards. *Cerambyx dux* is a new host for *D. kriechbaumeri*.

Keywords: *Dolichomitus kriechbaumeri*, *Cerambyx dux*, new host, Ichneumonidae
