

بررسی ویژگی های جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه های کلزا ای تولید شده از گیاهان مادری در معرض نشش شوری

عباس دهشیری^{۱*} و سید علی محمد مدرس ثانوی^۲

۱- عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات بثت و گواهی بذر و نهال ۲- استاد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این تحقیق سه رقم کلزا با تحمل متفاوت در برابر شوری شامل رقم اکاپی، زرفام و RGS003 تحت تأثیر چهار غلظت شوری (صفر، ۵، ۱۰، ۱۵ دسی زیمنس بر متر) قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل با سه تکرار انجام شد. محصول بذر برداشت شده در سال بعد در آزمایش-های تعیین درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی و تعیین وزن خشک گیاهچه و سایر آزمون‌های مرتبط به ویژگی‌های جوانه زنی استفاده شد. نتایج نشان داد شاخص‌های مرتبط با قوه نامیه بذر در ارقام متفاوت معنی داری نشان نداد. همچنین این صفات تحت تأثیر شوری قرار نگرفت. درصد گیاهچه‌های عادی نیز در سطوح مختلف تیمار رقم و شوری متفاوت معنی دار نداشت. از بین شاخص‌های بنیه بذر، طول ریشه-چه در بین ارقام متفاوت معنی داری نشان داد و رقم RGS003 کمترین طول ریشه-چه را نسبت به ارقام اکاپی و زرفام داشت. وزن تر ساقه-چه در هر دو آزمون جوانه زنی استاندارد و پیتری تسربی شده با افزایش شوری افزایش یافت. وزن خشک ساقه-چه نیز با افزایش شوری افزایش یافت (غیرمعنی دار) و با رسیدن سطح شوری به ۱۵ دسی زیمنس بر متر کاهش یافت. بنابراین تولید بذر در شرایط شور بر قوه نامیه و بنیه بذر تولیدی تأثیر منفی ندارد و حتی برخی از شاخص‌های بنیه بذر تولیدی را بهبود خواهد بخشید.

واژه‌های کلیدی: شوری، کلزا، بذر، قوه نامیه.

عملکرد در بالای حد آستانه را ۱۲ درصد به ازای افزایش هر واحد شوری بدست آورد که بر این اساس باقیستی کلزا را در گروه گیاهان متحمل محسوب نمود. افزایش شوری آب و خاک از محدودیت‌های اصلی کشت در مناطق گرم و خشک، از جمله ایران محسوب می‌شود. حدود ۱۲ درصد از کل مساحت کشور ایران (۱۹ میلیون هکتار) به صورت کشت و آیش و به منظور تولیدات کشاورزی استفاده می‌شود و ۶/۸ میلیون هکتار از این سطح دارای خاک‌های مبتلا به درجات مختلف شوری هستند. حدود ۴/۳ میلیون هکتار به غیر از شوری مشکل دیگری ندارند و حدود ۲/۵ میلیون هکتار علاوه

مقدمه

کلزا (*Brassica napus* L.) یکی از گیاهان روغنی است که دانه آن حاوی ۴۰-۴۸ درصد روغن و کنجاله آن حاوی ۳۵-۴۰ درصد پروتئین می‌باشد. کلزا در تمام شرایط آب و هوایی و در بیشتر مناطق کشور قابل کشت و کار است و زراعت تناوبی بسیار مناسبی برای غلات است (Dehshiri, 1998).

در برخی منابع کلزا جزء گیاهان متحمل به شوری محسوب می‌شود. از جمله فرانکویس (Francoise, 1994) حد آستانه تحمل به شوری کلزا را در آزمایش مزرعه‌ای ۹ دسی زیمنس بر متر و درصد کاهش

* نویسنده مسئول: سید علی محمد مدرس ثانوی، نشانی: تهران، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

E-mail: modaresa@modares.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۵/۱۱

تاریخ تصویب: ۱۳۹۴/۹/۱۷

وزن ساقه‌چه و وزن ریشه‌چه ژنوتیپ‌های پاییزه کلزا شامل سه رقم لیکورد، اکاپی و SLM046 نشان داد اثر شوری بر تمام صفات اندازه‌گیری شده در سطح احتمال یک درصد معنی دار بوده باعث کاهش مقادیر آنها شده است. همچنین اثر متقابل رقم ×شوری معنی دار بوده و رقم لیکورد مقاومترین رقم بوده است. (Izedkhah and Tajbakhsh 2009). بخشی پور و همکاران (Bakhshipoor, et al., 2009) در بررسی سه رقم اکاپی، زرفام و طلایه و چهار سطح شوری صفر، ۴، ۸ و ۱۲ دسی زیمنس بر متر دریافتندبا افزایش شوری کلیه صفات اندازه گیری شده شامل درصد جوانه‌زنی، طول ساقه چه، وزن ساقه چه، طول ریشه‌چه و وزن ریشه‌چه کاهش یافتد و مقاومترین رقم زرفام گزارش شد.

رشد گیاهچه کلزا از مرحله جوانه زدن بذر تا مرحله اتوتروفیک تحت تأثیر غلظت صفر، ۵، ۱۰، و ۱۵ دسی زیمنس بر متر و نوع نمک کلرید سدیم و کلرید کلسیم بررسی و مشخص شد با افزایش غلظت نمک‌های کلرید سدیم، کلرید کلسیم و ترکیب هردو طول ساقه-چه و ریشه‌چه به طور معنی داری کاهش یافت. بیشترین و کمترین نسبت وزن خشک ساقه‌چه به ریشه‌چه به ترتیب مربوط به بالاترین غلظت نمک و شاهد بود (Pirzad, et al., 2009). اثرات شوری بر صفات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌های کلزا در پنج رقم کلزای بهاره هایولا ۳۳۰، آر.جی.اس ۰۰۳، پی.پی ۳۰۸، هایولا ۴۰۱ و هایولا ۳۰۸ تحت پنج سطح شوری نمک کلرید سدیم صفر، ۴، ۸، ۱۰ و ۱۲ میلی موز بر سانتی متر) بررسی شد. نتایج نشان داد که اثر شوری روی تمام صفات مورد بررسی شامل درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، میانگین زمان جوانه‌زنی، وزن خشک ساقه چه، و وزن خشک ریشه‌چه معنی دار بود. تمام ارقام

بر مشکل شوری دارای محدودیت‌های دیگر نیز می‌باشد (Momeni, 2010). از دیگر سو، افزایش روز افرون جمعیت و لزوم تامین امنیت غذایی و محدودیت منابع آب مناسب ضرورت استفاده از آب‌های با کیفیت پایین از جمله آب‌های شور را نشان می‌دهد.

میانگین سطح زیرکشت مزارع تولید بذر کلزا در ۵ سال ۸۷-۹۱ در کشور حدود ۱۵۲۰ هکتار و میزان تولید بذر حدود ۱۳۳۵ تن بوده است. مناطق اصلی تولید بذر ارقام بهاره مانند هایولا ۴۰۱، هایولا ۳۰۸، آر.جی.اس ۰۰۳ استان‌های خوزستان و ایلامو ارقام زمستانه مانند اکاپی، زرفام، لیکورد، طلایه و... استان‌های همدان، خراسان، کرمانشاه، فارس و قم می‌باشد. مزارع تولید بذر کلزا در کشور در معرض شوری کم تا متوسط هستند، از جمله مزارع تولید بذر هیبرید هایولا در استان ایلام با آب شور با هدایت الکتریکی حدود ۵ دسی زیمنس بر متر آبیاری می‌شوند که قطعاً شوری در محیط ریشه بیش از این خواهد بود و با توجه به هم راستا بودن اثرات شوری و خشکی افزایش شوری می‌تواند اثرات تنفس خشکی پایان فصل را در کلزا تشدید کند. لذا بررسی ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر تولید شده تحت این شرایط ضرورت دارد. هر چند تأثیر شوری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر در مراحل جوانه‌زنی و رشد اولیه بررسی شده است، اما تأثیر شوری بر گیاه مادری و بازتاب آن بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر تولیدی تاکنون بررسی نشده است. و تحقیق حاضر به منظور بررسی این موضوع انجام شده است.

بررسی تأثیر تنفس شوری در چهار سطح صفر، ۶، ۱۰، ۱۴ دسی زیمنس بر متر بر جوانه‌زنی و برخی خصوصیات بنیه بذر شامل درصد جوانه‌زنی، میزان رشد، ضریب سرعت جوانه‌زنی، متوسط زمان جوانه‌زنی، شاخص بنیه بذر، طول ریشه چه، طول ساقه چه،

لیکورد، اپرا، الیت و موتنا بالاترین میانگین جوانه زنی روزانه و کمترین میانگین زمان لازم برای جوانه زنی و گیاهچه های غیر عادی، بهترین کیفیت بذر و بنیه را داشت (Otarodi, et al., 2009). تأثیر پرایمینگ بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های کلزا تحت تنش شوری بررسی گردید. ارقام کلزا شامل طلايه و اکاپی و پیش تیمار شامل آب مقطر و نیترات پتابسیم و تنش شوری شامل صفر، $\frac{1}{3}$ ، $\frac{1}{6}$ ، $\frac{1}{9}$ و $\frac{1}{15}$ مگاپاسکال بود. نتایج نشان داد که پرایمینگ بذر با آب مقطر در سطوح پایین تنش و با نیترات پتابسیم در سطوح بالای تنش به طور معنی داری سرعت جوانه زنی، درصد جوانه زنی و وزن خشک گیاهچه کلزا را بهبود می بخشد. در بین ارقام، طلايه واکنش بهتری به پیش تیمارهای فوق نشان داد (Mohammadi and Amiri, 2009).

مورد آزمون تا سطح شوری ۱۲ میلی موز بر سانتی متر توانایی حداقل ۶۰ درصد جوانه زنی و همچنین تشکیل گیاهچه کامل را داشتند. با توجه به میانگین ها، رقم آر. جی. اس. ۰۰۳. از نظر صفات مورد بررسی مناسب ترین و ارقام های بولا ۴۰۱ و های بولا ۳۳۰ در پایین ترین سطح قرار داشتند (Sabetmoghaddam and Gharinae., 2009).

کاربرد زئولیت و سطوح مختلف تیمار آبیاری در طول دوره رشد و نمو بذر بر خواص کیفی و تکنولوژیکی بذرها دو رقم پاییزه کلزا شامل اپرا و زرفام نشان داد که کاربرد زئولیت اثرات نامطلوب تنش خشکی بر صفاتی مانند گیاهچه غیر عادی و بذر سخت را به طور معنی داری کاهش داد. همچنین این آزمایش نشان داد که سطوح مختلف زئولیت، آبیاری و همچنین ارقام مختلف کلزا اثر معنی داری بر درصد جوانه زنی نهایی بذرها کلزا دارند (Irannejad, et al., 2009). اثر میزان رطوبت بذر در هنگام برداشت بر قوه نامیه، بنیه و کیفیت بذر دو رقم کلزا بررسی گردید (Sadeghi, et al., 2009). نتایج نشان داد، بالاترین درصد جوانه زنی اولیه و نهایی برای بذر رقم های بولا ۴۰۱ و در رطوبت ۱۵ درصد حاصل شده است. بیشترین وزن تر گیاهچه و وزن خشک گیاهچه نیز در رطوبت ۱۵ درصد حاصل شده است. درصد جوانه زنی اولیه و نهایی، متوسط جوانه زنی روزانه، وزن تر گیاهچه، وزن خشک گیاهچه، شاخص بنیه گیاهچه و سرعت جوانه زنی در رطوبت ۱۵ درصد بیشتر از بقیه رطوبت ها بوده است.

اثرات تنش خشکی و تاریخ کاشت حاکم بر گیاه مادری، روی بنیه بذر ۵ رقم کلزا بررسی شد و مشخص گردید اثر تنش خشکی بر ویژگی های جوانه زنی معنی دار نبود. تاریخ کاشت های اولیه بیشترین گیاهچه های غیر عادی را نشان دادند و رقم ساریگل نسبت به ارقام

مواد و روش ها

این تحقیق شامل دو بخش تولید بذر تحت تنش شوری و بررسی رفتارهای جوانه زنی بذر حاصل می باشد. بخش اول در دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. در این بخش سه رقم کلزا شامل رقم اکاپی، زرفام و رقم آر. جی. اس. ۰۰۳ تحت تأثیر چهار غلظت شوری قرار گرفتند. بذر ارقام کلزا از شرکت - های تولید کننده بذر داخلی (میهن بذر و کاسپین بذر) دریافت گردید. بذرها در سال ۱۳۸۹ تولید شده و هیچ نوع تیمار ضد عفنونی بذر روی آنها اعمال نشده بود.

ویژگی های ارقام عبارتند از:

رقم اکاپی: منشا فرانسه، آزادگرده افshan، تیپ رشدی پاییزه، سازگاری و عملکرد بالا در تمام مناطق سرد و معتدل سرد، تحمل نسبی به تنش ملایم شوری

(Shiranirad and Dehshiri, 2002)

شدند. درون هر گلدان ۱۰ عدد بذر کشت و دو هفته پس از سبز شدن، بوتهای اضافی حذف و ۶ بوته باقی ماند. تیمارهای شوری از مرحله خروج از روزت اعمال شدند. برای شور نمودن خاک از آبیاری با آب شور با رعایت نسبت آبشویی استفاده گردید. ترکیبات خاک مورد استفاده در جدول ۱ و ترکیبات آب شور مورد استفاده در جدول ۲ آمده است. تیمارهای میزان شوری و ارقام کلزا به صورت فاکتوریل با سه تکرار در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی بررسی شدند.

رقم زرفام: منشا رقم ایران، آزادگرده افshan، تیپ رشدی بینایین (پاییزه، بهاره)، نیاز به سرمادهی کم برای بهاره سازی، سازگاری خوب در مناطق با بهار گرم رقم آر.جی.اس ۰۳: منشا رقم آلمان، آزادگرده افshan، تیپ رشدی بهاره، سازگار با مناطق گرم و معتل گرم (Shiranirad and Dehshiri, 2002) باهدایت الکتریکی ۵، ۱۰، و ۱۵ دسی زیمنس بر متر است که با نسبت های مختلف آب شور طبیعی ایجاد شده است. گیاهان درون گلدان ۲۰ کیلویی کشت

جدول ۱- تجزیه شیمیایی خاک محل اجرای آزمایش

Table 1.Chemical analysis of the soil of the experiment saite

کربن آلی Organic carbon	pH	اسیدیته گل اشیاع EC	هدایت الکتریکی عصاره اشیاع ds.m ⁻¹	درصد رطوبت اشیاع Saturation percentage	پتانسیم قابل استفاده Available potassium	فسفر قابل استفاده Available phosphorus
%				%(w/w)	mg.kg ⁻¹	mg.kg ⁻¹
6.1	7.72		1.76	28	240	24.6
کربنات کلسیم معادل $\text{Ca}(\text{CO}_3)_2$	مس قابل جذب Available Cu	روی قابل جذب Available Zn	منگنز قابل جذب Available Mn	آهن قابل جذب Available iron	نیتروژن کل Total nitrogen	
(%)	mg.kg ⁻¹	Mg.kg ⁻¹	mg.kg ⁻¹	mg.kg ⁻¹	mg.kg ⁻¹	%
8.96	0.62		2.86	10.46	7.56	0.17

جدول ۲- تجزیه شیمیایی آب مورد استفاده

Table 1.Chemical analysis of irrigation water

اسیدیته pH	SO ₄ mg.l ⁻¹	Mg mg.l ⁻¹	منزیم mg.l ⁻¹	Ca mg.l ⁻¹	کلسیم μS.cm ⁻¹	هدایت الکتریکی EC	Sodium نسبت جذب سدیم
7.5	1324.6		54.8	112		10496	38.1
B بر mg.l ⁻¹	Na سدیم mg.l ⁻¹	CO ₃ کربنات mg.l ⁻¹		Cl کلراید mg.l ⁻¹	K پتانسیم mg.l ⁻¹	HCO ₃ بی کربنات mg.l ⁻¹	
0.48	1998.7		0	2432.6		3.13	73.2

درون ظرف های پلاستیکی مخصوص کشت، به ابعاد ۱۷/۵ × ۱۴/۷ × ۳/۵ سانتی متر بین دو لایه کاغذ صافی (Between paper) مرطوب به نحوی کشت شدند که دو لایه کاغذ صافی مرطوب در کف ظرف ها و یک لایه

آزمون جوانهزنی استاندارد براساس دستورالعمل انجمن بین المللی آزمون بذر (ISTA) اجرا شد (Anonymus, 1999). ابتدا ۴۰۰ عدد بذر در ۴ تکرار ۱۰۰ تایی از بذرهای هر ترکیب تیماری را شمارش و

تیمار و تکرار درون ظرفی داخل جعبه های تسریع پیری بذر قرار داده شدند و درون ظرف خارجی به میزان مشخص آب افزوده شد و سپس درپوش ظرف بسته شده و ظرف درون آون در دمای ۴۰ درجه سانتیگراد به مدت ۴۸ ساعت قرار داده شد. پس از خارج ساختن جعبه ها از درون آون به ژرمناتور تحت شرایط اجرای آزمون جوانه زنی استاندارد، ۷ روز در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد منتقلو سپس به طور روزانه واحدهای آزمایشی مورد بازدید قرار گرفته و یادداشت برداری انجام شد و گیاهچه های عادی و غیر عادی شمارش گردیدند.

(MTG = Mean Time to Germination) که شاخصی از سرعت جوانه زنی محسوب می گردد از رابطه زیر محاسبه گردید.
(Anonymous, 1993)

$$MTG = \frac{\sum(nd)}{\sum n}$$

در این رابطه: n = تعداد بذرهاي جوانه زده در طی d روز، d = تعداد روزها و $\sum n$ کل تعداد بذرها جوانه زده می باشد. و همچنین ضریب سرعت جوانه زنی (CVG = Coefficient of Velocity of Germination) نیز که مشخصه سرعت و شتاب جوانه زنی بذرها می باشد، از رابطه زیر تعیین شد (Anonymous, 1993).

$$CVG = \frac{G_1 + G_2 + \dots + G_n}{(1 \times G_1) + (2 \times G_2) + \dots + (n \times G_n)}$$

در این رابطه $G_n - G_1$ تعداد بذرهاي جوانه زده از روز اول تا روز آخر می باشد. در پایان اجرای هر آزمون، تعداد کل بذرهاي جوانه زده شمارش یادداشت برداری گردید و داده های حاصل به عنوان درصد جوانه زنی نهایی (FGP = Final Germination Percent) یا قابلیت جوانه زنی، مورد

نیز بر روی بذرهاي کشت شده قرار گرفت. بعد از کشت بذرها در ظرف های مخصوص، به مدت ۷ روز در تاریکی و در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد درون ژرمناتور نگهداری شدند. شمارش بذرهاي جوانه زده برای برآورد درصد جوانه زنی پس از انتقال ظرف ها به درون ژرمناتور شروع شد. برای تعیین وزن خشک گیاهچه از هر تکرار ۱۰ گیاهچه عادی انتخاب و وزن تر آن تعیین گردید و سپس به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۷۵ درجه سانتی گراد در آون قرار داده شد و وزن خشک آنها با استفاده از ترازوی دقیق با دقت ۰.۰۰۱ گرم اندازه گیری شد. طول ریشه چه و طول ساقه چه بر حسب میلیمتر اندازه گیری شدند. همچنین تعداد گیاهچه های عادی و غیر عادی تعیین شد. با استفاده از داده های شمارش روزانه بذرهاي جوانه زده، شاخص های متوسط جوانه زنی روزانه و سرعت جوانه زنی (MDG = Mean Daily Germination) که شاخصی از سرعت جوانه زنی روزانه می باشد از رابطه زیر تعیین شد (Anonymous, 1993).

$$MDG = \frac{FGP}{d}$$

در این رابطه FGP درصد جوانه زنی نهایی و d تعداد روزها تا رسیدن به حد اکثر جوانه زنی نهایی می باشد و سرعت جوانه زنی روزانه (Daily Germination Speed = DGS) نیز که عکس متوسط جوانه زنی روزانه می باشد به روش ذیل محاسبه شد (Anonymous, 1993).

$$DGS = \frac{1}{MDG}$$

به منظور ارزیابی بنیه گیاهچه تیمارهای مورد بررسی، آزمون پیری تسریع شده به شرح زیر اجرا شد. برای اجرای این آزمون تعداد ۱۰۰ بذر از هر واحد

متقابل نیز معنی دار نشده است (جدول ۳). متوسط جوانهزنی روزانه و سرعت جوانهزنی روزانه نیز تحت تأثیر تیمارهای موردنرسی قرار نگرفت و تفاوت بین ارقام و سطوح مختلف شوری معنی دار نبود. همچنین در صد گیاهچه‌های عادی در بین ارقام و سطوح مختلف شوری یکسان بوده و اختلاف معنی داری نداشت (جدول ۳). از بین شاخص‌های بنیه بذر، وزن خشک ریشه‌چه در بین ارقام تفاوت معنی داری داشت (جدول ۴) و رقم زرفام کمترین وزن خشک ریشه‌چه را نسبت به ارقام اکاپی و آرجی‌اس. اس. ۰۰۳ داشت (جدول ۵). همچنین اثر متقابل شوری \times رقم در آزمون پیری تسريع شده بر این صفت معنی دار شد. همچنین وزن تر ساقه‌چه تحت تأثیر تیمار شوری قرار گرفته و با افزایش شوری افزایش یافت (جدول ۶).

جدول ۳- تجزیه واریانس (میانگین مربعات) شاخص‌های جوانه‌زنی در آزمون جوانه‌زنی استاندارد

Table3-Analysis of variance (Mean squares) of seed vigor indexes in standard germination test

میانگین مربعات (MS)												
منبع		درصد جوانه‌زنی	متوسط جوانه‌زنی	سرعت	درصد	طول	طول	وزن	وزن	وزن	وزن	وزن
تغییرات	درجه آزادی	جوانه‌زنی	روزانه	جوانه‌زنی روزانه	گیاهچه‌های عادی	ساقه‌چه	ریشه‌چه	خشک	تر	تر	خشک	ساقه‌چه
SOV	df	آزادی نهایی	Mean daily	daily	Normal seedlingpercentage	Primary shoot length	Primary root length	Primary root fresh weight	Primary root dry weight	Primary shoot fresh weight	Primary shoot dry weight	هدایت الکتریکی (EC)
	df	final	Germination percentage	germination								
Cultivar(A)	2	19.22 ^{ns}	34.08 ^{ns}	0.000037 ^{ns}	24.76 ^{ns}	0.27 ^{ns}	2.54**	0.00056 ^{ns}	0.0000025 ^{ns}	0.00034 ^{ns}	0.0000028 ^{ns}	2973**
شوری Salinity(B)	3	20.49 ^{ns}	24.06 ^{ns}	0.000019 ^{ns}	28.59 ^{ns}	0.48 ^{ns}	0.29 ^{ns}	0.00042 ^{ns}	0.0000057 ^{ns}	0.00933**	0.0000251 ^{ns}	13718**
اثر مقابل اثر مقابل شوری (A×B)	6	25.12 ^{ns}	31.93 ^{ns}	0.000018 ^{ns}	30.41 ^{ns}	0.17 ^{ns}	1.13 ^{ns}	0.00017 ^{ns}	0.0000017 ^{ns}	0.00112 ^{ns}	0.0000139 ^{ns}	3619**
تکرار(بلوک) Replication	2	31.69 ^{ns}	6.44 ^{ns}	0.000018 ^{ns}	14.36 ^{ns}	0.0676 ^{ns}	7.0174**	0.00072 ^{ns}	0.0000012 ^{ns}	0.0327**	0.000044*	2283.86**
خطا Error	22	24.22	75.11	0.000043	21.04	0.63	0.46	0.00038	0.000023	0.00061	0.0000111	392
ضریب تغییرات(درصد) (CV%)	5	20.09	26.28	6.94	15.90	8.71	20.50	20	6.27	16.44	11.87	

ns, غيرمعنی دار، ** به ترتیب معنی دار در سطح احتمال ۵درصد و ۱درصد.

ns, no significant,*and** significant at 5% and 1% levels respectively.

استفاده قرار گرفت. تعیین هدایت الکتریکی بذرها نیز به منظور ارزیابی بنیه بذر انجام گرفت. در این آزمون تعداد ۴۰۰ بذر در ۴ تکرار صدتایی در ظرف‌های مخصوص به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد در آب مقطر قرار گرفت. در پایان دوره آزمون، هدایت الکتریکی محلول اندازه گیری شد. کلیه قرائت‌ها در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد انجام شد. تجزیه داده‌ها با استفاده از نرم افزار SAS 7.1 انجام شد.

نتایج

نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد در آزمون جوانهزنی استاندارد درصد جوانهزنی بذرها ارقام مختلف یکسان بوده و تفاوت معنی داری نداشته‌اند. همچنین تیمار شوری روی گیاه مادری تأثیری بر جوانهزنی نهایی بذرها تولید شده نداشته است و اثر

جدول ۴- تجزیه واریانس(میانگین مربعات) شاخص های جوانه زنی در آزمون پیری تسريع شده
Table3-Analysis of variance(Mean squars) of seed vigor indexes inaccelerated aging test

	متغیر	متغیر	میانگین مربعات (MS)											
			درصد	طول	وزن	وزن	وزن	خشک	تر	خشک	تر	خشک	تر	خشک
	جوانه زنی	جوانه زنی	جوانه زنی	جوانه زنی	جوانه زنی	جوانه زنی	جوانه زنی	جوانه زنی	جوانه زنی	جوانه زنی	جوانه زنی	جوانه زنی	جوانه زنی	جوانه زنی
SOV	df	final	daily	daily	Speed of	seedling	percentage	shoot length	root length	primary root	Primary	Primary	Primary	Primary
		Germination	germination	germination						fresh	dry	shoot	fresh	shoot dry weight
		percentage								weight	weight	weight	weight	weight
رقم	Cultivar(A)	2	43.62 ^{ns}	12.04 ^{ns}	0.000003 ^{ns}	42.72 ^{ns}	0.2755 ^{ns}	2.0608 ^{ns}	0.00022 ^{ns}	0.0000035 ^{**}	0.01068 [*]	0.00024 ^{ns}		
شوری	Salinity(B)	3	58.73 ^{ns}	36.85 ^{ns}	0.000014 ^{ns}	55.16 ^{ns}	0.2044 ^{ns}	0.9765 ^{ns}	0.00043 ^{ns}	0.0000003 ^{ns}	0.00976 [*]	0.00012 ^{ns}		
اثر مقابل														
رقم×شوری(A×B)	6	45.47 ^{ns}	39.71 ^{ns}	0.000011 ^{ns}	37.86 ^{ns}	0.3130 ^{ns}	0.1870 ^{ns}	0.00030 ^{ns}	0.0000024 ^{**}	0.00064 ^{ns}	0.00023 ^{ns}			
تکرار(بلوک)	Replication	2	33.51 ^{ns}	59.44 ^{ns}	0.000035 ^{ns}	30.38 ^{ns}	0.8604 [*]	0.7978 ^{ns}	0.00074 ^{ns}	0.000002 [*]	0.00087 ^{ns}	0.00018 [*]		
خطا	Error	۲۲	60.17	39.80	0.000021	49.97	0.2739	0.9763	0.00030	0.0000006	0.00242	0.00022		
ضریب														
متغیرات(درصد(CV%))		7.97	13.97	19.45	7.36	9.90	12.70	20	18.80	12.37	6.8			

ns غیرمعنی دار، ** به ترتیب معنی دار در سطح احتمال ۵ درصد و ۱ درصد.

ns, no significant,*and** significant at 5% and 1% levels respectively.

نوع رقم و سطح شوری قرار گرفت (جدول ۴). رقم اکاپی بیشترین وزن تر ساقه چه را داشت و ارقام زرفام و آر.جی.اس ۰۰۳ از این نظر تفاوتی نداشتند (جدول ۵).

این صفت با افزایش سطح شوری افزایش یافت. هدایت الکتریکی با افزایش سطح شوری افزایش یافت (جدول ۶). هدایت الکتریکی با افزایش سطح شوری در هر سه رقم افزایش یافته است اما میزان افزایش در رقم زرفام کمترین و در رقم آر.جی.اس ۰۰۳ بیشترین مقدار را به خود اختصاص دادند (جدول ۷). وزن تر ساقه چه در هر دو آزمون جوانه زنی استاندارد (غیر معنی دار) و پیری تسريع شده (معنی دار) با افزایش شوری افزایش یافته است (جدول ۶).

در آزمون پیری تسريع شده نیز، شاخص های جوانه زنی از جمله درصد جوانه زنی نهایی و متوسط جوانه زنی روزانه تحت تأثیر نوع رقم و سطح شوری قرار نگرفت. همچنین درصد گیاهچه های عادی در این آزمون نیز تفاوت معنی داری در بین ارقام و سطوح مختلف شوری نداشت (جدول ۴).

از بین شاخص های بنیه بذر، طول ساقه چه، طول ریشه چه و وزن تر ریشه چه تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت. اما وزن خشک ریشه چه تحت تأثیر رقم قرار گرفت (جدول ۴) و بیشترین وزن خشک ریشه چه در رقم آر.جی.اس ۰۰۳ مشاهده شد. رقم اکاپی در رتبه دوم و رقم زرفام در رتبه سوم قرار گرفت (جدول ۵). وزن تر ساقه چه در آزمون پیری تسريع شده تحت تأثیر

جدول ۵- مقایسه میانگین شاخص‌های جوانهزنی در بین ارقام

Table 5. Mean comparison of some seed vigor indexes in cultivars

رقم Cultivars	standard germination test			پیری تسریع شده	
	طول ریشه چه Primary root length	هدایت الکتریکی (EC)	جوانهزنی استاندارد	وزن خشک ریشه چه dry weight	وزن ترا ساقه چه Primary shoot fresh weight
Okapi اکاپی	8.05 ^a	167.42 ^{ab}		0.0040 ^{ab}	0.43 ^a
Zarfam زرفام	7.97 ^a	151 ^b		0.0035 ^b	0.38 ^b
RGS003 آر جی اس	7.22 ^b	182.5 ^a		0.0046 ^a	0.38 ^b

در هر ستون میانگین‌هایی که دارای حروف مشترک هستند براساس آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنی‌دار ندارند

Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level using Duncan Multiple Rang Test

جدول ۶- مقایسه میانگین شاخص‌های جوانهزنیدرسطح مختلف شوری

Table 6. Mean comparison of some seed vigor indexes in levels of salinity

شوری(دسی‌زیمنس بر متر) Salinity	standard germination test			پیری تسریع شده	
	وزن ترا ساقه چه Primary shoot fresh weight	هدایت الکتریکی (EC)	جوانهزنی استاندارد	وزن خشک ریشه چه dry weight	وزن ترا ساقه چه Primary shoot fresh Weight
0	0.3489 ^b	131 ^c		0.0051 ^{ab}	0.36 ^b
5	0.4056 ^a	144 ^c		0.0046 ^b	0.38 ^{ab}
10	0.4033 ^a	175 ^b		0.0061 ^a	0.43 ^a
15	0.4233 ^a	219 ^a		0.0043 ^b	0.42 ^a

در هر ستون میانگین‌هایی که دارای حروف مشترک هستند براساس آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنی‌دار ندارند

Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level using Duncan Multiple Rang Test

جدول ۷- مقایسه میانگین شاخص‌های جوانهزنی ارقام در سطوح مختلف شوری

Table 7. Mean comparison of some seed vigor indexes in cultivars under different levels of salinity

رقم Cultivars	شوری(دسی‌زیمنس بر متر) Salinity	وزن خشک ریشه چه		هدایت الکتریکی (EC)	میکرو‌زیمنس بر سانتی متر)
		Primary root dry weight	Primary root dry weight		
Okapi اکاپی	0	0.0030 ^{cd}		129 ^d	
	5	0.0046 ^{ab}		152.33 ^{cd}	
	10	0.0050 ^a		183 ^{bc}	
	15	0.0033 ^{bcd}		205.33 ^b	
Zarfam زرفام	0	0.0040 ^{abc}		130 ^d	
	5	0.0037 ^{abcd}		124.67 ^d	
	10	0.0023 ^d		186.33 ^{bc}	
	15	0.0040 ^{abc}		163 ^{cd}	
RGS003 آر جی اس	0	0.0047 ^{ab}		133.33 ^c	
	5	0.0043 ^{abc}		154.67 ^{cd}	
	10	0.0050 ^a		154.33 ^{cd}	
	15	0.0043 ^{abc}		287.67 ^a	

در هر ستون میانگین‌هایی که دارای حروف مشترک هستند براساس آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنی‌دار ندارند

Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level using Duncan Multiple Rang Test

روزانه و طول ریشه‌چه همبستگی منفی داشته است (داده ها ارائه نشده) بنابراین جوانه‌زنی و بنیه بذر رقم آر.جی.اس ۰۰۳ بیشترین حساسیت را به شوری نشان داده است. بررسی‌های بخشی پور و همکاران (Bakhshipoor, *et al.*, 2009) نیز نشان می دهد رقم زرفام در مقایسه با ارقام اکاپی و طلایه نسبت به شوری تحمل بیشتری دارد.

وزن تر ساقه‌چه در هر دو آزمون جوانه‌زنی استاندارد و پیری تسريع شده با افزایش شوری افزایش یافته است. وزن خشک ساقه‌چه نیز با افزایش شوری افزایش یافته (غیر معنی دار) و با رسیدن سطح شوری به ۱۵ دسی زیمنس بر متر کاهش یافته است. بین وزن تر ساقه‌چه و وزن تر ریشه‌چه با درصد جوانه‌زنی نهایی همبستگی معنی دار مثبت وجود داشته است. بنابراین بذرهای دارای قوه نامیه بیشتر از بنیه بذر بهتری نیز برخوردار هستند. نتایج این بررسی نشان می دهد تولید بذر کلزا در مناطق دارای مشکل شوری درصورتی که شوری در حد قابل تحمل گیاه بوده و امکان تولید بذر وجود داشته باشد تأثیری بر قوه نامیه و بنیه بذر تولیدی ندارد و تولید بذر در این مناطق امکان‌پذیر می باشد.

بحث و نتیجه گیری

شاخص‌های مرتبط با قوه نامیه بذر در ارقام تفاوت معنی داری نشان نداد. همچنین این صفات تحت تأثیر شوری قرار نگرفت. درصد گیاهچه‌های عادی نیز در سطوح مختلف تیمار رقم و شوری تفاوت معنی دار نداشت. بررسی تعدادی از محققان (Izedkhah and Tajbakhsh, 2009; Bakhshipoor, *et al.*, 2009; Pirzad, *et al.*, 2009). نشان داده است که شوری بر شاخص‌های قوه نامیه و بنیه بذر اثر معنی دار داشته و آنها را کاهش داده است اما اثر شوری حاکم بر گیاه مادری و تأثیر آن بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه تا کنون بررسی نشده است. جوانه‌زنی و فرآیندهای مرتبط با آن تحت تأثیر شوری محیط جوانه‌زنی قرار می گیرد اما با توجه به اینکه در این بررسی گیاه مادری در معرض شوری قرار گرفته و بذرهای حاصل در شرایط بدون تنفس شوری جوانه زده اند لذا شوری اثر گذار نیوده است. هدایت الکتریکی با افزایش سطح شوری در رقم سه رقم افزایش یافته است اما میزان افزایش در رقم زرفام کمترین و در رقم آر.جی.اس ۰۰۳ بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است (جدول-۵). با توجه به اینکه میزان هدایت الکتریکی با متوسط جوانه‌زنی

References

- Anonymous.** 1993. Hand book for seedling evaluation. International Seed Testing Association(ISTA). Zurich, Switzerland.
- Anonymous.** 1999. International rules for seed testing. International Seed Testing Association(ISTA).seed science and Technology, 27,Supplement.
- Bakhshipoor, S. (ed)** 2009. Proc. Iranian Oilseed Crops Conf., Esfahan. 21-22 Dec 2009. Esfahan. IRAN.
- Dehshiri, A., 1998.** colza cropping. Sobhan Publications.
- Francois, L. E. 1994.** Growth, seed yield and oil content of canola growth under saline conditions. Agron. J, 86: 233-237.
- Hampton, J., C. and D. M. Tekrony.** 1995. Hand book of vigor test and method (3. ed). International Seed Testing Association (ISTA).Zurich, Switzerland.
- Irannegad, H., A. Shirani rad., A. Allahdadi., A. Amiri., R. Azmandpisha, and P. Babazadeh,** 2009. The effect of chitosan different humidity regime on seed vigor of rapeseed. Proc. Iranian Oilseed Crops Conf., esfahan. 21-22 Dec 2009. Esfahan. IRAN.
- Izedkhah, M and M. Tajbakhsh,2009.** The effect of salinity on seed vigor of winter type rapeseed in lab condition. Proc. Iranian Oilseed Crops Conf., Esfahan. 21-22 Dec 2009. Esfahan. IRAN.

منابع

- Mohammadi, GH and F, Amiri.** 2009. Proc. Iranian Oilseed Crops Conf., Esfahan. 21-22 Dec 2009. Esfahan. IRAN.
- Moumeni, A.** 2010. Extent and geographical distribution of problem soils. The soils of Iran new achievements in perception. Management and use. Sena Publications, Tehran, Iran (In Persian)..
- Otarodi, H. (ed)** 2009. Proc. Iranian Oilseed Crops Conf., Esfahan. 21-22 Dec 2009. Esfahan. IRAN.
- Pirzad, A. (ed)** 2009. Proc. Ir. Oilseed Crops Conf., Esfahan. 21-22 Dec 2009. Esfahan. IRAN.
- Sabetmoghadam, H. (ed)** 2009. Proc. Iranian Oilseed Crops Conf., esfahan. 21-22 Dec 2009. Esfahan. IRAN.
- Sadeghi, H., S. Mehran and H.S. Hosein** 2009. Investigation of vigor and some quality traits of canola seeds in different harvesting stage. Agron Sci. 3,4:105-115.
- Shiranirad, A.H and A. Dehshiri.** 2002. Rapeseed Handbook. Nashr amozesh keshavarzi Publications, Karaj, Iran (In Persian).
- Valadiyani, A., A. Hassanzahe Ghort Tappeh and M. Tajbakhsh** 2005. Ivestigation of salinity effects on germination and vigourity of new varieties of canola. Pajouhesh and sazandegi. 66: 23-32.

Archive of SID