

مطالعه تأثیر انواع پلیمر در بذر پوشش دار چغندر قند بر خصوصیات جوانه زنی واستقرار بوته

مهناز چنگیزیان^۱، قاسم توحیدلو^{۲*} و پیمان فروزان^۲

- ۱- به دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
۲- استادیاران گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر پوشش دار کردن بذر منژرم چغندر قند (رقم رسول) بر خصوصیات جوانه زنی و استقرار بوته با استفاده از چهار پلیمر مختلف در سال ۱۳۹۲ در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند انجام گرفت. آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار انجام شد. پلیمرهای مختلف از قبیل منوپلیمر (MP)، کوپلیمر (CP)، هموپلیمر سخت (HPS) و هموپلیمر نرم (HPS) هر یک در پنج غلظت ۰/۵، ۱، ۵ و ۱۰ درصد به همراه تیمار شاهد (بدون پوشش) مورد مقایسه قرار گرفتند. صفات مورد بررسی شامل درصد جوانه زنی بلاfaciale بعد از پوشش دار کردن بذر، جوانه زنی یک ماه و سه ماه بعد از پوشش، وزن تر و وزن خشک گیاهچه، طول ساقه چه، طول ریشه چه و درصد استقرار بوته در مزرعه بودند. نتایج نشان داد که بین تیمارها در کلیه صفات اختلاف معنی داری وجود داشت. بر اساس نتایج به دست آمده، در اکثر صفات مورد بررسی هموپلیمرهای نرم و سخت دارای برتری نسبی بودند. البته در صفت درصد جوانه زنی در مزرعه که از اهمیت زیادی برخوردار است، منوپلیمر ۱۰ درصد به همراه هموپلیمرهای سخت و نرم در غلظت پائین (۰/۵ تا ۵ درصد) از راندمان خوبی برخوردار بودند.

کلمات کلیدی: چغندر قند، بذر منژرم، پوشش بذر، پلیمر.

۵۰ سانتی متر و فاصله بین بوته ها بر روی خطوط کشت
۲۰ سانتی متر می باشد. با این وضعیت، باید در هر هکتار یکصد هزار بوته وجود داشته باشد که اگر به طور متوسط وزن هر ریشه ۹۰۰ گرم در نظر گرفته شود ۹۰ دن در هکتار عملکرد ریشه خواهد بود.
یکی از علل عملکرد پائین در چغندر قند پائین بودن جوانه زنی، سرعت و قدرت جوانه زنی در بذر این گیاه

مقدمه

چغندر قند گیاهی دگرگشن بوده و از ریشه مخروطی شکل و ذخیره ای چغندر قند ساکاراز استحصال می شود که نقش مهمی در تغذیه ای انسان و حتی دام دارد. در ایران حدود ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به زراعت چغندر قند اختصاص دادارد. در کشت چغندر قند فاصله ردیف ها در مزرعه

* نویسنده مسئول: نشانی: کرج- شهرداری منطقه ۱۲- شهرداری کاخ- رو به روی کاخ- بلوار ارم- مهرشهر- نشانی: کرج- شهرداری منطقه ۱۲- دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد، گروه زراعت

و اصلاح نباتات

E-mail: ghtohid@gmail.com

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۷/۲۰

تاریخ تصویب: ۱۳۹۴/۱۱/۶

(Stability) گیاه در زمین اصلی افزایش یافته و دستیابی به تراکم بوته مطلوب در مزرعه را مقدور می سازد. همچنین ویگور بذر به وسیله مواد مغذی و هورمون های بالا برنده رشد می تواند افزایش یابد. گاهی اوقات این افزوondنی ها جهت بهتر شدن اندازه و شکل بذر به کار می رود. در این راستا استفاده از تولیدات بیولوژیکی فعال نیز مد نظر است (فلانگان و همکاران، Flangan *et al.*, 2002). مطالعه پوشش بذرها از نظر اقتصادی و کارایی نیز بسیار مورد توجه می باشد.

فلانگان و همکاران (Flanagan *et al.*, 2002) طی آزمایشی دریافتند که مصرف ۱۰ میلی لیتر از صمغ جلان به همراه آفت کش و قارچ کش و رنگ می تواند حدود ۱۰۰ گرم بذرهایی مانند سویا و ذرت را به دلیل صاف و یکنواخت بودن به راحتی پوشش دهد. به دلیل زبری بذر چغندرقند پوشش دادن آن با ماده ای چسبنده و بی ضرر که ضمن تغییر شکل ظاهری بذر آن ها را به صورت یکنواخت در می آورد مهم است. پوشش دار کردن بذور منوژرم چغندرقند و بذور سبزیجات کاربرد وسیعی دارند. پوشش پلیمری معمولا برای ایجاد یک لایه یکنواخت و نازک دور بذر بدون افزایش قابل توجهی در اندازه و وزن بذر به کار می رود. فیلمکوتینگ (ایجاد پوشش نازک) (هیدروفیل در محلول آب بوده و بنابراین مانع جوانه زنی بذر نمی شود) (دوآن و باریس، Duan, X and Burris, 1997).

کریکلن و همکاران (Kirkland *et al.*, 1985) پوشش بذری که قبل از کاشت انجام می شود را توصیه نموده اند. آنها معتقدند که این امر باعث بالا رفتن جوانه زنی بذر می شود. در این راستا باید از پر کننده هایی استفاده کرد که رطوبت را جذب می کنند تا جوانه زنی تسريع شده و در نتیجه عملکرد محصول افزایش یابد.

قطور بودن پوسته بذر و عدم نفوذ پذیری نسبت به آب می باشد. بذر چغندرقندی که دارای جینین زنده و کامل، پوسته نازک و نفوذ پذیر نسبت به آب باشد را می توان بذر مناسب و با کیفیت دانست. بزرگی بذر ممکن است ناشی از قطور بودن پوسته بذر باشد، در این صورت بذر دیر جوانه زده، جوانه زنی پایینی داشته و بطور کلی از کیفیت پایینی برخوردار می باشد. صفات ضخیم بودن پوسته بذر، سختی پوسته و اندازه بذر تحت تاثیر ریخته ارشی گیاه مادری و شرایط محیطی تولید بذر قرار می گیرند که همگی درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی را تحت تاثیر خود قرار می دهند. بذر منوژرم چغندرقند ستاره ای شکل بوده و دارای پنج زائده (پریانت) می باشد. زوائد بذر کشت آن را مشکل می سازد. از طرف دیگر در توده بذر چغندرقند، بذر نارس و یا بذوری با پوسته کلفت از قدرت جوانه زنی کمتری برخوردار بوده که موجب کاهش جوانه زنی بذر می گردد. لذا با پولیش مناسب بذر پوسته بذرهای کلفت نازک شده، بذرهای نارس و زوائد بذر حذف شده و موجب افزایش جوانه زنی و سرعت جوانه زنی می شود. از طرف دیگر ضد عفونی و پوشش دار نمودن بذر چغندرقند روز به روز رایج تر می شود. بذر های پوشش دار بذرهایی هستند که با ماده ای چسبنده و بی ضرر پوشیده شده اند (فلانگان و همکاران (Flangan *et al.*, 2002).

پوشش دار کردن بذور منوژرم چغندرقند و بذور سبزیجات کاربرد وسیعی داشته و معمولا به صورت انحصاری در اختیار شرکت های تولید کننده بذر می باشد. به دلیل امکان انجام مراحل تکمیلی بوجاری (حذف بذور پوکی، با جنین ناقص و بذوری با پوسته های ضخیم) در تکنولوژی پوشش دار بذر (Seed coating) قدرت و سرعت جوانه زنی و قدرت استقرار

لاتکس آن دارای T_g ۴ تا ۵ بود. آن ها از آکریلات استفاده نموده و پوشش پلیمری به دست آمده را برای بذرهایی مثل ذرت، آفتابگردان، چغندرقند و هویج مناسب دانستند.

روسا و همکاران (Rosa *et al.*, ۲۰۰۷) در تحقیقی بیان داشتند که کشاورزان برای به دست آوردن بالاترین عملکرد در هر هکتار احتیاج به بذرپوشش دار مناسب دارند. دو آن و باریس (Duan and Burris, ۱۹۹۷) اذعان داشتند که پوشش پلیمری معمولاً برای ایجاد یک لایه یکنواخت و نازک از پلیمر دور بذر بدون افزایش قابل توجهی در اندازه و وزن بذر به کار می رود.

اهداف این تحقیق عبارت بودند از:

۱. بررسی اثر نواع پلیمر پوششی در صد جوانه زنی و استفاده از پلیمرهای تولید داخل کشور)

۲. مطالعه کیفیت جوانه زنی بذر در زمان های مختلف پس از پوشش پلیمر در آزمایشگاه و مزرعه (در شرایط مزرعه ویگور بذر نماینده واقعی کیفیت آن می باشد).

مواد و روش ها

تحقیق حاضر در سال ۱۳۹۲ به صورت مشترک بیندانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج و موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند انجام گرفت.

این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار در آزمایشگاه به صورت زیر اجرا شد. در این تحقیق از چهار نوع پلیمر مختلف از قبیل مونوبلیمر، هموپلیمر نرم، هموپلیمر سخت، کوپلیمر، به همراه یک شاهد (بدون پلیمر)، در سطوح $0/5$ ، 1 ، 5 و 10 درصد استفاده شد. لازم به ذکر است که واحدهای سازنده هر پلیمر مونومر است. مونوبلیمر: از یک مونومر

المدیا و همکارانش (Almedia *et al.*, ۲۰۰۵) اثر پوشش های پلیمری را در جوانه زدن و قدرت بذرهای کم بروکلی مورد بررسی قرار دادند. در روش های تولید سبزیجات به بذور بادرجه خلوص بالا و قدرت جوانه زنی خوب نیاز است، چرا که کیفیت بذرها در تولید موفق محصول موثر است. در این تحقیق بذور کلم بروکلی در بستر لوله ایی با سوسپانسیون آبی هیدروکسی-اتیل - سلولز پوشانده شدند. اثرات متغیرهایی مانند، فشار هوای ایجاد شده در داخل محلول و سرعت جریان سوسپانسیون پوششی بر روی متغیرهای وابسته نظری جوانه زنی بذرها در آزمایشگاه و در خاک مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین زمان فرآیند مذکور ۱۲۰ دقیقه بود. در این ازمایش قدرت جوانه زنی بذرهای پوشش داده شده و بذرهای بدون پوشش مورد ارزیابی قرار گرفته و مشخص شد که بذرهای پوشش داده شده از وضعیت بهتری برخوردار بودند.

حمدی و همکاران (2009) در آزمایشی دریافتند که پوشش پلیمری تهیه شده نه تنها قدرت جوانه زنی را کاهش نداده بلکه قدرت نگهداری آفت کش و قارچ-کش بذرهای پوشش دار در مقایسه با بذرهای بدون پوشش بالاتر بوده بنابراین یکنواختی بیشتری نیز در جوانه زدن دارند.

واتس (Watts, 1976) طی آزمایشی بیان داشت، برای اینکه جوانه زنی بذر افزایش یابد باید پوشش پلیمری قابلیت انتقال اکسیژن را داشته باشد. او در آزمایشات خود از پلی وینیل الکل با درصد وزن های مختلف استفاده کرد و به این نتیجه رسید که مقدار بهینه پلی وینیل الکل ۵ تا نیم درصد وزنی می باشد.

اشنایدر و همکاران (Schneideret *et al.*, ۲۰۰۷) در آزمایشات خود از کوپلیمرهایی استفاده کردند که

صورت چین های آکاردئونی (Pleated filter paper) می باشد استفاده می گردد.

بعاد کاغذ کشت $82 \times 16/5$ سانتی متر و عمق چین ها $2/5$ سانتی متر بود. هر کاغذ حاوی ۲۵ عدد شیار، ارتفاع شیارها ۱۸ میلی متر و طول آن ۱۰ سانتی متر بود که در هر شیار ۲ عدد بذر قرار گرفت. برای آزمون جوانه زنی طبق قوانین ایستا ۴۰۰ عدد بذر در قالب ۴ تکرار ۵۰ تایی کشت شد. جهت مرطوب نگه داشتن بستر بذر به آن آب مقطر اضافه شده و در جعبه ای مرطوب قرار داده شد. سپس روی آن به وسیله دریچه ای پوشانده شده و در دستگاه ژرمیناتور قرار داده شد. فرایند جوانه زنی به مدت ۱۴ روز با دمای $20/30$ درجه سانتی گراد و رطوبت $80-85$ درصد انجام شد. جوانه ها هر ۲ روز یک بار شمارش گردید.

برای محاسبه درصد جوانه زنی نهایی تعداد بذر جوانه زده (ریشه چه سالم به طول ۵ mm) در هر تکرار شمارش شده و سپس به صورت زیر محاسبه شد:

$$GP = \sum n$$

N تعداد بذر جوانه زده سالم در هر یک از شمارش ها می باشد. طول ریشه چه و ساقه چه به روش زیر اندازه گیری شد:

در هر تکرار ۲۵ عدد بذر با فاصله حدود یک و نیم تا دو سانتی متر بر روی کاغذ های $14/5 \times 58$ سانتی متر (Bogensheets) قرار داده شده و یک کاغذ دیگر با همان ابعاد روی بذور قرار گرفته و با آب مقطر مرطوب شدند. سپس کاغذ ها به آرامی رول شده و داخل لوله پولیکا به ارتفاع ۱۳ سانتی متر قرار داده شد تا از هم باز نشوند. سپس این لوله ها به همراه کاغذ ها درون ظرف پلاستیکی درب دار چهار لیتری گذاشته شده و 300 میلی لیتر آب مقطر داخل ظرف ریخته شد.

تشکیل شده. هموپلیمر: همه از یک نوع مونوپلیمر تشکیل شده اند. کوپلیمر: از دو یا چند مونوپلیمر تشکیل شده اند.

صفات مورد آزمایش کیفیت جوانه زنی بذور تیمار شده بلافاصله پس از فرآوری، یک ماه و ۳ ماه بعد از پوشش دار نمودن آن مورد مطالعه قرار گرفتند. صفات مورد بررسی شامل: سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه و ریشه چه و وزن تر و وزن خشک گیاهچه بودند. آزمایش مزرعه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار که هر تکرار شامل ۱۰۰ عدد بذر بود در مزرعه به صورت ۳ هفته اجرا شد. در پایان نتایج ویگور بذر واستقرار بوته مورد مطالعه قرار گرفت.

در فرآوری بذر در این آزمایش از 15 کیلو گرم بذر رقم رسول که توسط موسسه تحقیقات چندرقند در اختیار محققین قرار داده شده بود استفاده گردید. بذور بعد از پولیش از دو نوع غربال عبور داده شدند: غربال دراز و غربال گرد. ابتدا توده حاصله از غربال (دراز) $3/2-2/2$ عبور داده شد (کار غربال دراز جدا کردن مولتی ژرم و بذور بسیار ریزی هستند که توانایی جوانه زنی را ندارند). بعد از این عملیات از غربال گرد استفاده شد و توده حاصله از غربال $4/75-4$ عبور داده شد تا بذر استاندارد حاصل گردد. بذر حاصل سپس توسط Seed divider (مقسم بذر) به ۵ بخش تقسیم گردید. هر بخش تقسیم شده با فرمول مخصوص رنگ آمیزی گردید.

بذر ها پس از رنگ آمیزی با سطوح مختلف پلیمر آغشته شده و بلافاصله کشت گردید. پس از خشک شدن، بذور به وسیله یک تقسیم کننده بذر یک زیر نمونه که هر نمونه نماینده 100 گرم بود آماده کشت شد (ISTA, 2011). در روش ایستا برای کشت بذر چندر قند از سال ۱۹۶۰ از کاغذ های کشت که به

منفی بر جوانه زنی آن بلافارسله پس از پوشش دهی نداشته است. در بین تیمارهای مورد استفاده دو تیمار HPS5% و HPS10% به ترتیب با میانگین ۹۰/۵ و ۸۹/۵ درصد دارای درصد جوانه زنی بهتری از سایر تیمارها بودند. اغلب تیمارهای پوشش دهی بذر که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند، تاثیر معنی داری بر صفت جوانه زنی بلافارسله پس از پوشش دهی نداشته و به همراه تیمار شاهد در کلاس آماری a قرار گرفتند. بنابراین پوشش دهی بذر غالباً تاثیر منفی بر میزان جوانه زنی بذر نداشته و این نتایج با نتایج حمدی و همکاران (2009) مبنی بر عدم بروز تاثیرات زیان بار در پوشش دهی بذور مطابقت دارد. در خصوص صفت جوانه زنی بلافارسله پس از پوشش دهی مشخص می شود که هموپلیمر نرم (HPS) و کوپلیمر (CP) بهتر از سایر تیمارها بوده اند. در این مورد پوشش هموپلیمر سخت (HPH) تاثیر منفی بر جوانه زنیدر کوتاه مدت داشته و قابل توصیه نمی باشد.

تأثیر پوشش بذر بر جوانه زنیک ماه بعد از پوشش
نتایج تجزیه واریانس در جدول شماره ۱ نشان می دهد که نوع پوشش دهی بر جوانه زنیدرها در مدت یک ماه پس از پوشش دهی تاثیر معنی داری داشته است. در جدول شماره ۳ بین تیمارهای مورد بررسی ۳ تیمار HPH.5%، MP10% و HPH10% به ترتیب با میانگین های ۹۰/۵، ۸۸/۵ و ۸۸/۵ درصد برتر از سایر تیمارها بوده اند. تیمار شاهد (بدون پوشش) علیرغم اینکه با این تیمارها اختلاف معنی داری به لحاظ آماری ندارد، اما جوانه زنیدر شاهد به ۷۹/۲۵ درصد در زمان یک ماه پس از پوشش دهی کاهش یافته است. بنابراین نتایج نشان می دهد که پوشش دهی بذور باعث حفظ جوانه زنی تا زمان یک ماه پس از پوشش دهی در طی

ظروف در ژرمیناتور با درجه حرارت ۲۰-۲۲ درجه سانتی گراد در رطوبت ۸۵ درصد قرار گرفت. بعد از دو هفته جوانه ها از داخل لوله پولیکا خارج و توسط خط کش طول ریشه چه و ساقه چه هر بذر با دقیقاً ۱ میلی متر اندازه گیری شد. در انتهای وزن خشک و وزن تر هر تکرار با ترازوی دقیق با دقیقاً $0.001 \pm$ توزین گردید. برای اندازه گیری وزن خشک جوانه ها، هر تکرار به صورت جداگانه به مدت ۲۴ ساعت در دستگاه آون با دمای ۷۰ درجه قرار گرفت.

برای تعیین قدرت جوانه زنی در مزرعه آزمایشی در بهار سال ۹۳ در ایستگاه تحقیقاتی کمال شهر کرج انجام گرفت. آزمایش مزرعه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار اجرا شد. برای اجرای آزمایش تعداد ۱۰۰ عدد بذر در هر تکرار که طول هر خط ان ۲ m بود کشت گردید. تعداد جوانه ها بطور دقیق و هر ۳ روز یک بار ثبت شده و پس از ۳ هفته تعداد کل جوانه ها شمارش و در نهایت قدرت نامیه بذر محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل آماری داده های حاصل از نمونه برداری پس از نرمال نمودن داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل های آماری از نرم افزار SAS و برای رسم نمودارها از EXCEL استفاده شد. برای مقایسه میانگین داده ها از روش ازمن چند دامنه ای دان肯 استفاده شد.

نتایج و بحث

تأثیر پوشش بذر بر جوانه زنی بلافارسله بعد از پوشش

بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس که در جدول شماره ۱ آورده شده است، اثر پوشش های مختلف بذر در جوانه زنی بلافارسله بعد از پوشش در سطح یک درصد معنی دار شده است. بر اساس نتایج مقایسه میانگین جدول شماره ۲ داده ها پوشش دهی بذر تاثیر

و کوپلیمر ۰/۵ درصد می باشد. پیش از این نیز اشنایدر و همکاران (Schneideret al 2007) در آزمایشات خود از پوشش های کوپلیمری در محصولات مختلف استفاده کردند و پوشش های کوپلیمری را برای بذرها یی مانند ذرت، آفتابگردان، چغندر قند و هویج مناسب دانستند.

تأثیر پوشش بذر بر وزن تر گیاهچه

نتایج مقایسه میانگین در جدول شماره ۵ نشان می دهد که مقدار وزن تر جوانه ها در تیمار شاهد با میانگین ۰/۳۸۲ گرم در رتبه های پائینی جدول قرار گرفته و تیمارهای HPS10% و HPS7.5% به ترتیب با میانگین های ۰/۶۲۷ و ۰/۶۲۲ گرم بالاتر از سایر تیمارها بودند. در این صفت ۱۲ تیمار پوشش داده شده دارای بیشترین میانگین بوده و بالاتر از شاهد قرار گرفتند.

اغلب تیمارهای هموپلیمری و منوپلیمری باعث حفظ رطوبت بذر شده و بذور دارای این نوع پوشش ها از وزن تر بیشتری برخوردار هستند. بهترین تیمار برای وزن تر بذر هموپلیمر سخت ۱۰ درصد می باشد. نقش آب در جوانه زنی بذر بسیار حائز اهمیت بوده و بدین جهت کریکلند و همکاران (Kirkland et al., 1985) توصیه کردند که برای پوشش دهنی بذر باید از موادی استفاده نمود که رطوبت را جذب یا حفظ نمایند تا جوانه زنی تسریع شده در نتیجه عملکرد افزایش یابد. به نظر می رسد پوشش های هموپلیمری و منوپلیمری دارای خاصیت حفظ آب مناسبی بوده و از این حیث قابل توصیه هستند.

تأثیر پوشش بذر بر وزن خشک گیاهچه

نتایج مقایسه میانگین در جدول شماره ۵ بیانگر اختلاف معنی دار بین تیمارها از این نظر می باشند. نکته

دوران نگهداری بذر گردیده است. جوانه زنیا فاصله یک ماه پس از پوشش دهی نشان دهنده روند کاملاً متفاوتی با همان صفت در فاصله زمانی بلا فاصله بعد از پوشش دهی می باشد به طوریکه غالباً تیمارهای هموپلیمر سخت (HPH) و منوپلیمر (MP) نسبت به سایر تیمارها از عملکرد بهتری برخوردار هستند. به نظر می رسد، این پلیمرها هرچند که در ابتدا باعث کاهش جوانه زنیمی شوند اما در ادامه و با گذشت زمان تا حد یک ماه، نقش حفاظتی بهتری برای بذر آن ایفا می نمایند. میزان جوانه زنیدر تیمار شاهد نسبت به اغلب تیمارهای پوشش دهی حاوی هموپلیمرهای سخت (HPH) و منوپلیمر (MP) دارای کاهش شدیدتری در جوانه زنیمی باشد. نقش حفاظتی و حمایتی پوشش بذر پیش از این نیز توسط المدیا و همکاران (Almedia et al., 2005) در بررسی پوشش دهی بذر کلم بروکلی مورد تائید قرار گرفته بود.

تأثیر پوشش بذر بر جوانه زنیسه ماه بعد از پوشش بر اساس نتایج مقایسه میانگین در جدول شماره ۴ هرچند که برخی از تیمارها با تیمار شاهد اختلاف معنی داری نداشتند اما دو تیمار CP.5% و MP1% به ترتیب با میانگین های ۹۵/۵ و ۹۴/۵ درصد دارای جوانه زنی بیش از سایر تیمارها بودند. بنابراین پوشش دهی بذور باعث می شود که قدرت جوانه زنی آنها تا بعد سه ماه حفظ شود. پوشش های همو پلیمری و هموپلیمری نرم و برخی از تیمارهای کوپلیمری دارای عملکرد بهتری برای حفظ جوانه زنیتا سه ماه پس از پوشش دهی هستند. بنابراین اگر قرار است بذور برای مدت طولانی نگهداری شوند و یا به بازارهای دورتر ارسال شوند، بهتر است از این پلیمرها برای پوشش دهی استفاده گردد. بهترین تیمار های پوشش دهی برای حفظ جوانه زنیتا زمان سه ماه پس از پوشش دهی منوپلیمر ۱ درصد

پوشش بر طول ریشه چه بذر نشان دهنده عدم وجود اختلاف معنی داراز لحاظ اماری بین تیمارها است. همانگونه که در این جدول مشخص است، به استثنای دو تیمار HPH10% و HPS5% بقیه تیمارها از لحاظ آماری در کلاس a قرار گرفتند. در بین تیمارها، دو تیمار شاهد و CP5% هر دو با میانگین ۷/۷۵ میلیمتر بهتر از سایر تیمارها بودند. در این مورد نیز می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که پوشش دهی هیچ گونه تاثیر منفی بر رشد ریشه چه نداشته است. اغلب تیمارها اختلاف معنی داری با تیمار شاهد در صفت طول ریشه چه نداشتند. نکته جالب توجه اینکه در صفت طول ریشه چه بر خلاف صفت طول ساقه چه، تیمارهای کوپلیمری دارای راندمان مناسبی بودند. بهترین تیمارها برای طول ریشه چه تیمار شاهد و پوشش کوپلیمری ۵ درصد بود. به هر حال ممکن است پوشش دهی بذور به عنوان یک مانع فیزیکی از رشد ساقه جلوگیری نمایند. با این وجود این نتایج با گزارش توحدللو و همکاران Duna, X1997 (Tohidloo, et al., 2006) و آن و باریس (Burris and حمدی و همکاران 2009) مبنی بر اینکه پوشش دهی باعث کاهش جوانه زنی بذور نشده و در مواردی نیز راندمان تولید آنها را افزایش می‌دهد، مطابقت دارد.

تأثیر پوشش بذر بر قدرت نامیه جوانه زنی بذر در مزرعه

نتایج مقایسه میانگین در جدول شماره ۵ حاکی از آن است که ۵ تیمار HPH1%, HPS5%, MP10%, HPH5% و HPS.5% دارای رتبه a بوده و به ترتیب با میانگین های ۴۷، ۴۶، ۴۳ و ۴۱ درصد قدرت نامیه در مزرعه در جایگاه بالاتری قرار گرفتند. در این صفت تیمار شاهد با میانگین ۳۵ عملکرد مناسبی از خود بروز نداد.

جالب در جدول مقایسه میانگین این است که تیمار شاهد با میانگین وزن خشک ۰/۰۱۳۷ گرم در گروه پایین قرار گرفته است. در این صفت تیمارهای HPH7.5% و HPH10% به ترتیب با میانگین های ۰/۰۲۶۳ و ۰/۰۲۶۵ گرم بیشترین میانگین ها را نشان دادند.

بذور پوشش دار شده با همین نوع پلیمرها (هموپلیمرها و منوپلیمرها) دارای میانگین وزن خشک بیشتری نیز بودند. بهترین تیمار برای وزن خشک بذر هموپلیمر سخت ۱۰ درصد بود.

تأثیر پوشش بذر بر طول ساقه چه

بر اساس نتایج مقایسه میانگین در جدول شماره ۵ مشاهده می‌شود که به جز ۴ تیمار HPH7.5%، آماری a قرار گرفتند. در این بین تیمار HPS10% با میانگین طول ساقه چه ۸/۴ میلیمتر دارای بیشترین میانگین بودند. در این صفت تیمار شاهد نیز با میانگین طول ساقه چه ۷/۸۵ میلیمتر رتبه بالاتری را به خود اختصاص داد. بنابراین به نظر می‌رسد، نوع پوشش تاثیر چندانی بر صفت طول ساقه چه ندارد که این می‌تواند به عنوان یک مزیت برای پوشش دهی تلقی شود. هموپلیمرها و منوپلیمرها دارای راندمان مناسبی برای صفت طول ساقه چه بوده و با تیمار شاهد اختلاف معنی داری نداشتند. به نظر می‌رسد پوشش های کوپلیمری از رشد ساقه چه جلوگیری کرده و از نظر این صفت در رتبه های پائینی قرار می‌گیرند. بهترین تیمار پوشش دهی برای صفت طول ساقه چه، پوشش هموپلیمری سخت ۱۰ درصد بود.

تأثیر پوشش بذر بر طول ریشه چه

نتایج تجزیه واریانس در جدول شماره ۱ اثر نوع

جوانه زنی بذر در مزرعه که بر عملکرد نهایی محصول تاثیر مستقیم دارد، به نظر می‌رسد پوشش‌های هموپلیمری کم غلظت، راندمان مناسبی داشته و از این لحاظ قابل توصیه هستند. روسا و همکاران (Rosa et al., 2007) نیز تاثیر پوشش دهی بذر را در افزایش استقرار بذر در مزرعه و متعاقباً افزایش عملکرد محصول مورد تأکید قرار داده بودند.

در تیمار تاثیر پوشش بذر بر قدرت نامیه آن به استثنای مونوپلیمر ۱۰ درصد که با میانگین ۴۷ درصد بیشترین درصد جوانه زنی در مزرعه را به خود اختصاص داده است، تیمارهای هموپلیمر سخت و نرم در غلظت‌های پایین (۰/۵٪ تا ۵٪ درصد) نیز از راندمان بسیار خوبی برخوردار بوده و در جدول مقایسه میانگین عمده‌تا در کلاس a قرار گرفته‌اند. با توجه به اهمیت استقرار و

جدول شماره ۱- تجزیه واریانس اثر پنج نوع پلیمر بر صفات بذر چغندر قند
Table1-Analysis of variance of effect of polymer on sugar beet seed seed traits

ضریب تغییرات (%)	مانع تغییر و میانگین مریعات S.O.V			صفات مورد بررسی Trait
	کل (df=63) Total	(df=63) Error	(df=20) تیمار Treatment	
9.91	307.9538	66.0634	241.8904**	جوانه زنی بلا فاصله بعد از پوشش Germination after coating
8.36	236.2019	45.4365	190.7654**	جوانه زنی یک ماه بعد از پوشش Germination after a month coating
7.81	228.0984	43.9365	184.1619**	جوانه زنی سه ماه بعد از پوشش Germination after three months coating
18.53	0.041717	0.07975	0.033742**	وزن تازه Fresh weight
21.39	0.000062	0.000018	0.000044**	وزن خشک Dry weight
17.50	3.2458	1.5173	1.7285**	طول ساقه چه Shoot length
14.52	2.3492	0.9746	1.3746**	طول ریشه چه Root length
14.31	297.7998	22.5797	266.0654**	استقرار گیاهی در مزرعه Plant establishment

** معنی دار در سطح احتمال ۱ درصد، * معنی دار در سطح احتمال ۵ درصد و ns: غیرمعنی دار

** Significant at 1%, * significant at 5%, ns: not significant

جدول ۲. مقایسه میانگین اثر نوع پوشش بر درصد جوانه زنی بلا فاصله بعد از پوشش coating material on germination after coating

نوع پوشش Coating	جوانه زنی Germination%	گروه آماری Classification
Control	93.5	a
HPS5%	90	ab
HPS10%	89.5	ab
CP5%	89	abc
HPS7.5%	89	abc
.5%·CP	88.5	abc
CP1%	87.5	abc
MP10%	87	abcd
HPH1%	87	abcd
MP1%	85.5	abcd
MP7.5%	84	abcd
.5%·MP	81.5	abcde
MP5%	80.5	abcde
CP7.5%	80	abcde
HPH5%	79	bcd
HPS1%	77	bcd
CP10%	75.5	cdef
.5%·HPS	73.5	def
HPH7.5%	70.5	ef
.5%·HPH	70	ef
HPH10%	65	f

میانگین‌های دارای حروف مشترک هر سوتون اختلاف معنی داری با یکدیگر ندارند.

Means with the same letter are not significant

جدول ۳. مقایسه میانگین اثر نوع پوشش بر درصد جوانه زنی یک ماه بعد از پوشش

Table 3. Mean comparison of different coating material on germination after a month

نوع پوشش Coating	جوانه زنی Germination%	گروه آماری Classification
MPI10%	90.5	a
HPH10%	88.5	ab
HPH0.5%	88.5	ab
CP1%	87	ab
HPS10%	84.5	abc
MPI1%	84	abc
MP0.5%	84	abc
HPH7.5%	84	abc
HPH1%	82	abcd
CP0.5%	82	abcd
MP7.5%	81	abcd
HPS0.5%	80	abcd
HPH5%	79.5	abcd
HPS1%	79.5	abcd
Control	79.25	abcd
HPS7.5%	79	abcd
MP5%	78	bcd
CP5%	77	bcd
HPSS%	75.25	cd
CP7.5%	71	d
CP10%	58.5	e

میانگین های دارای حروف مشترک در هر ستون اختلاف معنی داری با یکدیگر ندارند.

Means with the same letter are not significant

جدول ۴. مقایسه میانگین اثر نوع پوشش بر درصد جوانه زنی سه ماه بعد از پوشش

Table 4. Mean comparison of different coating material on germination after three months

نوع پوشش Coating	جوانه زنی Germination%	گروه آماری Classification
MP1%	95.5	a
CP0.5%	94.5	a
MP0.5%	93.5	ab
HPS7.5%	91.5	abc
MP10%	91	abc
HPS0.5%	90	abcd
MP7.5%	89	abcde
MP5%	88	abcdef
CP1%	87	abcdef
Control	86.5	abcdef
HPS5%	86	abcdef
HPS1%	83	bcddefg
HPH5%	83	bcddefg
HPH0.5%	83	bcddefg
HPS10%	81.5	cdefg
CP5%	81	cdefgh
HPH10%	79	defgh
HPH7.5%	78	efgh
CP7.5%	77.5	fgh
HPH1%	74	Gh
CP10%	70.5	H

میانگین های دارای حروف مشترک در هر ستون اختلاف معنی داری با یکدیگر ندارند.

Means with the same letter are not significant

جدول ۵- نتایج مقایسه میانگین اثربخشی نوع پلیمر بر صفات جوانه زنی چندنرقد در آزمایشگاه و قدرت نامه بذر در مزرعه با استفاده از آزمون
دانکن

Table5-Mean comparison of different traits affected by coating using Duncan test

تیمار Treatment	وزن تازه Fresh weight gr	وزن خشک Dry weight gr	طول ساقه چه Shoot length cm	طول ریشه چه Root length cm	قدرت نامه بذر در مزرعه Seed vigor %
Control	0.382 ^{cfg}	0.0137 ^c	7.85 ^{ab}	7.75 ^a	35 ^{cde}
MP10	0.427 ^{cdefg}	0.0202 ^{abcde}	7.52 ^{ab}	7.25 ^a	47 ^a
MP7.5	0.555 ^{abcd}	0.0233 ^{abc}	7.8 ^{ab}	6.72 ^{abc}	32 ^{def}
MP5	0.487 ^{abcdef}	0.0199 ^{abcde}	7.55 ^{ab}	7.2 ^{abc}	33 ^{def}
MP1	0.467 ^{bcd}	0.0196 ^{abcde}	7.32 ^{ab}	7 ^{abc}	30 ^{defg}
MP0.5	0.510 ^{abde}	0.0188 ^{bcd}	6.67 ^{ab}	6.57 ^{abc}	23 ^{gh}
HPS10	0.520 ^{abde}	0.0206 ^{bcd}	8.4 ^a	7.2 ^{abc}	23 ^{gh}
HPS7.5	0.622 ^{ab}	0.0243 ^{ab}	7.4 ^{ab}	6.52 ^{abc}	41 ^{abc}
HPS5	0.530 ^{abde}	0.0224 ^{abcd}	6.85 ^{ab}	5.57 ^c	47 ^a
HPS1	0.437 ^{cdefg}	0.0161 ^{cde}	7.22 ^{ab}	7.27 ^{abc}	33 ^{def}
HPS0.5	0.550 ^{abcd}	0.0183 ^{bcd}	6.85 ^{ab}	6.75 ^{abc}	41 ^{abc}
HPH10	0.627 ^a	0.0265 ^a	7.4 ^{ab}	6.57 ^{abc}	29 ^{fg}
HPH7.5	0.550 ^{abcd}	0.0263 ^a	6.25 ^b	6.92 ^{abc}	38 ^{cde}
HPH5	0.515 ^{abde}	0.0186 ^{bcd}	7.45 ^{ab}	6.92 ^{abc}	23 ^{gh}
HPH1	0.47 ^{2bcd}	0.0181 ^{bcd}	7.35 ^{ab}	6.37 ^{abc}	46 ^a
HPH0.5	0.507 ^{abde}	0.0225 ^{abcd}	5.92 ^b	6.4 ^{abc}	43 ^{ab}
CP10	0.350 ^{lg}	0.0183 ^{bcd}	6.2 ^b	6.17 ^{abc}	20 ^h
CP70.5	0.312 ^g	0.0187 ^{bcd}	5.92 ^b	7.2 ^{abc}	36 ^{cde}
CP5	0.575 ^{abc}	0.0157 ^{de}	7.45 ^{ab}	7.75 ^a	33 ^{def}
CP1	0.575 ^{abc}	0.0210 ^{abde}	6.5a ^b	6.5 ^{abc}	25 ^{fgh}
CP0.5	0.420 ^{defg}	0.0165 ^{cde}	5.92 ^b	7.32 ^{ab}	33 ^{def}

در شرایط مزرعه نیز پوشش های منوپلیمری و هموپلیمری در اکثر صفات مورد بررسی دارای میانگین بهتری بوده و از عملکرد قابل قبولی برخوردار بودند. به ویژه پوشش های منوپلیمری با غلطت بالا و هموپلیمری با غلطت کم در استقرار بذر در مزرعه عملکرد مطلوبی از خود بروز دادند.

نتیجه گیری کلی

در این آزمایش مشخص شد که پوشش دهی بذور با پلیمر نه تنها صدمه ای به آنها وارد نمی کند بلکه باعث حفظ و حتی افزایش کیفیت آنها نیز می شود. اگرچه برای تمامی صفات نمی توان یک تیمار مشخص مطلوب معرفی کرد اما با توجه به اهمیت صفات و پوشش بذر پوشش های منوپلیمری ۱ درصد و کوپلیمری ۵ درصد نتایج خوبی را از خود نشان دادند.

References

- Almeida, C., S. C. Rocha and F. L Razera .2005. Polymer Coating Germination and Vigor of broccoli seeds SCI. Agric.(Piracicaba, Braz.), V26,n.3, P.221-226.
- Duan, X., and J. S Burris .1997. Film coating impairs leaching of germination inhibitors in sugar beet seed. Crop sci 37:515-520
- Flangan, E. 2002.The control of seed quality and its relation to crop productivity, Proc. of the Aust. seed conf.,11-25.
- Hamdi Houlaso, F.N. Z. Shirazi, , A. Mahmoudi, , and D. Fatholah Taleqani, .2009.Crotonic use of acid in the preparation of vinyl polymers for use in seed treatment plants. MS. Thesis. Islamic Azad University,Karaj branch. Faculty of Science.

منابع

- Kirkland, E., R.E. Palanuk and H. V Ingmin.** 1985. Product of making seed Coating for increased yield. Patent United States. No. 4,495,724.
- Rosa, F., C. W. S. Hanson and J. S Mote.** 2007. Polymer based seed coating patent united state. Available at: <https://www.google.com/patents/US20070207927>.
- Schnieder, K., H., C. Taranta, W. Mayer, D. Voeste, E. Haden,G. Stammler, K. Kojima, M. Motoyoshi, N. Takayanagi, and O. Yamada.** 2007. patent united states. No. 0298965A1. Available at: <https://www.google.com/search?tbm=pts&hl=en&q=.+patent+united+states.+No.+0298965>.
- Tohidloo, G., and M. Kruse.** 2006. Zum Einfluss der Triebkraft des saatgut auf den Ertrag. Ein ueberblick (effect of seed vigor or yield – on overview) 118Verband deutscher landwirtschaftlicher untersuchungs-and forschungsanstalten (VDLUFA) Kongress in Freiburg, Germany. Kurzfassung der referate, P.140.
- Watts, H.** 1976. Method of coating seeds to control germination and the result coated patent United States. No 3, 947, 996.

Archive of SID