



دانشگاه شهروردی و نوین مهندسی کشاورزی

نشریه پژوهش در نسخوارکنندگان
جلد سوم، شماره چهارم، ۱۳۹۴
<http://ejrr.gau.ac.ir>

تأثیر مکمل نمودن جیره فلاشینگ میش‌های نژاد شال با روغن ماهی بر بازده تولیدمثلى پس از تلقيح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی

***نادر اسدزاده^۱، منوچهر سوری^۲، محمد مهدی معینی^۳ و حسن صادقی پناه^۳**

^۱دانشجوی دکتری و ^۲دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه،

^۳استادیار مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۰۹/۱۸؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۱۱/۰۴

چکیده

سابقه و هدف: اثرات سودمند افزودن مکمل‌های چربی دارای اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه شامل منابع امگا-۶ و امگا-۳ به جیره بر بازده تولیدمثلي دامها در مطالعات زیادی گزارش شده است. از طرفی یکی از مشکلات در اجرای طرح‌های اصلاح نژاد گوسفند، راندمان پایین تلقيح مصنوعی می‌باشد. تاکنون اثر ویژه افزودن روغن ماهی به عنوان منبع اسیدهای چرب امگا-۳ به جیره فلاشینگ میش بر بازده تولیدمثلي میش پس از تلقيح مصنوعی بررسی نشده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مکمل نمودن جیره فلاشینگ میش‌های نژاد شال با روغن ماهی بر بازده تولیدمثلي پس از تلقيح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی بود.

مواد و روش‌ها: تعداد ۱۱۱ رأس میش شال غیرشیرده و غیرآبستن، بر اساس جیره غذایی به سه گروه آزمایشی تقسیم شدند: ۱- گروه آزمایشی شاهد منفی (C-)، تغذیه شده با جیره فلاشینگ بدون مکمل چربی -۲- گروه آزمایشی شاهد مثبت (C+)، تغذیه شده با جیره فلاشینگ دارای ۳/۵ درصد مکمل چربی اشباع (پودر چربی پالم) و ۳- گروه آزمایشی روغن ماهی (FO)، تغذیه شده با جیره فلاشینگ دارای ۳/۵ درصد روغن ماهی. هم‌زمان سازی فحلی با استفاده از تیمار پروژستررون به مدت ۱۳ روز انجام شد. ۲۴ الی ۴۸ ساعت پس از خاتمه تیمار پروژستررون، نرخ بروز فحلی با استفاده از قوچ‌های مجهز به پیش‌بند و یراق نشانه گذار ثبت و ۴۸ ساعت

*مسئول مکاتبه: naderasadzadeh4@gmail.com

نادر اسدزاده و همکاران

پس از خاتمه تیمار پروژترون، تلقیح مصنوعی با روش لاپاراسکوپیک انجام شد. پانزده روز پس از تلقیح، قوچهای مجهر به براق نشانه‌گذار جهت تعیین نرخ بازگشت فحلی و جفتگیری با میش‌های آبستن نشده از تلقیح، وارد گله شدند. چهل روز پس از تلقیح، تشخیص آبستنی با روش اولتراسونوگرافی انجام شد. در زمان زایش تعداد و وزن برههای متولد شده و سه ماه بعد از آن، تعداد و وزن برههای از شیرگرفته برای هر میش تحت آزمایش، ثبت گردید و با استفاده از آنها صفات تولیدمثلى شامل نرخ آبستنی، نرخ زایش، نرخ سقط، نرخ مرده‌زایی، نرخ قصری، نرخ چندقلوزایی، نرخ زادآوری، نرخ بره‌زایی، محصول بره متولد شده، نرخ زنده‌مانی بره، نرخ بره‌گیری و محصول بره از شیرگرفته محاسبه شد.

یافته‌ها: افزودن روغن ماهی در جیره فلاشینگ، باعث افزایش نرخ بره‌گیری حاصل از تلقیح لاپاراسکوپیک و مجموع تلقیح لاپاراسکوپیک و جفتگیری طبیعی گردید ($p < 0.05$). افزایش نرخ بره‌گیری در میش‌های دریافت کننده روغن ماهی به دلیل بالاتر بودن نرخ چندقلوزایی و زادآوری بود؛ چرا که جیره‌های آزمایشی تأثیری بر نرخ آبستنی نداشتند ($p > 0.05$). در میش‌هایی که مکمل روغن هیدروژنه پالم (چربی اشباع) دریافت کرده بودند، نرخ زنده‌مانی بره از زمان تولد تا سن نود روزگی نسبت به دو گروه دیگر به طور معنی‌داری کمتر بود ($p < 0.05$).

نتیجه‌گیری: در برنامه‌های تلقیح مصنوعی و نیز جفتگیری طبیعی هم‌زمان شده، گنجاندن روغن ماهی در جیره فلاشینگ می‌تواند بازده تولیدمثلى را بهبود دهد. همچنین توصیه می‌شود، از بکار بردن مکمل چربی پالم هیدروژنه در جیره فلاشینگ گوسفند اجتناب شود.

واژه‌های کلیدی: میش، جیره فلاشینگ، روغن ماهی، تلقیح لاپاراسکوپیک، بازده تولیدمثلى

نشریه پژوهش در نسخوارکنندگان (۳)، شماره (۴) ۱۳۹۴

مقدمه

بازده تلقيح مصنوعی بهويژه با اسپرم منجمد در گوسفند بهدلیل ساختار آناتومیک گردن رحم و ويژگی های غشای اسپرم، در مقایسه با گاو و بز پایین تر می باشد (۲۹، ۳۴، ۲۲، ۴). راهکارهای تغذیه ای ممکن است تا حدودی جبران کتنده نقایص آناتومیک و فیزیولوژیک گوسفند در تلقيح مصنوعی باشند. نیتو و همکاران (۲۰۱۵) گزارش کردند که افزودن پودر ماهی به علاوه روغن ماهی به جireh میش تلقيح شده به روش لاپاراسکوپی، هرچند نرخ آبستنی را تحت تأثیر قرار نداد، ولی نرخ چندقلوژایی را افزایش داد (۳۹).

به طور کلی، بازده تولیدمثلى در گلهای گوسفند ایران پایین و در حدود ۰/۶۶ می باشد (۵). هرچند آمار دقیقی در خصوص بازده تلقيح مصنوعی در گلهای گوسفند و بز ایران در دسترس نمی باشد، اما نتایج کارهای انجام شده رضایت بخش نبوده است. در دهه های گذشته طرح اصلاح نژاد گوسفند (طرح محوری قوچ) با روش تلقيح مصنوعی سرویکال انجام شد و در سال های اخیر طرح تولید ترکیب ژنتیکی گوسفند پر تولید با استفاده از تلقيح مصنوعی لاپاراسکوپیک و سرویکال اسپرم گوسفندهای رومانف و پاکستانی توسط معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی در دست اجرا است. یکی از مشکلات اصلی این طرح ها پایین بودن نرخ باروری بوده که عملاً پیشرفت اين طرح ها را با مشکل مواجه ساخته است. بهبود بازده تولیدمثلى از جمله بازده تلقيح مصنوعی با استفاده از راهکارهای تغذیه ای، امروزه در دنيا بسيار مورد توجه می باشد. اثرات سودمند افزایش چربی جireh در مطالعات زيادي نشان داده شده است، به طوري که مکمل اسيدهای چرب غيراشياع در جireh به طرق مختلف می تواند بر عملکرد تولیدمثلى تأثير گذارد (۴۸، ۳۳، ۱۰). اسيدهای چرب تنها منبع ذخيره انرژی برای رشد و توسعه رويان قبل از جايگزيني می باشند و اسيدهای چرب غيراشياع خصوصاً ايکروزابتناوئيك و دكوزاهگزانوئيكها باعث بهبود كيفيت اوسيت و زندهمانی رويان تا قبل از جايگزيني از طريق بهبود متابوليسم چربی ذخيره ای می شوند (۵۵، ۱۸، ۱۷، ۱۵، ۹، ۱). صادقی پناه (۲۰۰۵)، اثر منابع مختلف مکمل چربی بر نرخ های آبستنی، برهزادی، دوقلوژایی و تولید بره به ازای هر راس میش را مورد مطالعه قرار داد و گزارش کرد که روغن سویا صفات فوق را به طور معنی داری نسبت به گروه شاهد بهبود داد (۴۳). اميروس و همکاران (۲۰۰۶) گزارش کرده اند که اسيدهای چرب جireh در گاوهای تغذیه شده با جireh های غنی از اسيديلينولنیک، بر اندازه فولیکول قبل از تخمکریزی تأثیر گذار است و پيشنهاد کردنده که اسيدهای چرب بلند زنجيره جireh می توانند رشد فولیکول ها و بازگشت چرخه های تخدمانی بعد از زایش را تحت تأثیر قرار دهند (۳). روغن ماهی حاوی

نادر اسدزاده و همکاران

غلظت‌های بالایی از دو اسید چرب غیراشباع ایکوزاپتناونئیک اسید^۱ و دکوزاهگزانوئیک اسید^۲ می‌باشد، بنابراین شاید ساخت $\text{PGF}_2\alpha$ ^۳ رحمی را تحت تأثیر قرار دهد. مهار تراوش $\text{PGF}_2\alpha$ با مصرف دو اسید چرب فوق، شاید بتواند مانع از پس‌روی نایهنجام جسم زرد آبستنی شده و باروری را از طریق افزایش زنده‌مانی جنین، افزایش دهد (۳۷، ۷). پتیت و همکاران در سال ۲۰۰۱ گزارش کردند، دانه بذرک که نسبت به مکمل چربی مکلاک حاوی مقادیر بیشتری اسیدهای چرب امگا-۳ و امگا-۶ است، موجب بهبود نرخ آبستنی ماده گاوها را شد (۴۰/۸۷/۵ درصد در مقابل ۵۰ درصد).

پژوهش‌های فوق‌الذکر در خصوص تأثیر مکمل‌های چربی امگا-۳ بر بازده تولیدمثلی عمدتاً روی گاو شیری و گوشتش انجام شده‌اند و در گزارش‌های مربوط به گوسفند، تأثیر منابع امگا-۳ بر بازده تولیدمثلی حاصل از جفتگیری طبیعی بررسی شده است؛ در حالی که این اثرات بر بازده تولیدمثلی حاصل از تلقیح مصنوعی می‌تواند متفاوت باشد. بازده تولیدمثلی حاصل از تلقیح مصنوعی با زمان ثابت^۴ که قطعاً متعاقب هم‌زمان‌سازی فحلی است، وابستگی بسیار زیادی به تراکم فحلی‌ها در ساعتی مشخص دارد و لذا هر تیماری که رشد و تخمکریزی فولیکول‌ها را بهتر هم‌زمان کند و در ساعت خاصی متراکم نماید، بازده تلقیح مصنوعی در زمان ثابت را بهبود و برعکس هر تیماری که بروز فحلی‌ها را غیرمتراکم کند، آنرا کاهش می‌دهد. در حالی که در خصوص جفتگیری طبیعی موضوع می‌تواند برعکس باشد؛ یعنی تیماری که تراکم فحلی شدید ایجاد می‌کند و برای مثال تمام میش‌ها در یک روز فحل می‌شوند، نسبت به تیماری که باعث فحل شدن میش‌ها طی دو یا سه روز می‌شود، بازده تولیدمثلی حاصل از جفتگیری طبیعی را ممکن است کاهش دهد؛ چرا که در تراکم شدیدتر حتی اگر نسبت قوچ به میش به درستی رعایت شود، ممکن است نرخ آبستنی پایین‌تر از زمانی باشد که قوچ‌ها فرصت دو یا سه روزه داشته باشند. در تحقیقی که توسط گالیور و همکاران (۲۰۱۰) در استرالیا انجام شد، تأثیر جیره غنی از امگا-۳ بر زمان بروز فحلی در میش‌های هم‌زمان شده با سیدر بررسی و گزارش شد که امگا-۳ باعث تاخیر در آغاز فحلی می‌شود (۲۰). در تحقیق مذکور از جفتگیری طبیعی استفاده شد و تاکنون گزارشی در خصوص تأثیر اختصاصی افزودن منبع امگا-۳ به جیره فلاشینگ میش بر بازده تولیدمثلی پس از تلقیح مصنوعی منتشر نشده است. در تنها تحقیقی که تا حدودی مشابه با مقاله حاضر می‌باشد، نیتو و همکاران (۲۰۱۵) در مکریک، اثر افزودن توام پودر ماهی به علاوه روغن ماهی به جیره پیش از تلقیح (به مدت پانزده روز)

1- Eicosapentaenoic acid (EPA)

2- Docosahexaenoic acid (DHA)

3- Prostaglandin F2α

4- Fixed time

نشریه پژوهش در نسخوارکنندگان (۳)، شماره (۴) ۱۳۹۴

را بر بازده تولیدمثلى میش بررسی کردند (۳۹). با توجه به این که پودر ماهی دارای پروتئین عبوری بوده و اثر برخی اسیدهای اmine بهویژه اسیدهای آmine شاخه دار بر فعالیت تحمدان اثبات شده است (۱۳ و ۵۵)، لذا در تحقیق مذکور امکان تفکیک اثرات پودر و روغن ماهی وجود نداشته است. همچنین پودر و روغن ماهی دو روز پیش از تلقیح از جیره حذف شده‌اند؛ در حالی که جیره فلاشینگ باید تا سه هفته بعد از تلقیح ادامه یابد و همان‌طور که پیشتر اشاره شد، بخشی از اثرات مغایر روغن ماهی بر بازده تولیدمثلى مربوط به بهبود زندگانی رویان طی دوره پس از تلقیح است. لذا مقاله حاضر اولین گزارش می‌باشد که به بررسی اثر اختصاصی گنجاندن روغن ماهی به عنوان منبع امگا-۳ در جیره فلاشینگ بر بازده تولیدمثلى حاصل از تلقیح مصنوعی در میش می‌پردازد.

مواد و روش‌ها

این آزمایش در ایستگاه تحقیقات گوسفند و بز موسسه تحقیقات علوم دامی کشور واقع در شهرستان کرج در سال ۱۳۹۳ و در فصل تولیدمثلي (شهریور و مهر) انجام شد. ۱۱۱ رأس میش شال غیرآبستن و غیرشیرده، قبل از شروع آزمایش با استفاده از باسکول دیجیتال و با دقت ۱۰۰ گرم وزن‌کشی شدند. هم‌زمان با وزن‌کشی امتیاز وضعیت بدنی میش‌ها با روش تامسون و میر (۱۹۹۴) تعیین شد (۵۲). سن تقریبی میش‌ها از روی دندان تعیین شد. میشها بر اساس سن ($1/25 \pm 0.04$)، وزن بدن ($50/40 \pm 0.05$) و امتیاز وضعیت بدن ($3/45 \pm 0.07$) طبقه‌بندی شده^۱ و سپس میش‌های هر طبقه به طور تصادفی بر اساس جیره غذائی به سه گروه آزمایشی اختصاص داده شدند.

گروه‌های آزمایشی عبارت بودند از: ۱- گروه آزمایشی شاهد منفی (C-)، تغذیه شده با جیره فلاشینگ بدون مکمل چربی (تعداد ۳۶ رأس)، ۲- گروه آزمایشی شاهد مثبت (C+)، تغذیه شده با جیره فلاشینگ دارای $3/5$ درصد مکمل چربی اشباع (پودر روغن هیدروژنه پالم)، (تعداد ۳۸ رأس) و ۳- گروه آزمایشی روغن ماهی (FO)، تغذیه شده با جیره فلاشینگ دارای $3/5$ درصد روغن ماهی (تعداد ۳۷ رأس). بر اساس نتایج پیش آزمون تحمل روغن ماهی (تغذیه با سطوح $2/5$ ، $3/5$ ، $4/5$ درصد از ماده خشک جیره) با استفاده از ۹ رأس میش سه ساله، درصد مکمل چربی در جیره گروه‌های دو و سه، $3/5$ درصد ماده خشک جیره تعیین شد. جیره‌های آزمایشی بر اساس جداول انجمن ملی تحقیقات گوسفند برای دوره جفت‌گیری میش تنظیم شد (۳۸) (جدول ۱). جیره‌های آزمایشی از ۱۴ روز (۲۰۰۷)

1- Body condition score

2- Stratification

3- National Research Council (NRC)

نادر اسدزاده و همکاران

قبل از تلقیح تا سه هفته پس از آن به میش‌ها خورانده شدند. هر گروه آزمایشی در سه آغل نیمه باز (۱۲-۱۳ رأسی) نگهداری می‌شد. دسترسی به آب و سنگ نمک آزاد بود. مواد خوراکی مورد استفاده شامل دو بخش علوفه و کنسانتره بود (جدول ۱). بخش علوفه‌ای جیره، از علف خشک یونجه و کاه بود که به قطعات ۲-۳ سانتی‌متری خرد گردیدند. جیره‌های غذایی به صورت خوراک مخلوط کامل^۱ تهیه گردیدند.

جدول ۱- اجزاء تشکیل دهنده و ترکیب مواد مغذی جیره‌های آزمایشی (بر اساس ماده خشک).

Table 1. Ingredient and nutrient composition of experimental diets (dry matter basis).

جیره‌های آزمایشی Experimental diets			اجزاء جیره Ingredients of diets
روغن ماهی Fish oil	شاهد مثبت Positive control	شاهد منفی Negative control	
32.9	32.9	21	یونجه خشک (درصد) Alfalfa hay (%)
38	38	37.2	کاه گندم (درصد) Wheat straw (%)
20.2	20.2	36.3	دانه چو (درصد) Barley grain (%)
-	3.5	-	پودر روغن هیدروژنه پالم (درصد) Hydrogenated palm oil powder (%)
3.5	-	-	روغن ماهی (درصد) Fish oil (%)
0.5	0.5	0.5	نمک (درصد) Salt (%)
0.5	0.5	0.5	مکمل ویتامینی و انتی اکسیدانت Vitamin and antioxidant (%)
3	3	3	بنتونیت (درصد) Bentonite (%)
1.4	1.4	1.5	دی کلسیم فسفات (درصد) Di-calcium phosphate (%)
مواد مغذی جیره Nutrient composition			
2.05	2.05	2.05	انرژی قابل متابولیسم (مگا کالری بر کیلو گرم) Metabolisable energy (Mcal/kg)
8.3	8.3	8.3	پروتئین خام (درصد) Crude protein (%)
1	1	0.9	کلسیم (درصد) Calcium (%)
0.43	0.43	0.45	فسفور (درصد) Phosphorus (%)
46.21	46.21	45.12	فibre نامحلول در شوینده خشکی (درصد) Natural detergent fiber (NDF) (%)
29.99	29.99	26.70	فibre نامحلول در شوینده اسیدی (درصد) Acid detergent fiber (ADF) (%)
4.47	4.47	1.14	عصاره اتری (درصد) Ether extracts (EE) (%)

1- Total Mixed Ration (TMR)

نشریه پژوهش در نسخوارکنندگان (۳)، شماره (۴) ۱۳۹۴

همزمان سازی فحلی با استفاده از اسفنج داخل واژنی پروژسترون (آرین پروجست، شرکت آرین فناوران فاریاب، ایران) به مدت ۱۳ روز انجام شد. روز اسفنج گذاری روز صفر در نظر گرفته شد و روز سیزدهم اسفنج ها کشیده و هم زمان ۴۰۰ واحد بین المللی هورمون گنادوتropin سرم مادیان آبستن^۱ (گناسر، شرکت هیپرا، اسپانیا) به صورت عضلانی تزریق شد. ظرف ۴۸ ساعت بعدی، هر صبح و عصر به مدت یک ساعت قوچ های تیزر مجهز به پیش بند و یراق نشانه گذار^۲ وارد گروه ها شده و فحل یابی از طریق مشاهده مستقیم انجام شد. در ضمن با توجه به مجهز بودن قوچ ها به یراق نشانه گذار، میش های فحل با رنگ علامت زده می شدند و در پایان هر بار فحل یابی، میش ها مهار و شماره ها ثبت می شدند. ۴۸ ساعت پس از خاتمه تیمار پروژسترون (روز پانزدهم آزمایش)، تلقیح مصنوعی با روش لایراسکوپیک (داخل رحمی) انجام شد. جهت انجام تلقیح لایراسکوپیک، تغذیه میش ها ۲۴ ساعت قبل از تلقیح (پس از وعده خوارک صبح) قطع شد و ۱۲ ساعت مانده به تلقیح آب آنها نیز قطع گردید. طی لایراسکوپی تعداد و اندازه فولیکول ها (بزرگ، متوسط و کوچک) و اجسام زرد روی هر دو تخمدان شمارش شدند. وجود جسم زرد به عنوان عدم فحلی در نظر گرفته شد که این میش ها تلقیح نشدند. وجود فولیکول گراف (بزرگتر از ۵ میلی متر) و یا جسم خونی نشان دهنده فحلی و یا وقوع تخمکریزی بود. همچنین پرخونی و انقباضات رحم به عنوان نشانه های فحلی در نظر گرفته شد. بدین ترتیب علاوه بر تشخیص فحلی از طریق قوچ فحل یاب، نرخ فحلی در زمان لایراسکوپی از طریق نشانه های ذکر شده نیز تعیین شد. بعد از انجام تلقیح، جهت جلوگیری از بروز عفونت های احتمالی ۲ سی سی پنی سیلین جی بنزاتین^۳ (LA) به میش ها تزریق شد. نیم ساعت بعد از پایان عملیات تلقیح، آب و خوارک در اختیار میش ها قرار گرفت. ۱۲ روز بعد از تلقیح مصنوعی، قوچ ها وارد گروه ها شده تا علاوه بر ثبت نرخ عدم بازگشت فحلی (با استفاده از یراق نشانه گذار ولی بدون پیش بند)، میش های غیر آبستن از طریق جفت گیری طبیعی امکان آبستنی پیدا کنند. میش هایی که به دلیل عدم تشخیص فحلی در زمان لایراسکوپی تلقیح نشدند، در برنامه جفت گیری طبیعی وارد شده و رکوردهای حاصل از جفت گیری طبیعی در آنها ثبت شدند. قوچ ها برای دو دوره فحلی بعدی (تا چهل روز بعد از تلقیح یعنی به مدت ۲۸ روز) با میش ها بودند. چهل روز بعد از تلقیح قوچ ها جدا شده و تشخیص آبستنی اول انجام شد. برای این کار از دستگاه اولترا سونوگرافی آلوکا^۴ مدل SSD-500 و

1- Pregnant mare's serum gonadotrophin (PMSG)

2- Marking harnesses

3- Penicillin g benzatin (L-A)

4- Aloka

نادر اسدزاده و همکاران

پروب خارجی مدل 5-935UST با فرکانس پنج مگاهرتز استفاده شد. با توجه به فاصله ۱۲ روزه تلکیح تا قوچ اندازی، در این مرحله فقط آبستنی‌های حاصل از تلکیح قابل تشخیص بود. دومین مرحله تشخیص آبستنی ۵۵ و سومین مرحله ۷۵ روز پس از تلکیح انجام شد تا آبستنی‌های حاصل از جفت‌گیری طبیعی اول و دوم نیز مشخص شوند. تمامی موارد سقط نیز ثبت شدند.

در زمان زایش، تاریخ زایش، تعداد، جنس و وزن بردهای متولد شده و اتفاقات زمان زایش شامل مرده‌زایی و تلفات مادر یا بره و سه ماه بعد از آن، تعداد و وزن بردهای از شیرگرفته برای هر میش تحت آزمایش، ثبت شدند. در طول دوره شیرخواری، تلفات و سایر اتفاقات برای مادر یا بردها ثبت شدند. با استفاده از اطلاعات فوق، صفات تولیدمثلی شامل نرخ آبستنی یا تعداد میش آبستن نسبت به تعداد میش در معرض جفت‌گیری (تشخیص آبستنی از طریق اولتراسونوگرافی)، نرخ زایش یا تعداد میش زایش کرده نسبت به تعداد میش در معرض جفت‌گیری، نرخ چندقلوzaی (تعداد میش چند قلوza نسبت به تعداد میش زایش کرده)، نرخ زادآوری یا تعداد بره متولد شده نسبت به تعداد میش زایش کرده، نرخ برده‌زایی یا تعداد بره متولد شده نسبت به تعداد میش در معرض جفت‌گیری، محصول بره متولد شده یا کیلوگرم بره متولد شده به ازای هر رأس میش در معرض جفت‌گیری، نرخ تلفات بره تا زمان از شیرگیری (سه ماهگی)، نرخ برده‌گیری یا تعداد بره از شیر گرفته به ازای هر رأس میش در معرض جفت‌گیری و محصول بره از شیر گرفته یا کیلوگرم بره از شیرگرفته به ازای هر رأس میش در معرض جفت‌گیری محاسبه گردیدند. از آنجایی که جیره‌های آزمایشی مربوط به دوره جفت‌دهی بودند و تأثیر آن‌ها بر تعداد جنین، در بردهای سقط شده نیز منعکس می‌باشد و از طرفی وقوع سقط مربوط به شرایط محیطی و مدیریت بعدی بوده و چندان متأثر از جیره دوره جفت‌دهی نیست، لذا در محاسبه نرخ‌های چندقلوzaی، زادآوری و برده‌زایی، بردهای سقط شده نیز در نظر گرفته شدند. البته یکبار هم این صفات بدون در نظر گرفتن موارد سقط محاسبه و ارائه شده‌اند.

داده‌ها در نرمافزار اکسل وارد و مرتب شدند، سپس با استفاده از نرمافزار SAS آنالیز گردیدند. برای فراسنجه‌های پارامتریک از رویه GLM استفاده و مقایسه میانگین‌ها با دستور PDIFL انجام شد. آنالیز کوواریانس برای امتیاز وضعیت بدنی، وزن و سن میش‌ها انجام شد که معنی دار نبودند و لذا در مدل گنجانده نشدند. برای فراسنجه‌های وزن‌های تولد و از شیرگیری آنالیز کوواریانس برای نوع تولد (تعداد هم‌زاد) و جنس انجام شد که با توجه به معنی دار شدن به عنوان عامل کوواریت در مدل آماری مربوط به صفات مذکور قرار گرفتند. برای فراسنجه‌های ناپارامتریک از آزمون یک طرفه ویلکاکسون^۱

1- Wilcoxon

نشریه پژوهش در نسخوارکنندگان (۳)، شماره (۴) ۱۳۹۴

استفاده شد، بدین ترتیب که برای فراسنجه‌هایی که تعداد تکرار بیش از ۳۰ بود از مقادیر P مربوط به تقریب نرمال^۱ و برای فراسنجه‌هایی که تعداد تکرار کمتر از ۳۰ بود، از مقادیر P مربوط به تقریب نرمال t ^۲ استفاده شد.

نتایج و بحث

نتایج اثر افرودن روغن ماهی به جیره فلاشینگ بر فراسنجه‌های فحلی میش در جدول ۲ ارایه شده است. نرخ بروز فحلی مشاهده شده (چشمی) طی ساعات پیش از تلقیح در گروهی که جیره فلاشینگ محتوی روغن ماهی مصرف کرده بود نسبت به گروه شاهد منفی (بدون مکمل چربی) تمایل به کاهش داشت ($P<0.10$). اما نرخ بروز فحلی لایپاراسکوپیک (از روی علائم تخدمان و رحم در زمان لایپاراسکوپی) تفاوت معنی‌داری بین سه گروه آزمایشی نداشت ($P>0.05$). این نتیجه نشان می دهد که روغن ماهی موجب کاهش شدت بروز فحلی (افزایش فحلی‌های خاموش) می‌شود. مطالعاتی که به بررسی تأثیر چربی اشباع و روغن ماهی یا سایر منابع امگا-۳ روی نرخ بروز فحلی در گوسفتند انجام شده باشند، بسیار کم هستند. گالیور و همکاران (۲۰۱۰) گزارش کردند که افزایش منبع امگا ۳ موجب تأخیر در فحلی میش‌ها می‌شود که می‌تواند به دلیل کاهش ساخت پروستاگلاندین‌های التهابی درگیر در آغاز فحلی و تخدمکریزی باشد (۲۰). نیتو و همکاران (۲۰۱۵) نیز تأخیر در شروع فحلی در اثر مصرف توام روغن و پودر ماهی را در میش گزارش کردند (۳۹). در مقاله حاضر تأثیر روغن ماهی بیشتر بر شدت بروز فحلی‌ها مشاهده شد؛ به طوری که برخی از میش‌ها رفتار فحلی را در مقابل قوچ فحلیاب نشان ندادند، ولی در زمان لایپاراسکوپی دارای فولیکول گراف یا جسم خونی و رحم پرخون بودند (فحلهای خاموش). کاهش شدت بروز فحلی در پژوهش حاضر نیز می‌تواند به واسطه کاهش ترشح پروستاگلاندین‌های دخیل در فحلی و تخدمکریزی باشد. همچنین از عوامل مؤثر بر شدت بروز فحلی افزایش غلظت استرادیول است (۲۷، ۳۰)، لذا جهت تفسیر دقیق‌تر تأثیر امگا ۳ بر زمان و شدت بروز فحلی، به سنجش غلظت استرادیول پس از خاتمه تیمار پروژسترون تا زمان تلقیح و نیز پویش دینامیک فولیکولی نیاز می‌باشد. لانگ و همکاران (۲۰۱۴) با مطالعه اثر افرودن چربی غیراشباع و اشباع به جیره تلیسه‌ها در مقایسه با گروه شاهد نشان دادند که نرخ بروز فحلی ۴۸ ساعت پس از خاتمه تیمار پروژسترون در گروه شاهد اندکی بالاتر از دو گروه دیگر و ۹۶ ساعت بعد کمتر از دو گروه دیگر بود (۳۲). متوس و همکاران (۲۰۰۴) گزارش کردند که جیره حاوی روغن ماهی باعث کاهش غلظت متابولیت‌های PGF2α در خون محیطی می‌گردد (۳۶).

1- Normal approximation

2- Tapproximation

نادر اسدزاده و همکاران

به عنوان عامل تحلیل برنده جسم زرد شناخته می‌شود و لذا هر چه غلطت آن بالاتر باشد، تحلیل جسم زرد کامل‌تر بوده و اثر سرکوب‌گر پروژسترون بر رشد فولیکول‌ها برداشته شده و در اثر رشد سریع‌تر فولیکول‌ها و تشکیل فولیکول‌یا فولیکول‌های تخمکریز، سطح استرادیول خون افزایش یافته و رفتار فحلی تشدید می‌شود (۳۶، ۴۳). لذا اختلالی که در ترشح PGF2 α در اثر مصرف روغن ماهی رخ می‌دهد، می‌تواند شدت این مکانیسم را کمتر کند.

نرخ عدم بازگشت فحلی طی ۱۲ الی ۴۰ روز پس از تلقیح، تفاوت معنی‌داری بین سه گروه آزمایشی نداشت ($P > 0.05$). با توجه به این‌که نرخ عدم بازگشت فحلی یکی از شاخص‌های تقریبی میزان موفقیت تلقیح مصنوعی می‌باشد، لذا این نتیجه نشان می‌دهد که منبع روغن امگا-۳ و نیز چربی اشباع تأثیر معنی‌داری بر نرخ آبستنی حاصل از تلقیح لاپاراسکوپیک نداشته‌اند.

جدول ۲- اثر افزودن روغن ماهی به جیره فلاشینگ بر نرخ فحلی و نرخ عدم بازگشت فحلی در میش‌های شال.

Table 3. Effect of adding fish oil to flushing diet on estrus and non-return rates of Chaal ewes.

P value			خطای	گروه‌های آزمایشی				فراسنجه parameter
C+ vs. FO	C- vs. FO	C- vs. C+		استاندارد SEM	روغن ماهی Fish oil	شاهد مثبت Positive control	شاهد منفی Negative control	
0.13	0.06	0.32	4.038	67.57 (25/37)	78.95 (30/38)	83.33 (30/36)	نرخ بروز فحلی مشاهده شده (درصد) Obvious estrus rate (%)	
0.36	0.34	0.22	2.603	91.89 (34/37)	89.47 (34/38)	94.44 (34/36)	نرخ بروز فحلی لاپاراسکوپیک (درصد) Laparoscopic estrus rate (%)	
0.44	0.42	0.47	5.092	59.38 (19/32)	57.58 (19/33)	56.67 (17/30)	نرخ عدم بازگشت فحلی (درصد) Non-return rate (%)	

C-: گروه شاهد منفی، تغذیه شده با جیره فلاشینگ بدون مکمل چربی

C+: گروه شاهد مثبت، تغذیه شده با جیره فلاشینگ دارای ۳/۵ درصد مکمل چربی اشباع (پودر روغن هیدروژنه پالم)

FO: گروه روغن ماهی، تغذیه شده با جیره فلاشینگ دارای ۳/۵ درصد روغن ماهی

اعداد داخل پارانتز توزیع فراوانی مشاهدات (تعداد میش که صفت موردنظر را بروز داده‌اند نسبت به تعداد کل میش مشمول در هر گروه) می‌باشد.

نتایج اثر افزودن روغن ماهی به جیره فلاشینگ بر نرخ‌های آبستنی، زایش، سقط، مردهزایی و قصری حاصل از تلقیح و جفت‌گیری طبیعی میش در جدول ۳ ارایه شده است. هر چند افزودن روغن ماهی به جیره فلاشینگ، نرخ آبستنی حاصل جفت‌گیری طبیعی و مجموع تلقیح و جفت‌گیری طبیعی را نسبت به جیره‌های

نشریه پژوهش در نسخوارکنندگان (۳)، شماره (۴) ۱۳۹۴

C- و C+ از نظر عددی افزایش داده است، ولی تفاوت بین گروه‌ها معنی دار نبود ($P > 0.05$). نیتو و همکاران (۲۰۱۵) گزارش کردند که افزودن توام روغن و پودر ماهی تأثیری بر نرخ آبستنی میش‌ها پس از تلقیح مصنوعی لایراسکوپیک ندارد (۳۹) با وجود گزارش‌های مبنی بر تأثیر مثبت مکمل‌های چربی غیراشباع از جمله منابع امگا-۶ و امگا-۳ بر نرخ آبستنی به ویژه در ماده گاوها (گزارش‌ها در خصوص گوسفند کمر می‌باشند)، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که منع چربی امگا-۳ (روغن ماهی) و همچنین مکمل چربی اشباع پالم، تأثیری بر نرخ آبستنی میش ندارند. صادقی پناه و همکاران (۲۰۰۶)، گزارش کردند که استفاده از مکمل چربی بهویژه منع امگا ۶ (روغن سویا) در جیره فلاشینگ میش‌های زندی نرخ آبستنی را نسبت به گروه شاهد افزایش داد (۴۴). جوشم (۲۰۰۷) استفاده از اسیدهای چرب زنجیر بلند حاصل از روغن پالم یا ترکیب اسیدهای چرب امگا-۶ و ترانس اکتاونئیک اسید در جیره گاوها را مورد مطالعه قرارداد و نشان داد که با تشخیص آبستنی در فاصله ۲۷ تا ۴۱ روز پس از تلقیح مصنوعی، آبستنی گاوها بیکار اسیدهای چرب غیراشباع استفاده کردند، $1/5$ برابر بیشتر از گروه روغن پالم بود (۲۶). حافظ و همکاران (۲۰۱۱) گزارش کردند که استفاده از چربی محافظت شده بهمیزان ۵ درصد از کل ماده خشک مصرفی در جیره بزهای زارائی^۱ از ۲۱ روز قبل از جفت‌گیری تا ۴۲ روز پس از جفت‌گیری نرخ آبستنی را به‌طور معنی داری افزایش می‌دهد (۲۱). افزایش کیفیت جنین و توانایی آن برای اتصال به سلول‌های رحم نقش حیاتی در برقراری آبستنی دارد (۴۲). برای رسیدن به نرخ آبستنی بالا، باید در دوره پس از تلقیح، تولید پروستاگلاندین را کاهش داد تا از جسم زرد حمایت شود که این امر باعث اطمینان از تولید پروژسترون شده و برای زنده‌مانی جنین حیاتی است (۱۶). ایکوزاپتانویک اسید و دوکوزاهمگزانویک اسید بخش اصلی اسیدهای چرب در فرآورده‌های دریابی را تشکیل می‌دهند (۵۰). این دو اسید چرب موجب مهار ترشح PGF_{2α} و مانایی جسم زرد آبستنی می‌شوند، در نتیجه مرگ و میر رویان کاهش می‌یابد (۳۵، ۳۷، ۴۹).

متعاقب نرخ آبستنی، افزودن روغن ماهی به جیره فلاشینگ، تأثیر معنی داری بر نرخ زایش حاصل از تلقیح بین گروه‌ها نداشت ($P > 0.05$). نرخ سقط و مرده‌زایی در میش‌هایی که هیچ نوع مکمل چربی دریافت نکردند (شاهد منفی) نسبت به دو گروه دیگر از نظر عددی بیشتر بود که تفاوت نرخ سقط در گروه شاهد منفی با گروه دریافت کننده مکمل چربی اشباع پالم تمایل به معنی داری داشت ($P < 0.10$). نرخ قصری در گروه روغن ماهی از نظر عددی کمترین بود که تفاوت آن با دو گروه دیگر معنی دار نبود.

1- Zaraibi

نادر اسدزاده و همکاران

(P<0.10). پیت و همکاران در سال ۲۰۰۲ گزارش کردند که درصد مرگ و میر رویان در ماده گاوهایی که دانه بذرک (منبع امگا ۳) خوردند صفر، در آن‌هایی که دانه سویا خوردند ۱۳/۶ و در آن‌هایی که مکمل چربی مگالاک خوردند ۱۵/۴ بود (۴۱).

جدول ۳- اثر افزودن روغن ماهی به جیره فلاشینگ بر نرخ‌های آبستنی، زایش، سقط، مردهزایی و قصری حاصل از تلقیح لاپاراسکوپیک و جفت‌گیری طبیعی در میش‌های شال.

Table 4. Effect of adding fish oil to flushing diet on pregnancy, parturition, abortion, stillbirth and barren rates from laparoscopic insemination and natural mating of Chaal ewes.

P value				گروه‌های آزمایشی experimental groups				فراسنجه parameter
C+ vs. FO	C- vs. FO	C- vs. C+	خطای استاندارد SEM	روغن ماهی Fish oil	شاهد مشتبه Positive control	شاهد منفی Negative control		
0.44	0.36	0.31	5.057	57.58 (19/33)	59.38 (19/32)	53.13 (17/32)	نرخ آبستنی حاصل از تلقیح (درصد) Pregnancy rate from laparoscopic AI (%)	
0.23	0.36	0.37	6.444	76.47 (13/17)	64.70 (11/17)	70.59 (12/17)	نرخ آبستنی حاصل از جفت‌گیری طبیعی (درصد) Pregnancy rate from natural mating (%)	
0.25	0.33	0.41	3.401	88.89 (32/36)	83.33 (30/36)	85.29 (29/34)	نرخ آبستنی حاصل از مجموع تلقیح و جفت‌گیری طبیعی (درصد) Accumulated pregnancy rate from AI & natural mating (%)	
0.35	0.36	0.23	5.081	54.54 33)/(18	59.37 32)/(19	50.00 32)/(16	نرخ زایش حاصل از تلقیح (درصد) Parturition rate from laparoscopic AI (%)	
0.23	0.23	0.50	6.562	76.47 17)/(13	64.71 17)/(11	64.71 17)/(11	نرخ زایش حاصل از جفت‌گیری طبیعی (درصد) Parturition rate from natural mating (%)	
0.37	0.23	0.34	3.664	86.11 36)/(31	83.33 36)/(30	79.41 34)/(27	نرخ زایش حاصل از مجموع تلقیح و جفت‌گیری طبیعی (درصد) Accumulated Parturition rate from AI natural mating (%)	
0.17	0.25	0.07	1.882	3.13 32)/(1	0.00 30)/(0	6.90 29)/(2	نرخ سقط (درصد) Abortion rate (%)	
0.50	0.15	0.15	1.136	0.00 31)/(0	0.00 30)/(0	3.70 27)/(1	نرخ مردهزایی (درصد) Stillbirth rate (%)	
0.25	0.33	0.41	3.401	11.11 36)/(4	16.66 36)/(6	14.70 34)/(5	نرخ قصری (درصد) Barren rate (%)	

C-: گروه شاهد منفی، تغذیه شده با جیره فلاشینگ بدون مکمل چربی

C+: گروه شاهد مشتبه، تغذیه شده با جیره فلاشینگ دارای ۳/۵ درصد مکمل چربی اشباع (پودر روغن هیدروژنه پالم)

FO: گروه روغن ماهی، تغذیه شده با جیره فلاشینگ دارای ۳/۵ درصد روغن ماهی

اعداد داخل پارانتز توزیع فراوانی مشاهدات (تعداد میش که صفت مورد نظر را بروز داده‌اند نسبت به تعداد کل میش مشمول در هر گروه) می‌باشد.

 نشریه پژوهش در نسخوارکنندگان (۳)، شماره (۴) ۱۳۹۴

نتایج اثر افزودن روغن ماهی به جیره فلاشینگ بر نرخ چندقلوزایی، زادآوری و برهزایی حاصل از تلقیح و جفت‌گیری طبیعی میش در جدول ۴ ارایه شده است. به‌طور کلی میش‌های دریافت کننده روغن ماهی بیشترین و میش‌های دریافت کننده مکمل چربی اشباع کمترین نرخ چندقلوزایی و زادآوری حاصل از تلقیح و مجموع تلقیح و جفت‌گیری طبیعی را داشتند که با توجه به مقادیر P می‌توان اظهار کرد که این تفاوت تمایل به افزایش داشته است (در حالت عدم در نظر گرفتن موارد سقط $P=0.11$ و با در نظر گرفتن موارد سقط $P=0.12$). اثرات مفید اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه بر نرخ چندقلوزایی توسط محققین دیگر نیز گزارش شده است (۴۳، ۴۰، ۴۱، ۳۹). هگازی و همکاران (۱۹۹۹) گزارش کردند میش‌هایی که از منابع مختلف مکمل چربی استفاده کرده بودند، نرخ‌های چندقلوزایی و زادآوری بالاتری داشتند (۲۳). تایتی و آواد (۲۰۰۷) گزارش کردند که نرخ چندقلوزایی در بزهای تعذیه شده با مکمل چربی بالاتر از گروه شاهد بود (۵۴). دقیق‌کیا و همکاران (۲۰۱۲)، گزارش کردند که استفاده از دانه‌های روغنی بذرک و سویا در جیره فلاشینگ میش‌های معانی باعث افزایش نرخ چندقلوزایی شده است (۱۱). تعداد تخمک آزاد شده از تخدمان‌ها یک عامل مهم در چندقلوزایی دام‌های ماده می‌باشد. مکمل‌های اسید چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه ممکن است از طریق تغییر ترشح هورمون‌های متابولیک و متabolیت‌های پلاسمای رشد فولیکول‌ها و در نتیجه تعداد فولیکول‌های تخمک‌ریز را تحت تأثیر قرار دهن (۴۳). گزارشات برخی دیگر از محققان حاکی از بی اثر بودن مکمل چربی بر بازده تولیدمثل از جمله دوقلووزایی می‌باشد (۴۷، ۴۶، ۲۸، ۲).

میش‌های دریافت کننده روغن ماهی بیشترین و میش‌های دریافت کننده مکمل چربی اشباع کمترین نرخ برهزایی را از نظر عددی داشتند. هرچند تفاوت بین این دو گروه در خصوص نرخ برهزایی حاصل از تلقیح و حاصل از جفت‌گیری طبیعی به‌طور مجزا معنی‌دار نبود، ولی تفاوت نرخ برهزایی حاصل از مجموع تلقیح و جفت‌گیری طبیعی تمایل به افزایش داشت ($P<0.10$). چندین مطالعه اثر مثبت منابع مختلف اسیدچرب بر عملکرد تولیدمثلی را گزارش کرده‌اند (۴۵). چربی موجود در جیره ممکن است رشد و توسعه فولیکول‌ها را از طریق تأثیر بر GnRH افزایش دهد و در نتیجه باعث افزایش دوقلووزایی و تعداد بره متولد شده گردد (۳۳، ۲۴، ۲۲، ۱۳). اما، اکبری‌نژاد و همکاران (۲۰۱۲) گزارش کردند که استفاده از منابع مختلف اسیدچرب (دانه کتان، دانه گلنگ، روغن پالم و شاهد) تأثیر معنی‌داری بر عملکرد تولیدمثلی از جمله نرخ زادآوری و باروری نداشت (۲).

نادر اسدزاده و همکاران

جدول ۴- اثر افزودن روغن ماهی به جیره فلاشینگ بر نرخ‌های چند قلوزایی، زادآوری و بوهزایی حاصل از تلقیح لپاراسکوپیک و جفت‌گیری طبیعی در میش‌های شال.

Table 5. Effect of adding fish oil to flushing diet on multiple lambing, prolificacy and fecundity rates from laparoscopic insemination and natural mating of Chaal ewes.

P value			خطای استاندارد SEM	گروه‌های آزمایشی experimental groups			فراستجه parameter
C+ vs. FO	C- vs. FO	C- vs. C+		روغن ماهی Fish oil	شاهد مثبت Positive control	شاهد منفی Negative control	
0.13	0.30	0.29	5.781	31.58 (6/19)	15.79 (3/19)	23.53 (3/17)	نرخ چندقلوزایی حاصل از تلقیح (درصد) Multiple lambing rates from laparoscopic AI (%)
0.34	0.48	0.32	5.846	15.38 (2/13)	9.09 (1/11)	16.67 (2/12)	نرخ چندقلوزایی حاصل از جفت‌گیری طبیعی (درصد) Multiple lambing rate from natural mating (%)
0.12	0.35	0.23	4.199	25.00 (8/32)	13.33 (4/30)	20.69 (6/29)	چندقلوزایی حاصل از مجموع تلقیح و جفت‌گیری طبیعی (درصد) Accumulated multiple lambing rate from AI and natural mating (%)
0.11	0.26	0.30	4.233	25.81 (8/31)	13.33 (4/30)	18.52 (5/27)	چندقلوزایی حاصل از تلقیح و جفت‌گیری طبیعی (بدون در نظر گرفتن برده‌های سقط شده) (درصد) Accumulated multiple lambing rates from AI & natural mating (Regardless of aborted lambs) (%)
0.13	0.35	0.27	6.471	131.58 (25/19)	115.79 (22/19)	129.41 (22/17)	نرخ زادآوری حاصل از تلقیح (درصد) Prolificacy from laparoscopic AI (%)
0.34	0.48	0.32	5.846	115.38 (15/13)	109.09 (12/11)	116.66 (14/12)	نرخ زادآوری حاصل از جفت‌گیری طبیعی (درصد) Prolificacy from natural mating (%)
0.12	0.38	0.22	4.560	125.00 (40/32)	113.33 (34/30)	124.14 (36/29)	مجموع نرخ زادآوری حاصل از مجموع تلقیح و جفت‌گیری طبیعی (درصد) Accumulated prolificacy from AI & natural mating (%)
0.11	0.26	0.30	4.233	125.81 (39/31)	113.33 (34/30)	118.52 (32/27)	نرخ زادآوری حاصل از مجموع تلقیح و جفت‌گیری طبیعی (بدون در نظر گرفتن برده‌های سقط شده) (درصد) Accumulated prolificacy from AI and natural mating (Regardless of aborted lambs) (%)
0.39	0.32	0.50	7.322	75.76 (25/33)	68/75 (22/32)	68/75 (22/32)	نرخ بوهزایی حاصل از تلقیح (درصد) Fecundity from laparoscopic AI (%)
0.20	0.39	0.30	8.411	88.23 (15/17)	70.59 (12/17)	82.35 (14/17)	نرخ بوهزایی حاصل از جفت‌گیری طبیعی (درصد) Fecundity from natural mating (%)
0.10	0.30	0.25	5.675	111.11 (40/36)	94.44 (34/36)	105.88 (36/34)	نرخ بوهزایی حاصل از مجموع تلقیح و جفت‌گیری طبیعی (درصد) Accumulated fecundity from AI & mating (%)
0.15	0.16	0.48	5.607	108.33 (39/36)	94.44 (34/36)	94.12 (32/34)	نرخ بوهزایی حاصل از مجموع تلقیح و جفت‌گیری طبیعی (بدون در نظر گرفتن برده‌های سقط شده) (درصد) Accumulated fecundity rate from AI & mating (Regardless of aborted lambs) (%)

C-: گروه شاهد منفی، تغذیه شده با جیره فلاشینگ بدون مکمل چربی

C+: گروه شاهد مثبت، تغذیه شده با جیره فلاشینگ دارای ۳/۵ درصد مکمل چربی اشباع (پودر روغن هیدروژنه پالم)

FO: گروه روغن ماهی، تغذیه شده با جیره فلاشینگ دارای ۳/۵ درصد روغن ماهی

اعداد داخل پارانتز توزیع فراوانی مشاهدات (تعداد میش که صفت موردنظر را بروز داده‌اند نسبت به تعداد کل میش مشمول در هر گروه) می‌باشد.

نشریه پژوهش در نسخوارکنندگان (۳)، شماره (۴) ۱۳۹۴

نتایج مربوط به میانگین مجموع وزن تولد برها و محصول بره متولد شده در جدول ۵ ارایه شده است. تفاوت معنی داری بین گروه های آزمایشی از نظر وزن تولد برها وجود نداشت ($P > 0.05$). هرچند میانگین وزن تولد حاصل از تلقیح در گروه روغن ماهی نسبت به دو گروه دیگر از نظر عددی پایین تر بود، اما علت این امر را می توان به نرخ چندقلو زایی بالاتر در گروه روغن ماهی نسبت داد؛ چرا که وزن تولد برها دو یا چندقلو نسبت به تک قلو پایین تر است و با توجه به قرار دادن اثر نوع تولد (تعداد هم زاد) در مدل آماری به عنوان عامل کوواریت، این تفاوت معنی دار نشده است. به طور کلی پایین تر بودن وزن تولد در گروه FO به دلیل گنجاندن روغن ماهی در جیره فلاشینگ در دوره جفت دهی نبوده و به دلیل بالاتر بودن چندقلو زایی در این گروه می باشد. فریشی و همکاران (۲۰۰۷) اثر استفاده از مکمل های چربی در دوره جفت گیری بر صفات تولید ممثلی گوسفند مهربانی را مورد مطالعه قرار داده و گزارش کردند که استفاده از مکمل چربی بر روی میانگین وزن تولد برها معنی دار نبود (۱۹). تایتی و همکاران (۲۰۰۸) و برخی محققین دیگر نیز عدم تأثیر مکمل چربی بر وزن تولد گوساله ها را گزارش داده اند (۵۳، ۳۱، ۱۴، ۶).

محصول بره متولد شده حاصل از تلقیح بین گروه های آزمایشی تفاوت معنی داری نداشت ($P > 0.05$). هرچند میانگین وزن تولد در گروه روغن ماهی نسبت به دو گروه دیگر پایین بود، ولی از نظر عددی، محصول بره متولد شده حاصل از مجموع تلقیح و دو جفت گیری طبیعی در گروه روغن ماهی به علت چندقلو زایی بالاتر، در این گروه بیشتر بود که تفاوت از لحاظ آماری معنی دار نبود ($P > 0.05$). در این خصوص گزارش منتشر شده ای از محققین دیگر یافت نشد.

نادر اسدزاده و همکاران

جدول ۵- اثر افزودن روغن ماهی به جیره فلاشینگ بر وزن تولد و محصول بره متولد شده حاصل از تلخیج لپاراسکوپیک و جفت‌گیری طبیعی در میش‌های شال.

Table 8. Effect of adding fish oil to flushing diet on lamb birth weight and born lamb crop from laparoscopic insemination and natural mating of Chaal ewes.

P value			گروه‌های آزمایشی experimental groups					فراسنجه parameter
C+ vs. FO	C- vs. FO	C- vs. C+	خطای استاندارد SEM	روغن ماهی Fish oil	شاهد ثبت Positive control	شاهد منفی Negative control		
0.27	0.68	0.51	0.103	4.20	4.62	4.43	وزن تولد حاصل از تلخیج (کیلوگرم) lamb birth weight from laparoscopic AI (Kg)	وزن تولد حاصل از جفت‌گیری طبیعی (کیلوگرم) Lamb birth weight from natural mating (Kg)
0.21	0.71	0.39	0.123	5.20	5.00	5.06	وزن تولد حاصل از مجموع تلخیج و جفت‌گیری طبیعی (کیلوگرم) Accumulated lamb birth weight from AI and natural mating (Kg)	وزن تولد حاصل از مجموع تلخیج و جفت‌گیری طبیعی (کیلوگرم) Accumulated lamb birth weight from AI and natural mating (Kg)
0.88	0.91	0.80	0.086	4.58	4.75	4.69	محصول بره متولد شده حاصل از تلخیج (کیلوگرم) Born lamb crop from laparoscopic AI (Kg)	محصول بره متولد شده حاصل از جفت‌گیری طبیعی (کیلوگرم) Born lamb crop from natural mating (Kg)
0.87	0.43	0.35	0.294	3.05	3.17	2.49	محصول بره متولد شده حاصل از مجموع تلخیج و جفت‌گیری طبیعی (کیلوگرم) Accumulated born lamb crop from AI and natural mating (Kg)	محصول بره متولد شده حاصل از مجموع تلخیج و جفت‌گیری طبیعی (کیلوگرم) Accumulated born lamb crop from AI and natural mating (Kg)
0.30	0.48	0.74	0.413	4.59	3.53	3.87	C-: گروه شاهد منفی، تغذیه شده با جیره فلاشینگ بدون مکمل چربی	C+: گروه شاهد مثبت، تغذیه شده با جیره فلاشینگ دارای ۳/۵ درصد مکمل چربی اشباع (پودر روغن هیدروژنه پالم)
0.41	0.25	0.72	0.241	4.96	4.49	4.27	FO: گروه روغن ماهی، تغذیه شده با جیره فلاشینگ دارای ۳/۵ درصد روغن ماهی	FO: گروه روغن ماهی، تغذیه شده با جیره فلاشینگ دارای ۳/۵ درصد روغن ماهی

نشریه پژوهش در نسخوارکنندگان (۳)، شماره (۴) ۱۳۹۴

نتایج اثر افزودن روغن ماهی به جیره فلاشینگ بر نرخ‌های زنده‌مانی و بره‌گیری (از شیرگیری) حاصل از تلقیح و جفت‌گیری طبیعی در جدول ۶ ارایه شده‌اند. نرخ زنده‌مانی بره از زمان تولد تا سن نود روزگی، در میش‌هایی که روغن پالم هیدروژنه دریافت کرده بودند، نسبت به دو گروه دیگر به‌طور معنی‌داری کمتر بود ($P < 0.05$). مقاله حاضر، اولین گزارش در خصوص تأثیر منفی گنجاندن روغن پالم هیدروژنه در جیره دوره جفت‌دهی گوسفنده بزرگ‌ها پس از تولد (۵ ماه بعد از جفت‌دهی) می‌باشد و نمی‌توان با قطعیت در خصوص این نتیجه اظهار نظر کرد؛ اما این پرسش مطرح می‌شود که آیا روغن هیدروژنه پالم تأثیر منفی بر کیفیت رویان تشکیل شده می‌گذارد که مرگ و میر بره را در بعد از تولد افزایش می‌دهد؟ آیا سازوکار این رخداد، از طریق تأثیر ایزومرهای اسیدچرب تشکیل شده در فرآیند هیدروژنه کردن، بر ژنوم رویان می‌باشد یا سازوکارهای دیگری دخیل هستند؟ اینها پرسش‌هایی هستند که باید در آینده پاسخ داده شوند. اگر این اتفاق تصادفی نباشد، باید از افزودن مکمل‌های چربی اشباع شده به جیره در دوره جفت‌دهی جداً اجتناب کرد. اپی ژنتیک یا تأثیر عوامل محیطی، مواد شیمیایی و ترکیبات خوراکی بر بیان ژن‌ها امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. نتایج تحقیقات منتشر شده در مجله نیچر (۲۰۱۴)، نشان می‌دهد که تغذیه مادر با یک رژیم غذایی پرچرب باعث الصاق برچسب‌های شیمیایی روی ژنوم رویان شده و باعث روشن یا خاموش شدن ژن‌های خاص می‌گردد. لذا بسیاری از ناهنجاری‌های ژنتیکی که در دوره جنینی و بعد از تولد بروز می‌کنند، می‌توانند در اثر تغذیه والدین در دوره آمیزش حاصل شده باشند (۲۵).

نرخ بره‌گیری حاصل از تلقیح در گروه روغن ماهی نسبت به دو گروه دیگر به‌طور معنی‌داری بالاتر بود ($p < 0.05$). نرخ بره‌گیری حاصل از مجموع تلقیح و جفت‌گیری طبیعی نیز در گروه روغن ماهی به‌طور معنی‌داری بالاتر از گروه مکمل چربی اشباع بوده ($P < 0.05$) و نسبت به گروه شاهد منفی نیز تمايل به افزایش داشت ($P < 0.10$). این نتیجه به‌دلیل بالاتر بودن نرخ بره‌زنی در گروه روغن ماهی بود که با توجه به نرخ زنده‌مانی صدرصدی در این گروه، باعث شد نرخ بره‌گیری (از شیرگیری) نیز در آن بالاتر باشد.

نادر اسدزاده و همکاران

جدول ۶- اثر افزودن روغن ماهی به جیره فلاشینگ بر نرخ های زنده مانی و بره گیری (از شیر گیری) حاصل از تلقیح لپاراسکوپیک و جفت گیری طبیعی در میش های شال.

Table 10. Effect of adding fish oil to flushing diet on lamb viability and weaning rates from laparoscopic insemination and natural mating of Chaal ewes.

P value			خطای استاندارد SEM	گروه های آزمایشی experimental groups				فراسنجه parameter
C+ vs. FO	C- vs. FO	C- vs. C+		روغن ماهی Fish oil	شاهد مثبت Positive control	شاهد منفی Negative control		
0.07	0.50	0.10	2.192	100.00 (24/24)	91.00 (20/22)	100.00 (18/18)	نرخ زنده مانی بره حاصل از تلقیح (درصد) Lamb viability rate from laparoscopic AI (%)	
0.15	0.50	0.17	2.500	100.00 (15/15)	91.67 (11/12)	100.00 (13/13)	نرخ زنده مانی بره حاصل از جفت گیری طبیعی (درصد) Lamb viability rate from natural mating (%)	
0.03	0.50	0.04	1.649	100.00 (39/39)	91.18 (31/34)	100.00 (31/31)	نرخ زنده مانی بره حاصل از مجموع تلقیح و جفت گیری طبیعی (درصد) Accumulated lamb viability rate from AI and natural matting (%)	
0.05	0.05	0.46	8.046	114.29 (24/21)	83.33 (20/24)	81.82 (18/22)	نرخ بره گیری حاصل از تلقیح (درصد) Weaning rate from laparoscopic AI (%)	
0.13	0.28	0.48	8.672	88.24 (15/17)	64.71 (11/17)	76.47 (13/17)	نرخ بره گیری حاصل از جفت گیری طبیعی (درصد) Weaning rate from natural mating (%)	
0.05	0.10	0.37	5.902	108.33 (39/36)	86.11 (31/36)	91.18 (31/34)	نرخ بره گیری حاصل از مجموع تلقیح و جفت گیری طبیعی (درصد) Accumulated weaning rate from AI and natural matting (%)	

C-: گروه شاهد منفی، تغذیه شده با جیره فلاشینگ بدون مکمل چربی

C+: گروه شاهد مثبت، تغذیه شده با جیره فلاشینگ دارای ۳/۵ درصد مکمل چربی اشباع (پودر روغن هیدروژنه بالم)

FO: گروه روغن ماهی، تغذیه شده با جیره فلاشینگ دارای ۳/۵ درصد روغن ماهی

اعداد داخل پارانتز توزیع فراوانی مشاهدات (تعداد میش که صفت موردنظر را بروز داده اند نسبت به تعداد کل میش مشمول در هر گروه) می باشد.

نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان (۳)، شماره (۴) ۱۳۹۴

نتایج اثر افزودن روغن ماهی به جیره فلاشینگ بر وزن از شیرگیری بره و محصول بره از شیرگرفته حاصل از تلقیح و جفتگیری طبیعی میش در جدول ۷ ارایه شده است. تفاوت وزن از شیرگیری بره حاصل از تلقیح و مجموع تلقیح و جفتگیری طبیعی در بین سه گروه معنی دار نبود ($P > 0.05$). قریشی و همکاران (۲۰۰۷) اثر استفاده از مکمل های چربی در دوره جفتگیری بر روی صفات تولید مثلی از جمله وزن شیرگیری بره های گوسفند مهربانی را بررسی و گزارش کردند که اختلاف معنی داری بین گروه های آزمایشی وجود نداشت (۱۹). افزودن روغن ماهی به جیره فلاشینگ از نظر عددی باعث افزایش محصول بره از شیرگرفته حاصل از تلقیح و نیز مجموع تلقیح و جفتگیری طبیعی نسبت به دو گروه دیگر شد، اما این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار نبود ($P > 0.05$).

جدول ۷- اثر افزودن روغن ماهی به جیره فلاشینگ بر وزن از شیرگیری و محصول بره از شیرگرفته حاصل از تلقیح لپاراسکوپیک و جفتگیری طبیعی در میش های شال.

Table 12. Effect of adding fish oil to flushing diet on lamb weaning weight and weaned lamb crop (ewe productivity) from laparoscopic insemination and natural mating of Chaal ewes.

P value			خطای استاندارد SEM	گروه های آزمایشی experimental groups			فراسنجه parameter
C+ vs. FO	C- vs. FO	C- vs. C+		روغن ماهی Fish oil	شاهد مثبت Positive control	شاهد منفی Negative control	
0.67	0.53	0.84	0.743	20.90	21.87	21.34	وزن از شیرگیری بره حاصل از تلقیح (کیلوگرم) Lamb weaning weight from laparoscopic AI (Kg)
0.94	0.16	0.33	0.727	19.70	20.34	22.17	وزن از شیرگیری بره حاصل از جفتگیری طبیعی (کیلوگرم) Lamb weaning weight from natural mating (Kg)
0.84	0.42	0.34	0.534	20.44	21.33	21.69	وزن از شیرگیری بره حاصل از تلقیح و جفتگیری طبیعی (کیلوگرم) Accumulated lamb weaning weight from AI and natural matting (Kg)
0.66	0.36	0.64	1.422	15.20	13.67	12.00	محصول بره از شیرگرفته حاصل از تلقیح (کیلوگرم) Weaned lamb crop from laparoscopic AI (Kg)
0.32	0.92	0.37	1.694	17.38	13.16	16.95	محصول بره از شیرگرفته حاصل از جفتگیری طبیعی (کیلوگرم) Weaned lamb crop from natural mating (Kg)
0.17	0.39	0.61	1.128	22.14	18.36	19.77	محصول بره از شیرگرفته حاصل از مجموع تلقیح و جفتگیری طبیعی (کیلوگرم) Accumulated weaned lamb crop from AI & natural matting (Kg)

C-: گروه شاهد منفی، تغذیه شده با جیره فلاشینگ بدون مکمل چربی

C+: گروه شاهد مثبت، تغذیه شده با جیره فلاشینگ دارای ۳/۵ درصد مکمل چربی اشباع (پودر روغن هیدروژنه پالم)

FO: گروه روغن ماهی، تغذیه شده با جیره فلاشینگ دارای ۳/۵ درصد روغن ماهی

نتیجه‌گیری

افزودن روغن ماهی به جیره فلاشینگ میش هرچند تأثیری بر نرخ آبستنی حاصل از تلقیح نداشت، اما بهدلیل افزایش نرخ چندقولوزایی و زادآوری موجب بهبود بازده تولیدمثلی پس از تلقیح مصنوعی شد؛ به طوری که تعداد برههای متولد شده و از شیرگرفته به ازای هر رأس میش تلقیح شده را افزایش داد. لذا در برنامه‌های تلقیح مصنوعی و یا همزمان سازی فحلی برای جفت‌گیری طبیعی، گنجاندن روغن ماهی در جیره فلاشینگ می‌تواند مفید باشد. همچنین توصیه می‌شود، از بکار بردن مکمل چربی پالم هیدروژنه شده در جیره فلاشینگ اجتناب شود.

منابع

1. Adamiak, S.J., Mackie, K., Watt, R., Webb, G.R., and Sinclair, K.D. 2005. Impact of nutrition on oocyte quality: cumulative effects of body composition and diet leading to hyperinsulinemia in cattle. *Biol. Reprod.* 73: 918–926.
2. Akbarinejad, V.I., Niasari-Naslaji, A., Mahmoudzadeh, H., and Mohajer, M. 2012. Effects of diets enriched in different sources of fatty acids on reproductive performance of Zel sheep. *Iranian J. of Veterinary Research.* 13: 310-316
3. Ambrose, D.J., Kastelic, J.P., Corbett, R., Pitney, P.A., Petit, H.V., Small, J.A., and Zalkovic, P. 2006. Lower pregnancy losses in lactating dairy cows fed a diet enriched in α -linolenic acid. *J. Dairy Sci.* 89: 3066–3074.
4. Anel, L., Kaabi, M., Abroug, B., Alvarez, M., Anel, E., Boixo, J.C., de la Fuente, L.F., and de Paz, P. 2005. Factors influencing the success of vaginal and laparoscopic artificial insemination in churra ewes: a field assay. *Theriogenology.* 63: 1235-1247.
5. Babaei Kafiabad, M., Sadeghipanah, H., and Karimi, K. 2014. Timing of eCG injection in hormonal treatment program of estrus induction in Torki-Ghashghaei ewes during deep anestrus. *J. of Ruminant Research.* 2: 113-132. (In Persian)
6. Bottger, J.D., Hess, B.W., Alexander, B.M., Hixon, D.L., Woodard, L.F., Funston, R.N., Hallford, D.M., and Moss, G.E. 2002. Effects of supplementation with high linoleic or oleic cracked safflower seeds on postpartum reproduction and calf performance of primiparous beef heifers. *J. Anim. Sci.* 80: 2023-2030.
7. Burke, J.M., Staples, C.R., Risco, C.A., de la Sota, R.L., and Thatcher, W.W. 1997. Effect of ruminant grade menhaden fish meal on reproductive and productive performance of lactating dairy cows. *J. Dairy Sci.* 80: 3386–3398.

نشریه پژوهش در نسخوارکنندگان (۳)، شماره (۴) ۱۳۹۴

8. Carroll, D., Jerred, M., Grummer, R., Combs, D., Pierson, R., and Hauser, E. 1990. Effects of fat supplementation and immature alfalfa to concentrate ratio on plasma progesterone, energy balance, and reproductive traits of dairy cattle. *J. Dairy Sci.* 73: 2855-2863.
9. Cerri, R.L.A., Bruno, R., Chebel, R.C., Galvão, K.N., Thatcher, W.W., DePeters, E.J., Luchini, D., and Santos, J.E.P. 2004. Effect of fat sources differing in fatty acid profile on fertilization rate and embryo quality in lactating dairy cows. *J. Dairy Sci.* 87(Suppl. 1): 297 (Abstr.).
10. Ciccioli, N.H., Wettemann, R.P., Spicer, L.J., Lents, C.A., White, F.J., and Keisler, D.H. 2003. Influence of body condition at calving and postpartum nutrition on endocrine function and reproductive performance of primiparous beef cows. *J. Anim. Sci.* 81: 3107–3120.
11. Daghig Kia, H., Aslani Kordkandi, Gh., Moghaddam, Gh, Alijani, S., and Hosseinkhani, H. 2012. The effect of flaxseed and soybean on the diet of flushing of reproductive performance of Moghani sheep out of the breeding season. *Animal Science Researches.* 22: 173-184. (In Persian)
12. De Fries, C.A., Neuendorff, D.A., and Randel, R.D. 1998. Fat supplementation influences postpartum reproductive performance in Brahman cows. *J. Anim. Sci.* 76: 864–870.
13. Downing, J.A., Joss, J., and Scaramuzzi, R.J. 1995. A mixture of the branched chain amino acids leucine, isoleucine and valine increases ovulation rate in ewes when infused during the late luteal phase of the oestrous cycle: An effect that may be mediated by insulin. *J. Endocrinology.* 145: 315-323.
14. Espinoza, J.L., Ramírez-Godínez, J.A., Jiménez, J.A., and Flores, A. 1995. Effects of calcium soaps of fatty acids on postpartum reproductive activity in beef cows and growth of calves. *Journal of Animal Science.* 73: 2888-2892.
15. Fouladi-Nashta, A.A., and Campbell, K.H.S. 2006. Dissociation of oocyte nuclear and cytoplasmic maturation by the addition of insulin in cultured bovine antral follicles. *Reproduction.* 131: 449–460.
16. Fouladi-Nashta, A.A., Gutierrez, C.G., Gong, J.G., Garnsworthy, P.C., and Webb, R. 2007. Impact of dietary fatty acids on oocyte quality and development in lactating dairy cows. *Biol. Reprod.* 77: 9–17.
17. Fouladi-Nashta, A.A., Wonnacott K.E., Gutierrez, C.G., Gong, J.G., Sinclair, K.D., Garnsworthy, P.C., and Webb, R. 2009. Oocyte quality in lactating dairy cows fed on high levels of n-3 and n-6 fatty acids. *Reproduction.* 138: 771–781.
18. Garnsworthy, P.C., Fouladi-Nashta, A.A., Mann, G.E., Sinclair, K.D., and Webb, R. 2009. Effect of dietary-induced changes in plasma insulin concentrations during the early post partum period on pregnancy rate in dairy cows. *Reproduction.* 137: 759 –768.

19. Ghoreishi, S.M., Zamiri M.J., and Rowghani, E. 2007. Effect of a Calcium Soap of Fatty Acids on Reproductive Characteristics and Lactation Performance of Fat-Tailed Sheep. *Pak. J. Biol. Sci.* 10: 2389-2395.
20. Gulliver, C.E., Friend, M.A., King, B.J., Robertson, S.M., and Clayton, E.H. 2010. Longer time to oestrus in ewes fed a high omega-3 diet. Proc. 61th Annual Meeting of the European Association for Animal Production (EAAP), Heraklion, Greece. 113p.
21. Hafez, Y.H., Khalifa, E.I., El-Shafie, M.H., Abdel Khalek, T.M.M., Ahmed, M.E., and Shehata, E.I. 2011. Effect of energy flushing pre-mating and during mating season on production and reproduction performance of Zaraibi goats. *Egyptian Journal of Sheep and Goat Sciences.* 6: 7-14.
22. Halbert, G., Dobson, H., Walton, J., and Buckrell, B. 1990. The structure of the cervical canal of the ewe. *Theriogenology.* 33: 977-992.
23. Hegazy, M.A., Ezzo, O.H., and El-Ekhawy, K.E. 1999. Productive and reproductive performance of Barki ewes on diets containing calcium soaps of fatty acids or hydrogenated oils. *Journal of Egyptian German Society for Zoology.* 28: A. 201-218.
24. Hightshoe, R.B., Cochran, R.C., Corah, L.R., Kiracofe, G.H., Harmon, D.L., and Perry, R.C. 1991. Effects of calcium soaps of fatty acids on post-partum reproductive function in beef cows. *J. Anim. Sci.* 69: 4097-4103.
25. Hughes, V. 2014. Epigenetics: The sins of the father. *Nature.* 507: 22-24.
26. Juchem, S.O. 2007. Lipid Digestion and Metabolism in Dairy Cows: Effects on Production, Reproduction and Health. PhD thesis, University of California Davis.
27. Karsch, F.J., Legan, S.J., Ryan, K.D., and Foster, D.L. 1980. Importance of estradiol and progesterone in regulating LH secretion and estrous behavior during the sheep estrous cycle. *Biol. Reprod.* 23: 404-413.
28. Kassa, T., Ambrose, J.D., Adams, A.L., Risco, C., Staples, C.R., Thatcher, M.J., Van Horn, H.H., Garcia, A., Head, H.H., and Thatcher, W.W. 2002. Effects of whole cottonseed diet and recombinant bovine somatotropin on ovarian follicles in lactating dairy cows. *J. Dairy Sci.* 85: 2823-2830.
29. Kershaw-Young, C.M., Khalid, M., McGowan, M.R., Pitsillides, A.A., and Scaramuzzi, R.J. 2009. The mRNA expression of prostaglandin E receptors EP2 and EP4 and the changes in glycosaminoglycans in the sheep cervix during the estrous cycle. *Theriogenology.* 72: 251-261.
30. Kesler, D.J., and Favero, R.J. 1997. Needleless implant delivery of gonadotropin-releasing hormone enhances the calving rate of beef cows synchronized with Norgestomet and esradiol valerate. *Drug development and industrial pharmacy.* 23: 607-610
31. Lammoglia, M.A., Willard, S.T., Oldham, J.R., and Randel, R.D. 1996. Effects of dietary fat and season on steroid hormonal profiles before parturition and on

 نشریه پژوهش در نسخوارکنندگان (۳)، شماره (۴) ۱۳۹۴

- hormonal, cholesterol, triglycerides, follicular patterns and postpartum reproduction in Brahman cows. *J. Anim. Sci.* 74: 2253-2262.
32. Long, N.M., Burns, T.A., Duckett, S.K., and Schafer, D.W. 2014. Reproductive performance and serum fatty acid profiles of underdeveloped beef heifers supplemented with saturated or unsaturated rumen bypass fat compared to an isocaloric control. *The Professional Animal Scientist*. 30: 502-509.
33. Lucy, M.C., Staples, C.R., Thatcher, W.W., Erickson, P.S., Cleale, R.M., Firkins, J.L., Clark, J.H., Murphy, M.R., and Brodie, B.O. 1992. Influence of diet composition, dry matter intake, milk production and energy balance on time of postpartum ovulation and fertility in dairy cows. *Anim. Prod.* 54: 323–331.
34. Mandal, R., Badyakar, D., and Chakrabarty J. 2014. Role of membrane lipid fatty acids in sperm cryopreservation. *Advances in Andrology*. 2014: 1-9.
35. Mattos, R., Staples, C.R., Williams, J., Amoroch, A., McGuire, M.A., and Thatcher, W.W. 2002. Uterine, ovarian, and production responses of lactating dairy cows to increasing dietary concentration of Menhaden fish meal. *J. Dairy Sci.* 85: 755-764.
36. Mattos, R., Staples, C., Arteche, A., Wiltbank, M., Diaz, F., Jenkins, T., and Thatcher, W. 2004. The effects of feeding fish oil on uterine secretion of PGF_{2α}, milk composition, and metabolic status of periparturient Holstein cows. *J. Dairy Sci.* 87: 921-922.
37. Mattos, R., Staples, C.R., and Thatcher, W.W. 2000. Effects of dietary fatty acid on reproduction in ruminants. *Rev. Reprod.* 5: 38-45.
38. National Research Council (NRC). 2007. Nutrient Requirements of Sheep. 6th Revised Ed. National Academy Press. Washington, D.C.
39. Nieto, R., Sánchez-Torres, M.T., Mejí, O., Figueroa, J.L., Olivares, L., Peralta, J.G., Cordero, J.L., Molina, P., and Cárdenas, M. 2015. Effect of fish meal and oil on hormone profile and reproductive variables in ewes inseminated by laparoscopy. *Livestock Science*. 178: 357–362.
40. Petit, H.V., Dewhurst, R.J., Proulx, J.G., Khalid, M., Haresign, W., and Twagiramungu, H. 2001. Milk production, milk composition, and reproductive function of dairy cows fed different fats. *Can. J. Anim Sci.* 81: 263-271.
41. Petit, H.V., Dewhurst, R.J., Scollan, N.D., Proulx, J.G., Khalid, M., Haresign, W., Twagiramungu, H., and Mann, G.E. 2002. Milk production and composition, ovarian function, and prostaglandin secretion of dairy cows fed omega-3 fats. *J. Dairy Sci.* 85: 889-899.
42. Robinson, J.J., Ashworth, C.J., Rooke, J.A., Mitchel, L.M., and McEvoy, T.G. 2006. Nutrition and fertility in ruminant livestock. *Anim. Feed Sci. Tech.* 126: 259-276.
43. Sadeghipanah, H. 2006. Effects of dietary fat level and source on reproductive performance, ovulation rate, steroidogenesis and metabolism of ovary in ewe. Ph.D. thesis. University of Tehran. (In Persian)

- 44.Sadeghipanah, H., Zare-Shahneh, A., and Nik-Khah, A. 2005. Effects of fat source in flushing diets on various reproductive parameters in Zandi fat-tailed ewes. Proceeding of the British Society Animal Science, London. 150p.
- 45.Santos, J.E.P., Bilby, T.R., Thatcher, W.W., Staples, C.R., and Silvestre, F.T. 2008. Long chain fatty acids of diet as factors influencing reproduction in cattle. *Reprod. Domest. Anim.* 43(Suppl. 2): 23-30.
- 46.Schingoethe, D.J., and Casper, D.P. 1991. Total lactational response to added fat during early lactation. *J. Dairy Sci.* 74: 2617– 2622.
- 47.Sklan, D., Kaim, M., Moallem, U., and Folman, Y. 1994. Effect of dietary calcium soaps on milk yield, body weight, reproductive hormones, and fertility in first parity and older cows. *J. Dairy Sci.* 77: 1652–1660.
- 48.Staples, C.R., Burke, J.M., and Thatcher, W.W. 1998. Influence of supplemental fats on reproductive tissues and performance of lactating cows. *J. Dairy Sci.* 81: 856-871.
- 49.Thangavelu, G., Colazo, M., Ambrose, D., Oba, M., Okine, E., and Dyck, M. 2007. Diets enriched in unsaturated fatty acids enhance early embryonic development in lactating Holstein cows. *Theriogenology.* 68: 949-957.
- 50.Thatcher, W.W., Bilby, T., Staples, C.R., MacLaren, L., and Santos, J. 2004. Effects of polyunsaturated fatty acids on reproductive processes in dairy cattle. Proc. 19th Southwest Nutrition and Management Annual Conference, Bioproducts, Inc. Pre Conference Symposium. University of Arizona. Pp: 1-28.
- 51.Thatcher, W.W., Binelli, M., Burke, J., Staples, C.R., Ambrose, J.D., and Coelho, S. 1997. Antiluteolytic signals between the conceptus and endometrium. *Theriogenology.* 47: 131–140.
- 52.Thompson, J., and Meyer, H. 1994. Body condition scoring of sheep. http://www.ir.library.oregonstate.edu/xmlui/bitstream/handle/1957/14303/ec143_3.pdf
- 53.Titi, H.H., and Kridli, R.T. 2008. Reproductive performance of seasonal ewes fed dry fat source during their breeding season. *New Zealand Journal of Agricultural Research.* 51: 25-32.
- 54.Titi, H.H., and Awad, R. 2007. Effect of dietary fat supplementation on reproductive performance of goat. *Anim. Reprod.* 4: 23-30.
- 55.Waghorn, G.C., Smith, J.F., and Ulyatt, M.J. 1990. Effect of protein and energy intake on digestion and nitrogen metabolism in wethers and on ovulation rate in ewes. *Anim. Prod.* 51: 291-300.
- 56.Wonnacott, K.E., Kwong, W., Hughes, V., Salter, M., Lea, R.G. Garnsworthy, C., and Sinclair, K.D. 2010. Dietary omega-3 and -6 polyunsaturated fatty acids affect the composition and development of sheep granulosa cells, oocytes and embryos. *Reproduction.* 139: 57–69.



J. of Ruminant Research, Vol. 3(4), 2016
<http://ejrr.gau.ac.ir>

Effect of supplementing flushing diet with fish oil on reproductive efficiency of Chaal ewes after laparoscopic artificial insemination

***N. Asadzadeh¹, M. Souri² and M.M. Moeini³ and H. Sadeghipanah⁴**

¹Ph.D. Student and ²Associate Prof., Dept. of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Razi University of Kermanshah, ³Assistant Prof., Animal Science Research Institute of Iran

Received: 12/09/2015; Accepted: 01/24/2016

Abstract

Background and objectives: The beneficial effects of adding supplemental polyunsaturated fats including omega-6 and omega-3 sources to the diet on reproductive performance of livestock have been shown in many studies. On the other hand, low performance of artificial insemination is a serious problem to perform genetic improvement projects in sheep. Special effect of adding fish oil as an omega-3 source to flushing diet on reproductive efficiency of ewes after laparoscopic artificial insemination has not been investigated. The aim of this study was to investigate the effect of supplementing flushing diet with fish oil on reproductive efficiency of Chaal ewes after laparoscopic artificial insemination.

Materials and methods: One hundred eleven of non-lactating and non-pregnant Chaal ewes, were divided into three experimental groups based on flushing diets: (1) negative control group (C-), fed the flushing diet without any supplemental fat, (2) positive control group (C+), fed the flushing diet containing 3.5% supplemental hydrogenated palm oil (palm fat powder) and (3) fish oil group (FO), fed flushing diet containing 3.5% fish oil. Estrus synchronization of ewes performed using progesterone sponges for 13 days. Twenty to 48 hours after sponge removal, the rate of estrus recorded using rams with aprons and marking harnesses. Forty eight hours after sponge removal, artificial insemination was performed with the laparoscopic approach. Fifteen days after artificial insemination, to determine estrus non return rate and for mating of non-pregnant ewes, the rams with marking harnesses were introduced into the flock. Forty days after insemination, pregnancy diagnosis was performed by ultrasonography. At the time of lambing, number and weight of born lambs and three months later, the number and weight of weaned

*Corresponding author: naderasadzadeh4@gmail.com

lambs were recorded for each ewe in experiment and using them reproductive traits including pregnancy, parturition, abortion, stillbirth, barren and multiple lambing rates, prolificacy, fecundity, born lamb crop, lamb viability, weaning rate and weaned lamb crop (ewe productivity) were calculated.

Results: Adding fish oil to flushing diet significantly increased the weaning rate from laparoscopic artificial insemination and accumulated weaning rate from artificial insemination and natural mating ($P<0.05$). The improved weaning rate for ewes fed fish oil resulted by more multiple lambing rate and prolificacy in this group in comparison with two other groups, because pregnancy rates in three groups were not affected by flushing diets ($P>0.05$). In the group fed hydrogenated palm oil, lamb viability until weaning time was significantly ($P<0.05$) lower than two other groups.

Conclusion: In the programs of artificial insemination and synchronized natural mating of sheep, adding fish oil to flushing diet can improve reproductive performance. It is recommended that avoid using hydrogenated palm oil in flushing diet of sheep.

Keywords: Ewe, Flushing diet, Fish oil, Laparoscopic insemination, Reproductive efficiency