



## چرخه زندگی اسکویید دم کوتاه (EuprymnahyllebergiNateewathana, )

از تفریخ تخم تا تخم ریزی در شرایط آزمایشگاهی

حسن ساربان

کارشناس، ایستگاه تحقیقات شیلاتی نرم تنان خلیج فارس، بندرلنگه، ایران

دريافت: ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ پذيرش: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

نويسنده مسئول مقاله: hassan\_sareban65@yahoo.com

### چکیده:

چرخه زندگی اسکویید دم کوتاه، *Euprymnahyllebergi* از خانواده Sepiolidae، با تفریخ تخمها و پرورش نوزادان در دمای  $5\pm 0/5$  درجه سانتی گراد و شوری  $37-38$  در هزار، در ایستگاه تحقیقات شیلاتی نرم تنان بررسی شد. پس از  $13\pm 2$  روز انکوباسیون، اسکویید نوزاد با طول مانتل  $0/05\pm 0/23$  میلی متر و وزن  $1\pm 4$  میلی گرم از تخم بیرون آمد و با آرتیما، میگوی مایسید و پست لارو میگوی وانامی تغذیه شد. نوزاد در مدت  $30$  روز به طول  $1/18\pm 0/94$  میلی متر و وزن  $16\pm 4/25$  میلی گرم، در مدت  $60$  روز به  $1/87\pm 1/96$  میلی متر و  $2/13\pm 0/21$  گرم، و در مدت  $90$  روز به  $2/33\pm 1/14$  میلی متر و  $4/4\pm 0/24$  گرم رسید. در مدت  $109$  روز که طول اسکویید به  $2/64\pm 0/12$  میلی متر و وزن  $5/849\pm 1/204$  گرم رسیده بود، اولین جفت گیری و در روز  $110$  تخم گذاری صورت گرفت و هر ماده به طور متوسط  $10\pm 7$  عدد تخم گذاشت. ماده ها  $2-4$  روز و نرها  $15-7$  روز پس از تخم گذاری از بین رفتند. نتایج کلی نشان داد که عمر این نوع اسکویید کوتاه بوده و به راحتی در شرایط آزمایشگاهی نسل بعدی خود را به وجود می آورد.

کلید واژگان: اسکویید دم کوتاه، چرخه زندگی، تفریخ تخم، تخم گذاری، *Euprymnahyllebergi*

## مقدمه

نسل‌های متوالی را دنبال کرد. همچنین می‌توان اسکوییدهای دم‌کوتاه را به علت داشتن رنگ‌آمیزی خاص و رفتار جالب در آکواریوم آب شور نگهداری کرد. بنابراین در این تحقیق به بررسی چرخه زندگی اسکویید دم‌کوتاه (*E. hyllebergi*) در شرایط آزمایشگاهی پرداخته شده است تا به تکثیر و پرورش این گونه در شرایط مصنوعی و به صورت انبوه کمک کرد.

## مواد و روش کار

## جمع آوری، انتقال و تفریخ تخم

در سال ۱۳۹۲ یک خوش تخم اسکویید دم‌کوتاه (*E. hyllebergi*) که به گرگور صیادی (۹ مایلی جنوب بندرلنگه و در عمق ۴۰ متری) چسبیده بود، جدا و به ایستگاه تحقیقات شیلاتی نرم‌تنان در بندرلنگه انتقال داده شد. تخم‌ها پس از جداسازی، به آزمایشگاه انتقال و با آب فیلتر شده دریا شستشو داده شدند. قطر تخم‌ها با کولیس (دقیق ۰/۱ میلی‌متر) و وزن آنها با ترازوی دیجیتالی (دقیق ۰/۰۰۱ گرم) اندازه‌گیری شد و برای تفریخ در سبد و درون تانک ۵۰ لیتری حاوی آب دریا (عبور داده شده از فیلتر شنی و فیلترهای ۲۰، ۱۰ و ۱ میکرون و لامپ ماورایی بنش، دمای  $28/5 \pm 0.5$  درجه و شوری ۳۷-۳۸ در هزار با هوادهی ملایم) قرار داده شدند. (*Nabhitabhata et al., 2005b*). تعویض آب به صورت روزانه و به میزان ۵۰ درصد بود و روشنایی با لامپ مهتابی به صورت ۱۲ ساعت روشنایی و ۱۲ ساعت تاریکی تأمین شد.

## پرورش نوزادان

با خروج اولین نوزاد، مجدد قطر و وزن تخم‌ها اندازه‌گیری و نوزادان تازه تفریخ شده به تانک ۳۰۰ لیتری از جنس پلی‌اتیلن سفید حاوی آب دریا (با همان ویژگی‌های مشابه تانک تفریخ) منتقل شدند. از روز دوم

حدود ۲۰ گونه از سرپایان (*Cephalopoda*) در خلیج فارس و دریای عمان شناسایی شدند (Roper et al., 1984) و به تازگینیزیک گونه با نام متعارف اسکویید دم‌کوتاه (*Bobtail squid*) با نام علمی *Euprymna hyllebergi* معروف شده است (Khatami et al., 2014). این گونه متعلق به خانواده *Sepiolidae* است که در آن حدود ۱۵ جنس و ۵۰ گونه وجود دارد (Roper et al., 1984). اندازه طول مانند گونه‌های مربوط به جنس *Euprymna* کمتر از ۱۰۰ میلی‌متر است، از این‌رو مشاهده و صید آنها در طبیعت به سختی صورت می‌گیرد (Norman and Lu, 1997). در سال‌های اخیر مطالعه گونه‌های مربوط به جنس *Euprymna* اهمیت زیادی پیدا کرده است که ارزش این مطالعات به وجود رابطه همزیستی با باکتری‌های دارای ویژگی نورزاپی از جنس *Vibrio* (Ruby and Lee, 1998). این باکتری علاوه بر تنظیم فعالیت شباهه‌روزی اسکویید، بر خلاف سایر گونه‌های آبزی، در این اسکویید سبب بیماری نمی‌شود. به همین دلیل پی بردن به این رابطه همزیستی باعث کم شایانی به درمان بیماری‌های ناشی از باکتری *Vibrio* در بی‌مهرگان مختلف می‌شود (Byern and Grunwald, 2010; Ruby, 1999). این رابطه همزیستی از نخستین‌روز تولد اسکویید دم‌کوتاه به وجود می‌آید. مشاهده و صید نوزادان و حتی بالغان این اسکویید در طبیعت به سختی انجام می‌شود و بهترین روش پرورش آنها در شرایط آزمایشگاهی است. از دیگر مزیت‌های مطالعه گونه‌های جنس *Euprymna* مربوط به رنگی آبزیان و بررسی صفات جمعیت است (Sinn, 2005)، زیرا به دلیل کوتاه بودن چرخه زندگی، می‌توان به راحتی نسل بعدی خود را به وجود آورد و از این‌رو می‌توان تغییرات یک ژن یا صفت خاص در جمعیت و

تفریخ، غذادهی نوزادان با آرتمیا (*Artemiasalina*) آغاز (Choe, 1966). داده‌ها به صورت میانگین ± انحراف معیار گزارش شدند.

### نتایج

#### تخم

تخم اسکویید دمکوتاه (*E. hyllebergi*) قادر ساقه و از لحاظ شکلی شبیه قطره آب بود (شکل ۱-الف و ه). تخم‌ها رنگ زرد و اندازه قطر آنها  $46 \pm 4$  میلی‌متر و وزن آنها  $24 \pm 2$  میلی‌گرم بود. پس از انکوباسیون به مدت ۱۲±۲ روز در دمای  $28 \pm 5$  درجه، اولین نوزاد از تخم خارج شد و در مدت ۳ روز همه نوزادان از تخم بیرون آمدند. بیشترین نوزادان در طول شب تفریخ شدند. در زمان انکوباسیون تخم‌ها شفاف شده به‌طوری که جنین درون تخم قابل مشاهده بود و قطر تخم‌ها به  $64 \pm 7$  میلی‌متر و وزن آنها به  $42 \pm 3$  میلی‌گرم رسید. درصد تفریخ تخم‌ها  $94 \pm 5$  درصد و تخم‌های تفریخ نشده به‌صورت سفید و مات بودند.

#### نوزادان

طول مانتل و وزن نوزادان تازه تفریخ شده،  $23 \pm 2$  میلی‌متر و  $4 \pm 1$  میلی‌گرم بود. نوزادان تازه تفریخ شده دارای رفتار شناای پلاتکتونی و به‌صورت منفرد بودند و بر روی تمام بدن آنها رنگدانه‌های قهوه‌ای وجود داشت (شکل ۱-ب). ۱۲ ساعت پس از تفریخ، رفتار نوزادان از شنا به نشستن در کف بستر تغییر یافت و به‌صورت نامنظم درون ستون آب شنا و سپس در کف تانک استراحت می‌کردند. تغذیه از آرتمیای زنده از روز دوم مشاهده شد. نوزاد پس از صید آرتمیا، به کف تانک رفته و شروع به تغذیه از صید خود می‌کند. سپس برای صید آرتمیای دیگر به ستون آب رفته و مجدد شکار می‌کند. از روز ۲۰-۲۷ پرورش، نوزادان در طول روز با فرو رفتن در بستر و با

تفریخ، غذادهی نوزادان با آرتمیا (*Artemiasalina*) آغاز و از هفته سوم با تغذیه از میگوی مایسید زنده و سپس پست لارو میگوی وانامی ادامه یافت (Nabhitabhata et al., 2005a). درصد، کف تانک نیز به‌وسیله سیفون از بقایای غذایی و مدفوع تمیز می‌شد. از روز ۱۰ پرورش، ماسه دریا (شستشو شده با آب شیرین) در کف تانک ریخته شد و برای تخم‌ریزی احتمالی از روز ۸۰ پرورش توری سفید با اندازه چشمی ۵ میلی‌متر در کف تانک قرار داده شد. تعیین جنسیت هم از طریق شناسایی تفاوت‌های ظاهری صورت گرفت.

#### زیست‌سننجی

وزن تر و طول مانتل ۳۰ عدد از نوزادان تازه تفریخ شده با ترازوی دیجیتال (دقت ۰/۰۰۱ گرم) و کولیس (دقت ۰/۱ میلی‌متر) اندازه‌گیری و سپس زیست‌سننجی به‌صورت منظم هر ۱۰ روز یک بار انجام شد. برای سنجش میزان رشد براساس وزن و طول مانتل، از فرمول زیر استفاده شد (Choe, 1966; Nabhitabhata et al., 2005 a, b)

$$\text{IGRW} = [(\ln W_2 - \ln W_1) / t] \times 100$$

$$\text{IGRL} = [(\ln ML_2 - \ln ML_1) / t] \times 100$$

$\text{IGRW}$  ضریب رشد نسبی براساس وزن و  $\text{IGRL}$  ضریب رشد نسبی براساس طول مانتل به‌صورت درصد بیان می‌شوند.

$W_2$ =وزن ثانویه،  $W_1$ =وزن اولیه،  $ML_2$ =طول ثانویه  $ML_1$ =طول اولیه مانتل و  $t$ =تعداد روزها (۱۰ روز).

#### تجزیه و تحلیل داده‌ها

داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Excel 2007 ثبت و جداول با همین برنامه رسم شد. برای تعیین معنادار بودن اختلاف بین اندازه تخم‌ها و نوزادان وحشی (جمع‌آوری شده از دریا) با پرورشی (تخم‌های به‌دست آمده در آزمایشگاه)، از تجزیه واریانس یک‌طرفه (ANOVA) استفاده گردید

شنا در ستون آب کرده و این شنای فعال تا روشن شدن مجدد محیط ادامه دارد.

آرایش و چیدن دانه‌های شن بر روی بدن، در جای خود ساکن می‌مانندند. با تاریک شدن محیط، نوزادان شروع به

جدول ۱ میزان رشد براساس طول مانتل و وزن تر در اسکویید دم کوتاه (*E. hyllebergi*) در روزهای مختلف

| روزهای پرورش     | طول مانتل mm±sd | افزایش طول مانتل | وزن تر      | افزایش وزن g±sd |            |             | IGRW(%)      |
|------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------|-------------|--------------|
|                  |                 |                  |             | افزایش وزن      | g±sd       | IGRL(%)     |              |
| ۰                | ۲/۲۲±۰/۰۵       | ---              | ---         | ۰/۰۰۴±۰/۰۰۱     | ---        | ۲/۳۱±۰/۰۲   | ---          |
| ۱۰               | ۲/۸۱±۰/۰۷       | ۰/۵۸±۰/۰۲        | ۰/۰۸۸±۰/۰۰۳ | ۰/۰۹۲±۰/۰۰۵     | ۲/۳۱±۰/۰۲  | ۲/۳۱±۰/۰۲   | ۳۱/۳۵۴±۴/۲۵۶ |
| ۲۰ <sup>a</sup>  | ۳/۴۲±۰/۰۹       | ۰/۶۱±۰/۰۲        | ۰/۰۹۴±۰/۰۰۴ | ۰/۱۸۶±۰/۰۰۹     | ۱/۹۶±۰/۰۱  | ۰/۰۹۳±۰/۰۵۹ | ۷/۰۳۹±۰/۰۵۹  |
| ۳۰               | ۵/۹۴±۱/۱۸       | ۲/۵۲±۱/۰۹        | ۰/۰۷۸±۰/۰۰۷ | ۰/۲۵۴±۰/۰۱۶     | ۵/۰۲±۱/۷۵  | ۰/۱۱۵±۰/۱۴۶ | ۳/۱۱۵±۰/۱۴۶  |
| ۴۰               | ۸/۳۴±۱/۴۱       | ۲/۴±۰/۲۳         | ۰/۲۸۹±۰/۰۷۸ | ۰/۵۴۳±۰/۰۹۴     | ۳/۳۹±۰/۳۰  | ۰/۵۹۷±۱/۱۲۰ | ۷/۰۹۷±۱/۱۲۰  |
| ۵۰               | ۱۰/۷۵±۱/۶۶      | ۲/۴۵±۰/۲۵        | ۰/۸۱۵±۰/۰۴۷ | ۱/۳۵۸±۰/۱۴۱     | ۲/۰۳۳±۰/۱۵ | ۰/۱۶۶±۰/۷۰۸ | ۹/۱۶۶±۰/۷۰۸  |
| ۶۰               | ۱۳/۹۶±۱/۸۷      | ۳/۲۱±۰/۲۱        | ۰/۸۵۶±۰/۰۷۲ | ۲/۲۱۴±۰/۲۱۳     | ۲/۶۱±۰/۲۱  | ۰/۸۸۷±۰/۰۷۷ | ۴/۸۸۷±۰/۰۷۷  |
| ۷۰               | ۱۵/۲۵±۲/۰۵      | ۱/۲۹±۰/۱۸        | ۰/۶۵۰±۰/۱۰۸ | ۲/۸۶۴±۰/۳۲۱     | ۰/۸۹±۰/۰۱  | ۰/۵۷۴±۰/۱۶۰ | ۲/۵۷۴±۰/۱۶۰  |
| ۸۰               | ۱۷/۲۱±۲/۱۶      | ۱/۹۶±۰/۱۱        | ۰/۴۹۳±۰/۱۰۶ | ۳/۳۵۷±۰/۴۲۷     | ۱/۲۱±۰/۰۹  | ۱/۵۸۸±۰/۱۵۳ | ۱/۵۸۸±۰/۱۵۳  |
| ۹۰               | ۱۸/۱۴±۲/۳۳      | ۰/۹۳±۰/۱۷        | ۰/۸۷۷±۰/۱۲۱ | ۴/۲۳۴±۰/۰۴۸     | ۰/۵۲±۰/۰۳  | ۰/۳۲۱±۰/۰۲۳ | ۰/۳۲۱±۰/۰۲۳  |
| ۱۰۰              | ۱۸/۴۳±۲/۴۲      | ۰/۲۹±۰/۰۹        | ۰/۶۹۴±۰/۳۴۴ | ۴/۹۲۸±۰/۷۳۱     | ۰/۱۶±۰/۰۲  | ۰/۱۵۱±۰/۴۷۰ | ۰/۱۵۱±۰/۴۷۰  |
| ۱۱۰ <sup>b</sup> | ۲۰/۱۲±۲/۶۴      | ۱/۶۹±۰/۱۱        | ۰/۸۲۱±۰/۳۲۴ | ۵/۸۴۹±۱/۲۰۴     | ۰/۸۷±۰/۱۱  | ۰/۵۴۱±۰/۳۵۳ | ۰/۵۴۱±۰/۳۵۳  |

=a فرو رفتن در بستر و =b سن تخم‌گذاری


تخم‌گذاری به مدت نیم ساعت طول کشید. هر ماده به‌طور متوسط  $۷۰\pm۰$  عدد تخم گذاشت. ماده‌ها ۲-۴ روز پس از تخم‌گذاری و نرها هم ۷-۱۵ روز از بین رفتند. طول قطر و وزن تخم‌های به‌دست آمده در آزمایشگاه  $۴/۱۳\pm۰/۲۵$  میلی‌متر و  $۳۶\pm۳$  میلی‌گرم بود که با اندازه تخم جمع‌آوری میلی‌متر و وزن نوزادان پرورشی  $۱/۹۶\pm۰/۰۹$  میلی‌متر و  $۳\pm۱$  میلی‌گرم بود که با نسل قبل اختلاف معناداری نداشت. طول مانتل و وزن نوزادان پرورشی  $۰/۰۹\pm۰/۰۵$  میلی‌متر و  $۴/۰۰\pm۰/۰۵$  میلی‌گرم بود که در دوره انکوباسیون در تخم‌های پرورشی  $۱۲\pm۴$  روز بود که اختلاف معناداری با دوره انکوباسیون تخم‌های جمع‌آوری شده از دریا نداشت ( $p>0/05$ ). اما میزان تفریخ در تخم‌های پرورشی کمتر و به  $۴\pm۱$  درصد رسید که با میزان تفریخ تخم‌های جمع‌آوری شده از

اسکویید دم کوتاه پس از ۳۰ روز، به طول مانتل  $۵/۹۴\pm۱/۱۸$  میلی‌متر و وزن  $۲۵۴\pm۱۶$  میلی‌گرم، پس از ۶۰ روز به  $۱۳/۹۶\pm۱/۸۷$  میلی‌متر و وزن  $۲/۲۱۴\pm۰/۲۱۳$  گرم، و پس از ۹۰ روزه به  $۱۸/۱۴\pm۲/۳۳$  میلی‌متر و وزن  $۴/۲۳۴\pm۰/۰۵۴$  گرم رسید (جدول ۱-ج).

بلغ جنسی، جفت‌گیری و تخم‌گذاری تفکیک جنسیت اسکویید دم کوتاه با شکل ظاهری امکان‌پذیر نبود و به همین دلیل نمی‌توان به سن بلوغ جنسی آنها پی برد، اما اولین جفت‌گیری در سن  $۱۰/۹$  روزه مشاهده شد. رفتار جفت‌گیری با شنا و حمله نر و گرفتن ماده از قسمت میانی سر و تنه شروع شد (شکل ۱-د) و بعد از  $۵-۱۰$  دقیقه از هم جدا شدند. در روز  $۱۱/۰$ ، ماده تخم‌های خود را بر روی توری در کف تانک گذاشت (شکل ۱-ه) و عمل

به طول مانتل ۲۲/۷۶ میلی متر و وزن ۷/۰۵۳ گرم رسید.

دریا اختلاف معناداری داشت ( $p < 0.05$ ). اندازه نر و ماده در سن جفت‌گیری و تخم‌گذاری یکسان بود و بزرگ‌ترین آنها



شکل ۱ چرخه زندگی اسکویید دمکوتاه (*E. hyllebergi*) در شرایط آزمایشگاهی. (الف) تخم‌های جمع‌آوری شده از دریا، (ب) نوزاد تازه تفریخ شده، (ج) اسکویید بالغ، (د) جفت‌گذاری درون تانک و (ه) تخم‌گذاری بر روی توری

جنس *Euprymna* در دمای مطلوب برای هر گونه، بالا است و اکثر گونه‌ها دارای میزان تفریخ بالای ۸۰ درصد هستند (جدول ۲). البته میزان تفریخ در نسل‌های متوالی کاهش پیدا می‌کند، به طوری که اگر میزان تفریخ در نسل اول ۸۰ درصد باشد در نسل بعدی به ۵۰ درصد کاهش پیدا می‌کند (Choe and Ohshima, 1963Nabhitabhata et al., 2005 a et al., 2005 a). در این تحقیق نیز میزان تفریخ در اسکویید *E. hyllebergi* در نسل بعد به نصف کاهش یافت و تقریباً نیمی از تخم‌ها تفریخ شدند. طول مانتل و وزن نوزادان تازه تفریخ گونه *E. hyllebergi* در کارگاه تایلند، ۴ میلی‌متر و  $۴ \pm 0.05$  میلی‌گرم بوده (Nabhitabhata et al., 2005 a) که با اندازه نوزادان تازه تفریخ در این تحقیق یکسان است (جدول ۲).

## بحث

شکل تخم در گونه‌های مربوط به جنس *Euprymna* مشابه ولی اندازه آن در بین گونه‌ها، متفاوت است، به طوری که اندازه تخم در گونه *E. hyllebergi* بین  $3/47$  تا  $4/56$  میلی‌متر متغیر است (Choe and Ohshima, 1963Nabhitabhata et al., 2005a). طول دوره انکوباسیون تخم‌های این گونه در دمای  $27-28$  درجه، ۱۴ روز بوده که نسبت به سایر گونه‌ها کمتر است (جدول ۲). دمای مناسب برای انکوباسیون تخم در گونه *E. berryi*  $23-24$  درجه، گونه *E. scolopes*  $21-24$  درجه و گونه‌های *E. morsei* و *E. tasmanica*  $20$  درجه سانتی گراد است که نسبت به گونه *E. hyllebergi* پایین تر بوده و بهمین دلیل دوره انکوباسیون بیشتر است. درصد تفریخ در گونه‌های

جدول ۲ مقایسه عوامل زیستی در گونه‌های مربوط به جنس *Euprymna*

| عوامل                         | <i>E. berryia</i> | <i>E. scolopes</i> | <i>E. tasmanica</i> | تحقيق حاضر | <i>E. hyllebergi</i> |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------|----------------------|
| اندازه تخم (میلی‌متر)         | ---               | ---                | ---                 | ---        | ۲/۷۴-۴/۵۶            |
| طول دوره انکرباسیون (روز)     | ۲۰                | ۱۸-۲۲              | ۲۹                  | ۱۲-۱۶      | ۱۲-۱۸                |
| درصد تغیریخ                   | >۸۰               | ۷۰-۹۰              | ---                 | ۸۹/۳-۹۹/۶  | ۸۲-۱۰۰               |
| طول مانتل نوزادان تازه تغیریخ | ۲/۴-۲/۸           | ۱/۶-۱/۹            | ۳                   | ۲/۳۳-۲/۴۷  | ۲/۴-۲/۸              |
| (درصد) IGRW                   | ۲/۳۴-۵/۲۸         | ۷/۶-۸/۴            | ---                 | -۳۱/۳۵     | ۱/۵۰-۱۷/۴۰           |
| طول دوره زندگی (روز)          | ---               | ۶۱-۱۱۵             | ---                 | ۱۱۲-۱۱۸    | ۶۶-۱۱۵               |
| تعداد تخم بهمازای هر ماده     | ---               | ۵۰-۲۵۰             | ۱۰۰-۱۴۶             | ۶۰-۸۰      | ۱۰۸-۴۶۴              |

در سن ۱۰ تا ۲۰ روز مشاهده شد که معادل  $۱۷/۴۰\pm ۰/۶۷$  درصد براساس طول مانتل و درصد براساس وزن بود (Nabhitabhata et al., 2005a,b). همچنین در این گونه میانگین میزان رشد از روز اول پرورش تا سن ۱۰۰ روزه،  $۲/۴۱\pm ۰/۴۶$  درصد براساس طول مانتل و  $۷/۵۱\pm ۱/۷۵$  درصد براساس وزن بود. در این تحقیق بالاترین میزان رشد براساس طول مانتل در سن ۲۰ تا ۳۰ روز و براساس وزن در ۱۰ روز اول پرورش بدست آمد، ولی میانگین رشد در طول دوره زندگی  $۲/۰۰\pm ۱/۵۳$  درصد طول مانتل و  $۶/۷۴\pm ۲/۱۱$  درصد وزن بود (جدول ۱). سن بلوغ جنسی در گونه *E. hyllebergi* به طور دقیق تعیین نشده است، ولی اولین جفت‌گیری در سن ۶۶ روزه مشاهده شده است (Nabhitabhata et al., 2005a); البته اغلب جفت‌گیری‌ها و تخم‌گذاری‌ها در سنین ۹۰-۱۰۰ روزه مشاهده شده که در این سن اندازه طول مانتل آنها به  $۲۲-۲۳$  میلی‌متر و وزن به ۵-۶ گرم رسیده است. فاصله بین جفت‌گیری و تخم‌گذاری ۲-۳ روز است و هر ماده به‌طور متوسط  $۱۹۱/۳\pm ۱۰۷/۴$  می‌گذارد (Nabhitabhata et al., 2005a,b).

نوزادان تازه تغیریخ شده در همه گونه‌های جنس *Euprymna* در روزهای اول پرورش دارای شناخت پلانکتونی بوده که در سن حدود ۳۰ روزه رفتار شناخت آنها به فرو رفتن در بستر شنی تغییر می‌کند (Choe and Ohshima, 1963; Anderson et al., 2002) رفتار فرو رفتن در بستر نسبت به سایر گونه‌ها زودتر شروع می‌شود، به طوری که نوزادان در سن ۱۵ روزه در بستر شنی فرو می‌روند Nabhitabhata et al., 2005<sup>a,b</sup>). در شرایط آزمایشگاهی در تایلند، طول مانتل و وزن نوزادان در گونه *E. hyllebergi* پس از ۳۰ روز پرورش به  $۷/۲۸\pm ۰/۲۰$  میلی‌متر و  $۱۶/۷۴\pm ۰/۷۸$  گرم و در سن ۶۰ روزه به  $۲/۶۰۲\pm ۰/۲۳۳$  گرم و در سن ۱۰۰ روزه به  $۵/۸۷۸\pm ۰/۱۶۸$  گرم رسید (Nabhitabhata et al., 2005a). اما در این تحقیق اندازه نوزادان در سنین مشابه نسبت به بررسی قبلی کمتر بوده است (جدول ۱). میزان رشد در گونه‌های موجود در جنس *Euprymna* متفاوت بوده اما بیشترین میزان رشد در ماه اول پرورش مشاهده شده است (جدول ۲). در گونه *E. hyllebergi* بالاترین میزان رشد

برنامه اصلاح نژاد بر روی آنها را بررسی کرد که این امر مستلزم دستیابی به بیوتکنیک تکثیر و پرورش سرپایان با اندازه کوچک در شرایط آزمایشگاهی است.

#### منابع

- Anderson, R.C., Mather, J.A. and Steele, C.W. 2002.** The burying behavior of (*Euprymnascolopes*) Berry, 1913 (Cephalopoda: Sepiolidae). *Western Society Annual Report*, 33:1–7.
- Byern, J.V. and Grunwald, I. 2010.** Biological adhesive systems from nature to technical and medical application. Springer-Verlag, Austria. 216p.
- Choe, S. 1966.** On the growth, feeding rates and the efficiency of food conversion for cuttlefishes and squids. *The Korean Journal of Zoology*, 9(2): 72–80.
- Choe S. and Ohshima, Y. 1963.** Rearing of cuttlefishes and squids. *Nature*, 197(4864): 307p.
- Claes, M.F. and Dunlap, P.V. 2000.** A symbiotic culture of the sepiolid squid (*Euprymnascolopes*): role of the symbiotic bacterium (*Vibrio fischeri*) in host animal growth, development, and light organ morphogenesis. *Journal of Experimental Zoology*, 286: 280–296.
- Hanlon, R.T., Claes, M.F., Ashcraft, S.E. and Dunlap, P.V. 1997.** Laboratory culture of the sepiolid squid (*Euprymnascolopes*): a model system for bacteria-animal symbiosis. *Biological Bulletin*, 192: 364–374.
- Khatami, SH., Sareban, H., Valinassab, T., Esmailzadeh, A. and Tavakoli-Kolour, P. 2014.** The first record of bobtail squid, (*Euprymnahyllebergi*) Nateewathana, 1997 (Cephalopoda: Sepiolidae) from the Persian Gulf, Iran. *Iranian Journal of Fisheries Sciences*, 13(4): 1082–1085.
- Nabhitabhata, J., Nilaphat, P., Promboon, P. and Jaroongpattananon, C. 2005a.** Life cycle of cultured bobtail squid, (*Euprymnahyllebergi*) Nateewathana, 1997. *Phuket Marine Biology Center Research Bulletin*, 66:351–365.
- Nabhitabhata, J., Nilaphat, P., Promboon, P., Jaroongpattananon, Ch., Nilaphat, G. and**

جفت‌گیری و تخم‌گذاری بالاتر بود، زیرا اندازه آنها در سنین مشابه، کمتر بود (جدول ۱). تعداد تخم‌های *hyllebergi* E. گذاشته شده به وسیله هر ماده در گونه *E. hyllebergi* E. نسبت به سایر گونه‌های موجود در این جنس بالاتر است (جدول ۲) و اندازه تخم‌های به دست آمده در آزمایشگاه در تمام گونه‌ها کمتر از تخم‌های جمع‌آوری شده از مولدهای وحشی است Nabhitabhata et al., 2005a; Norman and Lu, 1997; Hanlon et al., 1997; Choe and Ohshima, 1963. این نتایج مشابه نتایج به دست آمده در این تحقیق بوده و اندازه تخم‌های به دست آمده در آزمایشگاه کمتر از تخم‌های جمع‌آوری شده از دریا بود (شکل ۱-الف و ۱-ب). به طور معمول در گونه *E. hyllebergi* و در جمعیت‌های همسن، در زمان جفت‌گیری و تخم‌گذاری اندازه ماده بزرگ‌تر از نر است، ولی به دلیل اختلاف اندازه بین افراد یک جمعیت خلاف این هم مشاهده شده است که نر بزرگ با ماده (Nabhitabhata et al., 2005a,b) کوچک هم جفت‌گیری کرده است (شکل ۱-د). طول عمر نرها بیشتر از ماده‌ها بوده و طول عمر ماده‌ها به طور متوسط ۹۲/۷±۹/۷ روز و در نره ۱۰۸/۳±۱۲/۶ روز است (Nabhitabhata et al., 2005a). در این تحقیق طول عمر ماده‌ها کمتر از نرها بود و عمر متوسط ماده‌ها ۱۱۲±۳ و نرها ۱۲۰±۵ روز که مشابه مطالعه قبلی است. بررسی راهبرد کلی گونه‌های کوچک سرپایان به ویژه جنس *Euprymna* نشان می‌دهد که بیشترین انرژی صرف بلوغ جنسی زودرس و تولید حداکثر تخم شده تا در سریع ترین زمان ممکن نسل بعد خود را به وجود آورد (Choe and Ohshima, 1963). این راهبرد نکات مثبتی در بحث ژنتیک آبزیان دارد، به ویژه می‌توان صفات یا ژن خاص در نسل‌های مختلف و یا حتی

(*Vibrio fischeri*) symbiosis: a biomedical model for the study of bacterial colonization of animal tissue. *Journal of Molecular Microbiology and Biotechnology*, 1(1): 13–21.

**Ruby, E.G. and Lee, K. 1998.** The (*Vibrio fischeri*)-(*Euprymnascolopes*) light organ association: current ecological paradigms. *Applied and Environmental Microbiology*, 64: 805–812.

**Sinn, D.L. 2005.** From individuals to populations: personality traits in southern dumpling squid (*Euprymnatasmanica* Pfeffer, 1884) and their life history correlates. Doctor of Philosophy Thesis. University of Tasmania, 144p.

**Reunreng, A. 2005b.** Performance of sample large-scale cephalopod culture system in Thailand. *Phuket Marine Biology Center Research Bulletin*, 66:337-350.

**Norman, M.D. and Lu, C.C. 1997.** Redescription of the southern dumpling squid (*Euprymnatasmanica*) and a revision of the genus *Euprymna* (Cephalopoda: Sepiolidae). *Journal of Marine Biological Association of United Kingdom*, 77: 1109–1137.

**Roper, C. F. E., Sweeney, M. J. and Nauen, C. E. 1984.** FAO species catalogue, Vol.3, Cephalopods of the world. An annotated and illustrated catalogue of species of interest to fisheries, 277 p.

**Ruby, E.G. 1999.** The (*Euprymnascolopes*)-



## Life cycle of Bobtail Squid, *Euprymna hyllebergi* Nateewathana 1997, from egg incubation to spawning at laboratory condition

Sareban, Hassan

B.Sc. Graduate, Persian Gulf Mollusks Research Station, Bandar Lengeh, Iran

Received : 02/03/2015 Accepted : 19/01/2016

Corresponding author : hassan\_sareban65@yahoo.com

### Abstract:

The life cycle of bobtail squid (*Euprymna hyllebergi*:Sepiolidae) was investigated by incubating its eggs and rearing the hatchlings at  $28.5\pm0.5^{\circ}\text{C}$  and 37-38ppt salinity conditions in the Molluscs Research Station (Bandar Lengeh). After  $12\pm3$  days incubation, hatchlings with  $2.23\pm0.05$  mm mantle length and  $4\pm1$  mg wet weight emerged out. Hatchlings were fed with artemia, mysid shrimp and postlarvae of white-leg shrimp. In 30 days, they grew to  $5.94\pm1.18$  mm and  $254\pm16$  g, in 60 days to  $13.96\pm1.87$  mm, and  $2.214\pm0.213$  g, and in 90 days they grew to  $18.14\pm2.23$  mm and  $4.234\pm0.548$  g. First mating and spawning was observed in days 109 and 110, respectively, when the squids were  $20.12\pm2.64$  mm in mantle length and  $5.849\pm1.204$  g in body weight. Each female laid  $70\pm10$  eggs and died 2-4 days after spawning, followed by males after 7-15 days. Results show that bobtail squid have short life span and can easily be produced and succeeded by the next generation under laboratory conditions.

**Keywords:** Bobtail squid, Life cycle, Egg incubation, Spawning, *Euprymna hyllebergi*