



دانشگاه گنبد کاووس

نشریه "حافظت زیست بوم گیاهان"

دوره چهارم، شماره نهم، پاییز و زمستان ۹۵

<http://pec.gonbad.ac.ir>

بررسی برخی از خصوصیات بوم‌شناسی گونه دارویی و در حال انقراض زوفایی (*Thymbra spicata* L.) در استان ایلام (منطقه تلومه، تنگ بینا و شیرپناه)

مصطفی نادری^{۱*}، اصغر مصلح آرانی^۲، رضا احمدی^۳، علی اکبر جعفرزاده^۴، علی طهماسبی بور^۴

^۱دانشجو دکتری جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ایلام.

^۲دانشیار دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی دانشگاه یزد.

^۳دکتری جنگلداری، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام.

^۴دانشآموخته کارشناسی ارشد جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۲/۱۹؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۱۲/۷

چکیده

مطالعه حاضر برخی از خصوصیات رویشگاهی گونه در حال انقراض زوفایی (*Thymbra spicata*) را در سه منطقه تنگ بینا، تلومه و شیره پناه در استان ایلام مورد بررسی قرار می‌دهد. مشخصات زئومورفولوژی مناطق فوق با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، نقشه‌های زمین‌شناسی و یازدیدهای میدانی بررسی شد. برای تعیین ویژگی‌های اقلیمی هر یک از رویشگاه‌ها، پارامترهای اقلیمی با استفاده از داده‌های نزدیک‌ترین ایستگاه هواشناسی و برای تقسیم‌بندی اقلیمی از روش‌های دومارتن و آمبرزه، استفاده شد. خصوصیات خاک نظری بافت، شوری، اسیدیته، آهک، نسبت جذب سدیم، درصد رطوبت اشباع، درصد گلسمیم و متیزیم و ماده آلی اندازه‌گیری و به روش آنالیز فاکتوریل یا هم مقایسه شد. در این مطالعه همچنین گونه‌های همراه، فنولوزی و خصوصیات پیومتری جمعیت گونه زوفایی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که منطقه شیر پناه دارای سازند آسماری و دو منطقه دیگر دارای سازند گچساران بود. رویشگاه‌های این گونه دارای متوسط پارندگی بین ۲۰۸ میلی‌متر، متوسط دمایی بین ۱۸/۱ ۲۳/۵ درجه سانتی‌گراد و میانگین رطوبت نسبی بین ۴۰-۴۰٪ بودند. بر اساس روش آمبرزه اقلیم رویشگاه از منطقه پیابانی گرم تا خشک معتدل و نیمه خشک معتدل تعیین گردید. رویشگاه این گونه دارای خاک لومی شنی، درصد آهک بین ۷۵-۷۶٪، شوری بین ۴۳۸-۵۲۹٪، میکروموس بر سانتی‌متر و مواد آلی بین ۱-۴٪ بود. گونه گیاهی به عنوان گونه‌های همراه متعلق به

*نویسنده مسئول: m.ostafan.adery@gmail.com

نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان / دوره چهارم، شماره نهم، پاییز و زمستان ۹۵

۲۷ تیره در سه رویشگاه گونه زوفایی شناسایی شد. تراکم این گونه بین ۱۱۷۹-۱۹۲ پایه در هکتار، ارتفاع گیاه بین ۲۲-۱۳ سانتی‌متر و تاج پوشش بین ۷-۱۵ درصد اندازه‌گیری شد.

واژه‌های کلیدی: اکولوژی فردی، انقراض، ایلام، دارویی، *Thymbra spicata* L.

مقدمه

افزایش استفاده انسان از زمین به طور مستقیم از طریق گسترش شهری، حفاری، معدن کاوی و یا به صورت غیرمستقیم مانند مدیریت غلط، هجوم گونه‌های مهاجم، بقاء جمعیت‌های گیاهی و ذخایر ژنتیکی آن‌ها را تهدید می‌کند. افزایش فهرست گیاهان در حال انقراض یا منقرض شده موجب نگرانی محققان در زمینه حفاظت از گیاهان گردیده است (مصلح آرانی، ۱۳۸۸). از آن‌جا که گیاهان بومی هر کشوری بدليل محدودیت پراکنش آن‌ها از آسیب‌پذیری بالایی در برابر انقراض برخوردارند، حفاظت از آن‌ها نیازمند مطالعات علمی و فعلی است. کشور ایران یکی از مراکز مهم تنوع گیاهی دنیاً قدمیم به حساب می‌آید. نزدیک به ۲۲٪ از حدود ۸۰۰۰ گونه گیاهی که در ترکیب فلوریستیک پوشش گیاهی ایران یافت می‌شوند، بومی هستند. گیاه زوفایی (*Thymbra spicata*) یکی از ۲۰ گونه گیاهی است که در کتاب سرخ ایران در لیست گونه‌های در حال انقراض قرار گرفته است (Jalili and Jamzad, 1999).

به رغم اقدامات قابل توجهی چون ایجاد مناطق حفاظت شده و پارک‌های ملی، تشکیل بانک‌های بذر و کشت گیاهان در حال انقراض در باغ‌های گیاه‌شناسی، کمتر به نقش مطالعات اکولوژیکی در حفاظت و گسترش این گونه‌ها توجه شده است (رستمی‌کیا و همکاران، ۱۳۸۹). رشد گیاه در رویشگاه‌های طبیعی حاصل کارکرد عوامل مختلف زیستی از جمله اقلیم، خاک، توپوگرافی و غیره می‌باشد. با تبریزین شناسایی این عوامل به عنوان نیازهای رویشگاهی گیاهان اولین قدم در حفاظت و احیای آن‌ها محسوب می‌شود.

مطالعات نسبتاً متعددی در خصوص آت‌اکولوژی گونه‌های گیاهی انجام شده است. به طور مثال کاندمیر و کساران (2010) در بررسی آت‌اکولوژی گونه در حال انقراض *Alkanna haussknechtii* نشان دادند که این گونه در خاک‌های لومی خنثی یا کمی قلیایی با شوری کم و آهک و ظرفیت نگهداری آب بالا رویش می‌کند. این محققین همچنین نشان دادند که عناصر غذایی NPK در اندام‌های زیرزمینی این گونه بیشتر از اندام‌های هوایی آن می‌باشد. نجفی و همکاران (Nadjafi et al., 2009) در بررسی آت‌اکولوژی و فیتوشیمی گونه دارویی و در حال انقراض *Nepeta binaludensis* نشان دادند که این گونه در شیب‌های رو به شمال و ارتفاع بین ۲۳۰۰-۲۷۰۰ رویش دارد. این محققین همچنین نشان دادند که رویشگاه این گونه دارای بارندگی بین ۳۵۰-۳۷۰ و متوسط

مصطفی نادری و همکاران


حرارت سالانه ۷-۶ درجه سانتی گراد می‌باشد. ارتفاع این گیاه بین ۴۶ تا ۵۲ سانتی‌متر و قطر تاج آن بین ۳۹ تا ۴۲ سانتی‌متر و تراکم آن ۴ گیاه در یک متر مربع اندازه‌گیری گردید. حسنه و شاهمرادی (حسنه و شاهمرادی، ۱۳۸۶) در بررسی آت‌اکولوژی گونه جاشیر نشان دادند که این گونه در شیپهای شمال و شمال غربی مناطق کوهستانی و در دامنه ارتفاعی ۱۸۰۰ تا ۲۹۰۰ متر از سطح دریا استقرار دارد. رویشگاه‌های مختلف از نظر پوشش تاجی تفاوت معنی‌دار با هم نداشتند، ولی از نظر تراکم و میزان زادآوری متفاوت بودند. مطالعات احمدی و شاهمرادی (احمدی و شاهمرادی، ۱۳۸۴) در آت‌اکولوژی گونه *Agropyron cristatum* در استان آذربایجان غربی نشان داد که این گونه اکثراً در سازندگاه‌های قم، سازند جیرفت و آمیزه‌های رنگی دیده می‌شود. مطالعات خاکشناسی نشان می‌دهد که این گونه بهترین رشد را در خاک‌های با بافت متوسط از شنی تا لومی- رسی داشته و در خاک‌های شنی سست و رسی سنگین و شور بدخوبی رشد نمی‌کند. آزیز و شاهمرادی (آزیز و شاهمرادی، ۱۳۸۶) در مطالعه آت‌اکولوژی گونه مرتعی *Fernula ovina* در استان تهران نشان دادند که این گیاه در خاک‌های با بافت لومی تا لومی شنی می‌روید. هدایت الکتریکی خاک در رویشگاه این گیاه کمتر از یک دسی زیمتس بر متر و اسیدیته آن در حدود ۷ تا ۷/۵ است و فراوانی این گیاه در رویشگاه خود حدود ۸۱٪، پوشش تاجی ۱۲/۳۵٪ و تراکم ۱۶۷۵۰ پایه در هکتار می‌باشد.

حسنه (حسنه، ۱۳۷۳) در بررسی انجام شده روی گونه‌های اسکنبل در مراعت استان سمنان نشان داد که گونه اسکنبل هفت‌بندی در اقلیم نیمه بیابانی سرد و بیابانی خشک و گرم پراکنش دارد. نتایج فیاض (۱۳۷۷) نشان داد که خاک رویشگاه اسکنبل کرمانی در حوضه‌های جازموریان، چاهاب و تهلان در استان سیستان و بلوچستان آبرفتی با بافت سبک (شنی تا شن لومی) بوده است. حداقل pH خاک اسکنبل کرمانی ۷/۵ و حداکثر آن ۸/۲ ثبت گردیده است. حداقل هدایت الکتریکی خاک رویشگاه ۰/۴ و حداکثر آن نیز ۰/۸ dS/m اندازه‌گیری شد. بارش سالیانه رویشگاه‌های این گونه در استان سیستان و بلوچستان بین ۶۰ تا ۱۲۰ میلی‌متر، حداقل و حداکثر دمای مطلق ثبت شده در رویشگاه‌های این گونه نیز به ترتیب ۶ و ۵۱ درجه سانتیگراد گزارش شده است. با توجه به اهمیت زیست محیطی گونه‌های اندمیک این تحقیق با هدف شناسایی و مقایسه برخی از ویژگی‌های اکولوژیکی موثر بر استقرار گونه زفایی در استان ایلام انجام شده است.

مواد و روش‌ها

الف) گونه و مناطق مورد مطالعه: زوفایی (*Thymbra spicata*) گیاهی بوته‌ای از تیره نعناء (Lamiaceae)، معطر، ساقه چوبی، برگ‌ها کوچک، گل‌ها صورتی و به ارتفاع ۱۰-۴۰ سانتی‌متر می‌باشد. این گونه در هوای گرم و نور کافی دامنه‌های شمالی رویش دارد و مصارف سنتی فراوانی

داشته و در بین اهالی منطقه از توجه و اهمیت خاصی برخوردار است. گونه مذکور تقریباً خصوصیات آویشن را دارا بوده و به عنوان ضد عفونی کننده مجاری تنفسی، تونیک، برطرف کننده اسپاسم‌های ماهیچه‌ای، خلط‌آور، دفع کننده انگل‌ها و اشتها آور جهت مصارف درمانی بکار می‌رود. در نواحی جنوب شرقی آنتالیا و نواحی مدیترانه ترکیه از این گیاه برای درمان تنگی نفس، گاز معده، برونشیت، سرفه، اسهال و رماتیسم استفاده می‌شود و نیز در سال‌های اخیر گزارشاتی مبتنی بر اثر مصرف عصاره گیاه زوفایی بر کاهش کلسترول خون انتشار یافته است. این گیاه به عنوان متبع غذی از فلاونوئیدها، ترپن‌وئیدها و ایزوپرپن‌وئیدها همچون تیمول و کارواکرول است (اسدی و همکاران، ۱۳۹۱). این گونه در استان ایلام در منطقه تلومه، شیرپنه (شیره پناه) و تنگ بیتا گسترش دارد. منطقه شیره پناه (مختصات جغرافیایی $17^{\circ} 55' 45''$ طول شرقی و $54^{\circ} 42' 33''$ عرض شمالی) در غرب شهرستان ایوان در فاصله ۷۰ کیلومتری شهر ایوان و ۴۰ کیلومتری بخش زرنه واقع شده است. حداقل ارتفاع منطقه 1250 متر، حداقل ارتفاع 769 و ارتفاع متوسط منطقه 981 متر است. منطقه شکار ممنوع تنگ بیتا (مختصات جغرافیایی $41^{\circ} 58' 45''$ طول شرقی و $40^{\circ} 58' 45''$ عرض شمالی) و تلومه (مختصات جغرافیایی $25^{\circ} 21' 46''$ طول شرقی و $55^{\circ} 38' 18''$ عرض شمالی) در جنوب غربی شهر ایلام و فاصله آن از مرکز شهرستان 100 کیلومتر می‌باشد (شکل ۱).



شکل ۱ نقشه برآنکش گونه زوفایی در استان ایلام

ب) بررسی خصوصیات زئومورفولوژی

مشخصات زئومورفولوژی و ویژگی‌های واحد اراضی در هر رویشگاه با گزارش‌های موجود، استفاده از نقشه زمین‌شناسی، تصاویر ماهواره‌ای لندست Google Earth و نیز بازدیدهای میدانی تکمیل و اطلاعات هر رویشگاه ثبت گردید.

ج) بررسی ویژگی‌های هوای اقلیم‌شناسی

برای تعیین ویژگی‌های اقلیمی هر یک از رویشگاه‌ها، میانگین، حداقل و حداکثر درجه حرارت و بارندگی با استفاده از داده‌های نزدیک‌ترین ایستگاه هواشناسی (ایستگاه ایلام، ایوان) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین به متغیر افزایش دقت کار از روش‌های تقسیم بندی اقلیمی دومنتن و آمبرژ، برای هر رویشگاه استفاده شد (کریمی، ۱۳۶۴). از عوامل دیگر اقلیمی چون رطوبت نسبی، تبخیر و تعرق و تعداد روزهای یخبندان در سال جهت تکمیل ویژگی‌های هواشناسی رویشگاه استفاده گردید. به متغیر مقایسه هر یک از ویژگی‌های اقلیمی تمامی پارامترهای فوق طی یک دوره ۱۰ ساله به عنوان پایه زمانی مشترک مورد بررسی قرار گرفت.

د) بررسی ویژگی‌های خاک

به متغیر بررسی خصوصیات خاک سه پروفیل در هر منطقه حفر شد و نمونه‌برداری از لایه‌های ۰-۱۵ و ۱۵-۳۰ مطابق روش استاندارد انجام گرفت. pH عصاره گل اشباع با دستگاه pH متر (مدل John Way)، هدایت‌الکتریکی عصاره اشباع (EC_e) با دستگاه هداپت‌ستچ (مدل John Way) اندازه‌گیری و از روش واکی- بلاک برای تعیین درصد ماده آلی و از روش فلیم فتوتمتری برای تعیین میزان سدیم (برحسب میلی‌اکی‌والان در لیتر) استفاده شد. آهک نیز برحسب درصد در هر یک از نمونه‌ها مورد آزمایش قرار گرفت. برای اندازه‌گیری درصد کلسیم و متیزیم از روش تیتراسون با ورسین استفاده گردید. همچنین بافت خاک نیز از روش هیدرومتری تعیین شد (ابن جلال و همکاران، ۱۳۷۰). برای اندازه‌گیری درصد رطوبت اشباع خاک، گل اشباع در آون ۱۰۵ درجه سانتی‌گراد به مدت زمان ۲۴ ساعت گذاشته شد و سپس با استفاده از وزن گل خشک و وزن آب، درصد رطوبت اشباع محاسبه گردید. به متغیر نرمال بودن داده‌ها در این پژوهش از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شد.

به طور کلی همه داده‌های مربوط به مشخصه‌های خاک پس از اندازه‌گیری در آزمایشگاه به کمک نرم‌افزار SPSS 16 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. عمق ۰-۱۵ سانتی‌متری، لایه سطحی و عمق ۱۵-۳۰ سانتی‌متری به عنوان لایه عمقی در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از مقایسه میانگین مشخصه‌های خاک لایه سطحی، عمقی و نیمرخ کلی خاک رویشگاه‌ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه با یکدیگر مقایسه گردید.

ه) تعیین ویژگی‌های پوشش گیاهی

برای انجام مطالعات مربوط به پوشش گیاهی، نمونه‌برداری از پوشش گیاهی با روش تصادفی-سیستماتیک انجام شد. تعداد ۵ عدد ترانسکت به طول ۱۰۰ متر و به فواصل ۲۰ متری از یکدیگر به طور تصادفی در منطقه مورد مطالعه مستقر شدند. تعداد متناسب پلات‌های نمونه‌برداری با استفاده از روش آماری تعیین حجم نمونه‌گیری مصداقی (۱۳۸۲) و اندازه متناسب پلات به روش سطح حداقل (Mueller & Ellenberg, 1974) تعیین گردید. با توجه به روش سطح حداقل، اندازه متناسب هر پلات $5\text{m} \times 5\text{m}$ تعیین شد. همچنین با توجه به روش آماربرداری تعداد ۱۵ پلات برای هر منطقه و در مجموع ۴۵ پلات برای نمونه‌برداری پیش‌بینی شد که به طور تصادفی بر روی خطوط ترانسکت استقرار یافتد. ارتفاع بوته‌ها با متر نواری از سطح تاج پوشش تا سطح زمین بر حسب سانتی‌متر تعیین گردید. برای تعیین سطح پوشش از روش اندازه‌گیری قطر کوچک و بزرگ تاج پوشش گیاه استفاده شد. تراکم بوته‌ها نیز از طریق شمارش مستقیم تعداد افراد جمعیت در واحد هکتار تعیین گردید.

و) فنولوزی

تغییرات ریخت شناسی فصلی و مراحل رویشی و زایشی گونه زوفایی در سال ۱۳۹۰-۱۳۹۱ با بازدیدهای مکرر از رویشگاه‌های زوفایی بررسی گردید. بر این اساس آغاز رشد رویشی، طول دوره رشد، آغاز گلدهی، تشکیل پذر بررسی شد.

ز) گونه‌های همراه

گونه‌های همراه در رویشگاه‌های زوفایی در فصل رویشی بهار سال ۱۳۹۱ با انجام بازدیدهای میدانی از مناطق سه‌گانه جمع‌آوری گردید و با استفاده از متابع موجود شناسایی شدند. اسامی فارسی گونه‌های گیاهی از کتاب فلور ایلام اقتباس شد. (ملفریان، ۱۳۸۷).

نتایج

الف) خصوصیات زئومورفولوژی

رخساره‌های زئومورفولوژیکی منطقه شیره پناه شامل واحد کوهستان با دامنه نامتظم و آثار فرسایش آبی (شیاری و بین شیاری) می‌باشد. سازند آن آسماری بوده که ضخامت آن ۲۱۴ متر است و از لایه‌های آهک کرم تا قهقهه‌ای رنگ تشکیل شده است. تشکیلات این سازند شامل سنگ آهک با میان لایه‌های شیل و مارن است. خاک به صورت ریزدانه و عمق آن در این سازند زیاد است. در پایه واحد کوهستان در منطقه مورد مطالعه آثار تپه ماهوری دیده می‌شود. دو منطقه دیگر دارای سازند گچساران می‌باشد. ضخامت زیاد سازند گچساران در منطقه تلومه که به صورت دشتی با شبکه کم است نشان از رسوب‌گذاری سریع در محیط کولاپی اشکوب میوسن میانی دارد، ولی فرسایش سریع‌تر در منطقه

مصطفی نادری و همکاران

تنگبینا که سازند گچساران از زیر سازندهای بالائی بیرون زده و تحت تأثیر فرسایش قرار گرفته، ضخامت آن را کم کرده است. در هر دو منطقه دامنه به صورت نامنظم با بروزد سنگی که در بیرون-زدگی‌ها به صورت برجهسته با درز و شکاف‌های زیاد به خوبی قابل مشاهده است. در پای دامنه‌های هر دو منطقه نیز آثار واریزهای به خوبی قابل مشاهده است. در منطقه تنگ بینا که ژئومورفولوژی کوهستان است به دلیل عمق کمتر خاک، سنگ مادر در سطح زمین در برخی نقاط رختمنون پیدا کرده است.

جدول ۱ مقایسه پارامترهای اقلیمی سه منطقه تلومه، شیرپنه و تنگ بینا در استان ایلام

تنگ بینا	شیره پناه	تلومه	رویشگاه پارامترهای اقلیم	
			(mm)	(°C)
۲۰۰	۴۰۸	۲۰۸	متوسط بارندگی	(mm)
۲۲/۵	۱۸/۵	۱۸/۱	متوسط دمای سالانه	(°C)
۲۰/۶	۲۵/۷	۲۵/۴	میانگین دمای حداقل ماهانه	(°C)
۱۶/۳	۹/۸	۹/۴	میانگین دمای حداقل ماهانه	(°C)
۴۸/۲	۴۲/۱	۴۲/۹	دمای حداقل مطلق ماهانه	(°C)
۰/۵	۴/۰	۴/۳	دمای حداقل مطلق ماهانه	(°C)
۲۶	۲۴	۲۶	تعداد روزهای بخشنده	
۴۰	۲۵	۴۰	میانگین رطوبت نسبی	(درصد)
۵۴	۵۱	۵۴	میانگین حداقل رطوبت نسبی	(درصد)
۲۵	۲۵	۲۵	میانگین حداقل رطوبت نسبی	(درصد)
۱۶۷	۱۷۷	۱۶۷	تبخیر سالانه	(درصد)
۱۵	۱۶	۱۲	سرعت باد	(m/s)
جنوبی	جنوبی	جنوبی	جهت باد	
۲۶/۹	۲۵۲	۲۶/۹	ساعت آفتابی ماهانه	

ب) نتایج بررسی اقلیم

نتایج پارامترهای اقلیمی نشان داد که منطقه شیرپنه از متوسط بارندگی و تبخیر سالانه بیشتری نسبت به مناطق دیگر برخوردار است. در صورتی که متوسط دمای سالانه و ماهانه در منطقه تنگ بینا بیشتر از دو منطقه دیگر می‌باشد (جدول ۱). در منطقه شیرپنه براساس روش دومارتن اقلیم منطقه در ارتفاعات پایین نیمه خشک معتدل و در ارتفاعات فوقانی مدیترانه‌ای سرد و براساس روش آمبرژه اقلیم منطقه خشک معتدل تا نیمه خشک معتدل است. در منطقه تلومه و تنگ بینا طبق روش آمبرژه اقلیم

منطقه بیابانی گرم تا خشک معتدل تا نیمه خشک معتدل بوده و طبق روش دومارتن در ارتفاعات پایین به صورت خشک گرم و در ارتفاعات میانی و بالا بصورت نیمه خشک معتدل می‌باشد.

ج) نتایج حاصل از آزمایش خاک

به منظور تسهیل در تفکیک ویژگی‌های عمومی خاک هر یک از مناطق مورد مطالعه، نتایج به دست آمده از انجام آزمایشات خاکشناسی در جدول ۲ و ۳ ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهد که کربن و مواد آلی به طور معنی‌داری در منطقه تنگبینا بیشتر از دو منطقه دیگر است. آهک در منطقه شیره‌پناه و رطوبت نسبی در منطقه تنگبینا به طور معنی‌داری بیشتر از دو منطقه دیگر است. نتایج مقایسه لایه سطحی و عمقی خاک نشان داد که در دو منطقه تلومه و تنگبینا کربن و مواد آلی در لایه سطحی به طور معنی‌داری بیشتر از لایه عمقی است.

جدول ۲ نتایج تجزیه واریانس تاثیر منطقه و عمق بر صفات مورد مطالعه در رویشگاه گونه زوفایی

صفات	منبع	df	میانگین مریعات	احتمال
منطقه		۲	.۰۲۲	.۱۲
عمق		۱	.۰۱	.۰۰۳
منطقه*عمق		۲	.۰۱۶	.۰۰۴
منطقه		۲	۱۲۴۲۱۷	.۰۰۴
عمق		۱	۱۰۶۲۶	.۰۰۸
شوری			۱۲۰۹۸	.۰۰۸
منطقه*عمق		۲		.۰۰۸
منطقه		۲	۸۴۸	.۰۰۰
آهک		۱	۱۱۶	.۰۳۳
منطقه*عمق		۲	۶۵	.۰۰۵
منطقه		۲	۵۶۲	.۰۰۰
رطوبت اشباع		۱	۱۶	.۰۰۵
منطقه*عمق		۲	۷۷	.۰۱۵
منطقه		۲	۱۷	.۰۰۰
مواد آلی		۱	۲۱۴	.۰۰۰
منطقه*عمق		۲	.۰۱۳	.۰۰۴
منطقه		۲	۵۰۸	.۰۰۰
آهک		۱	۱۱	.۰۰۰
منطقه*عمق		۲	.۰۱	.۰۰۴

مصطفی نادری و همکاران

۱۳۱	۱۰	۲	منطقه	
۱۴۹	۲/۹	۱	عمق	کلسیم منیزیم
۱۶	۲/۵	۲	منطقه*عمق	
۱۱۱	۲/۴	۲	منطقه	
۱۱۲	۲/۴	۱	عمق	سدیم
۱۲	۱/۷	۲	منطقه*عمق	
۱۱	۶۷	۲	منطقه	
۱۶	۵۲	۱	عمق	شن
۱۸	۴	۲	منطقه*عمق	
۱۰۰۶	۸۲	۲	منطقه	
۱۹	۱۰۵	۱	عمق	
۱۵	۷	۲	منطقه*عمق	
۱۴۸	۱۲/۴	۲	منطقه	رس
۱۱	۵	۱	عمق	
۱۵	۱۰۵	۲	منطقه*عمق	

جدول ۳: مقایسه میانگین اثر منطقه و عمق بر صفات خاک رویشگاه زوفایی (حروف نشانده‌نده معنی‌دار بودن بر اساس آزمون دانکن می‌باشد).

منطقه	تلرمه	تگ بینا	شیرینیا
صفات	۱۵۲	- ۱۵	۱۵۲
اسیدیته	۷/۷b	۷/۶ab	۷/۷ b
شوری ($\mu\text{s}/\text{cm}$)	۶۸۷ a	۷۴۶ a	۲۵۶ a
آهک (درصد)	۵۷ab	۴۸ b	۷۲ a
رطوبت اشیاع	۴۵ab	۵ a	۲۱ cd
مواد آلی (درصد)	۴ab	۴/۸a	- ۱۸c
گربن آلی (درصد)	۲/۲ab	۲/۸a	- ۴۷c
کلسیم منیزیم (meq/L)	۹/۷a	۹/۲a	۷/۲a
سدیم (meq/L)	۱/۶ab	۱/۲ab	- ۱۶b
شن (درصد)	۴۶a	۴ ab	۲۸ab
رس (درصد)	۱۲b	۱۲b	۱۹ab
سیلت (درصد)	۴۱a	۴۷a	۴۲a

د) برخی ویژگی‌های بیومتری پوشش گیاهی: نتایج نشان داد که تعداد کل پایه‌ها و تراکم گونه زوفایی در منطقه تلومه کمتر از دو منطقه دیگر است. در عوض بیشترین سطح تاج این گونه در منطقه

نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان / دوره چهارم، شماره نهم، پاییز و زمستان ۹۵

تلومه قرار دارد. درصد تاج پوشش و متوسط سطح تاج این گونه نیز در منطقه تلومه بیشتر از دو منطقه دیگر بود (جدول ۴).

جدول ۴ ویژگی‌های بیومتری گونه زوفایی در سه منطقه شیرینه، تلومه و تنگ‌بینا در استان ایلام


مناطقی مورد مطالعه	تلومه	شیره پناه	تنگ بینا
تاج پوشش (درصد)	۱۵	۷	۹
متوسط ارتفاع	۲۲/۴۴	۱۲/۲	۲۲/۸۴
سطح تاج پوشش (متر مربع در هکتار)	۸/۶	۱۸/۱	۴۸/۲
تراکم (اصله در هکتار)	۱۹۲/۳۹	۱۱۷۹/۶	۱۱۷۲/۳
حداکثر سطح تاج (سانتی متر مربع)	۲۱۲۲	۲۹۸	۱۰/۷۴
متوسط سطح تاج (سانتی متر مربع)	۴۴۷/۱۸	۱۹۵/۸۸	۴۱/۱۸۲
تعداد کل پایه‌ها	۱۸۵	۴۲۰	۱۶۷۵

ه) نتایج حاصل از بررسی فنلوبزی

نتایج بررسی فنلوبزی گونه زوفایی نشان داد که در هر سه منطقه شروع رشد رویشی از بهمن ماه شروع می‌شود. شروع گلدهی در منطقه تلومه در اوخر فروردین آغاز می‌شود در حالی که در دو منطقه دیگر این مرحله در اردیبهشت ماه اتفاق افتاد. به همین ترتیب شروع بذردهی و ریزش بذور نیز در منطقه تلومه یک تا دو هفته زودتر از دو منطقه دیگر بود (جدول ۵).

مصطفی تادری و همکاران

جدول ۵- فن‌لوازی گونه زوایی در سه منطقه شیراز، تلوه و تنگ بینا در استان ایلام



شکل ۲ مراحل مختلف فنلولوژی گونه دارویی و در حال انقراض زوفایی در استان ایلام
a: اوج برگدهی اولیه، b: شروع برگدهی ثانویه، c: اوج برگدهی ثانویه، d: شروع گلدهی، e: اوج گلدهی، f: مرگ گیاه.

و) گونه‌های همراه

نتایج نشان داد که ۴۵ گونه گیاهی به عنوان گونه‌های همراه متعلق به ۲۷ تیره در سه رویشگاه گونه زوفایی در استان ایلام گسترش دارند. گونه‌هایی که در هر سه منطقه به صورت مشترک رویش دارند عبارتند از: *Capparis spinosa* *Astragalus fasciculifolius* *Amygdalus lycioides* *Erucaria hispanica* *Erucaria hispanica* *Diplotaxis Harra* var. *Spinosa* L. *Rumex ephedroides* *Prosopis farcta*. در جدول ۶ لیست گونه‌های گیاهی دیده می‌شود.

مصطفی نادری و همکاران

جدول ۷ گونه‌های همراه در رویشگاه گونه زوافای در سه منطقه شیرپنه، تلومه و تنگ‌بینا در استان ایلام

گونه	تیره	نام فارسی	تلومه	تنگ بینا	شیرپنه
<i>Achillea oligocephala</i> DC.	Asteraceae	یومادران پنیه‌ای	*	-	-
<i>Alcea angulata</i> Frevn & Sint.	Malvaceae	ختمی گوش دار	*	-	-
<i>Amygdalus arabica</i> Olivier.	Rosaceae	پادام بی پرگ	-	*	*
<i>Amygdalus lycioides</i> Spach.	Rosaceae	پادام خار آسود	*	*	*
<i>Anchsa strigosa</i> Labill.	Boraginaceae	گاوزبان خارک دار	*	*	-
<i>Astragalus fasciculifolius</i> Boiss.	Papilionaceae	گون	*	*	*
<i>Capparis spinosa</i> var. <i>Spinosa</i> L.	Capparidaceae	کور	*	*	*
<i>Centurea iberica</i> Trev. ex Spreng.	Asteraceae	گل گندم	*	-	*
<i>Cleome oxypetala</i> Boiss.	Capparidaceae	علف مار زرد	*	-	*
<i>Diplotaxis Harra</i> (Forssk.) Boiss	Convolvulaceae	دو رج	*	*	*
<i>Echinops mosulensis</i> Rech.f	Asteraceae	شکر تیغال	-	*	*
<i>Erodium oxyrrhynchum</i> M.B. subsp.	Geraniaceae	نوک لک لکی تیز	*	-	-
<i>Erucaria hispanica</i> Druce.	Convolvulaceae	مندابی	*	*	*
<i>Euhorbia denticulata</i> Lam.	Euphorbiaceae	فرفیون دنداته دار	-	-	*
<i>Gundelia Tournefortii</i> L.	Asteraceae	کنگر معمولی	-	*	-
<i>Gypsophila pollida</i> Stapf	Caryophyllaceae	گچ دوست	-	*	*
<i>Haplophyllum tuberculatum</i> Juss	Rutaceae	سدابی زگیل دار	*	*	-
<i>Heliotropium denticulatum</i> Boiss.	Boraginaceae	آفتاب پرست	*	-	*
<i>Malva neglecta</i> Wallr.	Malvaceae	پنیرک معمولی	*	*	-
<i>Mozaffariania insignis</i> Pimenov.	Urticaceae	-	-	*	-
<i>Noaea mucronata</i> Aschers. et Schweinf	Chenopodiaceae	خارکو	-	-	*
<i>Oliveria decumbens</i> Vent.	Urticaceae	لعل کوهستان	*	*	*
<i>Onosma aspermum</i> Bornm	Boraginaceae	زیگوله ای زبر	*	-	*
<i>Peganum harmala</i> L.	Zygophyllaceae	اسفند	-	*	-
<i>Phlomis olivieri</i> Benth.	Labiatae	گوش بره	-	-	*
<i>Pistacia khinjuk</i> stocks.	Adianthaceae	خینچجوک	-	*	*
<i>Poa bulbosa</i> L.	Poaceae	چمن پیازک دار	*	-	-
<i>Prosopis farcta</i> Macbr.	Mimosaceae	کهورک	*	*	*
<i>Pteropyrum naufelum</i> Al khayat	Polygonaceae	پرند ایلامی	-	*	-
<i>Quercus brantii</i> Lindi. Var. <i>persica</i>	Fagaceae	بلوط ایرانی	-	-	*
<i>Rumex ephedroides</i> Bornm	Polygonaceae	ترشک ریش بزی	*	*	*

نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان / دوره چهارم، شماره نهم، پاییز و زمستان ۹۵

<i>Saccharum ravennae</i> Murray	Poaceae	تابشیر هندی	-	-	*
<i>Salsola nitraria</i> Pall.	Chenopodiaceae	شور سوری	-	-	*
<i>Salvia Reuterana</i> Boiss.	Labiatae	مریم گلی	-	*	-
<i>Satureja khuzistanica</i> Jamzad.	Labiatae	مرزه خوزستانی	-	*	-
<i>Scrophularia deserti</i> Del. Var. <i>flojata</i> Eig.	Scrophulariaceae	گل میمونی	*	*	*
<i>Silybum marianum</i> Gaerth	Asteraceae	خار مریم	-	-	*
<i>Stachys inflata</i> Benth.	Labiatae	سنبله ای پادکنکی	-	-	*
<i>Stipa capensis</i> Thunb.	Poaceae	پهمن	-	*	-
<i>Tamarix ramosissima</i> Ledeb.	Tamaricaceae	گز پر شاخه	-	*	*
<i>Teucrium polium</i> L.	Labiatae	مریم تخدی	*	*	-
<i>Verbascum alceoides</i> Boiss & Hausskn.	Scrophulariaceae	گل ماهور	*	-	*
<i>Vitex pseudo-Negundo</i> Hand & Mzt.	Violaceae	پنج انگشت	-	-	*
<i>Ziziphus nummularia</i> Wight & Arn.	Rhamnaceae	رمیلیک	*	*	-
<i>Zoegea leptarea</i> L.	Asteraceae	خورشید صبح	-	*	-

* حضور و عدم حضور

بحث و نتیجه‌گیری

نتایج بررسی ژئومورفوگلوریکی رویشگاه گونه زوفایی نشان داد که این گونه در دامنه‌های سنگی یا به صورت نامنظم با بیرون‌زدگی‌هایی با درز و شکاف‌های زیاد دیده می‌شود. وجود درز و شکاف می‌تواند نقش مهمی در استقرار این گونه ایفا نماید. شکاف‌ها با ایجاد رطوبت و خاک و لاشبرگ‌های که در خود محصور نموده‌اند محیط مناسبی برای جوانه‌زنی بذور و استقرار این گیاه فراهم می‌کند. وجود درز و شکاف‌های زیاد ممکن است که واپسگی این گونه را نسبت به رطوبت نشان دهد و این عامل می‌تواند عامل محدود کننده پراکنش این گونه نیز محسوب شود. مشابه مطالعه حاضر در بررسی محدودیت‌های پراکنش گونه دارویی و در حال انقراض مورخوش (*Zhumeria majdei*) نشان داده شد که جوانه‌زنی بذور این گونه واپسگی مستقیم به رطوبت داشته و درز و شکاف‌های توده‌های سنگی عامل مهم استقرار این گونه محسوب می‌شوند (مصلح آراثی، ۱۳۸۸). در بررسی تاثیر برخی از خصوصیات واحدهای سنگی آندزیتی و گرانیتی بر روی میزان استقرار پوشش گیاهی در مناطق خشک نیز نشان داده شد که بین میزان پوشش گیاهی و تعداد درزهای سنگی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد (اختصاصی و همکاران، ۱۳۹۰). با توجه به نتایج حاصل از آزمایش خاک رویشگاه‌های این گونه مشخص شد که گونه زوفایی طالب مقادیر نسبتاً متفاوتی از آهک می‌باشد که دامنه این مقادیر در رویشگاه‌های مختلف متفاوت می‌باشد. میزان آهک موجود در رویشگاه‌های این گونه بین ۴۸-۷۶ بوده که می‌توان گفت

زوفایی گونه‌ای آهک دوست است. همان‌طور که ذکر شد مقدار درصد رطوبت اشبع نیز در سه رویشگاه متفاوت بوده، مقدار آن در رویشگاه تنگبیتا به ۴۷٪ می‌رسد که بیشتر از دو رویشگاه دیگر می‌باشد. اما بافت خاک هر سه رویشگاه لومی- شنی می‌باشد که نشان می‌دهد این گونه طالب خاک‌های سبک می‌باشد. نتایج همچنین نشان داد رویشگاه گونه زوفایی دارای خاک‌های با pH کمی قلیایی، شوری پایین و مواد آلی کم بوده که این عوامل می‌تواند بدلیل بستر توده سنگی و لایه نازک خاک باشد.

رویشگاه‌های این گونه دارای متوسط بارندگی بین ۴۰-۴۰۰ میلی‌متر و میانگین رطوبت نسبی بین ۴۰-۲۵٪ می‌باشد. تحمل دمایی این گونه بین ۴-۴۸ درجه سانتی‌گراد تا درجه سانتی‌گراد تعیین گردید. بر اساس روش آمریکا اقلیم رویشگاه از منطقه بیابانی گرم تا خشک معتدل و نیمه خشک معتدل تعیین گردید. نتایج بررسی گونه‌های همراه رویشگاه‌های گونه زوفایی نشان داد که دو گونه درختچه‌ای *Pistacia khinjuk* و *Amygdalus arabica* که از عناصر شاخص رویش‌های مناطق کوهستانی و مرتفع ایران و تواریق هستند فقط در دو منطقه شیره پناه و تنگبیتا دیده شدند. در عوض گونه *Ziziphus nummularia* که از عناصر رویش‌های ارتفاعات پایین‌تر می‌باشد نیز فقط در منطقه تلومه گسترش داشت. ضمناً گونه درختی *Quercus brantii* نیز فقط در منطقه شیره پناه گسترش داشت. وجود گونه‌های درختی مذکور بدلیل میزان بارندگی بالا در منطقه شیره پناه می‌باشد. نتایج بررسی‌های گونه همراه و نتایج اقلیمی نشان می‌هد که گسترش گونه زوفایی دامنه دمایی و ارتفاعی نسبتاً زیادی را پوشش می‌دهد. نتایج بیومتری نشان داد که کمترین مقدار تراکم گونه زوفایی با ۱۹۲ پایه در هکتار و بیشترین تاج پوشش و ارتفاع گونه زوفایی در منطقه تلومه مشاهده شد. در منطقه تلومه ضخامت خاک زیادتر از مناطق دیگر بوده به دلیل خاک و مواد غذایی بیشتر پایه‌هایی از زوفایی که در این منطقه موقق به استقرار می‌شوند رشد بیشتری دارند. در مقابل به دلیل کمبود درز و شکاف توده سنگی در منطقه تلومه شانس جوانهزنی بذور این گونه کاهش یافته و بهمین دلیل تجدید حیات طبیعی و تراکم این گونه در این منطقه کمتر می‌باشد. با توجه به شناخت بیشتر مردم از خصوصیات دارویی این گونه و بهره‌برداری روزافزون آن به نظر می‌رسد کشت و تکثیر این گونه به صورت زراعی و عرضه آن به بازار بجای بهره‌برداری مستقیم از طبیعت می‌تواند به عنوان راهکاری جهت حفظ این گونه در حال انقرض مورد توجه قرار بگیرد.

تشکر و قدردانی

در پایان از زحمات بی‌دریغ جناب آقای یعنوب نیازی دانشجوی دکترای آبخیزداری دانشکده متابع طبیعی یزد و جناب آقای مهندس گرایی کارشناس ارشد اداره متابع طبیعی استان ایلام بخاطر همکاری در به انجام رساندن این مقاله کمال تشکر و قدردانی را دارم.

منابع

- آویر، ف. و شاهمرادی، ا. ۱۳۸۶. آتاکولووی گونه مرتعی *Ferula ovina* در استان تهران، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، ۳: ۳۵۹-۳۶۷.
- احمدی، ا. و شاهمرادی، ا. ۱۳۸۴. آتاکولووی گونه *Agropyron cristatum* در استان آذربایجان غربی، مجله منابع طبیعی ایران، ۳: ۶۹۱-۷۰۱.
- اسدی، م. چراغی، ج. پیله وریان، ع. ا. اشرف مهرابی، ع. ایراهیمی وسطی کلایی، س. ۱۳۹۱. مقایسه اثر هیدروالکلی پخش هایی هولی گیاه زوفایی با لاستاتین بر پروفیل لمبیدی خون در موش، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، ۱۴ (۵): ۴۲-۴۸.
- اختصاصی، م. ر. صحیتی، م. ط. مصلح آرائی، ا. و عظیمزاده، ح. ر. ۱۳۹۰. تأثیر برخی از خصوصیات واحد های سنگی آندزیتی و گرانیتی بر روی میزان استقرار پوشش گیاهی در مناطق خشک (مطالعه موردی: مهریز-پزد)، فصلنامه پژوهش‌های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی)، ۹۲: ۴۲-۴۳.
- این جلال، ر. شفاعی بجستان، م. ۱۳۷۰. اصول نظری و عملی مکانیک خاک، انتشارات دانشگاه شهید چمران.
- حسنی، ن. ۱۳۷۳. آتو اکولووی اسکنبل در مرتع خشک سمنان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
- حسنی، ج. و شاهمرادی، ا. ۱۳۸۶. آتاکولووی چاشیر *Prangos ferulacea* در استان کردستان، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، ۲: ۱۸۴-۱۷۱.
- rstemi کیا (نوگی)، ی. فتاحی، م. ایمانی، ع. شریفی، ج. ۱۳۸۹. پرسی برخی از نیازهای رویشگاهی و خصوصیات کمی و کیفی بنه در جنگلهای شهرستان خلخال. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات جنگل و صنور ایران. جلد ۱۷ (۴): ۴۹۹-۴۸۹.
- فیاض، م. ۱۳۷۷. بررسی برخی از خصوصیات یوم‌شناسی سه گونه اسکنبل در حوزه‌های جازموریان، چاهان و تهاب در استان سیستان و بلوچستان، مجله مرتع و بیابان، ۲۱۱: ۱۹۱-۲۱۲.
- کریمی، م. ۱۳۶۴. مقایسه روش‌های تقسیم پندی اقلیمی در منطقه مرکزی ایران، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.
- مصدقی، م. ۱۳۸۲. مرتعداری در ایران، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ چهارم، ۳۳۳ ص.
- مصلح آرائی، ا. ۱۳۸۸. شناسایی آفات و عوامل موثر بر جوانه زنی بذر گیاه مورخوش، طرح پژوهشی مصوب دانشگاه یزد، ص. ۲۶.
- مخلفریان، و. ۱۳۸۷. قلور اسلام، انتشارات فرهنگ معاصر.
- Jalili A., Jamzad Z. 1999. Red Data Book of Iran. A Preliminary Survey of Endemic & Rare and Endangered Plants species in Iran. Research Institute of Forests and Rangelands (RIFR) Publication, Tehran, 750 p.
- Kandemir N., Cansaran, A. 2010. An autecological on endemic alkanna haussknechtii Bornm. (Boraginaceae) Critically endangered in Turkey. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 6(5): 613-618.

مصطفی نادری و همکاران

- Mueller D., Ellenberg H. 1974. Aims and methods of vegetation ecology. New York: John Wiley & Sons. 47 pp.
- Nadjafi F., Koocheki A., Honermeier B., Asili, J. 2009. Autecology, ethnomedicinal and phytochemical studies of *Nepeta binaludensis* Jamzad a highly endangered medicinal plant of Iran. Jeobp, 12(1), 97-110.
- Rostamikia (Noki) Y., Imani A.A., Fattahi M., Sharifi J. 2010. Site demands, quantitative and qualitative characteristics of wild pistachio in Khakhal (Text in Persian), Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 4: 489-499.