



دانشگاه گنبد کاووس

نشریه "پژوهش‌های ماهی شناسی کاربردی"

دوره اول، شماره دوم، تابستان ۹۲

<http://jair.gonbad.ac.ir>

مقایسه برخی خصوصیات ریخت‌سنگی و پویایی جمعیت‌های گاوماهی شنی در نهرهای کبودوال، زرین‌گل و شیرآباد گلستان *Neogobius pallasii* (Berg, 1916)

عرفان کریمیان

دانشجوی دکتری شیلات، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۱۰/۳۰؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۱/۱۲/۱۲

چکیده

گاوماهی شنی (*N. pallasii*) (Berg 1916) یکی از گونه‌های خانواده گاوماهیان (Gobiidae) است که پراکنش وسیعی در حوضه جنوبی دریای خزر و رودخانه‌های منتهی به آن دارد. هدف از این پژوهش، تعیین برخی پارامترهای ریخت‌سنگی گاوماهی شنی و صفات مناسب جهت جداسازی جمعیت‌های احتمالی آن در نهرهای کبودوال، زرین‌گل و شیرآباد است. به این منظور، جنس‌های نر و ماده در ۵ گروه سنی $^{+0}$ تا $^{+3}$ دسته‌بندی شدند. ۷ صفت شمارشی و ۳۱ صفت ریخت‌سنگی در $^{+0}$ تا $^{+3}$ و ۶۲ نمونه به ترتیب از نهرهای کبودوال، زرین‌گل و شیرآباد در تابستان ۱۳۸۷ بررسی شد. در مقایسه صفات ریخت‌سنگی بین ماهیان، تفاوت‌های معنی‌داری بین نمونه‌ها در سه نهر مشاهده شد ($P < 0.05$)، اما روش تجزیه به مؤلفه‌های اصلی (PCA)، نشان داد که صفات معدودی در جداسازی جمعیتی نقش دارند. تنها صفات عرض دهان، آرواره تحتانی و فوقانی دارای ضرایب عاملی بالاتر از $+0.75$ بودند. به نظر می‌رسد، نمونه‌های کبودوال و زرین‌گل همپوشانی بیشتری نسبت به نمونه‌های گاوماهیان شیرآباد داشته باشند که با فاصله جغرافیائی آنها نیز هم خوانی دارد.

واژه‌های کلیدی: خصوصیات ریخت‌سنگی، گاوماهی شنی، حوضه خزر جنوبی.

*مسئول مکاتبه: erfankarimian88@gmail.com

مقدمه

مطالعه بوم سازگان‌های آبی و بررسی ماهی‌های موجود در آن‌ها از لحاظ تکاملی، رفتارشناسی، حفاظت، مدیرت منابع آبی و بهره‌برداری ذخایر اهمیت بسیار دارد، به طوری‌که در مطالعه آب‌ها قبل از هر چیز باستی بررسی‌هایی روی ماهیان صورت گیرد (Bagenal, 1978). پنزاک و ژاکوبسکی (1990) معتقدند برای به دست آوردن تصویر دقیقی از ماهیان یک رودخانه افزون بر داشتن اطلاعات لازم در مورد روش‌های نمونه‌برداری، باید اطلاعاتی از وضعیت زیست‌شناسی گونه‌ها نیز داشت.

در دریای خزر حدود ۳۷ گونه و زیر گونه از این خانواده وجود دارد (Rahimov, 1986). اکثر گونه‌های گاوماهیان، دریایی بوده و در آب‌های لبشور و خلیی شور دیده می‌شوند؛ اما برخی از گونه‌های آن در آب‌های شیرین به صورت دائمی زندگی می‌کنند (Abdoli, 1999; Barimani, 1977; Berg, 1964). یکی از گونه‌های آب‌شیرین این خانواده، گاوماهی شنی (*Neogobius pallasi*) است که دارای پراکنش وسیعی در حوضه جنوبی خزر و رودخانه‌های منتهی به آن است (Naderi and Abdoli, 2004).

گونه (*N. pallasi*) (Berg, 1916) بومی دریای خزر بوده (Kiabi et al., 1999)، اما به عنوان یک گونه مهاجم اروپایی گزارش شده است (Biro, 1971; Skora and Stolarski, 1991). تصور می‌شود که منطقه پونتوی خزری (خزر، سیاه و آзов) یکی از عمدترین مناطقی است که بیشترین گونه‌های آبزی غیربومی از آنجا به اروپای مرکزی وارد شده است (Bij de Vaate et al., 2002).


مطالعه ریخت‌شناسی گونه‌ها در سطح جمعیت و تنوع پذیری آن‌ها، امکان درک بهتر از وضعیت جمعیت‌ها یا به نوعی ذخائر جمعیتی در شرایط کنونی اکوسیستم‌های آبی و همچنین ارتباط متقابل بین گونه‌ها و اکوسیستم را فراهم می‌کند. تنوع ریخت‌شناسی، ممکن است نتیجه انعطاف پذیری فنوتیپی، سازگاری‌های منطقه‌ای، تغییرات خصوصیات اکولوژیکی و یا رابطه متقابل هریک از این فرآیندها باشد (Annoni et al., 1997). از این رو، این پژوهش تلاش می‌کند با بررسی پارامترهای ریخت‌سنجدی گاوماهی شنی در چند گروه سنی و مناطق جغرافیایی مختلف، محاسبه شاخص تنوع بین نمونه‌ای و تعیین صفات مناسب برای جداسازی جمعیت‌های احتمالی گاوماهی در نهرهای مختلف، تصویر دقیق‌تری از وضعیت جمعیت گاوماهی شنی ساکن آب شیرین نهرهای کبودوال، زرین‌گل و شیرآباد به دست آورد.

مواد و روش‌ها

نمونه‌های مورد بررسی در این مطالعه از نهرهای کبودوال (طول جغرافیایی $54^{\circ}54'$ و عرض جغرافیایی $36^{\circ}53'$)، زرین‌گل (طول جغرافیایی $54^{\circ}59'$ و عرض جغرافیایی $36^{\circ}55'$) و شیرآباد (طول جغرافیایی $37^{\circ}57'$ و عرض جغرافیایی $36^{\circ}52'$) واقع در استان گلستان به دست آمد (Afshin, 1994; Vezarat- Niro, 2003). پس از شناسایی مسیر نهر، ایستگاه‌ها براساس عواملی از قبیل موانع موجود و امکان

مقایسه برخی خصوصیات ریخت‌سنگی و پویایی جمعیت‌های گاوماهی شنی...

دسترسی به نهر و جنس بستر تعیین شد. با توجه به طول کم نهرهای کبودوال و شیرآباد به ترتیب از ۵ و ۳ ایستگاه و در نهر زرین‌گل از ۱۴ ایستگاه در تابستان ۱۳۸۷ نمونه‌برداری شد که در نهر اخیر فقط در ۱ ایستگاه آن (سرشاخه فرعی نهر) گاوماهی شنی مشاهده گردید (شکل ۱). در این پژوهش، نمونه‌برداری از ماهیان فقط یکبار در تابستان (به دلیل دبی کمتر و شفافیت بیشتر جریان آب) در هر یک از نهرهای کبودوال، زرین‌گل و شیرآباد صورت گرفت.



شکل ۱- موقعیت منطقه مورد مطالعه در نهرهای کبودوال، زرین‌گل و شیرآباد- استان گلستان

با توجه به بستر سنگلاخی نهرهای کبودوال، زرین‌گل و شیرآباد، نمونه‌های ماهی به وسیله دستگاه الکتروشوکر با قدرت ۱/۷ کیلووات و جریان مستقیم و ولتاژ ۱۰۰-۲۰۰ ولت صید شد (Bagenal and Tesch, 1978., Copp *et al.*, 2005). بعد از تشییت ماهیان در فرمالین ۱۰ درصد، آنها را به آزمایشگاه منتقل کرده، وزن بدن با استفاده از ترازوی دیجیتالی با دقت ۰/۱ گرم توزین و طول کل بدن با استفاده از کولیس با دقت ۰/۰۱ میلی‌متر اندازه‌گیری شد. سن ماهیان از روی اتوپلیت بعد از سائیدن روی سنباده نرم و دیدن حلقه‌ها با بزرگنمایی ۱۵ برابر تعیین شد.

در مطالعه ریخت‌شناسی ماهی ۳۸ متغیر (۳۱ متغیر ریخت‌سنگی و ۷ متغیر شمارشی) توصیف شده به‌وسیله (Berg, 1949) اندازه‌گیری یا شمارش شدنده که فهرست آنها در جداول ۲ و ۳ آمده است. برای کاهش تغییرات حاصل از رشد آلومتریک (Karakousis *et al.*, 1993)، داده‌های ریخت‌سنگی قبل از تجزیه و تحلیل با فرمول بی‌چام (Beacham, 1985) تبدیل شدند. برای کاهش دامنه تغییرات صفات ریخت‌سنگی، نمونه‌ها در مقطع زمانی یکسان (شهریورماه ۱۳۸۷) صید شدند تا اثر تفاوت‌های ریخت‌شناسی وابسته به رشد گنادها و پر و خالی بودن دستگاه گوارش (شدت تغذیه) روی نتایج بهدست آمده کاهش یابد (Mamuris *et al.*, 1998). جهت تبدیل نمودن داده‌های مورفومتریک از رابطه $M_t = M_0 \left(\frac{L}{L_0} \right)^b$ مقادیر تبدیل شده صفات، L_0 : طول صفات مشاهده شده، L : میانگین طول استاندارد برای کل نمونه و همه نقاط، b : ضریب رگرسیونی بین $\log M_0$ و $\log L_0$ برای هر منطقه استفاده شد.

شاخص تنوع بین نمونه‌ای به‌وسیله معادله زئوتوفویسکی (Zheotovskii, 1981)

$$\mu = (\sqrt{p_1} + \sqrt{p_2} + \dots + \sqrt{p_m}) / m$$

تعداد متغیرهای صفتی) به‌دست آمد و اختلاف بین سنین بوسیله آزمون $U = \frac{|\mu_1 - \mu_2|}{\sqrt{S\mu_1^2 + S\mu_2^2}}$ برآورد شد (Mironovskii and Ustarbekov, 1997).

برای شناسایی از کتاب ماهیان آب‌های داخلی ایران (Abdoli, 1999) و (Coad, 2012) استفاده شد.

صفت ریخت‌سنگی و شمارشی با استفاده از آزمون واریانس یک‌طرفه (دانکن) در سطح معنی‌داری ۰/۰۵ مقایسه شد. برای تجزیه و تحلیل چند متغیره پراکندگی جمعیت گاوماهی و تعیین صفات مناسب برای جداسازی جمعیتی، از روش تجزیه به مؤلفه‌های اصلی PCA در نرم‌افزار SPSS استفاده شد (Kuliev, 1988). در این روش، صفاتی که دارای ضریب عاملی بزرگ‌تر از ۰/۷۵ باشند از صفات جداکننده جمعیت‌ها به شمار می‌روند.

نتایج

لازم به ذکر است که پس از بررسی‌های لازم، نام علمی گونه مورد بررسی از *Neogobius fluviatilis* تغییر یافت (Coad, 2012) به *Neogobius pallasi* (Berg, 1916) (Pallasi, 1814) (شکل ۲).

مقایسه برخی خصوصیات ریخت‌سنگی و پویایی جمعیت‌های گاوماهی شنی...

شکل ۲- گاوماهی شنی (*Neogobius pallasii*) (عکس از نگارنده)

نمونه‌های مورد مطالعه هر سه نهر، شامل پنج گروه سنی 0^+ تا 4^+ بودند و بزرگ‌ترین نمونه با طول کل $137/97$ در نهر شیرآباد دیده شد. در مقایسه میانگین طول کل گاوماهی شنی با استفاده از آزمون واریانس یک‌طرفه بین سه نهر نشان داده شد که بین آن‌ها اختلاف معنی‌داری وجود دارد؛ به صورتی که میانگین طول کل در سن 1^+ نهرهای کبودوال و زرین‌گل کمتر از نهر شیرآباد بود. بعد از آن، میانگین طول کل در سن‌های 2^+ تا 4^+ نهرهای کبودوال و شیرآباد از نهر زرین‌گل در حد معنی‌دار بیشتر بود. همچنین آزمون واریانس یک‌طرفه جهت مقایسه میانگین وزن گاوماهی شنی بین سه نهر همانند مقایسه میانگین طول کل نشان داد که بین آن‌ها اختلاف معنی‌داری وجود دارد، به صورتی که میانگین وزن در سن 1^+ نهرهای کبودوال و زرین‌گل کمتر از نهر شیرآباد بود. بعد از آن میانگین وزن در سن‌های 2^+ تا 4^+ نهرهای کبودوال و شیرآباد از نهر زرین‌گل در حد معنی‌دار بیشتر بود (جدول ۱).

جدول ۱- میانگین طول و وزن کل گاوماهی شنی (*N. pallasii*) نمونه‌برداری شده نهر کبودوال، زرین‌گل و شیرآباد در سنین مختلف

سن	طول کل (میلی‌متر)	وزن (گرم)	طول کل (میلی‌متر)	وزن (گرم)	طول کل (میلی‌متر)	وزن (گرم)	طول کل (میلی‌متر)	وزن (گرم)
1^+	۵۹/۲۵ \pm ۹/۳۶ ^b		۲/۵۶ \pm ۱/۶۸ ^b		۱۰/۳۲ \pm ۴/۸۶ ^a		۱۲/۷۹ \pm ۳/۲۹ ^a	
		۵۴/۱ \pm ۹/۲۷ ^b	۱/۹۹ \pm ۱/۱۷ ^b				۱۰/۳۷ \pm ۱۱/۹ ^a	
2^+					۸/۲۷ \pm ۲/۹۶ ^b		۱۰/۳۹ \pm ۳/۲۹ ^a	
							۱۰/۴۳ \pm ۳/۷۳ ^b	
3^+					۱۵/۴۱ \pm ۲/۲۳ ^b		۲۶/۹۳ \pm ۲/۹۷ ^a	
							۱۳/۴۸۶ \pm ۲/۹۳ ^a	
4^+					۱۱۱/۳ \pm ۳/۹۵ ^b		۳۱/۱۶ \pm ۰/۱۲ ^a	
							۱۸/۱۴ \pm ۱/۰۶ ^b	

تذکر: حروف غیر مشابه در هر ستون نشان‌دهنده تفاوت معنی‌دار در سطح ۵ درصد می‌باشد.

در مقایسه صفات ریختسنگی بین ماهیان سه نهر، مشاهده شد که ماهیان یکساله شیرآباد در تمامی صفات بهطور معنی‌دار دارای مقادیر بیشتری نسبت به ماهیان یکساله زرین‌گل بودند. ماهیان یکساله کبودوال فقط در طول قاعده باله پشتی و ارتفاع اولین شعاع باله مخرجی نسبت به ماهیان یکساله زرین‌گل متفاوت بودند؛ اما ماهیان یکساله کبودوال به جز در ارتفاع اولین شعاع باله مخرجی که با ماهیان یکساله شیرآباد اختلاف معنی‌داری نداشتند، در بقیه صفات بهطور معنی‌دار دارای مقادیر کمتری بودند. اختلافات در بین ماهیان دو، سه و چهارساله هر سه نهر به شکل دیگری بود. بهطوری که مقادیر تمامی صفات ماهیان دو، سه و چهارساله نهرهای کبودوال و شیرآباد، نسبت به ماهیان زرین‌گل بیشتر بود که این تفاوت فقط در صفات ارتفاع باله شکمی ماهیان دو ساله، فاصله دو چشم، ارتفاع اولین شعاع باله مخرجی، ارتفاع دهان ماهیان سه ساله، و قطر چشم ماهیان سه ساله شیرآباد و در عرض سر، فاصله دو چشم، قطر چشم، ارتفاع اولین شعاع باله مخرجی، طول قاعده باله شکمی، ارتفاع باله سینه‌ای، فاصله باله سینه‌ای تا باله شکمی، فاصله دو سوراخ بینی و آرواره فوکانی ماهیان چهار ساله معنی‌دار نبود (جدول ۲).

جدول ۲- مقایسه صفات ریختسنگی گاو ماهی شنی (*N. pallasi*) در نهرهای کبودوال، زرین‌گل و شیرآباد در سنین مختلف

صفات	نهر	سن	نهر	سن	نهر	سن	نهر	سن
طول کل	کبودوال	۵۹/۲۵ ± ۹/۳۶ ^b	زرین‌گل	۵۴/۱ ± ۹/۲۷ ^b	Shirin-Gol	۵۴/۱ ± ۹/۲۷ ^b	کبودوال	۱۰۳/۸۷ ± ۱۱/۹ ^a
	کبودوال	۱۲۷/۳۹ ± ۳/۲۹ ^a	کبودوال	۸۵/۶۴ ± ۱۳/۳۹ ^b	کبودوال	۸۵/۶۴ ± ۱۳/۳۹ ^b	زرین‌گل	۱۰۴/۳۹ ± ۳/۲۷ ^b
	کبودوال	۱۲۷/۱ ± ۲/۲۷ ^a	کبودوال	۱۰۳/۲۹ ± ۱۱/۳ ^a	کبودوال	۱۰۳/۲۹ ± ۱۱/۳ ^a	Shirin-Gol	۱۳۴/۶۴ ± ۲/۰۵ ^a
طول استاندارد	کبودوال	۴۷/۴۸ ± ۷/۶۷ ^b	کبودوال	۶۸/۳۶ ± ۱۰/۶۷ ^b	کبودوال	۶۸/۳۶ ± ۱۰/۶۷ ^b	زرین‌گل	۱۰۴/۱۷ ± ۲/۳۷ ^a
	کبودوال	۸۴/۱۴ ± ۹/۹۲ ^a	کبودوال	۴۳/۰۹ ± ۷/۴۴ ^b	کبودوال	۴۳/۰۹ ± ۷/۴۴ ^b	Shirin-Gol	۸۴/۳۳ ± ۲/۲۵ ^b
	کبودوال	۸۳/۶۵ ± ۹/۳۷ ^a	کبودوال	۵۸/۳۲ ± ۵/۱ ^a	کبودوال	۵۸/۳۲ ± ۵/۱ ^a	Shirin-Gol	۱۰۳/۸۵ ± ۲/۷۲ ^a
ارتفاع بدن	کبودوال	۹/۸۴ ± ۱/۷ ^b	کبودوال	۱۸/۶۶ ± ۲/۲۹ ^a	کبودوال	۱۸/۶۶ ± ۲/۲۹ ^a	زرین‌گل	۲۲/۸۷ ± ۱/۲۲ ^a
	کبودوال	۹/۴۴ ± ۱/۴ ^b	کبودوال	۱۵/۶ ± ۲/۴۷ ^b	کبودوال	۱۵/۶ ± ۲/۴۷ ^b	Shirin-Gol	۱۹/۸۲ ± ۱/۵۶ ^b
	کبودوال	۱۲/۰۹ ± ۱/۲۱ ^a	کبودوال	۱۲/۰۹ ± ۱/۲۱ ^a	کبودوال	۱۲/۰۹ ± ۱/۲۱ ^a	Shirin-Gol	۲۲/۸۹ ± ۱/۷۶ ^a
عرض بدن	کبودوال	۶/۵۸ ± ۱/۶ ^b	کبودوال	۱۳/۴۷ ± ۲/۱۵ ^a	کبودوال	۱۳/۴۷ ± ۲/۱۵ ^a	زرین‌گل	۱۷/۵ ± ۰/۸۱ ^a
	کبودوال	۶/۷۲ ± ۱/۱۶ ^b	کبودوال	۱۰/۹۵ ± ۱/۷۱ ^b	کبودوال	۱۰/۹۵ ± ۱/۷۱ ^b	Shirin-Gol	۱۴/۳ ± ۰/۱۴ ^b
	کبودوال	۸/۵۲ ± ۰/۷۶ ^a	کبودوال	۱۲/۷۹ ± ۱/۶ ^a	کبودوال	۱۲/۷۹ ± ۱/۶ ^a	Shirin-Gol	۱۶/۸۵ ± ۱/۲۷ ^a
طول ساقه دمی	کبودوال	۱۰/۲۲ ± ۱/۷ ^b	کبودوال	۱۷/۱۶ ± ۱/۹۳ ^a	کبودوال	۱۷/۱۶ ± ۱/۹۳ ^a	زرین‌گل	۲۰/۶۳ ± ۱/۳۶ ^a
	کبودوال	۹/۲۵ ± ۱/۶ ^b	کبودوال	۱۴/۱۹ ± ۲/۰۳ ^b	کبودوال	۱۴/۱۹ ± ۲/۰۳ ^b	Shirin-Gol	۱۶/۹۶ ± ۰/۹ ^b
	کبودوال	۱۱/۸۱ ± ۰/۱۸ ^a	کبودوال	۱۶/۰۶ ± ۱/۸۶ ^a	کبودوال	۱۶/۰۶ ± ۱/۸۶ ^a	Shirin-Gol	۱۹/۷۳ ± ۱/۷۳ ^a
ارتفاع ساقه دمی	کبودوال	۵/۰۸ ± ۰/۹۷ ^b	کبودوال	۹/۶۹ ± ۱/۳۷ ^a	کبودوال	۹/۶۹ ± ۱/۳۷ ^a	زرین‌گل	۱۲/۱۱ ± ۰/۷۷ ^a
	کبودوال	۴/۹۲ ± ۰/۹۱ ^b	کبودوال	۸/۰۳ ± ۱/۲۵ ^b	کبودوال	۸/۰۳ ± ۱/۲۵ ^b	Shirin-Gol	۹/۹ ± ۰/۴۲ ^b
	کبودوال	۶/۳۱ ± ۰/۵۷ ^a	کبودوال	۹/۲۱ ± ۱/۰۶ ^a	کبودوال	۹/۲۱ ± ۱/۰۶ ^a	Shirin-Gol	۱۱/۴۸ ± ۰/۳۸ ^a
طول سر	کبودوال	۱۲/۸۹ ± ۲/۱ ^b	کبودوال	۲۳/۴۴ ± ۳/۰ ^a	کبودوال	۲۳/۴۴ ± ۳/۰ ^a	زرین‌گل	۲۸/۵ ± ۰/۷۸ ^a
	کبودوال	۱۲/۲۷ ± ۱/۴۳ ^b	کبودوال	۱۹/۲۶ ± ۳/۱ ^b	کبودوال	۱۹/۲۶ ± ۳/۱ ^b	Shirin-Gol	۲۲/۵۴ ± ۱/۴۳ ^b
	کبودوال	۱۵/۸۹ ± ۱/۷۲ ^a	کبودوال	۲۳/۴۱ ± ۲/۸۵ ^a	کبودوال	۲۳/۴۱ ± ۲/۸۵ ^a	Shirin-Gol	۲۸/۸۸ ± ۱/۷۲ ^a

مقایسه برخی خصوصیات ریخت‌سنگی و پویایی جمعیت‌های گاوماهی شنی...

دادمه جدول ۲

صفات	نهر	سن	۱ ⁺	۲ ⁺	۳ ⁺	۴ ⁺
ارتفاع سر	کبودوال	۹/۷۲ ± ۱/۸۱ ^b	۱۸/۶۹ ± ۲/۲۴ ^a	۲۲/۸۳ ± ۱/۲۵ ^a	۲۳/۹۳ ± ۰/۱۶ ^a	۲۰/۹۸ ± ۰/۷۲ ^b
	زرین گل	۹/۳۹ ± ۱/۴۳ ^b	۱۵/۴۹ ± ۲/۲ ^b	۱۹/۷ ± ۱/۱ ^b	۲۴/۹۴ ± ۱/۶۶ ^a	۲۴/۹۴ ± ۱/۶۶ ^a
	شیرآباد	۱۱/۷ ± ۱/۱۸ ^a	۱۸/۵۲ ± ۲/۵۶ ^a	۲۳/۰۷ ± ۱/۲۲ ^a	۲۳/۰۷ ± ۱/۲۲ ^a	۲۰/۹۸ ± ۰/۷۲ ^b
عرض سر	کبودوال	۹/۷۹ ± ۱/۹۳ ^b	۱۹/۶۴ ± ۲/۴۱ ^a	۲۴/۵۶ ± ۰/۷۵ ^a	۲۵/۵۱ ± ۱/۱۲ ^a	۲۲/۹۱ ± ۲/۱۳ ^a
	زرین گل	۹/۸۵ ± ۱/۶۸ ^b	۱۶/۶۱ ± ۲/۰۲ ^b	۲۱/۱۸ ± ۰/۵۶ ^b	۲۴/۹۱ ± ۱/۶۶ ^a	۲۵/۰۴ ± ۲/۹۹ ^a
	شیرآباد	۱۲/۱۵ ± ۱/۴۱ ^a	۱۹/۲۸ ± ۲/۵۴ ^a	۲۴/۹۱ ± ۱/۶۶ ^a	۲۳/۰۷ ± ۱/۲۲ ^a	۹/۸۳ ± ۰/۴۷ ^a
طول بوزه	کبودوال	۳/۸۲ ± ۰/۸۴ ^b	۷/۴۵ ± ۱/۰۳ ^a	۹/۶۹ ± ۰/۸۲ ^a	۸/۲۷ ± ۰/۶۹ ^b	۱۰/۹۲ ± ۰/۶۱ ^a
	زرین گل	۳/۷۵ ± ۰/۶۱ ^b	۶/۱۸ ± ۱/۰۷ ^b	۷/۵۸ ± ۰/۳۹ ^b	۴/۵۸ ± ۰/۳۹ ^a	۴/۵ ± ۰/۰۹ ^a
	شیرآباد	۵/۱۷ ± ۰/۵۹ ^a	۷/۶ ± ۱/۰۷ ^a	۹/۴۶ ± ۰/۴۶ ^a	۴/۶۷ ± ۰/۴۷ ^a	۴/۳ ± ۰/۳۹ ^a
فاصله دو چشم	کبودوال	۱/۱۲ ± ۰/۴۴ ^b	۳/۰۶ ± ۰/۶۸ ^a	۴/۱۶ ± ۰/۴ ^a	۴/۵ ± ۰/۰۹ ^a	۴/۵۸ ± ۰/۰۹ ^a
	زرین گل	۱/۰۹ ± ۰/۵۲ ^b	۲/۱۸ ± ۰/۷۱ ^b	۳/۸۶ ± ۰/۷۹ ^a	۴/۶۷ ± ۰/۴۷ ^a	۴/۶۷ ± ۰/۴۷ ^a
	شیرآباد	۱/۵ ± ۰/۳۶ ^a	۳/۰۳ ± ۰/۷۳ ^a	۴/۳۱ ± ۰/۴۴ ^a	۶/۳ ± ۰/۲ ^a	۶/۳ ± ۰/۲ ^a
قطر چشم	کبودوال	۳/۲۹ ± ۰/۴۱ ^b	۵/۰۱ ± ۰/۴۶ ^a	۶/۱۵ ± ۰/۲۵ ^a	۵/۱۸ ± ۰/۴ ^a	۵/۱۸ ± ۰/۴ ^a
	زرین گل	۳/۱۹ ± ۰/۴۵ ^b	۴/۵۵ ± ۰/۵۲ ^b	۵/۲۷ ± ۰/۵۷ ^b	۶/۰۱ ± ۰/۴۲ ^a	۶/۰۱ ± ۰/۴۲ ^a
	شیرآباد	۳/۶۸ ± ۰/۵۳ ^a	۴/۹۵ ± ۰/۴۹ ^a	۵/۶۵ ± ۰/۲۷ ^b	۱۶/۳ ± ۰/۹۷ ^a	۱۶/۳ ± ۰/۹۷ ^a
طول قاعده باله پشتی	کبودوال	۷/۳۴ ± ۱/۳۴ ^b	۱۳/۰۳ ± ۱/۹۵ ^a	۱۶/۱۷ ± ۰/۴۵ ^a	۱۴ ± ۰/۴۳ ^b	۱۴ ± ۰/۴۳ ^b
	زرین گل	۶/۴۸ ± ۱/۳۲ ^c	۱۰/۹۶ ± ۱/۸ ^b	۱۳/۱۵ ± ۰/۴۷ ^b	۱۲/۰۶ ± ۰/۵۷ ^a	۱۷/۰۶ ± ۰/۵۷ ^a
	شیرآباد	۸/۴۵ ± ۰/۹۳ ^a	۱۲/۰۳ ± ۱/۴۳ ^a	۱۶/۱۷ ± ۰/۴۵ ^a	۱۲/۴۶ ± ۱/۹۸ ^a	۱۸/۴۱ ± ۰/۱۱ ^b
ارتفاع باله پشتی	کبودوال	۸/۳۱ ± ۱/۵ ^b	۱۵/۷۳ ± ۲/۳۹ ^a	۲۰/۵۳ ± ۱/۰۹ ^a	۲۲/۴۶ ± ۱/۹۸ ^a	۲۴/۶۶ ± ۰/۱۰ ^a
	زرین گل	۸ ± ۱/۲۹ ^b	۱۲/۴۳ ± ۲/۰۴ ^b	۱۶/۴ ± ۱/۶۶ ^b	۱۸/۴۱ ± ۰/۱۱ ^b	۱۸/۴۱ ± ۰/۱۱ ^b
	شیرآباد	۱۰/۰ ± ۱/۲۱ ^a	۱۶/۲۲ ± ۲/۱۹ ^a	۱۶/۲۷ ± ۱/۸۶ ^a	۱۶/۱۵ ± ۰/۴۷ ^a	۱۶/۱۵ ± ۰/۴۷ ^a
طول قاعده باله سینه‌ای	کبودوال	۵/۱۶ ± ۰/۹۸ ^b	۹/۸۹ ± ۱/۳۲ ^a	۱۲/۲۷ ± ۰/۴۸ ^a	۱۳/۵۴ ± ۰/۸۸ ^a	۱۰/۰۲ ± ۰/۰۶ ^b
	زرین گل	۴/۹۴ ± ۰/۹۳ ^b	۷/۷۱ ± ۱/۲۵ ^b	۹/۹۳ ± ۱/۱۰ ^b	۹/۹۳ ± ۱/۱۰ ^b	۱۳/۳۷ ± ۰/۰۲ ^a
	شیرآباد	۶/۴۳ ± ۱/۱۲۱ ^a	۹/۷۴ ± ۱/۱۷ ^a	۱۲/۰۴ ± ۰/۷۷ ^a	۲۵/۹۲ ± ۱/۲۵ ^a	۲۵/۹۲ ± ۱/۲۵ ^a
طول قاعده باله مخرجی	کبودوال	۱۰/۰ ± ۱/۱۸ ^b	۱۶/۲۵ ± ۲/۸۲ ^a	۲۴/۳۹ ± ۰/۷۸ ^a	۲۰/۴۶ ± ۱/۷۸ ^b	۲۰/۴۶ ± ۱/۷۸ ^b
	زرین گل	۹/۳۳ ± ۱/۳۹ ^b	۱۵/۴۵ ± ۲/۵ ^b	۱۹/۴۲ ± ۱/۲ ^b	۲۶/۱۸ ± ۱/۱۲ ^a	۲۶/۱۸ ± ۱/۱۲ ^a
	شیرآباد	۱۲/۷۱ ± ۱/۶۴ ^a	۲/۲ ± ۲/۶۷ ^a	۲۵/۸ ± ۱/۶۶ ^a	۸/۳۴ ± ۲/۵۱ ^a	۸/۳۴ ± ۲/۵۱ ^a
ارتفاع اولین شاعر باله مخرجی	کبودوال	۴/۲۷ ± ۰/۹۴ ^a	۷/۰۴ ± ۱/۴۲ ^a	۷/۴۶ ± ۱/۶۷ ^a	۷/۸۱ ± ۰/۰۵ ^a	۸/۶۸ ± ۰/۱۰ ^a
	زرین گل	۳/۴۴ ± ۰/۸۴ ^b	۵/۵۵ ± ۰/۹۷ ^b	۶/۹۲ ± ۰/۴۶ ^a	۶/۹۲ ± ۰/۴۶ ^a	۶/۹۲ ± ۰/۱۰ ^a
	شیرآباد	۴/۲۲ ± ۰/۸۱ ^a	۶/۴۹ ± ۰/۸۴ ^a	۷/۷۶ ± ۰/۳۶ ^a	۶/۴۲ ± ۰/۱۳ ^a	۶/۴۲ ± ۰/۱۳ ^a
طول قاعده باله شکمی	کبودوال	۲/۸۶ ± ۰/۵۶ ^b	۴/۹۲ ± ۰/۶۵ ^a	۵/۷۹ ± ۰/۵۲ ^{ab}	۶/۰۴ ± ۰/۹۶ ^a	۶/۰۴ ± ۰/۹۶ ^a
	زرین گل	۲/۵۳ ± ۰/۵۹ ^b	۴/۱۷ ± ۰/۶۵ ^b	۵/۳۷ ± ۰/۰۲ ^b	۶/۸۴ ± ۰/۰۵ ^a	۶/۸۴ ± ۰/۰۵ ^a
	شیرآباد	۳/۴۵ ± ۰/۴۱ ^a	۴/۷۶ ± ۰/۵۷ ^a	۵/۹۶ ± ۰/۲۳ ^a	۵/۹۶ ± ۰/۲۳ ^a	۵/۹۶ ± ۰/۰۵ ^a

نشریه پژوهش‌های ماهی‌شناسی کاربردی / دوره اول، شماره دوم، تابستان ۹۲

دادمه جدول ۲

صفات	سن	نهر	۱ ⁺	۲ ⁺	۳ ⁺	۴ ⁺
ارتفاع باله شکمی	کبودوال	کبودوال	۸/۷۵ ± ۱/۳۹ ^b	۱۵/۳۵ ± ۱/۷۸ ^a	۱۸/۲۵ ± ۰/۹۹ ^a	۱۹/۳ ± ۰/۲۳ ^a
ارتفاع باله سینه‌ای	زرین گل	زرین گل	۹/۹۱ ± ۱/۶۹ ^b	۱۴/۲۸ ± ۲/۱۴ ^a	۱۷/۰۲ ± ۰/۶۱ ^b	۱۷/۸۶ ± ۰/۴۹ ^b
ارتفاع باله پشتی تا	شیرآباد	شیرآباد	۱۰/۹ ± ۱/۴۴ ^a	۱۵/۴۳ ± ۱/۹ ^a	۱۸/۶۲ ± ۰/۵۹ ^a	۱۹/۴ ± ۰/۴۶ ^a
نوك پوزه	کبودوال	کبودوال	۴/۲۷ ± ۰/۹۴ ^a	۷/۰۴ ± ۱/۴۲ ^a	۷/۴۶ ± ۱/۶۷ ^a	۸/۳۴ ± ۲/۵۱ ^a
ارتفاع اولین شاع باله مخرجی	زرین گل	زرین گل	۳/۴۴ ± ۰/۸۴ ^b	۵/۰۵ ± ۰/۹۷ ^b	۶/۹۲ ± ۰/۴۶ ^a	۷/۸۱ ± ۰/۰۸ ^a
ارتفاع باله سینه‌ای	شیرآباد	شیرآباد	۴/۲۲ ± ۰/۸۱ ^a	۶/۴۹ ± ۰/۸۴ ^a	۷/۷۶ ± ۰/۳۶ ^a	۸/۶۸ ± ۰/۱۵ ^a
ارتفاع باله سینه‌ای	کبودوال	کبودوال	۱۱/۵۹ ± ۲/۵ ^b	۲۰/۰۹ ± ۲/۴۹ ^a	۲۵/۷ ± ۱/۲۵ ^a	۲۶/۱۹ ± ۰/۷۵ ^a
ارتفاع باله پشتی تا	زرین گل	زرین گل	۱۱/۶۳ ± ۲/۰۲ ^b	۱۷/۸۳ ± ۲/۶۶ ^b	۲۱ ± ۱/۴۲ ^b	۲۳/۰۵ ± ۱/۲۲ ^a
نوك پوزه	شیرآباد	شیرآباد	۱۴/۴۹ ± ۱/۵۴ ^a	۲۰/۹۸ ± ۲/۲۸ ^a	۲۵/۱۵ ± ۱/۳۶ ^a	۲۳/۸۴ ± ۶/۱۰ ^a
ارتفاع باله سینه‌ای	کبودوال	کبودوال	۱۶/۴۳ ± ۲/۷ ^b	۲۸/۸۱ ± ۳/۴۸ ^a	۳۵/۲۷ ± ۰/۶۲ ^a	۳۶/۸۵ ± ۱/۱۲ ^a
ارتفاع باله پشتی تا	زرین گل	زرین گل	۱۵/۱۴ ± ۲/۵۹ ^b	۲۴/۱۷ ± ۲/۷۲ ^b	۲۸/۶۶ ± ۱/۰۱ ^b	۳۱/۱۶ ± ۲/۵۹ ^b
ارتفاع باله سینه‌ای	شیرآباد	شیرآباد	۲۰/۲۲ ± ۱/۸۹ ^a	۲۸/۷۱ ± ۲/۳۹ ^a	۳۵/۵۸ ± ۱/۲۵ ^a	۳۸/۴۷ ± ۲/۰۳ ^a
ارتفاع باله سینه‌ای	کبودوال	کبودوال	۳۵/۱۸ ± ۵/۷۳ ^b	۶۲/۱ ± ۷/۲۹ ^a	۷۵/۵ ± ۲/۲۹ ^a	۸۰/۲ ± ۱/۱۷ ^a
ارتفاع باله سینه‌ای	زرین گل	زرین گل	۳۲/۸۳ ± ۵/۷۵ ^b	۵۱/۱۱ ± ۷/۷۲ ^b	۶۲/۰۷ ± ۲/۵۳ ^b	۶۶/۹۴ ± ۲/۷۴ ^b
ارتفاع باله سینه‌ای	شیرآباد	شیرآباد	۴۳/۰۱ ± ۲/۸۲ ^a	۶۱/۴۳ ± ۶/۹۹ ^a	۷۵/۳۶ ± ۲/۲۸ ^a	۷۸/۹۶ ± ۱/۸۴ ^a
ارتفاع باله سینه‌ای	کبودوال	کبودوال	۲۵/۱۲ ± ۴/۶۷ ^b	۴۴/۹۵ ± ۵/۵۷ ^a	۵۶/۶۶ ± ۱/۶۴ ^a	۶۰/۰۱ ± ۱/۷۲ ^a
ارتفاع باله سینه‌ای	زرین گل	زرین گل	۲۲/۷۹ ± ۴/۱۱ ^b	۳۷/۰۲ ± ۶/۱۲ ^b	۴۶/۴۴ ± ۱/۸۵ ^b	۴۹/۴۲ ± ۱/۱۰ ^b
ارتفاع باله سینه‌ای	شیرآباد	شیرآباد	۳۳/۹۸ ± ۲/۹۵ ^a	۴۵/۱۳ ± ۴/۹۵ ^a	۵۵/۷۴ ± ۲/۸۶ ^a	۵۸/۶۱ ± ۴/۲۴ ^a
ارتفاع باله سینه‌ای	کبودوال	کبودوال	۲/۲ ± ۰/۵۹ ^b	۴/۹۵ ± ۰/۹۷ ^a	۶/۱۹ ± ۰/۸۴ ^{ab}	۶/۳۷ ± ۰/۱۸ ^a
ارتفاع باله سینه‌ای	زرین گل	زرین گل	۲/۳۷ ± ۰/۴۳ ^b	۴/۱۴ ± ۰/۸۵ ^b	۵/۱۷ ± ۰/۴۳ ^a	۵/۸۹ ± ۰/۰۵ ^a
ارتفاع باله سینه‌ای	شیرآباد	شیرآباد	۲/۷۵ ± ۰/۵۲ ^a	۴/۶۳ ± ۰/۷۷ ^{ab}	۶/۳۸ ± ۰/۶۹ ^a	۶/۵۴ ± ۰/۰۵ ^a
ارتفاع باله سینه‌ای	کبودوال	کبودوال	۳/۳۹ ± ۰/۰۵ ^b	۵/۹۲ ± ۰/۸۵ ^a	۷/۳۷ ± ۰/۶۳ ^a	۸/۱۲ ± ۰/۴۹ ^a
ارتفاع باله سینه‌ای	زرین گل	زرین گل	۳/۲۹ ± ۰/۰۵ ^b	۴/۹۴ ± ۰/۸۳ ^b	۶/۱۶ ± ۰/۴۳ ^b	۶/۹۳ ± ۰/۰۴ ^a
ارتفاع باله سینه‌ای	شیرآباد	شیرآباد	۳/۹۲ ± ۰/۰۳ ^a	۵/۸۴ ± ۰/۸۲ ^a	۷/۳۳ ± ۰/۴۶ ^a	۸/۰۷ ± ۰/۰۹ ^a
ارتفاع باله سینه‌ای	کبودوال	کبودوال	۷/۱۳ ± ۱/۳ ^b	۱۳/۲۲ ± ۱/۸۲ ^a	۱۶/۲۵ ± ۰/۶۵ ^a	۱۷/۴۸ ± ۱/۹۷ ^a
ارتفاع باله سینه‌ای	زرین گل	زرین گل	۶/۶۹ ± ۱ ^b	۱۰/۱۹ ± ۱/۴۷ ^b	۱۱/۰۵ ± ۰/۰۵ ^b	۱۲/۹۱ ± ۰/۰۵ ^b
ارتفاع باله سینه‌ای	شیرآباد	شیرآباد	۹/۱ ± ۱/۰۱ ^a	۱۲/۷۵ ± ۰/۸۱ ^a	۱۶/۷۵ ± ۰/۸۱ ^a	۱۸/۳ ± ۱/۱۷ ^a
ارتفاع باله سینه‌ای	کبودوال	کبودوال	۴/۶۳ ± ۱ ^b	۹/۸۲ ± ۱/۵۳ ^a	۱۲/۷۶ ± ۰/۶۵ ^b	۱۲/۷ ± ۱/۱۱ ^b
ارتفاع باله سینه‌ای	زرین گل	زرین گل	۴/۷۶ ± ۰/۹۱ ^b	۷/۸۸ ± ۱/۴۹ ^b	۱۰/۱۸ ± ۰/۸۴ ^c	۱۱/۷۴ ± ۰/۰۵ ^b
ارتفاع باله سینه‌ای	شیرآباد	شیرآباد	۶/۲۴ ± ۰/۸۵ ^a	۱۰/۳۹ ± ۱/۰۱ ^a	۱۳/۹۹ ± ۱/۰۱ ^a	۱۶/۲۷ ± ۱/۰۴ ^a
ارتفاع باله سینه‌ای	کبودوال	کبودوال	۵/۰۲ ± ۱ ^b	۱۱/۶۵ ± ۲/۰۲ ^a	۱۵/۳۷ ± ۰/۶۵ ^a	۱۶/۲۱ ± ۰/۰۵ ^a
ارتفاع باله سینه‌ای	زرین گل	زرین گل	۵ ± ۱/۰۹ ^b	۹/۳ ± ۱/۸۸ ^b	۱۲/۰۳ ± ۱/۴۱ ^b	۱۳/۸۶ ± ۰/۶۲ ^b
ارتفاع باله سینه‌ای	شیرآباد	شیرآباد	۵/۷۶ ± ۱/۰۹ ^a	۱۱/۳ ± ۲/۳۳ ^a	۱۵/۶۶ ± ۱/۲۳ ^a	۱۷/۷۶ ± ۱/۲۶ ^a
ارتفاع باله سینه‌ای	کبودوال	کبودوال	۱/۹ ± ۰/۳۷ ^b	۳/۷۴ ± ۰/۸۴ ^a	۴/۹۶ ± ۰/۶۷ ^a	۴/۷۴ ± ۰/۲۳ ^b
ارتفاع باله سینه‌ای	زرین گل	زرین گل	۱/۹۲ ± ۰/۳۲ ^b	۳/۱۴ ± ۰/۶۴ ^b	۴/۱۳ ± ۰/۳۳ ^a	۴/۴۸ ± ۰/۰۰۷ ^b
ارتفاع باله سینه‌ای	شیرآباد	شیرآباد	۲/۴۶ ± ۰/۳۳ ^a	۴/۸۴ ± ۰/۶۶ ^a	۴/۷۳ ± ۰/۴۱ ^a	۵/۶۵ ± ۰/۲۹ ^a

مقایسه برخی خصوصیات ریخت‌سنگی و پویایی جمعیت‌های گاوماهی شنی...

-۲ جدول ادامه

صفات	سن	نهر	کبودوال	زرین گل	شیرآباد	آرواره فوقانی
ارتفاع در ناحیه چشمی						
زرین گل	۶/۵۷ ± ۱/۱۵b	۱۱/۳۷ ± ۲/۴۲b	۱۱/۸۹ ± ۰/۸۷c	۸/۷۴ ± ۱/۱c	۱۰/۳۸ ± ۰/۵1a	۱۱/۲۶ ± ۱/۴۸a
شیرآباد	۶/۰۱ ± ۱/۳۹b	۱۲/۵۶ ± ۱/۶۵ab	۸/۵۱ ± ۱/۳۸a	۶/۳۹ ± ۱/۰۸b	۸/۷۴ ± ۱/۱c	۱۰/۳۸ ± ۰/۵1a
کبودوال	۶/۰۱ ± ۱/۳۹b	۱۲/۵۶ ± ۱/۶۵ab	۸/۵۱ ± ۱/۳۸a	۶/۳۹ ± ۱/۰۸b	۸/۷۴ ± ۱/۱c	۱۱/۲۶ ± ۱/۴۸a
زرین گل	۶/۹۸ ± ۱/۰۱a	۱۲/۵۳ ± ۲/۱۵a	۱۲/۵۳ ± ۲/۱۵a	۱۶/۶۳ ± ۰/۶۴a	۱۶/۲۹ ± ۰/۹1b	۱۳/۱۵ ± ۱/۲۲a
شیرآباد						

با توجه به جدول ۳، تغییرات زیادی در صفات شمارشی در سنین مختلف نهرهای کبودوال، زرین گل و شیرآباد مشاهده نشد. تعداد شعاع‌های غیر منشعب باله پشتی اول (۶ عدد) و باله پشتی دوم (۱ عدد) در هر سه نهر ثابت بودند. تعداد شعاع‌های منشعب باله پشتی دوم و شعاع‌های منشعب باله مخرجی نیز در سنین مختلف نمونه‌های هر سه نهر اختلافات ناچیزی داشتند و فقط در بعضی سنین، اختلاف معنی‌داری بین آن‌ها مشاهده شد. تعداد فلس‌های بالای خط جانبی در ماهی‌های دو و چهار ساله‌ی زرین گل کمتر از ماهی‌های سنین دو و چهار ساله کبودوال و شیرآباد بود و در سنین دیگر اختلاف‌ها معنی‌دار نبود. اما تعداد فلس‌های زیر خط جانبی به جز سن ^۱، در بقیه سنین در بین سه نهر دارای اختلاف معنی‌دار بود. در مورد تعداد فلس‌های روی خط جانبی مشاهده گردید که ماهی‌های سن ^۱ و ^۲ شیرآباد نسبت به ماهی‌های کبودوال و زرین گل به‌طور معنی‌داری دارای تعداد بیشتری هستند، اما در بقیه سنین اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد (جدول ۳).


بر اساس شاخص تنوع بین نمونه‌ای، مشخص شد که تعداد فلس‌های روی خط جانبی تنوع بیشتری نسبت به سایر صفات مریستیک در سنین مختلف نمونه‌های نهرهای کبودوال، زرین گل و شیرآباد داشتند. به‌طوری‌که بیشترین شاخص تنوع ($\alpha=0.4$) در گاوماهیان ^۱ و ^۲ مشاهده شد و اختلاف تعداد فلس‌های روی خط جانبی در سن‌های مختلف گاوماهیان نهرهای شیرآباد و زرین گل بیشتر بود ($\alpha=0.3$). بقیه صفات مریستیک تغییرات کمتری را نشان دادند و در سنین مختلف گاوماهی‌های نهرهای مذکور تقریباً به هم نزدیک بودند. به‌طوری‌که کمترین شاخص تنوع بین نمونه‌ای در صفات تعداد شعاع‌های منشعب باله پشتی دوم و تعداد فلس‌های بالای خط جانبی مشاهده شد ($\alpha=0.2$).

جدول ۳- میانگین و انحراف معیار صفات شمارشی در سنین مختلف گاوماهی شنی نهرهای کبودوال، زرین‌گل و شیرآباد در شهریورماه ۱۳۸۷.

صفات	سن	کبودوال	زرین‌گل	شیرآباد
تعداد شعاع‌های منشعب باله پشتی دوم (۱۴-۱۶)	۱+	۱۵±۰/۷۹ ^a	۱۴/۳۳±۰/۴۸ ^a	۱۵ ^a
تعداد شعاع‌های منشعب باله مخرجی (۱۰-۱۲)	۲+	۱۴/۹۲±۰/۶۷ ^a	۱۴/۶۶±۰/۵۱ ^{ab}	۱۴/۸±۰/۴۹ ^b
تعداد فلس‌های روی خط جانبی (۴۹-۵۸)	۳+	۱۴/۵±۱/۰۴ ^a	۱۵ ^a	۱۵/۳۰±۰/۴۸ ^a
تعداد فلس‌های بالای خط جانبی (۷-۹)	۴+	۱۵±۱ ^a	۱۵ ^a	۱۵/۳۳±۰/۵۷ ^a
<hr/>				
تعداد فلس‌های زیرخط جانبی (۷-۱۲)	۱+	۱۱/۶۲±۰/۷۴ ^a	۹/۹۳±۰/۲۵ ^b	۱۱ ^a
تعداد فلس‌های بالای خط جانبی (۷-۹)	۲+	۱۱/۵۴±۰/۷۷ ^a	۱۰/۱۶±۰/۴ ^b	۱۰/۷۳±۰/۸۲ ^b
تعداد فلس‌های روی خط جانبی (۴۹-۵۸)	۳+	۱۱/۳۳±۰/۵۱ ^a	۱۰/۵±۰/۷ ^a	۱۱/۴±۰/۶۹ ^a
تعداد فلس‌های بالای خط جانبی (۷-۹)	۴+	۱۱/۳۳±۰/۵۷ ^a	۱۱ ^a	۱۰/۳۳±۱/۱۵ ^a
<hr/>				
تعداد فلس‌های بالای خط جانبی (۷-۹)	۱+	۵۱/۹۳±۱/۶۴ ^b	۵۰/۸۶±۰/۹۹ ^b	۵۴±۲/۸۲ ^a
تعداد فلس‌های روی خط جانبی (۴۹-۵۸)	۲+	۵۲/۹±۲/۰۲ ^b	۵۱/۶۶±۱/۱۶ ^b	۵۵/۲±۲/۴۸ ^a
تعداد فلس‌های بالای خط جانبی (۷-۹)	۳+	۵۳/۳۳±۲/۰۶ ^a	۵۲/۵۰±۰/۷ ^a	۵۵/۶۰±۲/۳۶ ^a
تعداد فلس‌های روی خط جانبی (۴۹-۵۸)	۴+	۵۴±۱ ^a	۵۱±۱/۴۱ ^a	۵۴/۶۶±۲/۰۸ ^a
<hr/>				
تعداد فلس‌های بالای خط جانبی (۷-۹)	۱+	۷/۸۸±۰/۳۸ ^a	۷/۴۶±۰/۵۱ ^a	۸±۰ ^a
تعداد فلس‌های زیرخط جانبی (۷-۱۲)	۲+	۸±۰/۴۹ ^a	۷/۱۶±۰/۴ ^b	۸±۰/۵۸ ^a
تعداد فلس‌های بالای خط جانبی (۷-۹)	۳+	۷/۸۳±۰/۴ ^a	۸± ^a	۸/۱±۰/۳۱ ^a
تعداد فلس‌های روی خط جانبی (۴۹-۵۸)	۴+	۷/۶۶±۰/۵۷ ^{ab}	۷± ^b	۸± ^a
<hr/>				
تعداد فلس‌های زیرخط جانبی (۷-۱۲)	۱+	۱۰/۱۱±۱/۴۱ ^a	۹/۱۳±۰/۸۳ ^a	۹/۵±۰/۷ ^a
تعداد فلس‌های بالای خط جانبی (۷-۹)	۲+	۱۰/۹±۱/۱ ^a	۱۰/۳۳±۰/۸۱ ^{ab}	۱۰/۰۳±۰/۹۶ ^b
تعداد فلس‌های بالای خط جانبی (۷-۹)	۳+	۱۱±۰/۶۷ ^a	۱۰± ^b	۱۰±۰/۴۷ ^b
تعداد فلس‌های بالای خط جانبی (۷-۹)	۴+	۱۰±۰ ^a	۱۰/۵±۰/۷ ^a	۹/۶۶±۱/۵۲ ^b

در بررسی آنالیز چند متغیره معلوم شد که مقادیر ویژه تجمعی مؤلفه اول و دوم شامل ۲۱/۲۴ و ۳۲/۸۷ و در کل ۱۰ مؤلفه با مقادیر ویژه بزرگتر از ۱ با مقدار ۷۴/۱۸ درصد جداسازی شد. در واقع، می‌توان گفت که نمونه‌های گاوماهی شنی نهرهای مورد مطالعه همپوشانی بالایی دارند. به طوری که در پراکنش نقطه‌ای نمونه‌ها بر اساس تجزیه عامل‌های استخراجی این نزدیکی نمونه‌ها به خوبی قابل نمایش است (شکل ۳).

مقایسه برخی خصوصیات ریخت‌سنگی و پویایی جمعیت‌های گاو‌ماهی شنی...



شکل ۳- پراکنش نقطه‌ای نمونه‌های گاو‌ماهی شنی (*N. pallasi*) نهرهای کبودوال، زرین‌گل و شیرآباد بر اساس صفات ریخت‌سنگی.

در تفکیک جمعیت‌ها به روش تجزیه عامل‌ها (PCA)، اکثر صفات دارای ضرایب عاملی کمتر از ۰/۷۵ بودند و تنها صفات عرض دهان، آرواره تحتانی و فوقانی دارای ضرایب عاملی بالاتر از ۰/۷۵ بودند و می‌توانند در تفکیک نمونه‌ها نقش بیشتری داشته باشند.

بحث

برای مدیریت منطقی و کارآمد شیلاتی، شناسایی ساختار ذخیره‌ای گونه‌ای از گونه‌ی ماهی که به بهره‌برداری می‌رسد، اهمیت بهسازی دارد؛ چرا که هر ذخیره باید به طور جداگانه مدیریت شود تا بهره‌برداری از آن گونه در حد بهینه قرار گیرد.(Salini *et al.*, 2004; Erguden and Turan, 2005) مطالعه ویژگی‌های ریخت‌شناسی با هدف تعریف و شناسایی واحدهای جمعیتی، پیشینه‌ای طولانی در دانش زیست‌شناسی ماهی داشته است (Tudela, 1999; Turan and Erguden, 2004) توضیح علل به وجود آمدن تفاوت‌های ریخت‌شناسی میان جمعیت‌ها دشوار است؛ به این دلیل که ویژگی‌های ریختی تحت کنترل و برهم کنش دو عامل شرایط محیطی و ژنتیک هستند (Swain and

اندازه بدن ممکن است به میزان ۸۰ درصد و یا بیشتر در وجود تغییرات بین متغیرهای اندازه‌گیری شده تأثیرگذار باشد (Tzeng, 2004). نتایج به دست آمده از تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که گاوماهیان هر سه نهر (بهویژه نهر زرین‌گل)، در اکثر صفات ریخت‌سنجدی و در بین سنین مختلف دارای تفاوت معنی‌دار بودند که می‌تواند نشان‌دهنده وجود تنوع نسبتاً بالای فنوتیپی در بین نمونه‌ها باشد.

در مطالعه انوری فر و همکاران روی بررسی تنوع و تمایز ریخت‌سنجدی سیاه ماهی *Capoeta gracilis* در رودخانه تجن ساری، نتایج آنالیز PCA نیز نشان داد که ایستگاه بالا دست و پایین دست سد، به طور معنی‌داری از یکدیگر متمایز شده‌اند و گراف پراکنش بر اساس مؤلفه‌های اول و دوم نیز، این دو جمعیت را از یکدیگر متمایز کرد (Anvarifar et al., 2012). با این حال، در مطالعه حاضر، با توجه به آنالیز چند متغیره بر اساس صفات ریخت‌سنجدی مشاهده شد که مقادیر ویژه‌ی تجمعی مؤلفه اول و دوم شامل ۲۱/۲۴ و ۳۲/۸۷ و در کل ۱۰ مؤلفه با مقادیر ویژه بزرگ‌تر از ۱ با مقدار ۷۴/۱۸ درصد جداسازی است. می‌توان نتیجه‌گیری کرد که نمونه‌های گاوماهی شنی نهرهای مورد مطالعه هم‌پوشانی بالایی دارند. به طوری که در پراکنش نقطه‌ای نمونه‌ها بر اساس تجزیه عامل‌های استخراجی، نزدیکی نمونه‌ها به خوبی قابل نمایش است. بهویژه، براساس صفات شمارشی هم‌پوشانی مشخص‌تر است و جدایی نمونه‌ها در هیچ‌کدام از آنها قابل تفکیک نیست. همچنین در تفکیک جمعیت‌ها به روش تجزیه عامل‌ها، اکثر صفات دارای ضرایب عاملی کمتر از ۷۵/۰ بودند که نشان‌دهنده نزدیکی نمونه‌ها و عدم جدایی جمعیت گاوماهی شنی در سه نهر مورد مطالعه است. تنها صفات عرض دهان، آرواره تحتانی و فوقانی دارای ضرایب عاملی بالاتر از ۷۵/۰ بودند و می‌توانند در تفکیک نمونه‌ها نقش بیشتری داشته باشند.

مطابق با نتایج، تفاوت کمی در داده‌های مریستیک بین گاوماهیان هر سه نهر وجود داشت که دلیل آن می‌تواند ثبات نسبی صفات مریستیک در ماهیان باشد (Winfield and Nelson, 1991). برخی منابع هم (Binaco and Banarscu, 1982; Gholioff, 1997) تفاوت‌های مریستیک در گونه‌ها و زیرگونه‌های مختلف ماهیان را در عرض‌های جغرافیایی مختلف گزارش کرده‌اند؛ ولی صفات مریستیک ماهیان یک منطقه اختلاف ندارد. از نظر مورفومتریک، تفاوت در اکثر فاکتورهای ریخت‌سنجدی بین بچه‌ماهیان و ماهیان بزرگ‌تر مشاهده شد که برخی پژوهشگران در بسیاری از ماهیان گزارش کرده‌اند (Berg, 1949; Gholioff, 1997). از آنجا که ماهیان کوچک‌تر هنوز مراحل رشد خود را به خوبی طی نکرده و شرایط زیستی آن‌ها نسبت به ماهیان بزرگ‌تر متفاوت است، طبیعی به‌نظر می‌رسد که چنین تغییراتی در آن‌ها دیده شود. در مقایسه صفات نسبی نیز، برخی فاکتورها در بچه‌ماهیان بزرگ‌تر، تعدادی برابر و بعضی هم کوچک‌تر از ماهیان بزرگ‌تر هستند که تحلیل آن مشکل بوده و نیاز به تجارت بالا و مطالعات وسیع‌تری دارد.

مقایسه برخی خصوصیات ریختسنگی و پویایی جمعیت‌های گاوماهی شنی...

تنوع فنتیپی در خصوصیات ریختسنگی یا مریستیک نه تنها تحت تأثیر زنتیک است، ممکن است نتیجه تغییرات محیطی نیز باشد (Lindsey, 1962; Eli, M. and Y., Lindsey, 1974; Todd *et al.*, 1981; Swain and Foote, 1999 (Lindsey, 1954) (Taning, 1952). در بعضی مطالعات، شرایط محیطی بهویژه دما، در طول مراحل حساس تکاملی بیشترین تأثیر را در خصوصیات مریستیک نشان داده است (Pinheiro *et al.*, 2005). لیندنسی (Pinheiro *et al.*, 2005). از سوی دیگر، هنگامی که ماهی در اوضاع محیطی جدیدی قرار گیرد، این امکان وجود دارد که تغییرات ریخت‌شناسی به سرعت در آن رخ دهد (Poulet *et al.*, 2004).

در این پژوهش، مقایسه صفات ریختسنگی و شمارشی نشان داد که در تمامی نمونه‌های مورد مطالعه، ضریب تغییرات صفات ریخت سنگی بیشتر از صفات شمارشی بوده است. بنابراین اثر فاکتورهای محیطی روی صفات ریخت‌سنگی بیشتر بوده و پایین بودن ضریب تغییرات در صفات شمارشی می‌تواند بیان کننده اختلاف کم در خصوصیات زنتیکی نمونه‌های مورد مطالعه باشد. به هر حال، مقایسه صفات ریخت‌سنگی بین سه نهر و نیز با توجه به پراکنش نقطه‌ای جمعیت‌ها بر اساس تجزیه عامل‌های استخراجی، نمونه‌های زرین‌گل، نسبت به دو نهر دیگر حالت بینابینی از خود نشان دادند و همپوشانی نقطه‌ای بین نمونه‌های زرین‌گل با نمونه‌های کبودوال بیشتر از همپوشانی با نمونه‌های شیرآباد بود که این نتیجه مطابق با فاصله جغرافیایی موجود بین این نهرها است.

منابع

- Abdoli A. 1999. The Inland Water Fishes of Iran. Publication of Natural Museum and Wildlife of Iran. 377p. (In Persian).
- Afshin I. 1994. Rivers of Iran. Ministry of NIRO. 575p.
- Annoni P., Saccardo I., Gentili G., Guzzi L. 1997. A multivariate model to relate hydrological, chemical and biological parameters to salmonid biomass in Italian Alpine rivers. *Fisheries Management and Ecology*, 4: 439-452.
- Anvarifar H., Farahmand H., and Nematolahi M.A. 2012. Investigation on diversity and distinguish of *Capoeta capoeta gracilis* in the Tajan river- Sari. *Iranian Journal of Biology*, 4: 517-535.
- Bagenal T. 1978. Methods for assessment of fish production in freshwater, Third edition, *Blackwell Scientific Publication Oxford*. London Edinbarugh Melbourn. PP. XVT365.

- Bagenal T., and Tesch F. 1978. Methods for Assessment of Fish Production in Fresh Waters. *IBP Handbook 3 Blackwell*, Oxford. Pp: 101-136.
- Barimani A. 1977. Ichthyology and Fisheries. Urmia University. Vol. 2, 245p. (In Persian).
- Beacham T.D. 1985. Meristic and morphometric variation in pink salmon (*onchorhynchus gorbuscha*) in southern British Columbia and Puget Sound. *Canadian Journal of Zoology*, 63: 366-377.
- Berg, L.S. 1949. Presnovodnye ryby Irana I sopredel'nykh stran [Freshwater fishes of Iran and adjacent countries. Trudy Zoologicheskogo Instituta Akademii Nauk SSSR, 8:783-858.
- Berg, L.S. 1964. Freshwater fishes of the U.S.S.R and adjacent countries. Volume 2, 4th edition. Israel Program for scientific Translations Ltd, Jerusalem, 553p.
- Bij de Vaate A., Jazdzewski K., Ketelaars H.A. 2002. Geographical patterns in range expansion of macroinvertebrate Ponto-Caspian species in Europe *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 59:1159-1174.
- Binaco P.G., Banarscu P. 1982. A contribution to the knowledge of the Cyprinidae of Iran. (Pisces, Cypriniformes. Cybiurne serie, Paris, Franco. B (2), 75-96 pp.
- Biro P. 1971. *Neogobius fluviatilis* in Lake Blaton a Pontocaspian goby new to the fauna of central European. *Journal of Fish Biology*- 4: 249-255.
- Coad B.W. 2012. The freshwater fishes of Iran. Family Gobiidae Genus Neogobius. www.briancoad.com. 06 April. 2012.
- Copp G.H., Bianco P.G., Bogutskaya N.G. 2005. To be, or not to be, a non-native freshwater fish? *J. Appl. Ichthyol.* 21:242–262 pp.
- Eli M.Y., Lindsey C.C. 1974. Heritable and temperature-induced meristic variation in the medaka, *Oryzias latipes*. *Canadian Journal of Zoology*, 52: 959–976.
- Erguden D. Turan C. 2005. Examination of genetic and morphological structure of Sea-Bass (*Dicentrarchus labrax* L., 1785) populations in Turkish Coastal waters. *Turkish Journal of Vertebrate Animal Sciences*, 29: 727-733.
- Gholiof Z.M. 1997. The Cyprinidae and Percidae fishes of Southern and middle Caspian Sea basin. Translated by Adeli, Y. 1998. Fisheries Research Institute of Guilan- Bandar Anzali. 44 p.
- Karakousis Y., Peios C., Economidis P.S., Triantaphyllidis C. 1993. Multivariate analysis of the morphological variability among *Barbus peloponnesius* (Cyprinidae) populations from Greece and two populations of *B. meridionalis* and *B. meridionalis petenyi*. *Cybium* 17, 229–240.
- Kazanchiev E.N. 1981. Fishes of Caspian Sea. Moscow, Lectures of Fisheries. Pp:124-143.
- Kiabi B.H., Abdoli A. Naderi M. 1999. Status of the fish fauna in the South Caspian Basin of Iran. *Zoology in the Middle East*, 18:57-65.
- Kuliev Z.M. 1988. Morphometric and ecological characteristics of Caspian Vimba" *Vimba. Vimba persa*" *Journal of Ichthyol.* 28: 29-37

مقایسه برخی خصوصیات ریخت‌سنگی و پویایی جمعیت‌های گاوماهی شنی...

- Lindsey C.C. 1954. Temperature-controlled variation in the paradise fish *Macropodus opercularis* (L.). Canadian Journal of Zoology, 32; 87–98.
- Lindsey C.C. 1962. Experimental study of meristic variation in a population of threespine sticklebacks, *Gasterosteus aculeatus*. Canadian Journal of Zoology- 40, 271–312.
- Mamuris Z., Apostolidis A.P., Panagiotaki P., Theodorou A.J., and Triantaphyllidis C. 1998. Morphological variation between red mullet populations in Greece. *Journal of Fish Biology*, 52: 107–117.
- Mironovskii A.N., Ustarbekov A.K. 1997. Age dynamics of variation in some morphological characters of *Blicca bjoerkna* in the lower reaches of the Terek: An example of rigid selection? *Journal of Fish Biology*, 37: 3: 239- 245.
- Penczak T., Jakubowski H. 1990. Drawbacks of electric fishing in rivers. Development in electric fishing. *Fishing News books*, Oxford.
- Pinheriro A., Teixeira C.M., Rego A.L., Marques J. F. Cabral H.N. 2005. Genetic and morphological variation of *Solea lascaris* (Risso, 1810) along the Portuguese Coast. *Fisheries Research*. Vol. 73: 67-78.
- Poulet N.P., Berrebi A.J., Crivelli S., Lek Argillier C. 2004. Genetic and morphological variation in the pike perch (*Sander lucioperca*) of a fragmented delta. *Arch. Hydrobiol.* 159,(4): 531-554.
- Rahimov D.B. 1986. Zoogeographical analysis of Gobiid fishes of Caspian Sea. Proceeding of 5th Congress of Hydrobiological Association, Academy of Science of USSR, Taliatti. Pp: 113-114.
- Salini J.P., Milton D.A., Rahman M.J. Hussein M.G. 2004. Allozyme and Morphologica variation throughout the geographic range of the tropical shad, hilsa (*Tenualosa ilisha*). *Fisheries Research*. Vol. 66: 53-69.
- Skora, K.E., and Stolarski J. 1993. New fish species in the Gulf of Gdansk *Neogobius* sp. [*Neogobius fluviatilis* (Pallas 1811)]. *Bulletin of the Sea Fisheries Institute* 1, 83.
- Swain D., and Foote C.J. 1999. Stocks and chameleons: the use of phenotypic variation in stock identification. *Fisheires Research*. 43, 113–128.
- Tanig A.V. 1952. Experimental study of meristic characters in fishes. *Biol. Rev.* 27, 169–193.
- Todd T.N., Smith G.R., Cable L.E. 1981. Environment and genetic contributions to morphological differentiation in ciscoes (Coregonidae) of the Great lakes. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences-* 38, 59–67.
- Tudela S. 1999. Morphological variability in a Mediterranean, genetically homogeneous population of the European anchovy, *Engraulis encrasicolus*. *Fisheries Research*, 42: 229-243.
- Turan, C. ErgÜden, D. 2004. Genetic and morphometric structure of *Liza abu* (Heckel, 1834) population from the Rivers Orontes, Euphrates and Tigris. *Turkish Journal of Vertebrate Animal Sciences*, Vol. 28: 729-734.

-
- Tzeng T.D. 2004. Morphological variation between populations of spotted mackerel *Scomber australasicus* off Taiwan. *Fisheries Research*. Vol. 68: 45-55.
- Veziarat-Niro 2003. Projetc Report of Hydrological Study of Zarrin-Gol River. Vol. 2. 68p. (In Persian).
- Winfield I.G. Nelson J.S. 1991. Cyprinid fishes. Systematics, biology and exploitation. First editiomn. Chapman and Hall. 677 P.