

مجله پژوهش‌های پنبه ایران  
جلد سوم، شماره دوم، ۱۳۹۴  
۱-۱۴  
[www.jcri.ir](http://www.jcri.ir)

## بازیابی و بیماریزایی باکتری *Xanthomonas citri* subsp. *malvacearum* از برگ‌های آلوده نه ساله پنبه و بررسی خصوصیات بیوشیمیایی جدایه‌ها

محمدرضی نتاج<sup>۱</sup> و \*غلام خداکرمیان<sup>۲</sup>

<sup>۱</sup>عضو هیات‌علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور، گرگان  
<sup>۲</sup>استاد بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۱۲/۳ ؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۳/۱۰

### چکیده

بیماری بلایت باکتریایی پنبه با عامل *Xanthomonas citri* subsp. *malvacearum* از بیماری‌های مهم و قرنطینه‌ای پنبه در ایران است که در سال ۱۳۸۴ در مزارع پنبه استان گلستان بروز کرد. نمونه‌هایی از برگ‌های آلوده در این سال جمع‌آوری و در دمای اتاق نگهداری شد. در سال ۱۳۹۳ قسمت‌هایی از برگ‌های آلوده پس از شستشو با آب لوله شهری، در چند قطره آب مقطر استریل قرار داده و به مدت چند ساعت در شرایط اتاق نگهداری شد. سوسپانسیون فوق در روی محیط آگار غذائی مخطط گردید. پس از ۴۸-۷۲ ساعت کلنی باکتری‌های زرد رنگ، مدور و ۱ میلی‌متر جداسازی گردید که در آزمون‌های گرم، اکسیداز و رشد در محیط بی‌هوازی منفی بودند. کلیه جدایه‌ها هوازی اجباری و قادر به هیدرولیز نشاسته بودند. جدایه‌ها از گلوکز، اینولین، اورات، مالونات، لاکتات و تریپتون استفاده کرده ولی قادر به استفاده از ترهالوز، ال-رامنوز، دی-رافینوز، فوکوز، مالتوز، ال-تارتارات، دی-گالاکتورونات، استات، نیکوتینات، گلايسين، کازئین، دالسیتول، ال-ترئونین و آدونیتول نبودند. در استفاده از آرابینوز، دی-فروکتوز، دی-زایلوز، ملزیتوز، ملی بیوز، گوانین، ال-سیستئین، ال-تریپتوفان، ال-هیستیدین، بتائین، بتا-آلانین، ال-والین، دی-سوربیتول، سیترات و ال-مالتات متغیر بودند. با تزریق باکتری به اپیدرم برگ رقم گلستان پس از ۳ روز علائم آسوخستگی مشاهده شد که در ادامه گسترش یافته و بلایت رگبرگ‌های اصلی و فرعی نیز مشاهده گردید. بنابراین لزوم توجه به نقش بقایای گیاهی آلوده در بروز و گسترش این بیماری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

\*نویسنده مسئول: [khodakaramian@yahoo.com](mailto:khodakaramian@yahoo.com)

واژه‌های کلیدی: پنبه، بلایت باکتریایی، بقا و *Xanthomonas citri* subsp. *malvacearum*

## مقدمه

بلایت باکتریایی پنبه یکی از مهم‌ترین عوامل خسارت زای پنبه می‌باشد که تقریباً در اکثر مناطق پنبه خیز دنیا از جمله در کشورهای هند، پاکستان، چین، استرالیا، مصر، سودان، تاجیکستان، ترکمنستان، آذربایجان و ازبکستان وجود دارد و در فصولی که شرایط محیطی برای گسترش این بیماری مناسب باشد کاهش عملکرد شدیدی را سبب می‌شود (Hillocks, 1992 و Brinkerhof, 1970). این بیماری از بیماری‌های قرنطینه‌ای ایران بوده که هر از چند گاهی در نقطه‌ای از کشور بروز می‌کند. عامل بیماری باکتری *Xanthomonas citri* subsp. *malvacearum* یک باکتری بذرزاد است (Bradbury, 1986). منبع آلودگی به بیماری معمولاً از بذر و بقایای گیاهی تأمین می‌شود و گیاهان آلوده به‌عنوان کانون‌های ثانویه بیماری بشمار می‌روند (Hirano and Upper, 1983). عامل بیماری قادر است در تمام مراحل رشد گیاه و به همه قسمت‌های هوایی بوته حمله نماید و علائم متفاوتی شامل بلایت گیاهچه، سیاه شدن ساقه، لکه زاویه ای برگ و پوسیدگی قوزه را ایجاد می‌نماید (Srinivasan, 1994).

در گیاه پنبه آلوده عامل بیماری در خاک، توان بقا کمی دارد. اصلی‌ترین مایه اولیه آلودگی از بذرهای آلوده و بقایای گیاهی تأمین می‌شود. مایه آلودگی توسط باد، باران، آبیاری بارانی و آب آبیاری از گیاه آلوده به گیاهان سالم دیگر انتقال می‌یابد. بیمارگر، قادر است در بذر و بقایای خشک شده گیاه زمستان‌گذرانی کرده و با کاشت پنبه و در صورت مساعد بودن شرایط بیماری، آلودگی ایجاد می‌شود (Srinivasan, 1994).

میزبان‌های اصلی بیمارگر گیاهان متعلق به جنس *Gossypium* هستند. دیپلوئیدهای حساس گونه‌های زراعی *G. arboreum* و *G. herbaceum* و گونه‌های وحشی *G. thurberi*، *G. harknessii* و *G. stocksii* گزارش شده‌اند. ارقام تتراپلوئید زراعی *G. hirsutum* و *G. barbadense* و رقم وحشی *G. tomentosum* از میزبان‌های باکتری گزارش شده‌اند.

در آریزونا و مکزیک گیاه *Thurberia thespeioides*، در مکزیک گیاه *Eriodendron anfractum* (*Ceiba pentandra*)، در هند *Lochnera pusilla* و گیاهان دیگر از خانواده پنیرکیان مانند *Thespesia populnea* و *T. lambas*، *Hibiscus vitifolius* به‌عنوان میزبان‌های جانبی عامل بیماری سوختگی باکتریایی پنبه گزارش شده‌اند (Holt et al., 1994; Srinivasan, 1994). همچنین در هند توانستند با موفقیت گیاه *Jatropha curcas* را تلقیح کنند و باکتری قادر به آلوده سازی لوبیا *Phaseolus vulgaris* بود (Srinivasan, 1994).

عامل بیماری در خاک در غیاب پنبه آلوده توان بقا کمی دارد. اصلی ترین مایه اولیه آلودگی از بذرها آلوده و بقایای گیاهی تامین می شود. در طول رشد بذر در خاک باکتری های موجود در بذر سبب آلوده کردن کوتیلدون ها شده و سبب ایجاد لکه های سبز روشن تا قهوه ای مایل به سیاه در کوتیلدون ها و برگ های اولیه و همچنین در صورت مساعد بوده شرایط محیطی برای شیوع بیماری سبب سوختگی گیاهچه پنبه می شود (Srinivasan, 1994).

اگر گیاهچه آلوده دوام بیاورد آلودگی ثانویه در دیگر گیاهان و در مراحل مختلف ایجاد خواهد شد. مایه آلودگی توسط باد و باران و آب از گیاه آلوده به گیاهان سالم دیگر انتقال می یابد و سبب ایجاد آلودگی های بعدی می شود. پاتوژن در برگ ها از راه روزنه ها وارد برگ شده بنابراین آلودگی زمانی اتفاق می افتد که روزنه ها باز باشند. شواهدی هم وجود دارد که نشان می دهد باکتری توانائی رخنه مستقیم به داخل برگ را دارد و این زمانی اتفاق می افتد که میزان مایه آلودگی زیاد و فعالیت آنزیمی زیاد باشد. باکتری در بافت پارانشیم بین برگ فعالیت کرده و با تولید پکتیناز سبب تخریب بافت میزبان می شوند. عامل بیماری بندرت وارد بافت آوندی می شود و سبب ایجاد لکه های گوشه دار می شود. باکتری عامل بیماری توسط قطرات آب، باد و باران به تمام قسمت های هوائی گیاه پخش شده و سبب آلودگی اندام ها می شود. آلوده شدن قوزه در اکثر موارد سبب آلوده شدن کرک های روی بذر، الیاف و سطح بذر شده و گاهی آلودگی داخلی بذر (Internal infection) اتفاق می افتد که در نتیجه باکتری توسط بذر به مناطق دیگر انتقال یافته و به عنوان کانون آلودگی در آینده بروز خواهد کرد. پاتوژن قادر است در بذر و بقایای خشک شده گیاه زمستان گذرانی کرده و با کاشت پنبه و در صورت مساعد بودن شرایط بیماری، آلودگی ایجاد خواهد شد (Srinivasan, 1994).

### مواد و روش ها

**جداسازی و خالص سازی باکتری:** نمونه ها، ابتدا با آب لوله شهری شسته و سپس با هیپوکلریت سدیم (محلول ۱ درصد تجاری) به مدت ۳۰ ثانیه ضد عفونی شدند. با چاقوی سترون از حد فاصل بافت آلوده و سالم، قطعاتی به ابعاد چند میلی متر برداشته و درون چند میلی لیتر آب مقطر سترون انتقال داده شدند. بعد از له نمودن قطعات گیاهی درون آب مقطر سترون، این سوسپانسیون در دمای اطاق نگهداری شد. یک لوپ از سوسپانسیون فوق در محیط آگار غذائی (Nutrient Agar) مخطط گردید (Fahy and Persley, 1983). تشتک ها ۲-۴ روز در دمای ۲۵-۲۸ درجه سانتی گراد قرار گرفتند. تک پرگنه های ظاهر شده روی محیط آگار غذائی به صورت نقطه ای کشت شده و پس از اطمینان از خلوص پرگنه ها، آزمایشات استاندارد جهت تشخیص باکتری و آزمون های بیماری زائی انجام شدند (Schaadet *et al.*, 2001).

**بررسی خصوصیات فنوتیپی جدایه‌ها:** تولید رنگدانه فلورسنت روی محیط King-B (King *et al.*, 1954)، آزمون گرم بر اساس روش ساسلو و همکاران (۱۹۸۲) و شاد (۲۰۰۱)، آزمون‌های تولید لوان، اکسیداز، لهنیدن ورقه‌های سیب زمینی، آرژنین دهیدرولاز و تولید فوق حساسیت در توتون مطابق روش لیلیوت و همکاران (۱۹۶۶) و کلمنت و همکاران (۱۹۶۴)، کاتالاز، هیدرولیز نشاسته، رشد هوازی و بی هوازی، رشد در ۴۱ درجه سانتی‌گراد و هیدرولیز ژلاتین بر اساس روش فهی و پرسلی (۱۹۸۳) انجام شد. آزمون‌های احیای نیترات، هیدرولیز توئین ۸۰، تحمل به نمک طعام و استفاده از قندها، اسیدهای آلی، اسیدهای آمینه و الکل‌ها بر اساس روش شاد و همکاران (۲۰۰۱) انجام شد. سایر آزمون‌ها نیز بر اساس روش‌های استاندارد باکتری شناسی به روش فهی و پرسلی (۱۹۸۳) و شاد و همکاران (۲۰۰۱) انجام شد.

**اثبات بیماریزائی:** برای انجام آزمون اثبات بیماریزائی با تهیه سوسپانسیون به رقت تقریبی  $10^6$  cfu از باکتری، به اپیدرم گیاه میزبان تزریق شد. گیاهان فوق در داخل گلخانه و در شرایط مطلوب دمائی و رطوبتی قرار گرفتند (Srinivasan, 1994).

## نتایج و بحث

**خصوصیات فنوتیپی جدایه‌ها:** جدایه‌های باکتری عامل بیماری به رنگ زرد تا نارنجی، اندازه آنها ۱-۲ میلی‌متر، گرد و صاف بودند. همگی گرم و اکسیداز منفی، کاتالاز مثبت و قادر به رشد در محیط هوازی بوده در حالی که در محیط بی هوازی قادر به رشد نبودند. **بیماری زائی:** به منظور اثبات بیماریزائی جدایه‌های باکتری، سوسپانسیون جدایه‌های فوق به کوتیلدون و اپیدرم برگ پنبه تزریق شد. ۴ روز پس از تزریق، علائم اولیه بیماری به صورت لکه‌های آب سوخته ظاهر شده و در ادامه به صورت لکه‌های زاویه ای شکل و بلایت رگبرگهای اصلی و فرعی نمایان گردید.



شکل ۲- پیدایش لکه‌های زاویه ای با گسترش علائم بیماری



شکل ۱- بروز آبسوختگی پس از تلقیح سوسپانسیون باکتری در اپیدرم برگ

جدول ۱- خصوصیات فنوتیپی باکتری *Xanthomonas citri* subsp. *malvacearum* جدا شده از برگ آلوده پنبه

شماره ایزوله												آزمونها
۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واکنش گرم (Gram reaction)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فلورسنت روی KingB (Flourescent on KB medium)
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	رشد هوازی (Oxidative metabolism)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	رشد بی هوازی (Fermentative metabolism)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولید لوآن (Levan production)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اکسیداز (Oxidase)
+	+	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	لپه‌نیدن ورقه‌های سیب زمینی (Soft rot on potato)
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	فوق حساسیت (Hypersensitive reaction)
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	کاتالاز (Catalase)
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	هیدرولیز نشاسته (Starch hydrolysis)
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	هیدرولیز توئین ۸۰ (Tween 80 hydrolysis)
-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	هیدرولیز ژلاتین (Gelatin hydrolysis)
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	رشد در نمک طعام ۵٪ (Growth in 5% NaCl)
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	احیای نیترات (Nitrate reduction)
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	رشد در ۳۷ درجه سانتی گراد (Growth in 37°C)

جدول ۲- خصوصیات بیوشیمیایی باکتری *Xanthomonas citri* subsp. *malvacearum* جدا شده از برگ آلوده پنبه

شماره ایزوله												آزمونها
۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	
												استفاده از (Carbohydrate source utilization):
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	سوکروز (Sucrose)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دی-گالاکتوز (D-Galactose)
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	دی-گلوکز (D-Glucose)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مالتوز (Maltose)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دی-مانوز (D-Mannose)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سلوبیوز (Cellobiose)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ال-ترئونین (L-Threonine)
+	-	-	+	+	+	-	-	-	+	+	+	ارابینوز (Arabinose)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	دی-فروکتوز (D-Fructose)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ترهالوز (Trehalose)
-	-	+	-	+	+	-	-	+	-	-	-	دی-زایلوز (D-Xylose)

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ال-رامنوز (L-Rhamnose)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دی-رافینوز (D-Raffinose)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فوکوز (Fucose)
-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	ملزیتوز (Melezitose)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	ملی بیوز (Melibiose)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کازئین (Casein)
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	اینولین (Inulin)
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	تریپتون (Trypton)
+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	بتائین (Betaine)
+	-	-	+	+	+	-	-	+	-	+	-	ال-سیستئین (L-Cysteine)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گلیسین (Glycine)
+	-	-	-	+	+	+	-	-	+	+	+	ال-تریپتوفان (L-Tryptophan)
-	-	-	-	+	+	-	-	-	+	-	-	ال-هیستیدین (L-Histidine)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ال-ترونین (L-Threonine)
-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	ال-والین (L-Valine)
-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	-	بتا-آلانین (β-Alanine)
+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	گوانین (Guanine)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	دی-سوربیتول (D-Sorbitol)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مزو-اینوزیتول (Meso-Inositol)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آدونیتول (Adonitol)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دالسیتول (Dulcitol)
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	لاکتات (Lactate)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استات (Acetate)
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	اورات (Urate)
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	مالونات (Malonate)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ال-تارتارات (L-Tartrate)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیترات (Citrate)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دی-گالاکتورونات (D-Galacturonate)
+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	ال-مالات (L-Maleate)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نیکوتینات (Nicotinate)
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	مالونات (Malonate)

به‌طور طبیعی درصد بذور آلوده به این باکتری بسیار کم است، اما همین درصد کم بذور آلوده برای بروز اپیدمی شدید بیماری در شرایط مطلوب کافی است (Brinkerhoff and Hunter, 1963). این باکتری مانند دیگر زانتومونادها نسبت به خشکی و حرارت بالا حساس بوده و به سرعت از بین می‌رود (Mehta, 1990).

باکتری‌ها داری ساز و کارهایی هستند که به واسطه آنها می‌توانند به سطوح و به یکدیگر متصل شوند. بیوفیلم می‌تواند از یک یا چند گونه میکروبی تشکیل شود. قادرند روی بسیاری از سطوح جاندار و بی‌جان مانند مواد معدنی، فلزات، سطوح جانوری و گیاهی، ریه روده و انواع ایمپلنت‌های پزشکی تشکیل گردند (O'Toole *et al.*, 2000). تشکیل بیوفیلم راهی برای حفظ توده زنده سلولی در محلی خاص و برای دوره معین برای آغاز تعاملات بهتر با محیط است. زندگی در بیوفیلم مزایای متعددی دارد. بیوفیلم‌ها برای بقای باکتری در روی گیاه و کلنی‌زاسیون قسمت‌های مختلف گیاه و نیز بقای بیمارگر در خارج از میزبان نقش دارند. همچنین بیوفیلم موجب افزایش مقاومت در برابر برخی تنش‌های محیطی و تحمل مواد ضد میکروبی، حفاظت از شکار شدن در برابر آغازیان تک سلولی یا دستیابی به انتقال ژن افقی می‌شوند. افزایش مقاومت در برابر اشعه ماورا بنفش، قابلیت تجیه‌کنندگی زیستی و افزایش تولید متابولیت‌های ثانویه را نیز گسترش می‌دهند. تراکم زیاد جمعیت باکتری، فرصتی را برای انجام برخی فرآیندها فراهم می‌کند که سلول‌های منفرد نمی‌توانند به‌طور موثر انجام دهند (Jahid and Ha, 2012).

کنترل بلایت باکتریائی به مشکل بحث برانگیزی به علت آلودگی سیستمیک آن تبدیل شده است و اصلاح و تولید ارقام مقاوم نیز نتوانسته رضایت بخش باشد (Islam *et al.*, 2003). بیمارگر قادر است در اندام‌های تازه گیاه به مدت ۵-۶ ماه دوام آورد. گزارشاتی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد بیمارگر قادر بوده به مدت ۱۷ سال در اندام‌های خشک گیاه دوام بیاورد. ولی اگر اندام‌های گیاه آلوده در خاک مرطوب دفن شوند، حداکثر به مدت یک ماه دوام خواهد آورد. گیاهان آلوده‌ای نیز که بصورت خودرو و از بذورهای سال قبل مزرعه زودتر از گیاهان اصلی سبز می‌شوند، منبع آلودگی در مزرعه هستند (Srinivasan, 1994). در دمای ۵۰ درجه سانتی‌گراد بیمارگر از بین می‌رود ولی اگر بیمارگر همراه بذر یا بقایای گیاهی باشد، در هوای گرم و مرطوب، دمای ۹۰ درجه سانتی‌گراد را به مدت یک ساعت و در هوای خشک تا ۵ ساعت دوام می‌آورد (Srinivasan, 1994). با توجه به جداسازی و بیماریزائی جدایه‌های باکتری از بافت‌های آلوده پس از ۹ سال، توجه به قرنطینه گیاهی و دقت در جابجائی نمونه‌های گیاهی از اهمیت بسزائی برخوردار می‌شود.

منابع

1. Bradbury, J.F. 1986. Guide to Plant Pathogenic Bacteria. C.A.B. International Mycological Institute, Ferrylane, Kew, Surrey, England. 332 pp.
2. Brinkerhoff, L. A. 1970. Variation in *Xanthomonas malvacearum* and its relation to control. Ann. Rev. Phytopathol. 8:85-110.
3. Brinkerhoff, L. A. and Hunter, R. E. 1963. Internally infected seed as a source of inoculum for the primary cycle of bacterial blight of cotton. Phytopathology, 53: 1397-1401.
4. Fahy, P.C. and Persley, G.J. 1983. Plant Bacterial Disease: A Diagnostic Guide. Academic Press. Sydney. 393 pp.
5. Hillocks, R.J. 1992. Cotton Diseases. C.A.B. International. 415pp.
6. Hirano, S.S. and Upper, C.D. 1983. Ecology and Epidemiology of foliar bacterial plant pathogens. Annual Review of phytopathology, 21:243-69.
7. Holts, J.H., Krieg, N.R. Sneath, P. H.A., Stiley, J.T. and Williams, S.T. 1994. Bergeys Manual of Determinative Bacteriology. 9<sup>th</sup> Edition. The Williams & Wilkins Co., Baltimore, MD. USA. 1: 787 pp.
8. Islam, Z., Khalequzzaman, K.M., Rahman, G.M.M., Tahasinul, M.I. and Hossain, M. 2003. Effect of chemicals in controlling bacterial blight of cotton. Asian J. Plant Sci. 2:569-543.
9. Jahid, I.K. and Ha, S.D. A review of microbial biofilms of produce: Future challenge to food safety. Food Science and Biotech. 21:299-316.
10. King, E.D., Ward, M.K. and Raney, D.E. 1954. Two simple media for demonstration of pyocyanin and fluorescin. J. Lab. Clin. Med. 44:301-307.
11. Klement, Z., Farkas, G.L. and Lovrekovich, L. 1964. Hypersensitive reaction induced by phytopathogenic bacteria in the tobacco leaf. Phytopathology 54:474-477.
12. Lelliot, R.A., Billing, E. and Hayward, A.C. 1966. A determinative scheme for the fluorescent plant pathogenic pseudomonas. J. Appl. Bacteriol. 29:470-489.
13. Mehta, Y.R. 1990. Management of *Xanthomonas campestris* sp. *undulosa* through cereal seed testing. Seed Science and Technol. 18: 467-476.
14. O'Toole, G. Kaplan, H.B. and Kolter, R. 2000. Biofilm formation as microbial development. Annu. Rev. Microbiol. 54:49-79.
15. Schaad, N.W., Jones, J.B. and Chun, W. (eds). 2001. Laboratory Guide for Identification of Plant Pathogenic Bacteria. 3rd edition. Aps Press. St. Minnesots, USA. 373pp.
16. Srinivasan, K.V. 1994. Cotton Diseases. CIRCOT Press. 314pp.
17. Suslow, T.V., Schroth, M.N. and Isaka, M. 1982. Application of rapid method for Gram differentiation of plant pathogenic and saprophytic bacteria without staining. Phytopathology, 72: 917-918.



**Relief and Pathogenicity of *Xanthomonas citri* subsp. *malvacearum* from infected cotton leaves after 9 years and investigation of biochemical characteristics of isolates**

**\*M. Razinataj<sup>1</sup> and G. Khodakaramian<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Cotton Research Institute, Gorgan, Iran.

<sup>2</sup>College of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.

**Abstract**

Cotton bacterial blight is an important and quarantine disease of cotton in Iran that appeared in cotton fields of Golestan province in 2005. Samples of infected leaves were collected and served in room temperature. In 2014, sections from infected leaves were washed with tap water, then were placed in a few drops of sterile distilled water in room temperature for five hours. The suspension was streaked on NA medium. After 48-72 hours, isolated bacterial colonies were yellow, circular and 1 mm in diameter. The bacteria were negative in Gram, oxidase and fermentative growth tests. All isolates were positive for oxidative growth and starch hydrolysis. The isolates were tested for utilization of glucose, inulin, urate, malonate, lactate and tryptone but did not use trehalose, L-rhamnose, D-raffinose, fucose, maltose, L-tartrate, D-galacturonate, acetate, nicotinate, glycine, casein, dulcitol, L-threonine, and adonitol. Isolates were variable in utilization of arabinose, D-fructose, D-xylose, melezitose, melibiose, guanine, L-cysteine, L-tryptophan, L-histidine, betaine,  $\beta$ -alanine, L-valine, D-sorbitol, citrate and L-maleate. In pathogenicity test, bacterial suspension was injected with a sterile syringe into the epidermis of a leaf of Golestan cotton cultivar. The water-soaked spots observed after 3 days that extended and revealed vein blight. The importance of the role of infected plant debris in the incidence and spread of the disease is of particular importance.

**Keywords:**

---

\*Corresponding author; mrazinataj@yahoo.com

Archive of SID