

ارزیابی همبستگی بین خصوصیات مورفولوژیکی در ارقام مختلف دو گونه تراپلوبید پنبه

سیدنصرالله محسنیان^۱، کمال قاسمی بزدی^{۲*} و محمدرضا داداشی^۱

^۱گروه کشاورزی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
آزمایشگاه آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات پنبه کشور، گرگان، ایران
تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۵/۱۶؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۷/۱۷

چکیده

به منظور ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی متمايزکننده ارقام پنبه و همبستگی بین صفات مختلف با نوع گونه، پژوهش حاضر در سال ۱۳۹۴ در ایستگاه تحقیقات پنبه هاشم‌آباد گرگان بر روی ارقام پنبه ساحل، گلستان، سپید، SKT-133، M-13، لطیف، ترمز^{۱۴}، باربادنس و دکتر عمومی از دو گونه مختلف در قالب طرح بلوك‌های کامل تصادفی اجرا شد. خصوصیات مورد بررسی شامل ارتفاع، تعداد و طول شاخه‌های زیبا و رویا و تعداد گره‌ها، تعداد و وزن غوزه‌ها، وزن بذر، عملکرد وش و درصد کیل الیاف ارقام بودند. براساس نتایج، برای تمام خصوصیات مورد بررسی، اختلاف معنی‌دار آماری در سطح احتمال یک درصد مشاهده شد که نشان‌دهنده وجود تفاوت‌های بارز و قابل تمایز در بین ارقام مورد بررسی بود. خصوصیات مربوط به شاخه‌های رویا و زیبا از روند خاصی در بین ارقام دو گونه تبعیت نکردن و این صفات را نمی‌توان وابسته به گونه دانست. از طرفی صفات ارتفاع گیاه، تعداد غوزه، وزن غوزه، وزن بذر و درصد کیل الیاف را می‌توان به نوع گونه نسبت داد، به طوری که ارقام دکتر عمومی از گونه *G. barbadense* و SKT-133 از گونه *G. hirsutum* به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد غوزه را تولید کردند. وزن غوزه از ۳/۲۵ گرم در رقم باربادنس تا ۵/۲۹ گرم در رقم ساحل متغیر بود. بیشترین درصد کیل الیاف (۴۲/۲ درصد) مربوط به رقم گلستان بود و رقم باربادنس از گونه *G. barbadense* کمترین درصد کیل الیاف را داشت. عملکرد وش همبستگی مثبت و معنی‌داری با وزن غوزه و عملکرد چین اول داشت. در مقابل، تعداد غوزه همبستگی منفی با درصد کیل الیاف داشت. طبق نتایج مقایسات گروهی، گونه *G. hirsutum* از نظر صفات درصد کیل الیاف ۱۰/۹ درصد، طول بلندترین شاخه رویا ۲۷/۵ سانتی‌متر، عملکرد چین اول ۷۵۳ کیلوگرم در هکتار، عملکرد

* مسئول مکاتبه: kghasemibezdi@yahoo.com

کل ۷۹۱ کیلوگرم در هکتار و وزن غوزه ۱/۳۹ گرم نسبت به گونه *G. barbadense* برتری داشت به طوری که بالا بودن این صفات نسبت به سایر صفات زراعی بیشترین تأثیر را بر عملکرد نهایی داشتند. لذا آگاهی از روابط بین صفات و تأثیر آن بر عملکرد کل می‌تواند در افزایش تولید این گیاه ارزشمند مفید باشد.

واژه‌های کلیدی: پنبه، عملکرد کل وش، *G. barbadense* و *G. hirsutum*

مقدمه

پنبه به عنوان یک گیاه صنعتی و استراتژیک شناخته می‌شود. به طوری که میلیون‌ها نفر از مردم جهان در فعالیت‌های مختلف مرتبط با آن از قبیل تحقیقات، زراعت، تولید بذر، تجارت و کار در صنایع مختلف وابسته نظری صنایع پنبه پاک کنی، روغن کشی، نساجی، قالی‌بافی و غیره اشتغال دارند (زانگ و همکاران، ۲۰۰۰). پنبه گیاهی است از خانواده *Malvaceae* و از جنس *Gossypium* که حدود ۳۰ گونه دیپلوبید و ۴۰ گونه تترابلوبید در این جنس موجود است (ناصری، ۱۹۹۵). گونه‌های زراعی پنبه بر اساس فرمول ژنومی به دو گروه پنبه‌های زراعی دنیای قدیم و پنبه‌های زراعی دنیای جدید تفکیک می‌شوند. پنبه‌های زراعی دنیای قدیم دیپلوبید شامل گونه‌های *G. herbaceum* و *G. arboreum* و *G. barbadense* و *G. hirsutum* می‌باشند (کوچکی، ۱۹۹۴). کلیه ارقام موجود در دنیای جدید متعلق به دو گونه *G. barbadense* و *G. hirsutum* می‌باشند (کوچکی، ۱۹۹۴؛ ناصری، ۱۹۹۵).

جهت افزایش محصولات کشاورزی، از روش‌های بهبود ژنتیکی، اصلاح نباتات زراعی و تولید ارقام پرمحصول و اصلاح شده استفاده می‌شود. بنابراین تهیه ارقام اصلاح شده پرمحصول و مقاوم به بیماری‌ها و تنفس‌های محیطی اثرات مثبت اقتصادی و زیست محیطی دارد. از این رو حفاظت از ارقام اصلاح شده به عنوان ذخایر ژنتیکی کشور و حمایت‌های مادی و معنوی دولتها از حقوق پژوهشگران آنها، امری ضروری و اجتناب ناپذیر بوده و از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار می‌باشد (مردیت، ۱۹۸۴).

عملکرد پنبه، برآیند اثر تعدادی از اجزای مؤثر بر عملکرد نظری تعداد غوزه، وزن غوزه، درصد کیل الیاف و تعداد شاخه زایا و رویا است. بهبود صفاتی که با عملکرد همبستگی مثبت نشان می‌دهند، افزایش عملکرد را در پی خواهد داشت (رئوف و همکاران، ۲۰۰۵). رمضان‌پور و همکاران (۲۰۰۲) معتقدند که انتخاب بر اساس یک صفت راه حل مناسبی در جهت بهبود و افزایش عملکرد نمی‌باشد و بایستی بر اساس مجموعه‌ای از صفات و روابط بین آنها نتیجه‌گیری کرد. در بررسی ایشان مهم‌ترین صفات جهت افزایش عملکرد، طول میانگره و وزن غوزه بودند که انتخاب بر اساس این صفات می‌تواند منجر به افزایش عملکرد شود. در بررسی کمالی و همکاران (۲۰۱۵) صفات تعداد غوزه در بوته، تعداد

شاخه زایا، ارتفاع بیشترین همبستگی را با عملکرد و ش داشتند. در بررسی قجری و اکرم‌ قادری (۲۰۰۶) عملکرد و ش با تعداد شاخه رویا، طول شاخه رویا و تعداد غوزه رابطه مثبت و معنی‌ داری وجود داشت. آنها معتقد بودند با افزایش این صفات، عملکرد و ش افزایش می‌ یابد.

فرایند شناسایی^۱ و ثبت^۲ هر رقم^۳ با اجرای آزمون تمایز، یکنواختی و پایداری^۴ (DUS) جهت تشخیص اینکه یک رقم به اندازه کافی از سایر ارقام متمایز بوده و این تمایز از یکنواختی و پایداری کافی برخوردار می‌ باشد انجام می‌ گیرد (الصبایی احمد، ۱۹۸۹). تمایز کیفیتی ضروری برای ثبت رقم محسوب می‌ شود، چرا که یک رقم برای کنترل و گواهی بذر آن و نیز از جنبه احراق مالکیت پژوهشگر و حقوق پژوهشگران باید به اندازه کافی از سایر ارقام متمایز باشد تا قابل شناسایی گردد. این تمایز از جنبه‌های فیزیولوژیکی، سیتوولوژیکی، شیمیایی و بهویژه مورفولوژیکی قابل بررسی می‌ باشد که البته به علت سهولت بررسی خصوصیات مورفولوژیکی، مهم‌ ترین خصوصیات بررسی و ارزیابی تمایز رقم محسوب می‌ شوند. ارزیابی این خصوصیات مورفولوژیکی بر مبنای دستورالعمل اتحادیه بین‌ المللی حمایت از ارقام گیاهی انجام می‌ گردد (وان گاستل، ۱۹۹۶). یکنواختی نیز به مفهوم تضمین ثبات کیفیت، متمایز کننده رقم می‌ باشد که میزان آن وابسته به نحوه تکثیر گیاه است، به طوری که گیاهان خودگشن یکنواخت‌ تر از گیاهان دگرگشن می‌ باشند و در شرایط زراعی مکانیزه و مناطق اقلیمی همگن انتظار می‌ رود یکنواختی بیشتری داشته باشند. یکنواختی به سطح و نوع تغییراتی می‌ گویند که در فنوتیپ بین گیاهان داخل یک رقم ظاهر می‌ شود. منظور از پایداری یا ثبات این است که در طول دوره تکثیر یک رقم از طبقه هسته اولیه تا طبقه گواهی شده، خصوصیات متمایز کننده رقم تغییر نکرده و ثابت باقی بمانند. گیاهان خودگشن در مقایسه با گیاهان دگرگشن با ثبات‌ تر بوده، ارقام دورگ بی‌ ثبات بوده و بذور جدید آنها باید هر ساله تولید و در اختیار کشاورزان قرار گیرند (وان گاستل، ۱۹۸۸).

در مناطق مختلف کشور ارقام تجاری پنبه با نام‌های متفاوت استفاده می‌ شوند. طی پژوهش‌ های انجام شده در سالیان گذشته، جهت تفکیک و تمایز ارقام از یکدیگر، تعدادی از مهم‌ ترین ارقام تجاری پنبه گونه *G. hirsutum* با استفاده از بررسی صفات اشاره شده در شناسه که توسط اتحادیه بین‌ المللی حمایت از ارقام گیاهی^۵ (UPOV) ارائه شده است، مورد شناسایی و آزمون یکنواختی قرار گرفته‌ اند (حمیدی و همکاران، ۲۰۱۱؛ قاسمی بزدی و حمیدی، ۲۰۱۳)، اما تاکنون در زمینه گونه‌ های پنبه

-
1. Identification
 2. Registration
 3. Cultivar
 4. Distinctness, Uniformity and Stability test
 5. International Union for the Protection of New Varieties of Plants

G. barbadense پژوهشی صورت نگرفته است. لذا در پژوهش حاضر خصوصیات مورفولوژیکی متمایزکننده دو گونه تترالپوئید پنبه با یکدیگر مورد آزمون قرار گرفتند.

مواد و روش‌ها

به منظور اجرای آزمایش، بذور ارقام پنبه ساحل، گلستان، سپید، SKT-133، M-13 و لطیف (متعلق به گونه *Gossypium hirsutum*)، ترمز ۱۴، باربادنس و دکتر عمومی (متعلق به گونه *G. barbadense*) و با تراکم مناسب توصیه شده 20×80 سانتی‌متر در قالب طرح بلوك‌های کامل تصادفی در کرت‌هایی با ۸ خط ۸ متری که هر کرت شامل ۵۰۰ بوته بود، با ۴ تکرار در تاریخ مناسب توصیه شده (بیستم اردیبهشت، ۱۳۹۴) در ایستگاه تحقیقات پنبه هاشم‌آباد گرگان کشت شدند.

ایستگاه تحقیقات پنبه هاشم‌آباد یکی از ایستگاه‌های تحقیقاتی موسسه تحقیقات پنبه کشور، در ۱۱ کیلومتری غرب گرگان مرکز استان گلستان واقع است و ارتفاع آن از سطح دریا $13\frac{2}{3}$ متر می‌باشد. متوسط بیشینه و کمینه دما، میانگین بارندگی و رطوبت نسبی سالیانه این ایستگاه به ترتیب ۴۲ و ۱۳ درجه سانتی‌گراد، $45^{\circ}-55^{\circ}$ میلی‌متر و $50-60$ درصد است. بر اساس آمار ۲۰ ساله ایستگاه سینوپتیک هاشم‌آباد گرگان، متوسط میانگین، کمینه و بیشینه رطوبت نسبی $12/9$ و $22/9$ درجه سانتی‌گراد، میانگین، کمینه و بیشینه رطوبت نسبی هوا 53 ، 88 و 71 درصد و میانگین بارندگی $523/2$ میلی‌متر بود (وزارت کشاورزی امریکا^۱، ۲۰۱۴).

مراحل مختلف عملیات داشت در طول دوره رشد و نمو به طور معمول انجام گرفت. جهت مشاهده و یادداشت برداری خصوصیات مورفولوژیک، تعداد ۲۰ بوته به طور تصادفی از هر کرت انتخاب شدند و تمامی مشاهدات روی این بوتهای یا بخشی از آن‌ها صورت گرفت. خصوصیات مورد بررسی بر اساس دستورالعمل ملی آزمون‌های تمایز، یکنواختی و پایداری ارقام پنبه (صادقیان مطهر و همکاران، ۲۰۰۷) شامل خصوصیات گیاه از قبیل ارتفاع گیاه (در بلوغ سبز)، تعداد و طول شاخه‌های زایی و رویا و تعداد گرهای غوزه شامل تعداد و وزن غوزه‌ها، وزن صد دانه، عملکرد و شکل و چیزهای اول و دوم و میزان الیاف (درصد کیل الیاف) ارقام بود. به منظور مقایسه بهتر و دقیق‌تر ارقام با یکدیگر این صفات تا حد امکان به صورت داده‌های کمی اندازه‌گیری شدند. آنالیز واریانس داده‌ها و تجزیه همبستگی با استفاده از نرم افزار SAS و مقایسه میانگین داده‌ها با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال ۵ درصد انجام شد. به طور کلی فرض صفر آزمون تمایز دو رقم بر اساس صفات کمی، برابر بودن میانگین صفات متناظر آنها بود. در صورتی که تفاوت میانگین دو رقم از حداقل فاصله تعیین شده بیشتر بود به عنوان دو رقم

1. United States Department of Agriculture (USDA)

متمايز در نظر گرفته می شد. همچنین جهت بررسی بیشتر، مقایسه گروهی بین دو گونه *G. hirsutum* و *G. barbadense* انجام شد.

نتایج و بحث

بر اساس نتایج تجزیه واریانس داده ها، در همه تیمارهای آزمایشی مورد بررسی، اختلاف معنی دار آماری در سطح یک درصد مشاهده شد که این امر نشان دهنده وجود تفاوت های بارز و قابل تمایز از نظر این صفات در بین ۹ رقم پنبه مورد بررسی بود (جداول ۱ و ۲).

جدول ۱: تجزیه واریانس صفات بررسی شده در ارقام مورد آزمایش در ایستگاه تحقیقات پنبه هاشمآباد گرگان - سال ۱۳۹۴

میانگین مربعات (MS)								
تعداد گره تا پایین ترین شاخه زایا	طول متوسط بین گره های شاخه زایا	تعداد گره در شاخه زایا	طول شاخه زایا	طول بلندترین شاخه رویا	تعداد شاخه رویا	ارتفاع گیاه (سانسی مت)	درجه آزادی	منابع تغییرات
۴/۶۵ ns	۰/۰۱ ns	۰/۶۵ ns	۱۲/۵۶ ns	۵۰/۲۱ **	۰/۱۶ ns	۱۵۰/۱۸ ns	۳	تکرار
۲۱۶/۸۶ **	۳/۲۰ **	۴/۶۴ **	۹۰/۹۰ **	۱۱۲۸/۹۴ **	۱/۷۶ **	۷۹۵۳/۷۴ **	۸	زنوتیپ
۸/۲۶	۰/۰۳۳	۰/۰۳۰	۱۰/۰۵	۹۵/۲۹	۰/۰۱۹	۱۵۱/۳۹	۲۴	اشتباه
۱۷/۸۷	۹/۶۶	۱۲/۴۵	۱۴/۴۳	۲۴/۱۲	۱۹/۳۲	۱۱/۳۲		ضریب تغییرات (درصد)
۱۶/۰۸	۵/۹۹	۴/۴۶	۲۱/۹۷	۴۰/۴۶	۲/۲۶	۱۰۸/۸۸		میانگین کل

ns: غیر معنی دار؛ * و **: به ترتیب معنی دار در سطوح احتمال پنج و یک درصد.

جدول ۲: تجزیه واریانس صفات بررسی شده در ارقام مورد آزمایش در ایستگاه تحقیقات پنبه هاشمآباد گرگان - سال ۱۳۹۴

میانگین مربعات (MS)								
کیل الیاف (درصد)	عملکرد وش (کیلوگرم در هکتار)	عملکرد چین دوم (کیلوگرم در هکتار)	عملکرد چین اول (کیلوگرم در هکتار)	وزن صد دانه (گرم)	وزن غوزه (گرم)	وزن غوزه تعداد غوزه	درجه آزادی	منابع تغییرات
۰/۴۸ ns	۳۵۲۲۰/۱۲ ns	۲۱۱۴۲/۰۷ ns	۴۵۸۹۷۷/۴۳ ns	۰/۱۱ ns	۰/۰۵ ns	۲/۳۴ ns	۳	تکرار
۱۲۰/۹۲ **	۷۶۰۰۳۹/۵۱ **	۹۹۳۵۲/۳۲ **	۸۶۰۶۹۴/۴۳ **	۲/۸۰ **	۲/۱۳ **	۱۹۴/۱ **	۸	زنوتیپ
۰/۲۸	۱۴۰۳۲۳/۹۵	۲۷۸۴۹/۲۱	۱۱۷۸۳۷/۸۷	۰/۰۲۰	۰/۰۳	۲/۲۶	۲۴	اشتباه
۱/۴۵	۱۵/۳	۲۲/۲۲	۲۰/۲۳	۳/۸۸	۴/۰۹	۹/۱۵		ضریب تغییرات (درصد)
۳۷/۰۴	۲۴۴۷/۲۹	۷۵۱/۰	۱۶۹۶/۲۸	۱۱/۶۶	۴/۵۰	۱۶/۴۳		میانگین کل

ns: غیر معنی دار؛ * و **: به ترتیب معنی دار در سطوح احتمال پنج و یک درصد.

تمایز ارقام از پکدیگر و تفکیک آنها در گروه‌های مختلف بر اساس آزمون دانکن صورت گرفت که نتایج مقایسه میانگین داده‌ها بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی مختلف مورد بررسی به تفکیک توضیح داده خواهد شد.

ارتفاع گیاه: براساس نتایج جدول ۳، با وجود این‌که ارقام موجود در گونه *G. hirsutum* در سه گروه با ارتفاع گیاه خیلی کوتاه، متوسط قرار گرفتند، اما در مجموع ارتفاع کمتری نسبت به ارقام گونه دیگر داشتند. رقم گلستان با میانگین ارتفاع ۶۹ سانتی‌متر، کمترین ارتفاع را در بین تمام ارقام مورد مطالعه داشت و در گروه با ارتفاع خیلی کوتاه قرار گرفت. ارقام سپید، SKT-133، M-13 و لطیف به ترتیب با میانگین ارتفاع ۸/۵، ۸/۷، ۸/۸ و ۸۷/۹ سانتی‌متر در گروه با ارتفاع کوتاه قرار گرفتند و رقم ساحل با میانگین ارتفاع ۱۰/۸ سانتی‌متر ارتفاع متوسطی داشت. سه رقم مورد مطالعه از گونه *G. barbadense* از نظر ارتفاع گیاه در سه گروه مختلف قرار گرفتند. رقم ترمز ۱۴ با میانگین ارتفاع ۹۶/۹ سانتی‌متر در گروه با ارتفاع متوسط، رقم دکتر عمومی با میانگین ارتفاع ۱۴۱/۳ سانتی‌متر در گروه با ارتفاع بلند و رقم باربادنس با میانگین ارتفاع ۲۱۴/۶ سانتی‌متر در گروه با ارتفاع خیلی بلند قرار گرفتند. طبق نتایج همبستگی صفات (جدول ۷)، ارتفاع گیاه رابطه منفی و معنی‌داری با عملکرد داشت، به طوری که افزایش ارتفاع موجب افزایش عملکرد کل نشد. همان‌طور که نتایج مقایسه میانگین‌ها نیز نشان می‌دهد بیشترین عملکرد در رقم گلستان حاصل شد که کمترین ارتفاع بوته را داشت و از طرفی رقم باربادنس که بیشترین ارتفاع را داشت عملکرد متوسط و کمی را تولید کرد. رابطه منفی بین عملکرد و ارتفاع گیاه توسط سایر محققان نیز گزارش شده است (رمضان‌پور و همکاران، ۲۰۰۲؛ کاشیک و همکاران، ۲۰۰۳؛ گورو رجان و ساندر، ۲۰۰۴؛ قجری و اکرم قادری، ۲۰۰۶).

خصوصیات مربوط به شاخه‌های رویا: از نظر تعداد، رقم SKT-133 با میانگین ۱/۷۴ عدد، کمترین تعداد شاخه رویا را داشت و بیشترین تعداد با ۳/۹۵ عدد در رقم سپید مشاهده شد (جدول ۳). سایر ارقام در گروه تعداد شاخه رویای متوسط در محدوده ۱/۷۹ تا ۲/۳۸ عدد قرار گرفتند. از نظر طول بلندترین شاخه رویا نیز رقم ترمز ۱۴ با میانگین ۱۵/۵ سانتی‌متر کوتاه‌ترین شاخه‌های رویا را داشت و بلندترین شاخه رویا نیز با ۷۱ سانتی‌متر در رقم سپید مشاهده شد. رقم دکتر عمومی با میانگین ۲۳/۵ سانتی‌متر در گروه شاخه‌های رویای کوتاه، ارقام M-13 و باربادنس به ترتیب با ۳۶/۸ و ۲۷/۴ سانتی‌متر در گروه شاخه‌های رویای متوسط و ارقام ساحل، گلستان، SKT-133 و لطیف به ترتیب با ۵۱/۵، ۴۸/۹ و ۵۱/۵ سانتی‌متر در گروه شاخه‌های رویای بلند قرار گرفتند (جدول ۳).

جدول ۳: نتایج کلاسه‌بندی میانگین صفات مربوط به ویژگی‌های ظاهری گیاه در ارقام مورد آزمایش پنبه

حالت ظاهر	طول بلندترین شاخه رویا (سانتی‌متر)			تعداد شاخه رویا			ارتفاع گیاه در بلوغ سیز (سانتی‌متر)			رقم
	امتیاز	کلاس	حالت ظاهر	امتیاز	کلاس	حالت ظاهر	امتیاز	کلاس		
بلند	۴۸/۹	b	متوسط	۲/۱۰	b	متوسط	۱۰۸/۷	c	ساحل	
بلند	۵۱/۵	b	متوسط	۲/۱۸	b	خیلی کوتاه	۶۹/۰	e	گلستان	
خیلی بلند	۷۱/۰	a	زیاد	۳/۹۵	a	کوتاه	۸۸/۵	de	سپید	
بلند	۴۳/۸	b	کم	۱/۷۴	b	کوتاه	۸۸/۷	de	SKT-133	
متوسط	۳۶/۸	bc	متوسط	۱/۸۶	b	کوتاه	۸۲/۷	de	M-13	
بلند	۴۵/۸	b	متوسط	۲/۱۳	b	کوتاه	۸۷/۹	de	لطیف	
خیلی کوتاه	۱۵/۵	d	متوسط	۲/۳۸	b	متوسط	۹۶/۹	cd	ترمز	
متوسط	۲۷/۴	cd	متوسط	۱/۸۷	b	خیلی بلند	۲۱۴/۶	a	باریادنس	
کوتاه	۲۳/۵	cd	متوسط	۲/۱۵	b	بلند	۱۴۱/۳	b	دکتر عمومی	
	۱۴/۲۵			۰/۶۳			۱۷/۹۶		دامنه بحرانی دانک	

- میانگین‌های دارای حروف مشترک، از نظر آماری (در سطح احتمال ۵ درصد) در یک گروه قرار می‌گیرند.

بر اساس نتایج، مشاهده شد که خصوصیات مربوط به شاخه‌های رویا شامل تعداد شاخه رویا و طول بلندترین شاخه رویا از روند خاصی بین ارقام گونه‌های مختلف تبعیت نکردند و این صفات را نمی‌توان وابسته به گونه گیاهی دانست بهطوری که در بین ارقام مربوط به یک گونه پنبه نیز تنوع بسیار زیادی مشاهده شد. مثلاً در بین ۶ رقم مورد بررسی از گونه *G. hirsutum* در این مطالعه، تعداد شاخه‌های رویای کم، متوسط و زیاد با طول متوسط، بلند و خیلی بلند مشاهده شد. در بین ۳ رقم مورد بررسی از گونه کم، متوسط و زیاد با طول متوسط، بلند و خیلی بلند مشاهده شد. از ۳ رقم مورد بررسی از گونه *G. barbadense* نیز با وجود این که تعداد شاخه‌های رویا همگی در حد متوسط بودند اما طول بلندترین شاخه رویا به سه حالت خیلی کوتاه، کوتاه و متوسط مشاهده شد. از طرفی این دو خصیصه مربوط به شاخه‌های رویا را می‌توان از خصوصیات شاخص و بارز هر رقم دانست بهطوری که مثلاً بیشترین تعداد شاخه رویا و بلندترین طول شاخه رویا متعلق به رقم سپید بود. رقم SKT-133 که کمترین تعداد شاخه رویا را داشت، دارای طول شاخه‌های رویای بلندی بود و تعداد شاخه رویا در رقم ترمز ۱۴ که کوتاهترین شاخه‌های رویا را داشت، در حد متوسطی قرار داشت (جدول ۳).

خصوصیات مربوط به شاخه‌های زایا: از بین چهار صفت مربوط به شاخه‌های زایا (جدول ۴) در مورد دو صفت طول شاخه زایا و طول متوسط بین گرهای شاخه زایا نمی‌توان رابطه مشخصی را بین گونه پنبه و صفت مورد بررسی بیان کرد بلکه این صفات را باید جزو صفات مشخصه هر یک از ارقام دانست. به عنوان مثال، میانگین بلندترین طول شاخه زایا با ۲۹/۷ و ۲۹/۲ سانتی‌متر مربوط به ارقام سپید و دکتر عمومی بود

که اولی متعلق به گونه *G. hirsutum* و رقم دوم متعلق به گونه *G. barbadense* است. کوتاهترین طول شاخه زایا نیز با ۱۶/۶، ۱۸/۱ و ۱۸/۴ سانتی‌متر به ترتیب مربوط به ارقام باربادنس، گلستان و ترمز ۱۴ بودند که باز هم از هر دو گونه *G. barbadense* و *G. hirsutum* هستند.

از نظر تعداد گره‌های شاخه زایا، تمام ارقام گونه *G. hirsutum* دارای تعداد کم (۲/۷۶ گره) تا متوسط (۵/۰۱ گره) بودند ولی تمام ارقام گونه *G. barbadense* دارای تعداد زیاد (۱۵/۵ گره) تا خیلی زیاد (۵/۸۳ گره) بودند (جدول ۴). لذا می‌توان گفت تعداد گره‌های شاخه زایا در ارقام گونه‌های *G. barbadense* بیش‌تر از ارقام گونه *G. hirsutum* است. تعداد گره‌ها تا پایین‌ترین شاخه زایا نیز در ارقام گونه *G. hirsutum* از محدوده خیلی کم (۹ عدد در رقم سپید) تا متوسط (۲۱/۵) عدد در رقم ساحل (بود که در مورد این صفت نیز، ارقام مذکور دارای تعداد گره کمتری نسبت به ارقام گونه دیگر بودند که در محدوده متوسط (۱۳/۱۹ عدد در رقم دکتر عمومی) تا خیلی زیاد (۳۲/۷) عدد در رقم باربادنس) بود (جدول ۴).

نتایج همبستگی (جدول ۷) نشان داد بین تعداد گره تا پایین‌ترین شاخه زایا و ارتفاع گیاه رابطه قوی، مثبت و معنی‌داری ($r=+0.89$) وجود داشت. نتایج مقایسه میانگین‌ها نیز این مطلب را تأیید کردند. به طوری که افزایش تعداد گره در رقم باربادنس به افزایش در ارتفاع گیاه منتهی شد. از طرفی ارتفاع گیاه در سایر ارقام که تعداد گره کمتری داشتند، کوتاه‌تر بود.

تعداد غوزه و وزن غوزه: بر اساس نتایج جدول ۵، دو صفت تعداد غوزه و وزن غوزه را به احتمال زیاد می‌توان به نوع گونه پنیه پنهان نسبت داد به‌طوری که ارقام گونه *G. hirsutum* همگی دارای تعداد غوزه زیاد تا خیلی زیاد بودند اما ارقام گونه *G. barbadense*، بر عکس دارای تعداد غوزه زیاد تا خیلی زیاد و وزن غوزه کم تا متوسط بودند. در ارقام مورد بررسی در این پژوهش، تعداد غوزه در بین ارقام گونه *G. hirsutum* به‌طور متوسط بین ۱۰/۹ عدد در رقم SKT-133 تا ۱۳/۶ عدد در رقم سپید و وزن غوزه بین ۴/۸۲ گرم در رقم گلستان تا ۵/۲۹ گرم در رقم ساحل متغیر بود اما در بین ارقام گونه *G. barbadense* کمترین تعداد غوزه با میانگین ۱۹ عدد متعلق به رقم ترمز ۱۴ و بیش‌ترین تعداد با ۳۲/۷ عدد متعلق به رقم دکتر عمومی بود. وزن غوزه نیز در بین ارقام این گونه به‌طور متوسط از ۳/۲۵ گرم در رقم باربادنس تا ۳/۹۷ گرم در رقم دکتر عمومی متغیر بود (جدول ۵). لذا همان‌طوری که ملاحظه می‌شود اختلاف زیادی از نظر این صفت بین دو گونه مذکور وجود داشت به‌طوری که کمترین تعداد غوزه در بین ارقام گونه *G. barbadense* خیلی بیش‌تر از بیش‌ترین تعداد غوزه ارقام گونه *G. hirsutum* بود و بر عکس بیش‌ترین وزن غوزه در بین ارقام گونه *G. barbadense* خیلی کمتر از کمترین وزن غوزه ارقام گونه *G. hirsutum* بود (جدول ۵). کمالی و همکاران (۲۰۱۵) نیز تعداد غوزه در بوته را یکی از صفات متمایز کننده ارقام معرفی کردند.

جدول ۳: تاثیر کلاسیفیکاتور مبنای صفات مربوط به شاخه‌های زیاد در درازام مود آزمایش پنجه

تعداد گرهای شاخه زیا (در مرحله گلدهی)	تعداد گرهای شاخه زیا (پایین ترین شاخه زیا)	طول متوسط بین گرهای شاخه زیا		تعداد گرهای شاخه زیا		طول شاخه رایا (ساخته منه)	
		امتیاز	کلاس	امتیاز	کلاس	امتیاز	کلاس
متوسط	۱/۵	b	c	۴/۶	c	۷/۱۲	c
کم	۱۲/۶	c	c	۴/۹/۶	c	۷/۷/۶	c
خیلی کم	۹/۰	c	بلند	۸/۸/۸	ab	۷/۳/۵	c
کم	۱۱/۴	c	بلند	۹/۹/۳	a	۵/۵	ab
م	۱۷/۲	c	متوسط	۵/۹	b	۷/۸/۸	b
کم	۱۲/۷	c	بلند	۹/۰/۷	ab	۷/۸/۵	b
کم	۱۲/۲	c	بلند	۸/۲/۸	ab	۵/۱۵	ab
خیلی زیاد	۳۲/۷	a	بلند	۶/۳	ab	۸/۸/۳	a
متوسط	۱۹/۴	b	بلند	۸/۵/۸	ab	۵/۱۵	ab
				۸/۰		۱/۱۰	
						۴/۱۹	

دالمه بحثی دانکن
- میانگین‌های درای حروف مشترک، از نظر آماری (در سطح اختیال ۵ درصد) در یک گروه قرار می‌گیرند.

- میانگین‌های درای حروف مشترک، از نظر آماری (در سطح اختیال ۵ درصد) در یک گروه قرار می‌گیرند.

طبق نتایج، ضرایب همبستگی حاکی از وجود رابطه معنی‌دار و منفی بین تعداد غوزه با وزن غوزه داشت و افزایش تعداد غوزه منجر به کاهش وزن (اندازه) غوزه گردید. وزن غوزه با درصد الیاف و عملکرد کل نیز رابطه قوی، مثبت و معنی‌داری داشت (جدول ۷). تعداد غوزه کمتر با افزایش در وزن غوزه جبران گردید به طوری که ارقامی که وزن غوزه بیشتری داشتند عملکرد کل بیشتری نیز تولید کردند. در پژوهش حاضر، بین وزن غوزه با ارتفاع بوته و تعداد شاخه رویا رابطه منفی وجود داشت که با نتایج قجری و اکرم قادری (۲۰۰۶) مطابقت داشت. به عبارتی با افزایش تعداد شاخه رویا و ارتفاع بوته وزن غوزه کاهش یافته است. با توجه به این که با افزایش ارتفاع بوته و تعداد شاخه رویا، فتوسنتز جاری انجام شده صرف نگهداری و رشد این اندامها می‌گردد، لذا ماده فتوسنتزی کمتری در اختیار رشد و توسعه غوزه قرار می‌گیرد و به همین علت وزن غوزه کاهش پیدا می‌کند (قجری و اکرم قادری، ۲۰۰۶).

وزن صد دانه: این صفت ارتباط زیادی به نوع گونه پنیه داشت به‌طوری که براساس نتایج جدول ۵؛ کمترین وزن صد دانه با $10/4$ گرم مربوط به رقم سپید از گونه *G. hirsutum* بود. وزن صد دانه در تمام ارقام گونه *G. barbadense* زیاد و بین $12/6$ تا $12/3$ گرم بود ولی ارقام مورد مطالعه از گونه *G. hirsutum* در دو گروه متوسط و زیاد قرار گرفتند و بین $10/4$ گرم در رقم سپید تا $12/1$ گرم در رقم ساحل متغیر بودند. نتایج تجزیه همبستگی (جدول ۷) نشان دهنده رابطه منفی بین وزن صد دانه با درصد کیل الیاف (میزان الیاف نسبت به وش) بود، هر چند که این رابطه منفی دار نبود، اما مقایسه میانگین‌های وزن صد دانه (جدول ۵) با درصد کیل الیاف (جدول ۶) نشان می‌دهد که رابطه منفی بین این دو صفت وجود داشته است. به نظر می‌رسد ارقامی که وزن دانه بیشتری دارند به دلیل این که حجم (وزن) بیشتری از غوزه به دانه‌ها اختصاص می‌یابد از میزان الیاف آن کاسته می‌شود. همان‌طور که مشاهده می‌شود ارقام گونه *G. barbadense* (ترمز ۱۴، باربادس و دکتر عمومی) که بیشترین وزن دانه را داشتند کمترین میزان الیاف را تولید کردند (جدول ۵ و ۶). در تحقیق رمضان‌پور و همکاران (۲۰۰۲) بین وزن صد دانه با عملکرد الیاف رابطه منفی وجود داشت، بنابراین برای افزایش عملکرد الیاف باید ارقامی با وزن بذر کمتر مورد استفاده قرار گیرند.

خصوصیات مربوط به عملکرد وش: عملکرد مهم‌ترین خصوصیتی است که در اکثر موارد، پژوهش‌ها به آن ختم می‌شود. این صفت نیز از خصوصیات قابل تمایز بین گونه‌های مختلف پنیه به حساب می‌آید. ارقام گونه *G. barbadense* با عملکردهای در محدوده 1766 تا 2027 کیلوگرم در هکتار دارای عملکرد وش کم تا متوسط بودند اما بیشترین عملکردها در ارقام گونه *G. hirsutum* مشاهده شد که همگی دارای عملکردهای زیاد تا خیلی زیاد بودند (جدول ۶). در بین این ارقام، گلستان با 3095 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد را در بین کلیه ارقام مورد بررسی داشت. لذا همان‌طوری که ملاحظه می‌شود اختلاف زیادی از نظر این صفت بین دو گونه مورد بررسی وجود داشت به‌طوری که

کمترین عملکرد وش در بین ارقام گونه *G. hirsutum* ۲۴۷۵ کیلوگرم در هکتار در رقم SKT-133 خیلی بیشتر از بیشترین عملکرد وش ارقام گونه *G. barbadense* ۲۰۲۷ کیلوگرم در هکتار در رقم دکتر عمومی) بود.

جدول ۵: نتایج کلاسه‌بندی میانگین صفات مربوط به غوزه و بذر در ارقام مورد آزمایش پنجه

رقم	کلاس	امتیاز	حالت تظاهر	کلاس	امتیاز	وزن غوزه (گرم)	وزن صد دانه (گرم)		تعداد غوزه
							اظاهر	کلاس	
ساحل	cd	۱۲/۷	متوسط	a	۵/۲۹	خیلی زیاد	ab	زیاد	۱۲/۱
گلستان	cd	۱۳/۱	متوسط	b	۴/۸۲	زیاد	ab	زیاد	۱۲/۰
سپید	c	۱۳/۶	متوسط	b	۴/۹۳	زیاد	e	متوسط	۱۰/۴
SKT-133	d	۱۰/۹	کم	b	۴/۹۹	زیاد	bc	متوسط	۱۱/۵
M-13	cd	۱۱/۶	متوسط	b	۴/۸۳	زیاد	cd	متوسط	۱۱/۱
لطیف	c	۱۳/۴	متوسط	b	۴/۹۶	زیاد	de	متوسط	۱۰/۶
ترمز	b	۱۹/۰	زیاد	d	۳/۵۲	کم	a	کم	۱۲/۶
باریادنس	b	۲۱/۰	زیاد	d	۳/۲۵	کم	a	کم	۱۲/۶
دکتر عمومی	a	۳۲/۷	خیلی زیاد	c	۳/۹۷	متوسط	a	زیاد	۱۲/۳
دامنه بحرانی دانکن	۲/۱۹			۰/۲۶	۰/۶۶				

- میانگین‌های دارای حروف مشترک، از نظر آماری (در سطح احتمال ۵ درصد) در یک گروه قرار می‌گیرند.

به طور کلی در همه ارقام، عملکرد وش در چین اول بیشتر از عملکرد وش در چین دوم بود (جدول ۶). عملکرد وش در چین اول بیشترین همبستگی ($r=0.92$) را با عملکرد کل وش داشت در حالی که عملکرد وش در چین دوم با عملکرد کل وش معنی‌دار نبود (جدول ۷). مردیت و بریج (۱۹۷۲) در رابطه با اثر عوامل محیطی بر وزن غوزه‌ها دریافتند که با نزدیک شدن به انتهای فصل رشد به علت نامناسب شدن وضعیت درجه حرارت و تشعشع خورشیدی، غوزه‌هایی که در این مرحله به وجود می‌آیند وزن کمتری خواهند داشت، بنابراین منطقی به نظر می‌رسد که چین‌های دوم و سوم شامل غوزه‌های سبکتری نسبت به چین اول باشند. جنکینز و همکاران (۱۹۷۱) گزارش کردند که در اختصاص ماده فتوستنتزی، اولویت با غوزه‌هایی است که زودتر تشکیل می‌شوند و به همین دلیل غوزه اول شاخه‌های زایشی نسبت به غوزه‌های دوم و سوم بهتر ترتیب ۱۴ و ۲۱ درصد سنگین‌تر بود. کمالی و همکاران (۲۰۰۹) با بررسی همبستگی و روابط علت و معلولی عملکرد ارقام پنجه به این نتیجه رسیدند که عملکرد وش همبستگی مثبت و معنی‌داری با چین اول دارد.

جدول یو-تایج کلاسی بدی میاگین صفات مریب به عملکرد را قام مرور آزمایش پنیه

ردیف	رقم	عملکرد وش جینن اول		عملکرد وش جینن دوم		عملکرد کل وش		عملکرد کلی (کیلوگرم در هکتار)		عملکرد کلی (کیلوگرم در هکتار)	
		کلاس	امتیاز	حالات ظاهر	کلاس	امتیاز	حالات ظاهر	کلاس	امتیاز	حالات ظاهر	کلاس
۱	۱۵۰	cd	متوسط	خیلی زیاد	۷۵۶۴	a	متوسط	خیلی زیاد	۹۶۶	b	متوسط
۲	۲۳۹.۸	a	زیاد	زیاد	۷۰.۹۵	a	متوسط	متوسط	۹۷	b	زیاد
۳	۱۹۰.۶	abc	زیاد	زیاد	۷۴۸۳	ab	متوسط	متوسط	۷۷	b	زیاد
۴	۱۸۲۲	bc	زیاد	زیاد	۷۴۷۵	bcd	متوسط	متوسط	۶۵۳	bc	زیاد
۵	۲۲۴۴	ab	خیلی زیاد	خیلی کم	۷۷۷۲	ab	خیلی کم	خیلی کم	۵۲۸	c	خیلی زیاد
۶	۱۸۱۴	bc	زیاد	زیاد	۷۴۷۴	ab	زیاد	زیاد	۸۶۳	ab	زیاد
۷	۱۳۵۸	cd	کم	کم	۱۹۵۷	d	کم	کم	۶۰.۹	b	کم
۸	۱۰۱	d	کم	کم	۱۷۶۴	e	متوسط	متوسط	۷۵۵	bc	کم
۹	۱۲۱۴	d	کم	کم	۷۰.۲۷	cde	متوسط	متوسط	۸۱۳	ab	کم
۱۰	۲۴۳۱.۵	۵۰۷۰	۱۵۱۹								

- میاگین‌های دارای حروف مشترک، از نظر آماری بینند.

- میاگین‌های دارای حروف مشترک، از نظر آماری بینند.

درصد کیل الیاف (میزان الیاف): این صفت نیز یکی از خصوصیاتی بود که در گونه‌های مختلف پنبه متفاوت بود و در بسیاری از موارد تمایز نشان داد. درصد کیل مشخص کننده نسبت وزنی الیاف به عملکرد و شر تولیدی می‌باشد که هر چه درصد کیل بیشتر باشد مقدار الیاف تولیدی بیشتر خواهد بود. مطالعات مختلف نشان دادند که با افزایش تعداد دانه در غوزه و اندازه دانه، درصد کیل کاهش می‌یابد (رمضان‌پور و همکاران، ۲۰۰۲). وزن دانه نیز با درصد کیل الیاف همبستگی منفی و معنی‌داری نشان داد، هر سه رقم گونه *G. barbadense* مورد بررسی در این پژوهش دارای کمترین درصد کیل الیاف بودند و در گروه با درصد کیل الیاف خیلی کم (بین ۲۹/۱ تا ۳۰/۱ درصد) قرار گرفتند. در حالی که ارقام گونه *G. hirsutum* همگی دارای درصد کیل الیاف متوسط تا خیلی زیاد و در مجموع بالاتر از گونه *G. barbadense* بودند. در بین این ارقام، سپید، لطیف و SKT-133 به ترتیب با ۴۰/۱، ۴۰ و ۴۱/۱ درصد دارای کیل زیاد بودند و رقم گلستان با میانگین ۴۲/۲ درصد در گروه ارقام با درصد کیل الیاف خیلی زیاد قرار گرفت و بالاترین درصد کیل الیاف را در بین تمام ارقام مورد بررسی نشان داد (جدول ۶). لذا صفت درصد کیل الیاف را نیز می‌توان مربوط به خصوصیت گونه‌ای ارقام مختلف دانست ضمن این‌که در ارقام درون هر گونه نیز تمایز کاملاً مشخصی بر اساس این صفت مشاهده شد.

مقایيسات گروهی: نتایج مقایيسات گروهی بین ارقام دو گونه *G. hirsutum* و *G. barbadense* در جدول ۸ ارائه شده است. این نتایج اختلاف بین دو گونه را از نظر اکثر صفات در سطح احتمال بک درصد معنی‌دار نشان داد اما از نظر صفاتی از جمله طول شاخه زیا، تعداد شاخه رویا و عملکرد چین دوم اختلاف معنی‌داری بین دو گونه وجود نداشت (جدول ۸).

طبق نتایج مقایيسات گروهی، گونه *G. hirsutum* نسبت به گونه *G. barbadense* از نظر صفات درصد کیل الیاف، طول بلندترین شاخه رویا، عملکرد چین اول، عملکرد کل و وزن غوزه برتری داشت به طوری که گونه *G. hirsutum* از نظر میزان کیل الیاف ۱۰/۹ درصد، طول بلندترین شاخه رویا ۲۷/۴۸ سانتی‌متر، عملکرد چین اول ۷۵۳/۱۵ کیلوگرم در هکتار، عملکرد کل ۷۹۱/۵۵ کیلوگرم در هکتار و وزن غوزه ۱/۳۹ گرم بیشتر از میانگین گونه *G. barbadense* بوده است.

حدول، لا يضر اس همیستگ، خطه، نیز کلیه صفات مواد نم (رسی)، در آن قام مواد آنها بش نشنه

X_1 (ارتفاع گیاه)، X_2 (تعداد شاخه روبه)، X_3 (طول بلندترین شاخه روبه)، X_4 (طول شاخه زایا)، X_5 (تعداد گره شاخه زایا)، X_6 (طول متوسط بین گره‌های شاخه زایا)، X_7 (تعداد گره تا پایین ترین شاخه زایا)، X_8 (تعداد غوره)، X_9 (وزن غوره)، X_{10} (وزن صد دانه)، X_{11} (درصد الیاف)، X_{12} (عملکرد چین اول)، X_{13} (عملکرد چین دوم) و X_{14} (عملکرد کل وش).

جدول ۸: مقایسات گروهی (اورتوگونال) صفات مختلف بین دو گونه *G. barbadense* و *G. hirsutum*

تفاوت بین دو گونه	میانگین گونه <i>G. barbadense</i>	میانگین گونه <i>G. hirsutum</i>	Pr>F	F	SSQ	صفات مورد مقایسه
۰/۸۸	۲۱/۳۸	۲۲/۲۶	۰/۴۴	۰/۶۱	۶/۱۲	طول شاخه زایا (سانتی‌متر)
۱/۳۷	۵/۳۷	۴/۰۰	۰/۰۰۰۱	۴۹/۰۷	۱۵/۱۴	تعداد گره‌های شاخه زایا
۰/۵۹	۶/۳۹	۵/۸۰	۰/۰۰۰۸	۸/۲۲	۲/۷۶	طول متوسط بین گره‌های شاخه زایا
۸/۵۱	۲۱/۷۵	۱۳/۲۴	۰/۰۰۰۱	۶۹/۹۶	۵۷۸/۴۹	تعداد گره‌های تا پایین‌ترین شاخه زایا
۶۳/۳۳	۱۵۰/۹۰	۸۷/۵۷	۰/۰۰۰۱	۲۱۱/۹۴	۳۲۰۸۶/۷۷	ارتفاع گیاه (سانتی‌متر)
۱/۲۲	۱۲/۴۸	۱۱/۲۶	۰/۰۰۰۱	۵۸/۱۰	۱۱/۹۴	وزن صد دانه (گرم)
۱۰/۹	۲۹/۷۸	۴۰/۶۸	۰/۰۰۰۱	۳۲۸۱/۸۵	۹۵۰/۳۸	درصد کیل الیاف
۰/۱۹	۲/۱۳	۲/۲۲	۰/۲۲	۱/۵۴	۰/۲۹	تعداد شاخه رویا
۲۷/۴۸	۲۲/۱۴	۴۹/۶۲	۰/۰۰۰۱	۶۳/۳۹	۶۰۴۰/۸۳	طول بلندترین شاخه رویا (سانتی‌متر)
۷۵۳/۱۵	۱۱۹۴/۱۸	۱۹۴۷/۳۳	۰/۰۰۰۱	۳۸/۵۱	۴۵۳۷۸۵۴/۶۴	عملکرد چین اول (کیلوگرم در هکتار)
۳۸/۴	۷۲۵/۴۰	۷۶۳/۸۰	۰/۵۲	۰/۴۲	۱۱۷۹۶/۲۷	عملکرد چین دوم (کیلوگرم در هکتار)
۱۱/۶۹	۲۴/۲۲	۱۲/۵۳	۰/۰۰۰۱	۴۸۳/۵۴	۱۰۹۳/۵۶	تعداد غوزه
۷۹۱/۵۵	۱۹۱۹/۵۹	۲۷۱۱/۱۴	۰/۰۰۰۱	۳۵/۷۲	۵۰۱۲۳۸۰/۹۸	عملکرد کل (کیلوگرم در هکتار)
۱/۳۹	۳/۵۷	۴/۹۶	۰/۰۰۰۱	۴۵۴/۱۳	۱۵/۴۱	وزن غوزه (گرم)

از طرفی گونه *G. barbadense* از نظر صفاتی از جمله تعداد گره‌های شاخه زایا، طول متوسط بین گره‌های شاخه زایا، تعداد گره‌ها تا پایین‌ترین شاخه زایا، ارتفاع گیاه، وزن صد دانه و تعداد غوزه بیشتر از گونه *G. hirsutum* بود به طوری که گونه *G. barbadense* از نظر تعداد گره‌های شاخه زایا ۱/۳۷ سانتی‌متر، طول متوسط بین گره‌های شاخه زایا ۰/۵۹ سانتی‌متر، تعداد گره‌ها تا پایین‌ترین شاخه زایا ۸/۵۱ سانتی‌متر، ارتفاع گیاه ۶۳/۳۳ سانتی‌متر، وزن صد دانه ۱/۲۲ گرم و تعداد غوزه ۱۱/۶۹ عدد بیشتر از گونه *G. hirsutum* بود، اما بالا بودن مقادیر این صفات در گونه *G. barbadense* به عملکرد کل منتهی نشد (جدول ۸). از طرفی در گونه *G. hirsutum* بالا بودن درصد کیل الیاف، طول بلندترین شاخه رویا، عملکرد چین اول و وزن غوزه به افزایش عملکرد کل منتهی شد. بنابراین می‌توان این گونه نتیجه گرفت که بالا بودن صفات یاد شده نسبت به سایر صفات زراعی بیشترین تأثیر را بر عملکرد نهایی دارد.

نتیجه‌گیری کلی

به طور کلی در بین ارقام پنیه مورد بررسی در این پژوهش، بیشترین ارتفاع گیاه به رقم باربادنس از گونه *G. barbadense* به میزان ۲۱۴/۶ سانتی‌متر و کمترین آن به رقم گلستان از گونه *G. hirsutum* با ۶۹ سانتی‌متر اختصاص یافت. بیشترین (۳/۹۵ عدد) و کمترین (۱/۷۴ عدد) تعداد شاخه رویا مربوط به ارقام سپید و SKT-133 بود که هر دو متعلق به گونه *G. hirsutum* بودند. بیشترین تعداد گره‌های شاخه زایا به میزان ۵/۸۳ عدد در رقم باربادنس مشاهده شد. ارقام ساحل، گلستان و سپید از گونه *G. hirsutum* با کمترین تعداد گره شاخه زایا در یک گروه آماری قرار گرفتند. ارقام دکتر عمومی از گونه *G. barbadense* و SKT-133 از گونه *G. hirsutum* به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد غوزه را تولید کردند. وزن غوزه از ۵/۲۹ تا ۳/۲ گرم متغیر بود که کمترین آن به رقم باربادنس از گونه *G. barbadense* و بیشترین آن به رقم ساحل از گونه *G. hirsutum* اختصاص یافت. درصد کیل الیاف از ۲۹/۱ تا ۴۲/۲ درصد متغیر بود. رقم گلستان بیشترین درصد کیل الیاف را تولید کرد و ارقام باربادنس، ترمز ۱۴ و دکتر عمومی به طور مشترک کمترین میزان کیل را داشتند و در یک گروه آماری قرار گرفتند. عملکرد وش در رقم گلستان به طور معنی‌داری بیشتر از سایر ارقام بود و رقم باربادنس کمترین عملکرد وش را تولید کرد. با توجه به پایین بودن عملکرد رقم باربادنس در چین‌های اول و دوم و درصد کیل الیاف، کاهش عملکرد کل وش در این رقم دور از انتظار نبود. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، صفاتی از جمله خصوصیات مربوط به شاخه‌های رویا و زایا از روند خاصی در بین ارقام تبعیت نکردن و به همین علت این صفات را نمی‌توان وابسته به گونه دانست. از طرفی تعداد غوزه، وزن غوزه و وزن صد دانه را می‌توان به نوع گونه نسبت داد به طوری که ارقام مختلف گونه *G. barbadense* بیشترین وزن صد دانه را تولید نمودند و در مقابل ارقام گونه دیگر کمترین میزان آن را داشتند. در رابطه با همبستگی بین صفات، عملکرد کل وش رابطه قوی، مثبت و معنی‌داری با وزن غوزه و عملکرد وش در چین اول داشت. در مقابل تعداد غوزه رابطه منفی و معنی‌داری بر درصد کیل الیاف داشت. طبق نتایج مقایسات گروهی، گونه *G. hirsutum* از نظر صفات درصد کیل الیاف، طول بلندترین شاخه رویا، عملکرد چین اول، عملکرد کل و وزن غوزه نسبت به گونه *G. barbadense* برتری داشت به طوری که بالا بودن این صفات نسبت به سایر صفات زراعی بیشترین تأثیر را بر عملکرد نهایی داشتند. با توجه به اثر این صفات در عملکرد نهایی، آگاهی از روابط بین صفات و تأثیر آن بر عملکرد کل می‌تواند در افزایش تولید این گیاه ارزشمند مفید باشد. به طور مثال به دلیل اثر مثبت وزن غوزه و عملکرد وش در چین اول بر عملکرد نهایی، می‌توان از ارقامی با وزن غوزه بالاتر یا عملکرد وش بیشتر در چین اول استفاده نمود. همچنین با افزایش وزن غوزه و کاهش تعداد غوزه از طریق مدیریت زارعی نظیر تراکم و انتخاب ارقام مناسب می‌توان به عملکردهای بالاتر دست یافت.

منابع

1. El-Sebae Ahmad, S. 1989. Variety release and promotion of quality seed. Pp:34-40 In: Seed production technology. By: Srivastava, J.P., and Simarski, L.T., (eds), International Center for Agric. Res. in the Dry Areas (ICARDA). Aleppo. Syria.
2. Ghajari, A., and Akram Ghaderi, F. 2006. Influence of row Spacing and Population Density on Yield and Yield Components off Three Cotton Cultivars in Gorgan. J. Agric. Tural Sci. 12 (4): 833-844.
3. Ghasemi Bezdi, K., and Hamidi A. 2013. Evaluation of distinctness, uniformity and stability of Cotton (*Gossypium hirsutum* L.) superior cultivars by using morphological characteristics. Final report of research project. Register 43049/07. Cotton Res. Inst. Pub. 56 pp.
4. Gururajan, K.N., and Sunder, S. 2004. Yield component analysis in American cotton. Proc. Int. Symp. On Strategies for Sustainable Cotton Production. 201-204.
5. Hamidi A., Ghasemi Bezdi K., Baniani E., and Hekmat M.H. 2011. Identification and registration of cotton (*Gossypium hirsutum* L.) cultivars using morphological characteristics. Final report of research project. Register 89/1761. Seed and Plant Certification and Registration Inst. Iran Pub. 106 pp.
6. Kamali, A., Fakheri, B.A., and Zabet, M. 2015. The study of drought stress effects on yield and yield component of cotton using biplot analysis. Iranian J. Cotton Res. 3 (1): 33-47.
7. Kaushik, S.K., Kapoor, C.J., and Koli, N.R. 2003. Association and path analysis in American cotton (*G. hirsutum* L.). J. Cotton Res. Dev. 17: 24-26.
8. Koucheki, A. 1994. agriculture in arid areas. Fourth Edition. 200 p.
9. Meredith, Jr, W.R. 1984. Quantitative genetics, In: Cotton, pp: 151-201, By: Kohl, R.J. and Lewis, C.F. No. 24, American Society of Agronomy, Inc., Crop Science Society of America, Inc., Soil Science Society of America Inc., Publishers, Madison, Wisconsin, USA.
10. Meredith, Jr, W.R., and Bridge, R.R. 1972. Heterosis and gene action in cotton, *Gossypium hirsutum* L. Crop Sci. 12: 304-310.
11. Naseri, F. 1995. Cotton. Astan Quds Razavi, Mashhad.
12. Ramezanpour, S.S., HosseiniZadeh, A.H., Zeinali, H. 2002. A Study on Relationship Between Morphological and Agronomic Traits, and Seedcotton yield in 56 Glandless cotton Varieties (*Gossypium hirsutum* L.) Using Multivariate Statistical Methods. Iranian, J. Agric. Sci. 33 (1): 103-113.
13. Sadeghian Motahhar, S.I., Mozaffari, J., Jalal Kamali, M., Dehghani Shoraki, I., Ahmadi, M.R., Shafadin, S., Khaksar, K., Khazaei, F., VafeaiTabar, M., Abasail, M., Jamali, S.H. 2007. National guidelines tests for distinctness,

- uniformity and stability in tetraploid cotton. Press registration Res. Institute's certification of seeds and seedlings. 27 p.
- 14.USDA. 2014. Long term Golestan province weather almanac. Golestan province meteorology office scientific gazette. Anonymous. Cotton world supply, use, and trade. Available at www.fas.usda.gov/cotton/current.
- 15.Van Gastel, A.J.G. 1988. Introduction to the practical on varietal identification and verification. Pp: 127-135 In: Quality seed production, By: Van Gastel, A.J.G., and Kerley, J. (eds), International Center for Agric. Res. Dry Areas (ICARDA), Aleppo, Syria.
- 16.Van Gastel, A.J.G. 1996. Variety evaluation. Pp :141-150 In: Seed science and technology, By: Van Gastel, A.J.G., Pagnotta, D.M., and Porceddu, E. (eds), International Center for Agric. Res. in the Dry Areas (ICARDA), Aleppo, Syria.
- 17.Zhang, B.H., Li, U., and Yao, C.B. 2000. Plant regeneration via somatic embryogenesis in cotton. Plant Cell, Tiss. Org. Cult. 60: 89-94.