

گزارش موردنی از بروز سقط فراموش شده در حاملگی سرویکال

دکتر بی بی شهناز عالی

خلاصه

در این مقاله وقوع سقط فراموش شده در حاملگی سرویکال در یک زن ۳۸ ساله P2G1۰۰۱ گزارش می‌گردد. این بیمار به علت ادامه خونریزی واژینال بعد از کورتاژی که ۱۴ روز قبل در بیمارستان دیگری برای وی انجام شده بود، مراجعه کرد. گزارش پاتولوژی وی بیان کننده سقط فراموش شده بود. با توجه به شواهد سونوگرافی، بیمار با تشخیص تخلیه ناقص رحم مجدداً تحت کورتاژ قرار گرفت. در جریان عمل به علت خونریزی شدید و غیرقابل کنترل تصمیم به لاپاراتومی و هیسترکتومی گرفته شد. در لاپاراتومی با وجود سرویکس متسع تشخیص حاملگی سرویکال گذاشته شد و برای متوقف ساختن خونریزی، هیسترکتومی با حفظ تخمدان‌ها صورت گرفت. بعد از چهار روز بیمار با حال عمومی خوب از بیمارستان مرخص گشت. گزارش پاتولوژی نشان‌دهنده کاشته شدن و نفوذ گفت در ناحیه آندوسرویکس رحم بود.

واژه‌های کلیدی: حاملگی سرویکال، سقط فراموش شده، هیسترکتومی

ماه پیش با سزارین متولد شده بود. بیمار ذکر می‌کرد که ۱۴ روز پیش به دلیل دو ماه تأخیر قاعدگی و بروز خونریزی واژینال سونوگرافی شده است. گزارش سونوگرافی وی با توجه به تصاویری با اکوی مخلوط و واضح نبودن جنین، سقط فراموش شده یا حاملگی مولار را مطرح کرده بود. به این ترتیب بیمار تحت کورتاژ قرار

بروز سقط فراموش شده در حاملگی سرویکال

در این مقاله وقوع سقط فراموش شده در حاملگی سرویکال، در زن ۳۸ ساله‌ای گزارش می‌شود که در حاملگی دوم به علت ادامه خونریزی واژینال پس از کورتاژی که ۱۴ روز قبل در بیمارستان دیگری برای وی انجام شده بود، مراجعه کرد. وی یک فرزند داشت که ۱۷

لاپاراتومی مشاهده شد، عبارت بود از یک جسم رحم در حد طبیعی و یک سرویکس قهوه‌ای و بسیار متسع که به قدری نازک شده بود که نسوج جفتی به راحتی از ورای آن قابل روئیت بود. با تشخیص حاملگی سرویکال برای متوقف ساختن خون‌ریزی بیمار اقدام به هیسترکتومی کامل بدون برداشتن آدنکس‌ها شد. چهار روز بعد بیمار با حال عمومی نسبتاً خوب از بیمارستان مرخص شد. گزارش پاتولوژی نمونه رحمی وی کاشته شدن تروفوبلاست‌ها را در قسمت آندوسرویکس نشان داد.

بحث

حاملگی سرویکال یک شکل بسیار نادر از حاملگی خارج رحمی است که به عنوان کاشته شدن بلاستوسیست در داخل کانال سرویکال تعریف می‌شود. بروز این عارضه بخاطر تنوع معیارهای تشخیصی از ۱۱۸۰۰ تا ۱۹۵۰۰۰ کل موارد حاملگی گزارش می‌شود (۲). عواملی نظیر سقط درمانی قبلی، سندرم آشرمن، سزارین قبلی، میوم رحمی و روش‌های کمک‌باروری مثل IVF در پیدایش این عارضه مؤثرند (۱۰). نقش عواملی مثل سن و حاملگی‌های متعدد در ایجاد بیماری مورد بحث است (۲).

معیار تشخیصی حاملگی سرویکال بر اساس بررسی بافت‌شناسی نمونه هیسترکتومی است که در آن آندوسرویکس توسط تروفوبلاست‌ها مورد تهاجم قرار می‌گیرد. از نظر بالینی معیارهای تشخیصی عبارتند از: ۱- جسم رحم کوچکتر از سرویکس بزرگ و متسع باشد. ۲- سوراخ داخلی سرویکس باز نباشد. ۳- در کورتاژ حفره آندومتر، بافت جفت وجود نداشته باشد. ۴- سوراخ خارجی سرویکس زودتر از آنچه که در سقط خود بخودی اتفاق

گرفته بود. در طی این عمل به علت خون‌ریزی زیاد ۶ واحد خون به او تزریق شده بود و عمل تخلیه رحم به صورت ناقص خاتمه یافته بود. گزارش پاتولوژی وی سقط فراموش شده بود. در مراجعه مجدد، بیمار آنمیک بود و خون‌ریزی واژینال در حد خفیف تا متوسط داشت. رحم وی بزرگتر از حد طبیعی و در حد هفته ششم حاملگی بود. سرویکس بسیار کوتاه و تقریباً چسبیده به سقف واژن و سوراخ آن بسته بود. پری رحم بالفاصله از بالای واژن شروع می‌شد و به نظر می‌رسید که رحم در دو طرف سرویکس به لگن چسبندگی دارد و غیرقابل حرکت دادن می‌باشد. سونوگرافی شکمی که از بیمار انجام شد، رحم را بزرگتر از حد معمول و حاوی تصاویری با اکسی مخلوط که احتمالاً بقایای محصولات حاملگی بود، نشان داد. هموگلوبین بیمار ۱۰ بود. با آماده ساختن ۴ واحد خون مجدد بیمار تحت کورتاژ قرار گرفت. سوراخ خارجی سرویکس در حد بوژی ۳ بازبود. به علت کوتاهی و چسبندگی سرویکس عبور بوژی از کانال سرویکس به حفره آندومتر امکان پذیر نبود و به این دلیل لازم شد برای مستقیم شدن مسیر کانال سرویکس از دو تناکولوم در لبه‌های قدامی و خلفی سرویکس استفاده شود.

پس از انجام دیلاتاسیون تا بوژی شماره ۶ اقدام به کورتاژ شدو از داخل حفره آندومتر مقدار بسیار کمی نسج خارج شد، ولی با خارج شدن نسوج قسمت فوقانی و طرفی سرویکس و نواحی تحتانی جسم رحم که مرتبأ مسیر کورت را از سوراخ داخلی سرویکس منحرف می‌ساخت، خون‌ریزی شدید و غیرقابل کنترلی از رحم اتفاق افتاد که با تزریق متراژین و تامپون نمودن دهانه رحم کاهش نیافت. تزریق خون برای بیمار شروع و با شک به حاملگی سرویکال تصمیم به لاپاراتومی گرفته شد. منظره‌ای که در

هافمن ارائه شد که جایگزینی ساک حاملگی در کanal سرویکس مهم‌ترین آنهاست. وجود شکل ساعت شنی در رحم و بالا کشیده شدن مثانه در قیاس با ساک حاملگی و بزرگ‌بودن سرویکس از علائم دیگر سونوگرافی هستند. مهم‌ترین تشخیص افتراقی این حالت در سونوگرافی، سقط خودبخودی قریب‌الواقع است که در آن ساک حاملگی در حال خروج از رحم و در داخل کanal سرویکس باشد ولی مهم‌ترین وجه افتراق این‌دو در بازبودن سوراخ داخلی سرویکس و تداوم محتویات‌اندومتر و اندوسرویکس در مورد اخیر است. استفاده از سونوگرافی رنگی واژینال داپلر و ضربانی و MRI تشخیص‌زودرس این عارضه را به مراتب آسانتر ساخته است (۹).

در صورت تشخیص به موقع می‌توان از درمان‌های محافظتی جهت حفظ باروری بیمار استفاده کرد. در مراحل اولیه حاملگی اولین درمان عبارت از برداشتن محصولات حاملگی از طریق واژن با آمادگی کافی از نظر بیهوشی، تزریق خون و انجام هیسترتومی احتمالی است. این درمان گاهی موجب خون‌ریزی خفیف می‌شود ولی اغلب اوقات خون‌ریزی شدید رخ می‌دهد. روش‌های بندآوردن خون شامل پک‌کردن رحم، بستن شریان‌های سرویکال توسط دو بخیه عمیق در قسمت‌های جانبی سرویکس و یا انجام عمل شیروودکار و مک‌دونالد می‌باشند. همچنین می‌توان با وارد کردن یک سوند فولی ۳۰-۴۰ میلی‌لیتری تامپوناد ایجاد کرد. آمبولیزاسیون شریان رحمی و حتی بستن آن و یا شریان ایلیاک داخلی نیز گاهی مؤثر واقع شده است (۹،۱). گزارش‌های متعددی از درمان موفقیت‌آمیز بیماران توسط این روش وجود دارد (۴،۵،۶،۷،۸،۹،۱۳).

در موارد خاصی تزریق متوتر و کسات به طریقه داخل آمنیونی یا سیستمیک به صورت موفقیت‌آمیزی بکار

می‌افتد، باز شود (۱۰). در صورتی که جفت درناحیه سرویکس کاشته شود، تکامل آن به سه صورت ممکن است. در حالت اول با رشد ساک حاملگی به سمت سوراخ خارجی سرویکس، حاملگی شبیه به یک قاعده‌گی غیرطبیعی خاتمه می‌یابد. در شکل دوم، ساک حاملگی می‌تواند به سمت حفره رحم رشد کند و به صورت طبیعی ادامه یابد، هرچند که محل کاشته شدن جفت روی سوراخ داخلی سرویکس است و در حالت سوم نظری این بیمار تمامی ساک حاملگی در کanal سرویکس جایگزین شده و یک موقعیت خطرناک مامایی را ایجاد می‌کند (۲).

در بیمار فوق‌الذکر تنها عامل مساعد کننده ایجاد حاملگی سرویکال، سزارین قبلی شناخته شد. هرچند گزارش پاتولوژی‌وی اندوسرویکس را محل تهاجم تروفوبلاست‌های جفت نشان می‌داد ولی وضع ظاهری سرویکس نکته مشکوکی به نفع حاملگی سرویکال نداشت. همانطور که گفته شد در حاملگی سرویکال، سرویکس متسع و باز است در حالی که در این بیمار سوراخ سرویکس بسته بود. هرچند در زمان لاپاراتومی سرویکس بزرگ و متسع بود، ولی در معاینه واژینال نه تنها دهانه رحم متورم و متسع نبود، بلکه بسیار کوتاه‌تر از حد طبیعی به نظر می‌رسید و نکته غیرعادی دیگر آن چسبندگی و ثابت‌بودن سرویکس در ناحیه سقف واژن بود. علامت اختصاصی بالینی بیماری خون‌ریزی بدون درد است که در اوایل حاملگی و یا در جریان کورتاژ اتفاق می‌افتد (۱۱،۶).

تا قبل از سال ۱۹۷۸ تشخیص صحیح حاملگی سرویکال قبل از جراحی نادر بود، اما امروزه استفاده از سونوگرافی واژینال امکان تشخیص زودرس و درمان غیرجراحی بیماری را فراهم کرده است. خصوصیات سونوگرافی قابل قبول این عارضه در سال ۱۹۸۷ توسط

Summary

A Case Report of Missed Abortion in Cervical Pregnancy

B.SH. Aali, MD.¹

1. Assistant Professor of Obstetrics and Gynecology, Kerman University of Medical Sciences and Health Services, Kerman,Iran

In this paper a case of missed abortion in a cervical pregnancy is presented. A 38 year old women G₂P_{1,001} referred with vaginal bleeding following a curettage which had been performed 14 days ago in another hospital. The pathological report was indicative of missed abortion. Based on the sonographic evidences which were indicative of retained products of pregnancy, it was decided to perform curettage again. During curettage a severe and uncontrollable haemorrhage ended up to hysterectomy with the preservation of adnexa. The enlarged cervix was indicative of cervical pregnancy. The patient was discharged after 4 days in a healthy condition and histopathologic examination revealed endocervical implantation of trophoblasts and degenerated product of conception which were suggestive of missed abortion.

Journal of Kerman University of Medical Sciences, 2000; 7(2): 98-102

Key Words:Cervical pregnancy, Missed abortion, Hysterectomy

References

رفته است. در مراحل اولیه حاملگی شاید بهترین راه، تزریق سیستمیک دارو باشد ولی در صورتی که قلب جنین ظاهر شده باشد، تزریق داخل آمنیونی مناسب‌تر به نظر می‌رسد (۱۳، ۹، ۶، ۱).

کلید اصلی درمان محافظتی موفق، تشخیص قبل از عمل جراحی است و پیشافت‌های اخیر در حال حاضر اجازه درمان‌های طبی و جراحی را با عوارض کمتر فراهم نموده است.

در بسیاری از موارد تا زمانی که با تصور سقط ناقص اقدام به کورتاژ نگردد، تشخیص حاملگی سرویکال داده نمی‌شود. در این صورت خون‌ریزی غیرقابل کنترلی اتفاق می‌افتد که معمولاً راهی به جز هیسترکتومی برای توقف آن وجود ندارد. از آنجا که در این بیمار تمامی توجه به سقط فراموش شده و باقی ماندن محصولات حاملگی به عنوان علت خون‌ریزی معطوف بود و تشخیص حاملگی سرویکال به خاطر نادر بودن آن در ذهن مطرح نبود، تشخیص قبل از عمل داده نشد و به علت خون‌ریزی شدید در حین کورتاژ، نظیر چند گزارش دیگر (۸، ۳، ۲) لاپاراتومی و هیسترکتومی برای بیمار انجام شد.

این موقعیت بالینی چنان نادر و تهدید‌کننده حیات بیمار است که گفته می‌شود قسمت اعظم متخصصین زنان در طول عمر خود با آن برخورد نمی‌کنند و تعداد قلیلی که با آن مواجه می‌شوند، آرزو می‌کنند که هرگز آن را تجربه نمی‌کردند (۲). بنابر این علی‌رغم نادر بودن این عارضه به علت عواقب و خطرات جدی همیشه باید حاملگی سرویکال را به عنوان یک تشخیص افتراقی مهم در خون‌ریزی‌های نیمه اول حاملگی در نظر داشت.

- 1.Ayromloo J. Conservative management of cervical pregnancy with subsequent fertility.*Am J Obstet Gynecol*1990; 163(3): 1093-1094.
- 2.Giambanco L, Chianchiano N, Palmeri Vand Catalano G. Cervical pregnancy: an obstetric emergency.*Minerva Ginecol*1998; 50(7-8): 321-324.
- 3.Hmeidan FA, Pretzsch G, Alexander H and Schollmeyer M. Cervical pregnancy a rare ectopic pregnancy.*Zentralbl Gynakol* 1991; 113(12): 723-726.
- 4.Kohl H and Schade R. Report about cervical pregnancy.*Zentralbl Gynakol*1990; 112(16): 1017-1022.
- 5.Okeahialam MG, Tuffnell DJ,O'Donovan P and Sapherson DA.Cervical pregnancy managed by suction evacuation and balloon tamponade.*Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol*1998; 79(1): 89-90.
- 6.Pastorelli G, Steiner R and Haller V.Cervical pregnancy.*Gynakol Geburtshilfliche Rundsch*1997; 37(4): 209-215.
- 7.Simon Ph, Donner C, Delcour C, Kirkpatrick C and Rodesch F. Selectiveuterine artery embolization in the treatment of cervical pregnancy: two case reports.*Eur J Obstet Gynecol Reprod Bio*1991; 40(2): 159-161.
- 8.Sonmez AS, Kafkasli A, Balat O,*et al*.Cervical pregnancy: Can age and parity be predisposing factors?*Acta Obstet Gynecol Scand*1994; 73(9): 734-736.
- 9.Stovall GT and Ling WF: Extra uterine pregnancy, clincal diagnosis and management. 1st ed., U.S.A.,McGraw-Hill, 1993; pp162-164, 289-291.
- 10.Thomas G, Stovall, Marian L and McCord. Early pregnancy loss and Ectopic pregnancy. In: Jonathan S and Berek (Eds). Novak's Gynecology. 12th ed., Baltimor, Philadelphia, Williams &Wilkins, 1997; pp511-512.
- 11.Thomas RL, Gingold BR and Gallagher MW. Cervical pregnancy: a report of two cases.*J Reprod Med Obstet Gynecol*1991;36(6): 459-462.
- 12.Van de Meerssche M, Verdonk P,Jacquemyn Y, Serreyn R and Gerris J. Cervical pregnancy: Three case reports and a review of the literature.*HumReprod*1995; 10(7): 1850-1855.
- 13.Weissman A and Hakim M. Diagnosis and treatment of cervical pregnancy: A case report.*J Reprod Med Obstet Gynecol*1993; 38(8): 656-658.