

مقاله موردنیا

گزارش یک مورد سارکومای حفره بینی

دکتر کرامت مظفری نیا^۱

خلاصه

موردنی که گزارش می‌شود خانمی است ۶۵ ساله اهل کرمان که به دلیل انسداد بینی و خون دماغهای راجعه از ۵ ماه قبل مراجعه کرده است. در معاینه بالینی توموری بزرگ در حفره بینی وجود داشت. در CT اسکن انجام شده وجود یک تومور بزرگ در حفره بینی و سینوس فکی سمت چپ مشهود بود. این تومور با حاشیه منفی (Negative safe margin) از طریق برش جراحی رادیکال کالدول لوک خارج شد. منشاء اولیه تومور شاخک تحتانی بود. در بررسی بافت‌شناسی تومور سارکومای مزانشیمال گزارش شد. این نوع سارکوم از تومورهای بسیار نادر حفره بینی می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: سارکوما، حفره بینی

۱-دانشیار بخش گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
تاریخ دریافت مقاله: ۸۱/۱۲/۱۷ تاریخ دریافت اصلاحات: ۸۲/۷/۱۵ تاریخ پذیرش: ۸۲/۷/۲۳

مقدمه

کرده باشد برداشتن تمام فک فوقانی (ماکرزلیکتومی) ضروری است و در مواردی که در گردن غدد لنفاوی مثبت وجود داشته باشد، تشریح کامل گردن (R.N.D) نیز توصیه می‌گردد (۳) و بالاخره در مواردی که احتمال متاستاز دور دست یا نهفته وجود داشته باشد، علاوه بر جراحی شیمی درمانی نیز توصیه می‌گردد.

گزارش مورد

بیمار زنی ۶۵ ساله و اهل کرمان بود که از حدود ۵ ماه قبل دچار انسداد پیشرونده حفره بینی طرف چپ همراه با خونریزی مکرر از بینی شده بود. بیمار هنگام مراجعت از انسداد کامل حفره بینی سمت چپ و خرخر شبانه (Snoring) شکایت داشت. در معاینه حفره بینی سمت چپ پر از نسوج تومورال و همراه با نقاط نکروزه متعدد در سطح تومور بود. معاینه گردن طبیعی بوده و هیچ علامتی دال بر وجود لنفادنوتاتی وجود نداشت. در سی‌تی اسکن انجام شده، تومور تمام حفره بینی، قسمت‌هایی از بینی و حلق فوقانی (نازوفارنکس فوقانی)، سینوس فکی چپ، نواحی اتموئیدال قدامی، خلفی و سینوس اسفنوئید طرف چپ را پر کرده بود.

با برش جراحی رادیکال کالدول‌لوك بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفت. تومور تمام حفره بینی چپ و سینوس فکی، نواحی سطح داخلی حدقه چشم و اتموئیدال قدامی و خلفی را پر کرده بود.

سطح قدامی سینوس اسفنوئید کاملاً تخریب شده و پر از نسوج تومورال بود و منشأ تومور از توربینیت تحتانی بود. نهایتاً تومور با Safe margin منفی به طور کامل برداشته و حذف شد. گزارش پاتولوژی سارکوم‌مزانشیمال حفره بینی بود که با توجه به ماهیت توسعه‌طلبی آن بیمار جهت انجام درمان‌های تکمیلی (رادیوتراپی - شیمی درمانی) به مرکز مربوطه فرستاده شد. با توجه به امکان متاستازهای نهفته و دور دست (ریه) براي بیمار

سارکوما از تومورهای بدخیم حفره بینی و سینوس‌های پارانازال با شانس پایین بقای عمر می‌باشد (۲۰، ۲۱).

سارکومای حفره بینی ۱٪ کلیه سارکومای سر و گردن و ۱۵٪ تمامی تومورهای سینوس‌های صورت را تشکیل می‌دهد (۳). اتیولوژی تومور مثل بقیه تومورهای بدخیم نامعلوم است قرار گرفتن در معرض تابش اشعه (irradiation) مثلاً بعد از رادیوتراپی در موارد سرطان نازوفارنکس می‌تواند از عوامل خطر پیدایش آن باشد (۳، ۴، ۵، ۱۱). شیوع سارکوما در جنس مذکور بیشتر از جنس مؤنث گزارش شده است (۳).

سیر بالینی این تومور در اکثر موارد کند و بدون علامت است. در مراحل پیشرفته علائمی نظیر انسداد، خونریزی بینی و غیره رخ می‌دهد. این سیر تدریجی باعث می‌شود تومور زمانی تشخیص داده شود که تعیین و تشخیص منشاء اولیه آن مشکل و یا ناممکن باشد (۳). سارکومای حفره بینی علاوه بر انتشار و گسترش موضعی می‌تواند متاستاز خونی و لمفاتیک سریع ایجاد کرده و حیات بیمار را تهدید نماید (۲). سارکوم بینی ممکن است به صورت یک تومور بدخیم و مهاجم همراه با شوانووهای بدخیم با افتراق سلولی را بدمیوبلاستیک ظاهر شود (۹).

درمان سارکومای حفره بینی و سینوس‌های پارانازال در تمام موارد جراحی است. جراحی به تنها بی‌ فقط برای ضایعات در مرحله پایین (low-grade) مشروط بر اینکه ضایعه به طور کامل برداشته شده باشد توصیه می‌شود. از آنجا که عود موضعی تومور سارکوما زیاد است (۱۵) توصیه می‌شود ضایعه تومورال به طور کامل و با حاشیه سالم بافتی (safe-margine) برداشته شود (۲۴).

در مواردی که احتمال حاشیه مثبت (positive safe margin) وجود داشته باشد بعد از جراحی رادیوتراپی توصیه می‌شود (۳). در مواردی که تومور بسیار بزرگ باشد و سینوس را در گیر

در گزارش دیگر از سال ۱۹۸۰-۱۹۹۵ از ۱۵ مورد سارکومای سر و گردن باز فقط یک مورد در حفره بینی بوده است (۱۵).

تا سال ۱۹۹۶ جمعاً چهل مورد لیوموسارکومای حفره بینی و سینوس‌های پارانازال در مجلات گوش و حلق و بینی گزارش شده است که یک مورد آنها از شاخه‌های تختانی منشأ داشت است (۱۵).

بعضی انواع سارکوما مثل کندروسارکوما و همانژیوسارکوما در حفره بینی و سر و گردن نادر می‌باشند (۱،۱۶). نوع فیروسارکوما در شیرخواران نیز گزارش شده است (۱۰).

کندروسارکوم مزانشیمال از انواع نادر سارکوما است و در واقع نوع مهاجم کندروسارکوما می‌باشد. یک مورد کندروسارکوم مزانشیمال در یک جوان ۱۶ ساله گزارش شده که تهاجم وسیع به حدقه چشم، حفره بینی، سینوس اسفنوئید و حفره قدامی مغزی داشته است (۲۳).

یک مورد سارکوم گرانولوستیک در حفره بینی گزارش شده است. این نوع سارکوم اغلب با اختلالات تکثیر سلولی مغز استخوان (میلوپرولیفراتیو) همراه می‌شود و ممکن است مقدمه بروز لوسی باشد حتی ممکن است با لمفوم لمفوبلاستیک به آسانی اشتباه شود (۱۷).

سارکوم اونیگ (Ewing) بینی ممکن است از بافت نرم یا استخوانی بینی منشأ بگیرد (۸،۱۸،۱۹).

بر اساس گزارشات مختلف شانس ادامه حیات بیماری خوب نیست. در یک گزارش شانس ادامه حیات ۵ ساله ۱۹ تا ۳۰ درصد بوده است (۵). طبق یک گزارش دیگر شانس ادامه حیات ۳ ساله ۲۸ درصد، ۵ ساله ۲۳ درصد و ۱۰ ساله ۲۰ درصد بوده است و در یک گزارش دیگر شانس ادامه حیات ۵ تا ۱۰ ساله ۱۸ درصد بوده است (۱۲). مهمترین فاکتور مؤثر بر

شیمی درمانی نیز انجام شد. بیمار با گذشت ۶ ماه هنوز اثربخشی نداشته است.

بحث

سارکوم‌ها تومورهای بدخیم مزانشیمال هستند که نام‌گذاری آنها بر اساس منشاء بافتی و افتراء سلولی صورت می‌گیرد. (مثلاً لیوموسارکوما، لیوسارکوما و ...) (۱۴). لذا جز در موارد استثنایی منشأ بافتی تومور (هیستوژنزیس) بسیار مهم است. برای افتراء منشأ بافتی تومور (هیستوژنزیس) از روش‌هایی مثل ایمونوکمیستری، میکروسکوپ الکترونیک و بررسی منشأ سلولی (سایتوژنیک) استفاده می‌شود. از نظر منشأ سلولی (سایتوژنیک) نیز در دو دهه اخیر آنالیز شماهی مختلف کروموزومی سارکوما انجام شده است. شمای کروموزال برای فرم‌های مختلف و فوتیپ‌های نتوپلاستیک متغیر است (۲۲). در مواردی که منشأ بافتی (هیستوژنزیس) تومور حتی با تکنولوژی‌های پیشرفته تشخیص داده نشود (در حدود ۵٪ موارد) آنها را تحت عنوان سارکومای غیراختصاصی یا سارکوم نهادی می‌نمایند (Sarcoma not Otherwise Specified) نام‌گذاری می‌نمایند (۲۲).

لازم به ذکر است که با استفاده از نشانگرهای تومورال (مارکرها) مثل آنتی‌بادی‌های رشته پروتئین‌های واسطه‌ای Protein 100، Cytokeratin، Desmin، Vimentin، Cytoskeleton، میوگلوبین، میوزین، آلفا آنتی‌کیموتربیپسین، آلفا آنتی‌تریپسین، کلارزن تیپ IV، می‌توان منشأ بافتی تومور (هیستوژنزیس) را نیز مشخص نمود (۱۳).

در یک بررسی ۲۷۷ موردی کانسر حفره بینی و سینوس‌های صورت از سال ۱۹۶۳ تا ۱۹۹۱ ذکری از سارکومای این نواحی نشده است (۲۲).

در حالی که در یک گزارش ۱۱ موردی رابدومیوسارکومای سر و گردن ۱ مورد در حفره بینی بوده است (۱۴).

- ۴ درمان تومور جراحی است و با توجه به احتمال زیاد عود تومور پس از عمل جراحی، تومور باید به طور کامل وسیع و با حاشیه سالم (safe margin) بافتی و منفی برداشته شود.
- ۵ جراحی به تنها بی فقط برای ضایعات در مرحله پایین (low grade) مشروط بر این که خارج کردن ضایعه کامل و با حاشیه منفی باشد، توصیه می شود.
- ۶ در مواردی که حاشیه جراحی مثبت است و یا امکان خارج کردن کامل تومور نمی باشد باید اقدام به رادیوتراپی نمود.
- ۷ در مواردی که احتمال دست اندازی دور دست وجود دارد شیمی درمانی نیز بایستی انجام شود.
- ۸ در مواردی که در گردن غده لنفاوی مثبت (N^+) وجود دارد علاوه بر جراحی تومور تشریح کامل گردن (R.N.D) نیز انجام گیرد.
- ۹ چون احتمال عود موضعی تومور زیاد است پی گیری نزدیک بیماران ضروری است.

شانس ادامه حیات بیماران، جنس و درجه (Grade) تومور و عود موضعی (Local failure) بوده است (۱۲، ۲۰).

کمترین شانس ادامه حیات مربوط به انواع استئوسارکوم، آژیوسارکوم و فیبروسارکوم بوده است. در حالی که شانس ادامه حیات مطلق ۵ ساله برای آژیوسارکوم و فیبروسارکوم تا ۶٪ نیز گزارش شده است (۲۴).

با توجه به میزان زیاد عود تومور توصیه می شود کلیه بیماران در فواصل کوتاه مدت تعقیب شوند مضافاً بر اینکه مرگ و میر ناشی از تومور اغلب مربوط به انتشار داخل مغزی ضایعه تومورال است (۳).

نتیجه گیری

- ۱ سارکوما از تومورهای نادر حفره بینی است و در ارزیابی بیمارانی که تومور حفره بینی یا سینوس های صورت دارند باید به فکر آن بود.
- ۲ شانس ادامه حیات بیماران بستگی به جنس، درجه بندی تومور و عود موضعی آن دارد.
- ۳ مرگ و میر ناشی از سارکومای حفره بینی اغلب مربوط به انتشار داخل مغزی ضایعه است (۳).

References

1. Avalos E, Martin A, Romero L, et al. Paranasal sinus chondrosarcoma. A case report. *Acta Otorrinolaringol Esp* 1998; 49(3): 245-6.
2. Ballenger J.J. Diseases of the nose, Throat, Ear, Head, Neck. 14th ed., Philadelphia, Lea & Febiger, 1991; p217.
3. Cody D.T and DeSanto L.W: Neoplasm of the nasal cavity. In: Cummings C.W, Fredrickson J.M, Harker L.A, et al(eds.), Otolaryngology: Head & Neck Surgery. 3rd ed., Philadelphia, Mosby, 1998; PP 894-5.
4. Coia LR, Fazekas JT and Kramer S. Postirradiation sarcoma of the head and neck: a report of three late sarcomas following therapeutic irradiation for primary malignancies of the paranasal sinus, nasal cavity, and larynx. *Cancer* 1980; 46(9): 1982-5.
5. DeSanto L.W and Garrity J.A: Exophthalmos for the otolaryngologist in Papa Rella, Shumrick, Gluckman, Meyerhoff. Otolaryngology, W.B. Saunders, 1991.
6. Epley KD, Lasky JB and Karesh JW. Osteosarcoma of the orbit associated with Paget disease. *Ophthal Plast Reconstr Surg* 1998; 14(1): 62-6.
7. Harbo G, Grau C, Bundgaard T, et al. Cancer of the nasal cavity and paranasal sinuses. A clinicopathological study of 277 patients. *Acta Oncol* 1997; 36(1): 45-50.
8. Howard DJ and Daniels HA. Ewing's sarcoma of the nose. *Ear Nose Throat J* 1993; 72(4): 277-9.
9. Kim ST, Kim CW, Han GC, et al. Malignant triton tumor of the nasal cavity. *Head neck* 2001; 23(12): 10758.

10. Kim KI and Yoo SL. Infantile fibrosarcoma in the nasal cavity. *Otolaryngol Head Neck Surg* 1996; 114(1): 98-102.
11. King AD, Ahuja AT Teo P, Tse GM and Kew J. Radiation induced sarcomas of the head and neck following radiotherapy for nasopharyngeal carcinoma. *Clin Radiol* 2000; 55(9): 684-9.
12. Koka V, Vericel R, Lartigau E, Lusinchi A and Schwaab G. Sarcomas of nasal cavity and paranasal sinuses: chondrasarcoma, osteosarcoma and fibrosarcoma. *J Laryngol Otol* 1994; 108(11): 947-53.
13. Kyriachos M: Tumors and tumoral like conditions of the soft tissue. In: Kessane J.M(ed.), Anderson's pathology. 9th ed., C.V. Mosby, 1990; PP 1839-1840.
14. Lee JH, Lee MS, Lee BH, et al. Rhabdomyosarcoma of the head and neck in adults: MR and CT findings. *AJNR Am J Neuroradiol* 1996; 17(10): 1923-8.
15. Lippert BM, Godbersen GS, Luttges J and Werner JA. Leiomyosarcoma of the nasal cavity. Case report and literature review. *ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec* 1996; 58(2): 115-20.
16. Martin Vazquez C, Bullido E, Alvarez Montero O, et al. Hemangiosarcoma of the nasal cavity. *Acta Otorrinolaringol Esp* 1996; 47(2): 149-52.
17. Prades JM, Alaani A, Mosnier JF, Dumollard JM and Martin C. Granulocytic sarcoma of the nasal cavity. *Rhinology* 2002; 40(3): 159-61.
18. Rubinstein MI, Drake AF and McClatchey KD. Alveolar soft part sarcoma of the nasal cavity: report of a case and a review of the literature. *Laryngoscope* 1988; 98(1): 1246-50.
19. Sercarz JA, Mark RJ, Tran L, Storper I and Calcaterra TC. Sarcomas of the nasal cavity and paranasal sinuses. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1994; 103(9): 699-704.
20. Sercarz JA, Mark RJ, Tran L, Storper I and Calcaterra TC. Sarcomas of the nasal cavity and paranasal sinuses. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1994; 103(9): 699-704.
21. Spiro JD, Soo KC and Spiro RH. Nonsquamous cell malignant neoplasms of the nasal cavities and paranasal sinuses. *Head Neck* 1995; 17(2): 114-8.
22. Stenberg S.S: Diagnostic surgical pathology 3rd ed., Lippincott, Williams and Wilkins, 1999; PP 14- 138.
23. Sugiyama K, Hirano A, Llena JF, et al. Mesenchymal chondrosarcoma in anterior skull base: case report. *Noshuyo Byori* 1996; 13(1): 57-60.
24. Zohar Y, Wulikh M, Aminov H, et al. Head and neck sarcoma. *Harefuah* 1996; 130(11): 740-4, 799.