

مقاله موردنی

گزارش دو مورد اشریشیاکلی فاقد آنزیم بتالاکتاماز و مقاوم به آمپیسیلین در بین ۱۵۰ باکتری جدا شده از کشت ادرار و مدفوع در کرمان

دکتر محمدحسن مصطفی^۱، دکتر شهرلا منصوری^۲ و دکتر مهدیه سلاجقه^۳

خلاصه

بتالاکتامازها آنزیم‌هایی هستند که سبب غیرفعال کردن آنتی‌بیوتیک‌های گروه بتالاکتام می‌گردند و یکی از مهمترین عوامل مقاومت نسبت به این داروها می‌باشدند. جدیداً سویه‌هایی از باکتری‌های مختلف گزارش شده اند که فاقد آنزیم بتالاکتاماز بوده و لیکن نسبت به پنی‌سیلین‌ها مقاومند. در این تحقیق تولید بتالاکتاماز در ۱۵۰ نمونه اشریشیاکلی مقاوم به آمپی‌سیلین با روش یدومنtri بررسی شد. دو نمونه که یکی از عفونت ادراری و دیگری از مدفوع جدا شده بودند، علاوه بر مقاومت نسبت به آمپی‌سیلین، نسبت به ترکیب آموکسی‌سیلین - کلاؤلانیک اسید نیز مقاوم بوده و قادر به تولید آنزیم بتالاکتاماز نبودند. حداقل غلظت مهارکنندگی از رشد (MIC) آمپی‌سیلین که با روش رقیق‌سازی در آگار انجام شد، برای این دو سویه بالاتر از ۵۱۲ میکروگرم بر میلی‌لیتر بود. وجود اشریشیاکلی مقاوم به آمپی‌سیلین و مقاوم به مهارکننده بتالاکتاماز اولین مورد گزارش چنین سویه‌هایی در ایران است.

واژه‌های کلیدی: بتالاکتاماز، اشریشیاکلی، آمپی‌سیلین

۱- استادیار میکروبیولوژی، ۲- دانشیار میکروبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۳- دکتر داروساز

مقدمه

فرم‌های کلاسیک این بتالاکتامازها شامل TEM-2 و SHV-1 می‌باشد که تولید آنها در باکتری‌های گرم منفی توسط پلاسمیدها گذشتگی گردد (۲).

استفاده از چنین ترکیباتی سبب ایجاد باکتری‌های جهش یافته‌ای شده که به طور نسبی به اثر غیرفعال کننده‌های بتالاکتاماز مقاوم شده و بنابراین نسبت به ترکیبات بتالاکتام و ممانعت کننده‌های بتالاکتاماز مقاوم گردیده‌اند (۱، ۲، ۳، ۷، ۱۶، ۱۷).

این جهش در آنزیم‌های بتالاکتاماز کلاس A از خانواده SHV و TEM گزارش گردیده است (۱۴، ۱۶، ۱۸). پس از مشاهده اولین مورد بتاکتامازهای TEM که مقاوم به اسید کلاؤلانیک بودند، گزارشاتی مبنی بر پیدایش چنین آنزیم‌هایی در سایر نقاط داده شده است (۲، ۴، ۱۳، ۱۴، ۱۷). وجود سویه‌هایی از باکتری‌های مقاوم به مهارکننده‌های بتالاکتاماز علاوه بر باکتری‌های آنتریک در باکتری‌های دیگر نظیر هموفیلوس آنفلوآنزا نیز گزارش گردیده است. برای مثال در آمریکای شمالی سویه‌هایی از هموفیلوس آنفلوآنزا یافت شده که نسبت به آمپیسیلین مقاوم بوده و دارای MIC بالا نسبت به این دارو بوده‌اند لیکن قادر به تولید آنزیم بتالاکتاماز نبوده‌اند (۳). این بررسی با هدفی مشابه و در مورد سویه‌های اشریشیاکلی مقاوم به ممانعت کننده‌های بتالاکتاماز در کرمان صورت گرفته است.

مواد و روش کار

باکتری‌های مطالعه شده ۱۵۰ نمونه اشریشیاکلی شامل ۱۰۸ سویه از موارد عفونت ادراری و ۴۱ سویه از نمونه‌های کشت مدفوع بود که به دیسک ۱۰ میکروگرمی آمپیسیلین مقاومت داشتند. باکتری‌های

اشریشیاکلی مهمترین عامل عفونت‌های ادراری و از عوامل عمدۀ عفونت‌های بیمارستانی بوده که به طور معمول در روده انسان و حیوانات یافت می‌شود (۱۲). آنتی‌بیوتیک‌های گروه بتالاکتام به دلیل قدرت اثر، طیف گسترده و توانایی در کشتن و سمیت کم برای سلول‌های یوکاریوت به فراوانی در پزشکی و دندانپزشکی استفاده شده و اهمیت زیادی در درمان دارند (۲). استفاده گسترده از این داروها به خصوص در بیمارستان‌ها سبب بروز سویه‌های مقاوم به دارو گردیده و افزایش مقاومت نسبت به این داروها در میان باکتری‌های روده‌ای گزارش شده است (۱۰، ۱۲، ۱۵).

حساسیت نسبت به داروهای بتالاکتام بستگی به اتصال دارو به پروتئین هدف، مقاومت در برابر بتالاکتاماز و در باکتری‌های گرم منفی نفوذپذیری غشاء دارد. در حالی که زیربنای اصلی مقاومت، غیرفعال شدن دارو به وسیله بتالاکتامازهاست. این آنزیم‌ها حلقه بتالاکتام در پنی‌سیلین‌ها و سفالوسپورین‌ها را شکسته و سبب غیرفعال شدن دارو می‌گردند. بتالاکتامازها هم توسط باکتری‌های گرم مثبت و هم گرم منفی تولید شده و ژن‌های کروموزومی و پلاسمیدی می‌توانند در تولید بتالاکتامازها نقش داشته باشند (۸). علاوه بر تولید بتالاکتاماز، مقاومت در برابر داروهای بتالاکتام می‌تواند ناشی از تغییر در مقدار یا میل ترکیبی پروتئین متصل شونده به پنی‌سیلین (PBP) برای آنتی‌بیوتیک باشد. مقاومت کلینیکی نسبت به بتالاکتام‌ها در باکتری‌های گرم منفی غالباً در ارتباط با تغییر PBP نمی‌باشد (۴).

در اشریشیاکلی بیش از ۲۰۰ نوع بتالاکتاماز یافت شده که بر اساس عملکرد و ساختمنان تقسیم‌بندی شده‌اند.

نموده و روی يك لام تميز، نمونه ميكروبی در يك قطره محلول يد، پنی سيلين حل شد. پس از محلوت شدن کامل يك قطره نشاسته با غلظت (۴/۰ درصد) روی لام اضافه کرده و تغيير رنگ محلول از ارغوانی به سفید (نشان دهنده وجود بتالاكتاماز) در فواصل زمانی ۵، ۱۰ و ۳۰ دقيقه بررسی گردید. كنترل مثبت شامل سويه استافيلوكوك ارئوس ۲۵۹۲۲ ATCC توليد کننده آنزيم بتالاكتاماز بود.

نتایج

در اين بررسی با انجام آزمایش يدومتری جماعت دو نمونه در زمانهای ۵، ۱۰ و ۳۰ دقيقه منفی بود. که يكى از نمونهها مربوط به موارد ادراري و يك نمونه از کشت مدفوع جدا شده بود. بررسی فاصله زمانی تولید بتالاكتاماز در سويههای ادراري و مدفوعی در جدول ۱، نشان داده شده است. به طورکلی در ۵٪ از نمونهها در ۵ دقيقه اول، در ۱/۳۵٪ پس از ده دقيقه و در ۱۴/۹٪ موارد واکنش پس از ۳۰ دقيقه مثبت گردید.

در سويههای ادراري واکنش مثبت در ۵ دقيقه اول بيشتر بود در حالی که سويههای مدفوعی واکنش مثبت پس از ۱۰ دقيقه بيشتر بود.

حداقل غلظت مهارکنندگی از رشد برای آمپی سيلين برای دو سويه بتالاكتاماز منفی، بالاتر از ۵۱۲ µg/ml بود و هر دو سويه نسبت به ديسک آموکسى سيلين - كلاؤلانيك اسيد مقاوم بودند. قطر هالة عدم رشد در برابر اين ديسک معادل با ۱۰ ميلى متر بود که در جدول استاندارد قطر هالة عدم رشد $\geq 18 \text{ ميلى لتر}$ حساس گزارش می گردد.

مزبور از ميان ۵۵۰ سويه اشريشياكلی که طی اسفند ماه ۱۳۷۸ لغايت مرداد ماه ۱۳۷۹ از سطح شهر کرمان جمع آوري و شناسايي شده بودند، جدا گردیدند (۱۲). آزمایش تعیین حساسیت: از ديسک ۱۰ میکروگرمی آمپی سيلين ساخت شركت پادتن طب و ديسک Amoxicillin / clavulanic acid 20/10mg و با استفاده از روش استاندارد Necls Difco استفاده شد (۷).

تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC): برای تعیین MIC از روش استاندارد Agar dilution استفاده شد. آمپی سيلين به صورت پودر و با خلوص ۸۲/۶٪ از شركت جابرین حيان تهيه شد. با توجه به خلوص آنتى بيوتيك غلظت های نهايی ۱۶ تا ۵۱۲ میکروگرم در ميلى لیتر در محيط مولر هيتتون آگار تهيه شد. پس از استاندارد کردن محلول ميكروبی با استاندارد ۰/۵ مک فارلند، رقت ۱:۲۰۰ از آن تهيه شد و سوسپانسيون ميكروبی (۱۰ ميكروليتر) روی پليت به صورت نقطه ای کشت داده شد به طوری که غلظت نهايی معادل $1 \times 10^4 \text{ CFU/ml}$ باشد.

بررسی تولید بتالاكتاماز: تولید بتالاكتاماز بر اساس آزمایش يدومتری و به روش اسلامی انجام گرفت (۱۱) به طور مختصر به يك ويال پنی سيلين G، ۱ ميليون واحدی ساخت کارخانه جابرین حيان، يك ميلى لیتر آب مقطر استريل اضافه شده و به حجم های ۰/۱۵ ميلى لیتر تقسيم گردید. برای نگهداری محلول پنی سيلين برای مدت طولاني محلول های تقسيم شده -20°C - قرار داده شد. محلول يد با اضافه کردن ۱/۵ گرم يدورپتاسيم، ۰/۳ گرم کريستال يد در بافر فسفات تهيه و حجم آن به ۱۰۰ ميلى متر رسانده شد. برای انجام آزمایش ۱/۱ ميلى لیتر از محلول يد را به ۰/۱۵ ميلى لیتر محلول پنی سيلين اضافه

جدول ۱: تولید بتالاکتاماز در ایزوله‌های ادراری و مدافوعی اشريشیاکلی در زمان‌های ۵، ۱۰ و ۳۰ دقیقه

واکنش مثبت در فاصله زمانی (دقیقه)				زمان	سویه‌های مورد بررسی
تعداد کل	تعداد (درصد)	۳۰	۱۰		
۱۰۸ (۱۰۰)	۱۸ (۱۶/۶)	۲۹ (۲۶/۹)	۶۱ (۵۶/۵)	سویه‌های جدا شده از کشت ادرار	سویه‌های جدا شده از کشت ادرار
۴۰ (۱۰۰)	۴ (۱۰)	۲۳ (۵۷/۵)	۱۳ (۳۲/۵)	سویه‌های جدا شده از کشت مدافع	سویه‌های جدا شده از کشت مدافع
۱۴۸ (۱۰۰)	۲۲ (۱۴/۹)	۵۲ (۳۵/۱)	۷۴ (۵۰)	جمع کل	

کشورهای اروپایی میزان سویه‌های IRT از موارد کلینیکی

۳% گزارش شده است.

در اسپانیا این باکتری‌ها را علاوه بر نمونه‌های انسانی از نمونه‌های مربوط به روده خوب نیز جداسازی نموده‌اند (۱۳). علاوه بر اشريشياکلی انواع IRT در پروتئوس میراپلیس، کلیسیلا پنومونیه و سایر باکتری‌های روده‌ای گزارش شده است (۱۲).

در بررسی حاضر ۲ مورد از ۱۵۰ سویه اشريشياکلی (۱/۳) تولید کننده آنزیم بتالاکتاماز نبوده‌اند که اندکی کمتر از میزان گزارش شده در کشورهای اروپایی است که می‌تواند به علت روش بررسی در این مطالعه باشد. هر دو سویه نسبت به سفالوسپورین‌های نسل دوم و سوم شامل سفازولین، سفتریاکسون و سفرادین حساس گزارش شده بودند و جداسازی اشريشياکلی‌های مقاوم به آموکسی‌سیلین - کلاولانیک اسید ولی حساس به سفالوتین و سایر سفالوسپورین‌ها، به خوبی وجود آنزیم‌های IRT را در این دو سویه مشخص می‌کند که با تحقیق Brians و دیگر پژوهشگران در این زمینه همخوانی دارد (۲۵,۱۶).

با توجه به اهمیت یافتن چنین سویه‌هایی که با مکانیسم جدید نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های گروه بتالاکتام

اشريشياکلی یکی از عوامل عمدۀ عفونت‌های ادراری و عفونت‌های جدی در نوزادان، بیماران نوتروپنیک و سایر بیماری‌های زمینه‌ای بوده و اهمیت زیاد این باکتری در ایجاد بیماری‌های عفونی مختلف بر کسی پوشیده نیست. مقاومت زیاد این باکتری در برابر آمپی‌سیلین به عنوان دارویی مناسب در درمان عفونت‌های گرم منفی مسئله‌ای حائز اهمیت می‌باشد. در تحقیق انجام شده در کرمان میزان مقاومت نسبت به آمپی‌سیلین ۷۶/۸ درصد گزارش شده است. (۱۲)

اخیراً گزارش‌های زیادی در مورد مقاومت نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های بتالاکتام به واسطه مهار از ممانعت کننده‌های بتالاکتاماز که به فامیل TEM مربوط می‌شوند، به عمل آمده است (۵). اولین مکانیسمی که در مورد مقاومت نسبت به مهار کننده‌های بتالاکتام - بتالاکتاماز در اشريشياکلی شرح داده شده است، در ارتباط با تولید بیش از حد بتالاکتاماز نوع TEM و تغییر در پروتئین‌های غشایی است که جذب آنتی‌بیوتیک و مهار کننده را محدود می‌کنند (۵).

اثر غیرفعال کننده بتالاکتامازها به علت موتاسیون در بتالاکتامازهای TEM که به نام (Inhibitor Resistance TEM) نامیده شده‌اند، افزایش یافته و در فرانسه و سایر IRT

بحث

سویه ها مورد بررسی قرار گیرد تا شاید از طریق یافتن مکانیسم ایجاد مقاومت، بتوان راهی برای مقابله با آن بدست آورد.

مقاوم شده اند، جا دارد تا این بررسی بر روی سویه های بیشتری و حتی در مورد سایر باکتری ها انجام گیرد و خصوصیت ژنتیکی نظیر وجود پلاسمید احتمالی در این

References

1. Arpin C, Labia R, Dubois V, Noury P, Souquet M and Quentin C. TEM-80, a novel inhibitor-resistant β -lactamase in a clinical isolate of *Enterobacter cloacae*. *Antimicrob Agents Chemother* 2002; 46(5): 1183-1189.
2. Brinas T, Zarazaga M, Saenz Y, Ruiz-Lerrea F and Torres C. β -lactamases in ampicillin-resistant *Escherichia coli* isolates from foods, humans and healthy animals. *Microb* 2003; 46(10): 3156-3163.
3. Barry AL, Fuchs PC and Brown SD. Identification of β -lactamase-negative, ampicillin-resistant strains of *Haemophilus influenzae* with four methods and eight media. *Anti Microb Agents chemother* 2001; 45(5): 1585-1588.
4. Canica M, Ferreira M, Ferreira E and Cabral L. Phenotype and molecular characterization of the first inhibitor-resistant TEM-derived β -lactamase identified in Portugal. *Microb* 2002; 46(11): 3688-3689.
5. Canica MM, Barthelemy M, Gilly L, Labia R, Krishnamoorthy R and Paul G. Properties of IRT-14 (TEM-45) a newly characterized mutant of TEM-type β -Lactamases. *Antimicrob Agents chemother* 1997; 41(2): 374-378.
6. Donowitz GR and Mandell GI. Beta-Lactam antibiotics. *New Eng J Med* 1988; 318(17): 419-426.
7. Forbes BA, Sahm DF, Weissfeld AS: Laboratory methods for detection of antibacterial resistance. In: E.J. Baron LR, Peterson SM and Finegold (eds). 10th ed., Mosby Co., 1998; PP: 250-272.
8. Georgopapadakou N. H. Minireview: penicillin Binding proteins and Bacterial resistance to β -Lactamas. *Antibacter Agents. Chemother*. 1995; 37: 2045-2053.
9. Kerins DM. Ampicillin Sulbactam- a combination of an old and a new agent in the treatment of infection. *Am J Med Sci* 1991; 301(6): 406-411.
10. Levy SB. The challenge of antibiotic resistance *Sci Am* 1998; 278(3): 46-53.
11. Macfaddin JE: β -Lactamase test. In: Biochemical tests for identification of medical bacteria. 3th ed., Philadelphia, Lippincott, Williams & Wilkins, 1999; PP: 254-273.
12. Mansouri S and Shareifi S: Antimicrobial resistance Pattern of *Escherichia coli* causing urinary tract infections, and that of human fecal flora, in the southeast of Iran. *Microb Drug Resist* 2002; 8(2): 123-128.
13. Miro E, Navarro F, Mirelis B, Sabate M, Rivera A, Coll P and Prats G. Prevalence of clinical isolate of *Escherichia coli* producing inhibitor-resistant β -Lactamase at a University Hospital in Barcelona, Spain, over a 3 year period. *Antimicrob Agents Chemother* 2002; 46(12): 3991-3994.
14. Perilli M, Segatore B, Massis MR. et al. Characterization of a new extended-spectrum β -Lactamase (TEM-87) isolated in *proteus mirabilis* during an Italian survey. *Antimicrob Agents chemother* 2002; 46(3): 925-928.
15. Struelens MJ. Tracking the epidemiology of antimicrobial drug resistance in hospitals: time to deploy molecular typing. *J Med Microbiol* 1998; 47(12): 1035-1036.
16. Tzouvelekis LS, Gazouli M, Prinarakis EE, Tzelepi E and Legakis NJ. Comparative evaluation of the inhibitory activities of the novel penicillanic acid sulfone RO 48-1220 against β -Lactamases that belongs to groups 1, 2b and 2be. *Antimicrob Agents chemother* 1997; 41(2): 475-477.
17. Vakulenko SB, Geryk B, Kotra LP, Mobashery S, and Lerner SA. Selection and characterization of β -Lactam - β -Lactamase inactivator - resistant mutants following PCR mutagenesis of the TEM-1 β -Lactamase gene. *Antimicrob Agents Chemother* 1998; 42(7): 1542-1548.
18. Vakulenko S and Golemi D. Mutant TEM β -Lactamase producing resistance to ceftazidime ampicillins and β -lactamase inhibitors. *Antimicrob Agents chemother* 2002; 46(3): 646-653.