

## شناسایی بیفیدوباکتریوم‌های جدا شده از نمونه‌های مدفوعی در ایران با استفاده از PCR با پرایمرهای اختصاصی در سطح جنس و آنالیز توالی ژنی 16S rRNA

مرتضی خمیری<sup>۱</sup>، دکتر سید علی مرتضوی<sup>۲</sup>، دکتر حمید بهادر قدوسی<sup>۳</sup>، دکتر علی خامسان<sup>۴</sup>، دکتر درخشان احمدی<sup>۵</sup>، و دکتر فخری شهیدی<sup>۳</sup>

### خلاصه

در این تحقیق برای اولین بار بیش از 40 ایزوله باکتریایی مربوط به بیفیدوباکتریوم از مدفوع تعدادی از شهروندان ایرانی جدا و خالص‌سازی شد. پس از مطالعه خواص فنوتیپی و شناسایی آنها در سطح گونه، 18 ایزوله از آنها به عنوان بیفیدوباکتریوم لانگوم، 10 ایزوله به عنوان بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و یک ایزوله به عنوان بیفیدوباکتریوم کتولانوم شناسایی شدند. اما با استفاده از آزمایشات فنوتیپیک برای بقیه ایزوله‌ها نظر قاطعی جهت قرارگیری در زیر گونه‌ای مشخص ارائه نشد. بنابراین برای تأیید در سطح جنس و نیز برای شناسایی دقیق گونه‌های باکتریایی جدا شده به یکی از دو روش، استفاده از PCR با پرایمرهای اختصاصی Bif601r و Bif164f یا تعیین توالی نوکلئوتیدهای ژن 16SrRNA مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. به کارگیری PCR علاوه بر تأیید باکتری‌هایی که قبلاً با استفاده از آزمایشات فنوتیپیک تحت جنس بیفیدوباکتریوم شناسایی شده بودند، مشخص نمود که 8 ایزوله رد شده با آزمایشات فنوتیپیک نیز متعلق به جنس بیفیدوباکتریوم است. در روش تعیین توالی نوکلئوتیدهای ژن 16S rRNA علی‌رغم قرارگیری 5 ایزوله در زیر گونه بیفیدوباکتریوم لانگوم اختلاف قابل توجهی در تخمیر کربوهیدرات‌های آنها با این گونه مشاهده می‌شود که ممکن است در تخمیر 2 تا 6 کربوهیدرات با آن اختلاف داشته باشند. علاوه بر این تعدادی از ایزوله‌های تأیید شده

1- دانشجوی دوره دکتری علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد و مربی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 2- استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، 3- دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد 4- عضو هیأت علمی پژوهشی، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج 5- عضو هیأت علمی انستیتو ملی علمی و تحقیقات (INRS) کانادا در مونترال دریافت مقاله: 1383/2/28 دریافت مقاله اصلاح شده: 1383/8/13 پذیرش مقاله: 1383/9/11

به عنوان بیفیدوباکتریوم لانگوم قادر به تخمیر ربیوز نبودند. بنابراین با توجه به نتایج حاصل، سویه های جدیدی از بیفیدوباکتریوم لانگوم در این طرح ارائه شده است.

### واژه های کلیدی: بیفیدوباکتریوم، سویه های ایرانی، 16SrRNA، PCR، پرایمرهای Bif164f و Bif601r، شناسایی

#### مقدمه

انجام مطالعات فنوتیپی، بررسی های مولکولی و ژنتیکی هم انجام می شود. تا کنون محققین روش های مولکولی متفاوتی را برای شناسایی باکتری ها اتخاذ کرده اند از جمله: هیبریدیزاسیون DNA-DNA (14)، هیبریدیزاسیون با شناساگرهای (probes) اختصاصی DNA (13) تعیین نقشه ژنتیکی بر اساس روش انگشت نگاری DNA (DNA Finger Printing) (29)، روش ARDRA (Amplified Ribosomal DNA Restriction Analysis) (21)، PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی در سطح جنس، گونه یا نژاد (16،28)، تعیین توالی نوکلئوتیدهای ژن 16SrRNA، 23SrRNA و یا فضای بین این دو (27) می توان نام برد. نتایج حاصل از دو روش اخیر، استفاده از PCR و نیز تعیین توالی نوکلئوتیدها مانند دیگر روش های ژنتیکی کاملاً مطمئن، دقیق، سریع، مقرون به صرفه و قابل اعتماد است. به علاوه در این روش ها محدودیت های کمتری در اجرا وجود دارد (16).

خلائی که در خصوص انجام پژوهش هایی بر روی بیفیدوباکتریوم ها در ایران احساس می شد موجب شد تا در گام اول با جداسازی و شناسایی این باکتری زمینه برای کارهای بعدی در ایران فراهم گردد. لذا در پژوهش حاضر برای تأیید تعدادی از ایزوله های بیفیدوباکتریوم در سطح جنس و شناسایی برخی از آنها در سطح گونه که برای اولین بار از مدفوع تعدادی از شهروندان ایرانی جدا شده بودند (1)، از دو روش PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی و تعیین توالی نوکلئوتیدهای ژن 16SrRNA استفاده شد.

#### مواد و روش ها

جداسازی و شناسایی با استفاده از روش های فنوتیپی بیفیدوباکتریوم های استفاده شده در این پژوهش قبلاً از مدفوع تعدادی از شهروندان مشهدی جداسازی و خالص سازی شده بود (مقاله مربوط به این پژوهش برای چاپ ارائه شده است). به طور خلاصه برای جداسازی از محیط کشت بیرنز (Beerens) به عنوان یک محیط اختصاصی استفاده شد (4). نمونه های مدفوعی پس از رقیق شدن به صورت خطی روی محیط کشت داده شدند.

مجاری روده ای انسان جایگاه جمعیتی از میکروب های فعال و متنوع است که عموماً تحت عنوان میکروفلور روده خوانده می شوند. بیفیدوباکتریوم (Bifidobacterium) یکی از مهم ترین میکروارگانیسم های این مجموعه پیچیده و متنوع است. بیفیدوباکتریوم باکتری گرم مثبت، چند شکلی، شدیداً بی هوازی و بدون اسپور است (9،12،24). حضور این باکتری ها در روده اثرات مفیدی را بر سلامتی انسان موجب می شوند که از جمله آن می توان از اثرات تغذیه ای مانند تولید برخی از ویتامین های مورد نیاز بدن و افزایش هضم پذیری پروتئین ها (9،11)، اثرات دارویی مانند جلوگیری از عفونت روده ای، جلوگیری از بروز یا کاهش اسهال (2،10)، کاهش اختلالات ناشی از رادیوتراپی (11)، درمان احتمالی برخی از ضایعات مغزی ناشی از نارسایی کبد (نوعی هپاتیک (Hepatic encephalopathy) (25)، کاهش میزان کلسترول خون (19)، کاهش ترکیبات سرطانی (20) و اثرات ایمنولوژیک با تقویت سیستم ایمنی بدن (8) و کاهش اثرات عدم تحمل لاکتوز (7) را نام برد.

تلاش های بسیاری برای افزایش سلول های بیفیدوباکتریوم در مجاری روده صورت گرفته است. یکی از این روش ها مصرف دهانی این باکتری ها همراه با غذاهای ویژه ای تحت عنوان فرآورده های پروبیوتیک است. امروزه فرآورده های غذایی پروبیوتیک به خصوص از نوع لبنی آن در دنیا رواج فراوانی دارد. مصرف این فرآورده ها یکی از بهترین روش های حفظ تعادل فلور میکروبی مفید روده و حفظ سلامتی محسوب می شود (11،26).

با توجه به اهمیت این باکتری ها تلاش های زیادی برای شناسایی، ردیابی در روده و استفاده از آنها صورت گرفته است. به دلیل این که روش های فنوتیپی برای شناسایی باکتری ها اغلب وقت گیر، بسیار سخت و پر مشقت است (13،16) و نیز نتایج حاصل از روش های فنوتیپی مانند تخمیر کربوهیدرات ها در برخی موارد مبهم می باشد و قادر به تفکیک کامل یا دقیق باکتری ها در سطح گونه نیست، امروزه برای شناسایی و یا تأیید نژادهای ناشناخته که از منابع طبیعی جدا می شوند علاوه بر

پس از اینکوباسیون در دمای 37°C تحت شرایط بی‌هوازی با استفاده از سیستم جار بی‌هوازی و گاز پک (مرک، آلمان) به مدت 5 روز، کلنی‌های رشد یافته‌ای که دارای سلول‌هایی با اشکال شاخه‌دار، یا اشکالی مانند V و Y، برخی نیز با سرهای برجسته و گرم مثبت بودند، انتخاب شدند. پس از آن طی 2-3 بار انتقال بر روی محیط TPY Agar

(تریپتوکیز، پیتون و عصاره مخمر (مرک، آلمان)) حاوی L-سیستین - HCl (مرک، آلمان) خالص‌سازی شدند (24). برای شناسایی باکتری‌های خالص شده سه دسته از آزمایشات فنوتیپی مربوط به بیفیدوباکتریوم‌ها به شرح زیر انجام شد:

الف- آزمایشات سطح جنس: در این مرحله با توجه به کارهای میتسوکا دوازده آزمایش شامل رشد در شرایط هوازی، تولید گاز از گلوکز، تولید کاتالاز، تولید نیترات، تولید ایندول، تجزیه ژلاتین و تولید اسید از رامنوز، سوربوز، گلیسرول، اریتریتول، آدونیتول و دولسیتول انجام شد (18).

ب- تخمیر کربوهیدرات‌ها: در این مرحله هر یک از ایزوله‌هایی تأیید شده با آزمایشات سطح جنس از نظر توانایی تخمیر 25 ترکیب کربوهیدراتی مانند تعدادی از قندهای ساده، پلی‌ساکاریدها، پلی‌الکل‌ها و ... آزمایش شد (22، 24).

ج- تعیین آنزیم فروکتوز-6- فسفات فسفوکتولاز (F6PPK): مهم‌ترین و قابل اعتمادترین آزمایش فنوتیپی برای شناسایی بیفیدوباکتریوم‌ها بررسی وجود آنزیم فروکتوز-6- فسفات فسفوکتولاز است. این آزمایش بر اساس روش اسکاردوی انجام شد (24).

#### استخراج DNA

1 ml از کشت تازه 48 ساعته در محیط مایع MRS3+ (21) با سرعت 10000 دور در دقیقه به مدت 4 دقیقه سانتریفیوژ (اپندروف، آلمان) شد. سلول‌های رسوب داده شده با 200 µl تریس 20 mM و pH=8 شستشو و دوباره سانتریفیوژ شدند. پس از شکستن دیواره سلولی با استفاده از آنزیم لایزوزیم و حذف پروتئین به وسیله پروتئیناز K، DNA بر اساس روش فنل، کلروفرم استخراج شد (3) و در 50 µl آب دی‌یونیزه استریل حل شد.

#### انجام PCR

با استفاده از پرایمرهای اختصاصی در سطح جنس، Bif164f (15، 23) و Bif601r (5)، قطعه‌ای از ژن 16S rRNA ریپوزومی (rDNA) که شاخص جنس بیفیدوباکتریوم می‌باشد در یک دستگاه PCR (مدل Gene Amp، شرکت Applied Biosystem، آمریکا) تکثیر شد. مخلوط واکنش (Reaction mixture) (50 µl) حاوی 25 pmol پرایمر اختصاصی Bif164f و Bif601r، 0/2 mM از هر یک از دی‌اکسی‌ریبونوکلئوتیدهای تری‌فسفات 1 µl از DNA جدا شده از باکتری‌های مورد آزمایش و 2/5 U از Taq DNA پلی‌مراز (Amersham-Pharmacia Biotech، Baie d'Urfée-Canada)، MgCl<sub>2</sub> با غلظت نهایی 1/5 mM، 5 µl از بافر PCR، با برنامه زیر انجام شد:

- 1) دناتوراسیون اولیه در 94°C بمدت 5 دقیقه طی یک سیکل
- 2) 35 سیکل عبارت از: دناتوراسیون در 94°C به مدت 30 ثانیه، چسبیدن رشته‌ها در 60°C به مدت 45 ثانیه و افزایش طول رشته‌ها در 72°C به مدت 1 دقیقه.
- 3) افزایش طول نهایی رشته تشکیل شده در 72°C به مدت 5 دقیقه
- 4) خنک کردن تا دمای 6°C

در PCR علاوه بر DNA استخراج شده از ایزوله‌های باکتریایی مربوط به این پژوهش، از DNA استخراج شده از دو باکتری بیفیدوباکتریوم آدولستیس (ATCC 1730) و لاکتوباسیلوس جانسونی (ATCC332) به ترتیب به عنوان کنترل مثبت و کنترل منفی استفاده شد. از لوله‌ای نیز به عنوان نمونه شاهد (Blank) استفاده شد که حاوی همه اجزاء محلول واکنش به جز DNA بود.

برای آنالیز فرآورده تکثیر شده PCR، 5 µl از آن روی ژل آگاروز 1/2% در بافر TBE 0/5% (w/v) برده شد. پس از برقراری جریان 100V در الکتروفورز به مدت حدود 1 ساعت، ژل در محلول اتیدیوم برمایید (5 µg/ml) رنگ‌آمیزی شد و سپس با استفاده از نور UV مورد مشاهده قرار گرفت. از یک مارکر DNA 500bp (آلمان) نیز به عنوان نشانگری برای تخمین وزن مولکولی قطعه DNA حاصل، استفاده شد.

بررسی توالی (Sequence) نوکلئوتیدها در ژن SrRNA (rDNA)16

به مدت 45 ثانیه استفاده شد (6). پس از تکثیر کامل ژن 16S، RNA ریبوزمی توالی نوکلوتیدهای آنها به وسیله شرکت Shildon در کانادا تعیین گردید. پس از بررسی و مقایسه ژن‌های موجود در بانک

ابتدا PCR با استفاده از پرایمرهای عمومی F1 و R2 (جدول 1) با مخلوط واکنشی مشابه PCR قبلی و با برنامه‌ای تقریباً مشابه انجام شد. در این برنامه پس از دناتوراسیون اولیه، از 35 سیکل تکثیر عبارت از: دناتوراسیون در 94°C به مدت 30 ثانیه، چسبیدن رشته‌ها در 55°C به مدت 30 ثانیه و افزایش طول رشته‌ها در 72°C

جدول 1: مشخصات پرایمرهای استفاده شده در این تحقیق

نوع پرایمر	توالی ژنی پرایمر (5' → 3')	طول پرایمر	محل اثر	اندازه ژن حاصل	مشخصات
					کاربرد
Bif164f Bif601r	GGGTGGTAATGCCGGATG TAAGCGATGGACTTTCACACC	18 21	- 181 164 - 581 601	~ 500	اختصاصی برای شناسایی بیفیدوباکتریوم در سطح جنس
F1 R2 R1	GACTCGGTCCTAGTTTGA AGGCCCGGGAACGTATTCAC GGACTACCAGGGTATCTAAT	18 20 20	8-25 -1431 1450 - 797 816	~ 1500	عمومی برای همه باکتری‌ها

ماخذ: منابع 4 و 5

بیفیدوباکتریوم بودن جنس آنها، با استفاده از آزمون تخمیر کربوهیدرات‌ها در سطح گونه شناسایی شدند. بر اساس نتایج حاصل تا این مرحله 40 سویه باکتریایی تحت عنوان جنس بیفیدوباکتریوم‌ها شناسایی شدند که می‌توان عملاً آنها را به دو گروه تقسیم کرد:

الف) گروهی که از نظر آزمون تخمیر مشابه یکی از گونه‌های بیفیدوباکتریوم ظاهر شدند (نتایج نشان داده نشده است). در این گروه تعداد 29 باکتری شناسایی شدند که 18 گونه از آنها به عنوان بیفیدوباکتریوم لانگوم، 10 گونه بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و یک گونه بیفیدوباکتریوم کنتولاتوم شناسایی شدند. از بین سویه‌هایی که به عنوان بیفیدوباکتریوم لانگوم شناسایی شدند 9 سویه تنها در تخمیر قند ریبوز با آن اختلاف دارند.

ب) گروهی که از نظر آزمایشات تخمیری مشابه هیچ یک از بیفیدوباکتریوم‌های شناخته شده نبودند. در این گروه 5 سویه از باکتری‌ها شناسایی شدند که نتیجه تخمیر آنها در جدول 2 مشاهده می‌شود.

ژنی با آدرس <http://www.ncbi.net> نوع استرین‌های مورد آزمایش تعیین گردید.

خالص سازی قطعه ژنی حاصل از PCR برای خالص سازی فرآورده حاصل از PCR از پرایمرها و dNTP (داکسی نوکلئوزاید تری فسفات) اضافی از کیت DNeasy Tissue (شرکت Qia gene، انتاریو، کانادا) و روش ارائه شده در کیت استفاده شد.

### نتایج

بررسی فنوتیپی بیفیدوباکتریوم‌های جدا شده پس از جداسازی و خالص سازی کلنی‌های مشکوک به بیفیدوباکتریوم بر اساس خصوصیات مورفولوژی، همه باکتری‌هایی که در اولین دسته از آزمایشات بیوشیمیایی (در سطح جنس) مشابه بیفیدوباکتریوم ظاهر شدند (همه آزمایشات سطح جنس منفی بودند) از نظر وجود آنزیم 6-فسفات-فسفوکتولاز آزمون شدند. پس از تأیید

باکتری‌های آزمایش شده دارای الگوی تخمیر مشابهی با بیفیدوباکتریوم‌های شناخته شده بودند که 27 سویه از آنها در شکل 1 مشاهده می‌شود (اطلاعات مربوط به دو سویه در شکل نیامده است).

در این پژوهش علاوه بر تأیید ایزوله‌های باکتریایی که قبلاً با استفاده از آزمایشات سطح جنس بیفیدوباکتریوم بودن آنها محرز شده بود، 8 ایزوله از سویه‌هایی که تنها در یک یا دو آزمایش از آزمایشات سطح جنس در مراحل اولیه شناسایی به روش فنوتیپی با بیفیدوباکتریوم‌ها اختلاف داشتند انتخاب و پس از انجام PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی سطح جنس Bif164f و Bif601r، مورد بررسی قرار گرفتند. این بررسی نشان داد که همه این ایزوله‌ها نیز از جنس بیفیدوباکتریوم می‌باشند (شکل 1a خط‌های 13 تا 15 و شکل 1b خط‌های 1 تا 5).

PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی در سطح جنس برای تأیید و تکمیل نتایج حاصل از روش‌های فنوتیپی، از PCR و روش‌های شناسایی مولکولی استفاده شد. برای بررسی باکتری‌های گروه اول، که در بخش قبلی به آنها اشاره شد، از PCR و پرایمرهای اختصاصی Bif 164f و Bif 601r استفاده شد. نتایج حاصل از تکثیر ژن اختصاصی فضای بین دو پرایمر پس از اجرای PCR، بردن روی ژل آگارز و مشاهده در معرض نور UV در شکل 1 نشان داده شده است. همان‌طور که در این شکل مشاهده می‌شود همه سویه‌های آزمایش شده دارای باند اختصاصی مشابهی با بیفیدوباکتریوم لانگوم (ATCC 308) هستند که به عنوان کنترل مثبت در خط‌های شماره 17 شکل 1a، 1b و خط شماره 7 شکل 1c دیده می‌شوند. همان‌طور که در بالا آمد 29 سویه از

جدول 2: نتایج تخمیر قندهای مهم مربوط به بیفیدوباکتریوم‌های جدا شده

آرابینوز	سلویبوز	اسکولین	فروکتوز	گالاکتوز	گلوز	لاکتوز	مالتوز	مالتیتول	مانوز	ملیبتوز	ملیترتوز	رانیوز	ریبوز	سالیسین	سوربیتول	نشاسته	ساکارز	ترهالوز	زایلوز	قند کد
+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	F4311
+	V	V	+	+	+	+	+	-	V	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	F1712
+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	-	+	+	W	+	+	+	0813 M
+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	F0311
+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	-	+	-	-	+	-	+	F0631

علامت: + = مثبت؛ - = منفی؛ V = متفاوت؛ W = ضعیف. نتایج مربوط به تکرار 2 بار آزمایش است.


جدول 3: درصد همولوژی نوکلئوتیدهای 16S rDNA سویه‌های بیفیدوباکتریوم جدا شده در این تحقیق با 16S rDNA دیگر بیفیدوباکتریوم‌های ثبت شده در بانک ژن\*

کد باکتری/باکتری‌های مورد آزمایش	شماره‌های قابل دسترسی در بانک ژن	گونه‌های بیفیدوباکتریوم	درصد همولوژی (مقدار همپوشانی باقی مانده ها)**
M2011 F1712, M0521 F0631, M0311 F4311, M1512 M2521, M0813 M1513	AG151399.1 AE014756.1	B. longum strain KB B.Longum NCC2705	99

M1514	AJ270492.1 AE014756.1	Butyrate-producing bacterium B.Longum NCC2705	99
M1511	AJ311605.1 AY267190.1	<i>B. breve</i> B. breve strain KB76	88
F0914 F0913 , F0512	U25952.1 U25952.1	B. bifidum KCTC B. bifidum KCTC	99
F0311 , F0313	AE014756.1 AE014786.1	B.Longum NCC2705	99
F0621	AF432082.1	<i>B. catenulatum</i>	99


\*به آدرس: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/>

\*\*درصدها بدون در نظر گرفتن اشتباهات دستگاه سیکونسر در کروماتوگرام محاسبه شده است. در اکثر موارد با خارج کردن خطای سیکونسر میزان همولوژی تا 100 درصد ارتقا می‌یابد.




**شکل 1:** فرآورده های حاصل از PCR با استفاده از پرایمر اختصاصی سطح جنس *Bif164f* و *Bif601r* : (a) خطوط 1 تا 18: *F0511 F0641 F0911 M0311 , M0812 F2511 M0311 , F1711 , F1713 F0411 , M1513 M1512M1511 F0411 F0211* ، کنترل منفی لاکتوباسیلوس جنس *ATCC 332* ، کنترل مثبت بیفیدوباکتریوم آدولستیس *ATCC1730* ، شاهد حاوی همه اجزاء مخلوط واکنش در PCR بجز DNA . (b) خطوط 1 تا 18: *F0912 , M0312 F0312 , M0811 F0311M2611 F0321 , UU11 F4321 M1514 F0611 F0412 , F4312 F1011 F1713 F1713* ، کنترل مثبت بیفیدوباکتریوم آدولستیس *ATCC1730* ، شاهد حاوی همه اجزاء مخلوط واکنش در PCR بجز DNA (c) خطوط 1 تا 8: *M1515 , F1714 F0411 , F0632 F0314 M0511* ، کنترل منفی لاکتوباسیلوس جنس *ATCC 332* ، کنترل مثبت بیفیدوباکتریوم آدولستیس *ATCC1730* ، شاهد حاوی همه اجزاء مخلوط واکنش PCR بجز DNA ؛ M در دو طرف هر یک از اشکال مارکر 500bp (d) اندازه باندهای مربوط به نشانگر جهت مقایسه در اشکال 1a ، 1b و 1c

نوکلئوتیدهای ژن 16S rRNA ( با پرایمر عمومی F1 یا R1 ) در آنها بررسی شد. علاوه بر این تعدادی از سویه‌های شناخته شده از گروه اول که با آزمایشات فنوتیپی در سطح گونه شناسایی شده بودند، نیز با این روش بررسی شدند. نتایج حاصل از این بخش از آزمایشات در شکل 1 و جدول 3 ملاحظه می‌شود.



a)



b)

**شکل 2:** فرآورده حاصل از PCR با استفاده از پرایمرهای عمومی به اندازه تقریبی 1500bp : به ترتیب خط‌های 1 تا 17 عبارتند از: *F0914, F0913, F0313, F0631, M0813, F0621, F0311, F0512, F1712, F4311, M1511, M2011, M0521, M0311, M1513, M1512, M1514, M2521* ( در این شکل ظاهر نشده است ) b) اندازه باندهای مربوط به نشانگر جهت مقایسه در اشکال 2a

PCR با استفاده از پرایمرهای عمومی و تعیین توالی نوکلئوتیدهای ژن 16S rRNA برای تأیید و همچنین تعیین نوع گونه برخی از باکتری‌های جدا شده که الگوی تخمیر کربوهیدرات‌های آنها با هیچ یک از بیفیدوباکتریوم‌هایی که تاکنون شناخته شده است (از گروه دوم) یکسان نبود، توالی

تعداد باکتری‌های بررسی شده با این روش 18 سویه است که پس از تعیین توالی نوکلئوتیدها در این گونه‌ها و مقایسه آنها با داده‌های موجود در بانک ژن به آدرس <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/> ، میزان همولوژی (Hemology) آنها با همدیگر بررسی شد. از 18 باکتری بررسی شده 13 عدد به عنوان بیفیدوباکتریوم لانگوم، 3 عدد به عنوان بیفیدوباکتریوم بیفیدوم، یک ایزوله بیفیدوباکتریوم کتولاکتوم و یکی دیگر بیفیدوباکتریوم بروی شناسایی شدند. میزان همولوژی توالی نوکلئوتیدهای ژن 16S rRNA در 13 سویه آزمایش شده در این تحقیق با توالی نوکلئوتیدهای 16S rDNA موجود در داده‌های بانک ژن مربوط به بیفیدوباکتریوم لانگوم 99٪ است. توالی نوکلئوتیدهای سه سویه از باکتری‌های آزمایش شده نیز با توالی نوکلئوتیدهای بیفیدوباکتریوم بیفیدوم به میزان 99٪ همولوژی دارند. در دو مورد دیگر نیز همولوژی بالایی با بیفیدوباکتریوم کتولاکتوم (99٪) و بیفیدوباکتریوم بروی (88٪) مشاهده شد (جدول 3).

### بحث

بررسی نتایج حاصل از روش‌های فنوتیپی و روش‌های ژنتیکی نشان می‌دهد که تنها استفاده از یک روش شناسایی نمی‌تواند موجب شناسایی دقیق ایزوله‌های باکتریایی حاصل از یک منبع طبیعی باشد و معمولاً باید نتایج حاصل از روش‌های فنوتیپی با روش‌های ژنتیکی مقایسه و نتیجه نهایی استنتاج گردد. Langendijk و همکارانش (1995) نیز در یافته‌های خود در این مورد تأکید کرده‌اند (15).

طبق نتایج حاصل از به کارگیری PCR با پرایمرهای اختصاصی، همه باکتری‌هایی که با روش‌های فنوتیپی به عنوان بیفیدوباکتریوم در سطح جنس شناسایی شده بودند با استفاده از این روش هم تأیید شدند. این موضوع نشان می‌دهد که معیارهای آزمون شده در سطح جنس مناسب بوده و می‌توان گفت باکتری‌های شناسایی شده با آزمایشات سطح جنس تحت عنوان بیفیدوباکتریوم قابل

همان‌طور که ذکر شد علاوه بر بررسی توالی نوکلئوتیدهای 16S rRNA سویه‌های گروه دوم، تعدادی از سویه‌های شناخته شده در سطح گونه نیز بررسی شدند. نتایج ضمن تأیید نتایج حاصل از روش‌های فنوتیپی بر این واقعیت صحه می‌گذارند که ما در این تحقیق به سویه‌هایی از بیفیدوباکتریوم لانگوم دست یافته‌ایم که قادر نیستند ریبوز را تخمیر نمایند در حالی که در گزارش‌های اسکاردوی و میتسوکا این گونه ریبوز مثبت گزارش شده است (17،23). سویه‌های تأیید شده ریبوز منفی عبارتند از: M2011، M0521، M1512، M1513، M2521. بنابراین، این سویه‌ها در حال حاضر تا انجام پژوهش‌های بیشتر به ترتیب تحت عناوین زیر نام‌گذاری می‌شوند:

*Bifidobacterium longum* M0521

*Bifidobacterium longum* M2011

*Bifidobacterium longum* M1512

*Bifidobacterium longum* M1513

*Bifidobacterium longum* M2521

برخی از سویه‌های ریبوز مثبت تأیید شده با استفاده از پرایمرهای اختصاصی Bif 164f و Bif 601r و بررسی شده با استفاده از روش تعیین توالی نوکلئوتیدهای ژن S 16rRNA در شکل 1 و 2 دیده می‌شوند که آنها نیز به همین روش نام‌گذاری می‌گردند:

*Bifidobacterium longum* M0311

*Bifidobacterium longum* M1514

با توجه به یافته‌های حاصل از این پژوهش و کارهای مشابه (16،17،23،28) می‌توان نتیجه گرفت که PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی همراه با آزمون‌های فنوتیپی می‌تواند شناساگرهای مهمی برای شناسایی نژادهای بیفیدوباکتریوم در نمونه‌های مدفوع و نیز کنترل کیفی در کشت‌های با نژادهای پروبیوتیک باشند.

بررسی گسترده‌تر بیفیدوباکتریوم در فلور میکروبی روده در کشور، تعیین نقش‌های فیزیولوژیک، مکانیسم‌های اثر و ارتقاء سلامت در بدن با خوراندن پروبیوتیک‌ها به انسان به خصوص با مطالعه روی افرادی که در معرض خطر سرطان روده قرار دارند، انجام

قبول و مورد پذیرش است. اما از آنجایی که نتایج حاصل از 8 ایزوله تأیید نشده با روش‌های فنوتیپی متفاوت از آنچه بود که از اعمال روش‌های ژنتیکی حاصل شد و تکرار آزمون‌های فنوتیپی نشان داد نتایج برخی آزمایشات اولیه به قدر کافی دقیق و صحیح نبوده است، قابل اعتماد بودن بیشتر نتایج حاصل از روش‌های ژنتیکی نسبت به روش‌های کلاسیک ثابت می‌شود. شناسایی باکتری‌ها با استفاده از روش بررسی توالی نوکلئوتیدهای 16SrRNA نیز تفاوت‌هایی در سطح گونه، با نتایج حاصل از روش‌های فنوتیپی را نشان داد. بنابراین بر اساس نتایج حاصل می‌توان با قاطعیت گفت که تنها استفاده از روش‌های کلاسیک برای شناسایی بیفیدوباکتریوم‌ها به خصوص در سطح گونه کافی نبوده و نتایج حاصل از آنها به طور کامل قابل اعتماد نیست. لذا پیشنهاد می‌شود با توجه به پیشرفت روش‌ها و ابزار تحقیق در کشور ما نیز برای شناسایی باکتری‌ها تنها به روش‌های کلاسیک اکتفا نشود بلکه امکانات بررسی‌های مولکولی و ژنتیکی نیز فراهم گردد.

مقایسه نتایج توالی نوکلئوتیدهای 16SrRNA و نتایج حاصل از بررسی خواص تخمیری سویه‌های F1712، F4311، M0311، F0631، M0813، جالب است. زیرا علی‌رغم قرارگیری این سویه‌ها در زیر گونه بیفیدوباکتریوم لانگوم اختلافات قابل توجهی در تخمیر کربوهیدرات‌های آنها با این گونه مشاهده می‌شود. این سویه‌ها در الگوی تخمیر خود به ترتیب دارای چهار، دو، پنج، سه و شش اختلاف با بیفیدوباکتریوم لانگوم می‌باشند. بنابراین با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه می‌توان گفت این ایزوله‌ها سویه‌های جدیدی از بیفیدوباکتریوم لانگوم بوده و در حال حاضر تا انجام تحقیقات بیشتر این باکتری‌ها به ترتیب تحت عناوین زیر نام‌گذاری می‌شوند:

*Bifidobacterium longum* F1712

*Bifidobacterium longum* F4311

*Bifidobacterium longum* M0311

*Bifidobacterium longum* F0631

*Bifidobacterium longum* M0813



مطالعاتی برای به کارگیری بیفیدوباکتریومها در فرآوردههای لبنی در ایران، ایجاد تغییرات ژنتیکی در بیفیدوباکتریومها برای افزایش رشد و ماندگاری در شیر، فراهم آوردن بستری برای کار همه جانبه در خصوص بیفیدوباکتریومها با تشکیل تیمی قوی از متخصصین بیولوژی، میکروبیولوژی، تغذیه و تکنولوژیستها در بخش صنایع غذایی در کشور از جمله پیشنهاداتی است که برای کارهای آینده ارائه می شود.

### تقدیر و تشکر

از همکاریهای جناب آقای مهندس علی گل موحد، انستیتوی ملی علوم و تحقیقات کانادا (INRS-Institut, Armand-Frappier, Pointe-Claire, Canada)، آزمایشگاه تشخیص طبی پاسارگاد مشهد، پژوهشکده بوعلی مشهد و سرکار خانم سهیلا مشکوری سپاسگزاری می نماید.

**Summary****Identification of *Bifidobacterium* Strains Isolated from Fecal Samples of Some Iranian Subjects Using 16SrRNA Gene Sequence Analysis and PCR-based Gene Specific Primers**Khomeiri M., MSc.<sup>1</sup>, Mortazavi S.A., PhD<sup>2</sup>, Ghoddusi H.B., PhD<sup>3</sup>, Khamessan A., PhD<sup>4</sup>, Ahmad D., PhD<sup>5</sup>, and Shahidi F., PhD.<sup>3</sup>

1. PhD. Student of Food Science and Technology, 2. Professor, 3. Associate Professor, Food Science and Technology Department, Agricultural School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. 4. Member of Animal Science Research Institute, Karaj, Iran 5. Faculty Member of INRS, Canada

For the first time in Iran 40 strains of *Bifidobacterium* were isolated from feces of Iranian subjects. By using phenotypic tests, 18 isolates were identified as *Bifidobacterium longum*, 10 as *Bifidobacterium bifidum* and one as *Bifidobacterium catenolatum*. In order to validate these results and also to identify other isolates that had not been identified by phenotypic tests, two methods of PCR with genus-specific primers of *Bif164f* and *Bif601r* and 16SrRNA gene sequence analysis were applied. Results of PCR confirmed the obtained phenotypic identifications. Moreover by this method the 8 remaining strains were identified as *Bifidobacterium* species. Using sequencing 16SrRNA gene, 5 *B. longum* strains were identified that had different fermentation pattern from *B. longum*. Some new ribose negative *Bifidobacterium longum* strains were also identified. The obtained results present new strains of *Bifidobacterium longum*.

**Key Words:** *Bifidobacterium*, 16S rRNA, PCR, Iranian strains, *Bif 164f*, *Bif 601r*, Identification  
Journal of Kerman University of Medical Sciences, 2005; 12(1): 21-31

**منابع**

1. خمیری، مرتضی؛ قدوسی، حمید؛ مرتضوی، سیدعلی؛ خامسان، علی؛ احمد، درخشان و شهیدی، فخری. جداسازی، شناسایی و بررسی چگونگی توزیع نژادهای بیفیدوباکتریوم در برخی از افراد ایرانی. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (زیر چاپ).
2. Arunachalam KD. Role of bifidobacteria in nutrition, medicine and technology. *Nutrition Research* 1999; 19(10): 1559-1597.
3. Ausubel F.M, Brent R, Kingston R.E, Moore D.D, Seidman J.G, Smith J.A and Struhl K (eds). Current Protocols in Molecular Biology. Vol 1., John Wiley & Sons, 1998;.
4. Beerens H. An elective and selective isolation medium for *Bifidobacterium* spp. *Letters in Applied Microbiology* 1990; 11: 155-157.
5. Bernhard AE and Field KG. Identification of nonpoint sources of fecal pollution in coastal waters by using host-specific 16S ribosomal DNA genetic markers from fecal anaerobes. *Appl Environ Microbiol* 2000; 66(4): 1587–1594.
6. Briedis DJ, Khamessan A, McLaughlin RW, Vali H, Panaritou M, and Chan EC. Isolation of *Campylobacter fetus* subsp. *fetus* from a Patient with Cellulitis. *J Clin Microbiol* 2002; 40(12): 4792–4796.
7. Fooks LJ, Fuller R and Gibson GR. Probiotics, prebiotics, and human gut microbiology. *Int Dairy Journal* 1999; 9(11): 53-61.
8. Fukushima Y, Kawata Y, Hara H, Terada A and Mitsuoka T. Effect of a probiotic formula on

- intestinal immunoglobulin A production in healthy children. *Int J Food Microbiol* 1998; 42(1-2): 39-44.
9. Fuller R. Probiotics in man and animals. *J Appl Bacteriol* 1989; 66(5): 365-378.
  10. Gibson GR and Wang X. Inhibitory effects of bifidobacteria on the growth of other colonic bacteria. *J Appl Bacteriol* 1994; 77(4): 412-420.
  11. Gomes A.M.P and Malcata F.X. Bifidobacterium spp. and Lactobacillus acidophilus: biological, biochemical, technological and therapeutical properties relevant for use as probiotics. *Trends in Food Science & Technology* 1999; 10: 139-157.
  12. Holzapfel WH, Haberer P, Snel J, Schillinger U and Huis in't Veld JH. Overview of gut flora and probiotics. *Int J Food Microbiol* 1998; 41(2): 85-101.
  13. Kaufmann P, Pfefferkorn A, Teuber M and Meile L. Identification and quantification of Bifidobacterium species isolated from food with genus-specific 16S rRNA-targeted probes by colony hybridization and PCR. *Appl. Environ Microbiol* 1997; 63(4): 1268-1273.
  14. Klein G, Pack A, Bonaparte C and Reuter G. Taxonomy and physiology of probiotic lactic acid bacteria. *Int J Food Microbiol* 1998; 41(2): 103-125.
  15. Langendijk PS, Schut F, Jansen GJ, et al. Quantitative fluorescence in situ hybridization of Bifidobacterium spp. with genus-specific 16S rRNA targeted probes and its application in fecal samples. *Appl Environ Microbiol* 1995; 61(8): 3069-3075.
  16. Matsuki T, Watanabe K, Tanaka R and Oyaizu H. Rapid identification of human intestinal bifidobacteria by 16S rRNA-targeted species and group-specific primers. *FEMS Microbiol Lett* 1998; 167(2): 113-121.
  17. Matsuki T, Watanabe K, Fujimoto J, et al. Development of 16S rRNA-Gene-targeted Group-Specific Primers for the Detection and Identification of Predominant Bacteria in Human Feces. *Appl Environ Microbiol* 2002; 68(11): 5445-5451.
  18. Mitsuoka T. Taxonomy and ecology of bifidobacteria. *Bifidobacteria Microflora* 1984; 3(1): 11-28.
  19. Pereira DI and Gibson GR. Cholesterol assimilation by lactic acid bacteria and bifidobacteria isolated from the human gut. *Appl Environ Microbiol* 2002; 68(9): 4689-4693.
  20. Rafter J. Probiotics and colon cancer. *Best Pract Res Clin Gastroenterol* 2003; 17(5): 849-859.
  21. Roy D, Sirois S and Vincent D. Molecular discrimination of lactobacilli used as starter and probiotic cultures by amplified ribosomal DNA restriction analysis. *Curr Microbiol* 2001; 42(4): 282-289
  22. Roy D and Ward P. Evaluation of rapid methods for differentiation of Bifidobacterium species. *Journal of Applied Bacteriology* 1990; 69: 739-749.
  23. Satokari RM, Vaughan EE, Akkermans AD, Saarela M and deVos WM. Bifidobacterial diversity in human feces detected by genus-specific PCR and denaturing gradient gel electrophoresis. *Appl Environ Microbiol* 2001; 67(2): 504-513.
  24. Scardovi V. Genus Bifidobacterium Orla-Jensen, 1924. In: Krieg NR and Holt JG(Eds.), *Bergey's Manual of Systematic Bacteriology*. Vol 1, 1984; PP 1418-1434.
  25. Solga SF. Probiotics can treat hepatic encephalopathy. *Med Hypotheses* 2003; 61(2): 307-313.

26. Tamime AY, Marshall VM and Robinson RK. Microbiological and technological aspects of milks fermented by bifidobacteria rev. 1995; *J Dairy Res* 1995; 62(1): 151-187.
27. Tilsala-Timisiarvi A and Alatossava T. Development of oligonucleotide primers from the 16S-23S rRNA intergenic sequences for identifying different dairy and probiotic lactic acid bacteria by PCR. *Int J Food Microbiol* 1997; 35(1): 49-56.
28. Venema K and Maathuis AJ. A PCR-based method for identification of bifidobacteria from the human alimentary tract at the species level. *FEMS Microbiol Lett* 2003; 224(1): 143-149.
29. Zavaglia A.G, deUrraza P and DeAntoni G. Characterization of Bifidobacterium Strains Using Box Primers. *Anaerobe* 2000; 6: 169-177.