

شیوع کم کاری تیروئید در خانم های باردار مراجعه کننده به درمانگاه شهید دادین کرمان بر حسب عوامل خطر

طیبه نادری^{۱*}، زهرا هنرود^۲، عباس بهرامپور^۳، غلامرضا یوسفزاده^۴

خلاصه

مقدمه: با توجه به اینکه غده تیروئید جنین در ماه های اوایل حاملگی (کمتر از ۲۰ هفته) هنوز فعال نیست، مغز جنین از نظر هورمون های تیروئید شدیداً به مادر وابسته است. اختلال عملکرد تیروئید در مادر به ویژه هیپوتیروئیدی آشکار و تحت بالینی با افزایش خطر سقط، پرها کلامپسی، جدا شدن زودرس جفت، وزن کم هنگام تولد، زایمان پیش از موعد و کاهش هوش کودک همراه است. هدف از این تحقیق، تعیین توزیع کم کاری تیروئید در خانم های باردار زیر ۲۰ هفته بر حسب عوامل خطر می باشد.

روش: در این بررسی ۶۲۰ خانم باردار مراجعه کننده برای مراقبت های دوره حاملگی با سن حاملگی کمتر از ۲۰ هفته با انجام تست TSH و Free T4 به روش Elexiss مورد آزمایش قرار گرفتند. برای هر فرد پرسشنامه ای حاوی تعدادی از عوامل خطر شناخته شده هیپوتیروئیدی تکمیل شد. شیوع کم کاری تیروئید اعم از آشکار و تحت بالینی و ارتباط احتمالی آن با بعضی عوامل خطر مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها: شیوع کم کاری تیروئید ۱۰/۱۵ درصد ۱۰/۲۵٪ آشکار و ۷/۹٪ تحت بالینی) به دست آمد. کم کاری تیروئید با هیچ کدام از عوامل خطر مورد مطالعه در این تحقیق ارتباط معنی دار نداشت. و فقط هیپوتیروئیدی آشکار با سابقه وجود آлерژی در فرد ارتباط معنی دار داشت ($P < 0.0025$).

نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای هیپوتیروئیدی (آشکار و تحت بالینی) و عوارض مادری و جنینی آن و هم چنین عدم همراهی آن با عوامل خطر مفروض در حاملگی به ویژه در نوع تحت بالینی که فقط با تست آزمایشگاهی قابل تشخیص می باشد، بهتر است در تمام زنان باردار همراه با تست های رایج حاملگی هیپوتیروئیدی نیز بررسی شود.

واژه های کلیدی: کم کاری تیروئید، بارداری، عوامل خطر

۱-دانشیار بیماری های زنان و مامایی، دانشکده پزشکی افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۲-دستیار بیماری های زنان و مامایی، دانشکده پزشکی افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۳-استاد آمار حیاتی، دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۴-استادیار اندوکرینولوژی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی و دانشکده پزشکی افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نویسنده مسؤول، آدرس: کرمان، بزرگراه امام، پردیزه افضلی پور، گروه زنان • آدرس پست الکترونیک: tayebeh_ndr39@yahoo.com

دریافت مقاله اصلاح شده: ۱۳۹۰/۸/۱۴ پذیرش مقاله: ۱۳۹۰/۹/۱۶

مقدمة

در مادران مبتلا به کم کاری تیروئید میزان اختلال تکامل عصبی روانی جنین، اختلال رشد داخل رحمی، وزن کم هنگام تولد، زجر جنینی، سقط خودبه خودی، مرگ جنین و همچنین شیوع نازایی، زایمان زودرس، جدا شدن زودرس جفت و پره اکلامپسی افزایش می یابد (۱۶، ۱۷). کودکان متولد شده از مادران هیپوتیروئید ضریب هوشی پایین تری دارند (۱۷، ۳).

شایع‌ترین علت کم کاری تیروئید در مناطقی که در آنها میزان مصرف ید طبیعی است، بیماری خودایمنی تیروئید می‌باشد (۲).

در مراحل اولیه هیپوتیروئیدی که با علایم و نشانه‌های غیرقابل تشخیص همراه است (تحت بالینی)، وضعیت جبران شده را می‌توان با توجه به افزایش TSH بیشتر از حد فوقانی محدوده طبیعی، یعنی $45-4/0$ میلی‌یونیت در لیتر و T4 طبیعی ($0.9-2$ ng/dl) شناسایی کرد. چندین پژوهش این عقیده را که هیپوتیروئیدی تحت بالینی هیچ اثری بر حاملگی ندارد زیر سؤال برده‌اند (۱۸-۲۰). مسئله مهم در تشخیص هیپوتیروئیدی در حاملگی انتخاب تست حساس برای تشخیص است. در مردان و زنان غیرحمله با استفاده از اندازه‌گیری سطح T4 و TSH می‌توان هیپوتیروئیدی را تشخیص داد (۳). افزایش قابل توجه گلوبولین متصل شوند به تیروکسین (TBG) به علت افزایش گلیکوزیلاسیون و لذا کاهش پاک‌سازی آن موجب افزایش غلظت تووال هورمون‌های تیروئیدی می‌شود. به علاوه عوامل تیروتروپیک ترشح شده از جفت یعنی تیروتروپین و گنادولتروپین کوریونی انسان بر روی عملکرد تیروئید و سطح کل T4 و T3 تأثیر می‌گذارند و با وجودی که سطح هورمون آزاد که بخش فعال هورمون است در محدوده طبیعی است، سطح کل هورمون‌های تیروئیدی افزایش می‌یابد. به همین دلیل بهترین شاخص‌های عملکرد تیروئید در حاملگی T4 Free و TSH هستند (۲۱). در ماههای اولیه

مقدمه

شیوع کم کاری و اختلالات تیروئید بر اساس مراجع مختلف متفاوت است. در بعضی مطالعات میزان شیوع هیپوتیروئیدیسم $2/5$ درصد (۱) و در برخی شیوع کلی $7/5$ درصد گزارش شده است (۲). بهدلایل ناشناخته اختلالات تیروئید در زنان به میزان 10 برابر شایع‌تر از مردان است (۳). چون اکثر موارد بیماری تیروئید دارای ماهیت خود اینمنی هستند، مستعد بودن زنان به ابتلا به بیماری‌های خود اینمنی (احتمالاً به علت محیط هورمونی زنانه) می‌تواند یکی از عوامل مطرح در این زمینه باشد. از غربالگری همگانی تیروئید در دو گروه زنان مسن و زنان حامله به طور روزافزون حمایت می‌شود (۴). میزان بروز هیپوتیروئیدیسم تحت بالینی (sub-clinical) در زنان 18 تا 45 ساله در حدود 5 درصد است که سالانه 2 تا 5 درصد از این عده به سمت نارسایی آشکار پیشرفت می‌کنند (۱) و در زنان با افزایش سن میزان شیوع افزایش می‌یابد (۵).

پیامدهای همراه با اختلالات تیروئید شامل خونریزی‌های غیرطبیعی، افزایش شیوع کیست‌های تخدمانی، سقط مکرر، وزن کم هنگام تولد، نارسایی تخدمان و گالاکتوره می‌باشد (۷،۱۳،۱۵). سرخجه مادرزادی، افزایش و یا کاهش ید رژیم غذایی، کاهش سلنیوم، دفعات زایمان، استفاده از قرص‌های ضدبارداری، تعداد سال‌هایی که فرد قدرت باروری دارد، استرس، تغییرات فصلی، آلرژی، توارث، مصرف سیگار، آسیب ناشی از پرتوتابی و عفونت‌های ویرال و باکتریال با اختلالات تیروئید در ارتباط هستند (۸،۹). زنان مبتلا به دیابت نوع ۱ برابر بیشتر احتمال دارد که اختلال عملکرد تیروئید را پس از زایمان تجربه کنند (۱۰،۴). در مبتلیان به سندرمهای داون و ترنر و در موارد آنمی، ترمبوسیتوپنی، تیروئید کتومی ساب‌توال و کمبود ید رژیم غذایی کم کاری تیروئید بیشتر دیده می‌شود (۱۵،۱۱).

(بالینی و تحت بالینی) در خانم‌های باردار بود تا در صورت بالا بودن شیوع آن، غربالگری آن توسط اندازه‌گیری TSH و Free T4 توصیه گردد.

روش بررسی

تعداد ۶۲۰ خانم باردار با سن حاملگی کمتر از ۲۰ هفته که برای اولین بار برای مراقبت‌های دوران بارداری به درمانگاه شهید دادیان شهر کرمان مراجعه داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند. بعد از دادن توضیحات کافی و بیان هدف از انجام طرح و جلب رضایت آنها، مقدار ۵ سی‌سی خون گرفته و بعد از سانتریفوژ کردن سرم جدا و فریز می‌شد. نمونه‌ها به‌طور هفتگی برای اندازه‌گیری TSH و Free T4 به روش Elexis به آزمایشگاه ارسال می‌گردیدند. همچنین به‌منظور تعیین ارتباط احتمالی عوامل خطر ایجاد کم کاری تیروئید یا همراه با آن شامل، سابقه خانوادگی کم کاری تیروئید، وجود دیابت تیپ I در بیمار، سابقه نازایی، مصرف سیگار، مصرف لیتیوم، آمیودارون، قرص‌های ضدبارداری خوراکی، سابقه آلرژی، سابقه رادیوتراپی به گردن، سابقه کیست تخمدان سؤال می‌شد و پارامترهای شمارش خونی شامل $\text{Hb} < 10 \text{ g/dl}$ و $\text{Plt} < 10,000 / \mu\text{L}$ در فرم ضمیمه پرسشنامه ثبت می‌شد و افرادی که سابقه بیماری تیروئید شناخته شده داشتند از مطالعه حذف می‌شدند. سطح TSH بالاتر از 4 ng/dL به عنوان Free T4 و $2-4 \text{ ng/dL}$ هیپوتیروئید تلقی می‌شد. TSH بین $2-4 \text{ ng/dL}$ و $0.7-2 \text{ ng/dL}$ نیز به عنوان کمتر از طبیعی یعنی $0.7-2 \text{ ng/dL}$ تلقی می‌شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون دو نمونه‌های مستقل و آزمون مربع کای استفاده شد.

حاملگی (به‌ویژه تا هفته ۲۰ حاملگی) که هنوز غده تیروئید جنین فعال نیست مغز از نظر هورمون‌های تیروئیدی شدیداً به مادر وابسته است. به همین دلیل هیپوتیروئیدی آشکار و تحت بالینی مادر با افزایش خطر سقط، پره اکلامپسی، وزن کم هنگام تولد، زایمان پیش از موعد و کاهش هوش کودک همراه هستند (۱۱). با وجود این هنوز هم در مورد غربالگری همگانی هیپوتیروئیدی در حاملگی اختلاف نظر وجود دارد. برخی غربالگری همگانی را در زنان نازا و در زمان حاملگی توصیه می‌کنند (۸،۲۲) و گروهی غربالگری را مقرن به صرفه نمی‌دانند (۲۰،۱۳).

در یک بررسی در سال ۲۰۰۵ در آمریکا، اختلال عملکرد بالینی تیروئید با افزایش موارد فشارخون، زایمان زود هنگام، وزن تولد پایین، جدا شدن زودرس جفت و مرگ جنین در حاملگی همراه بوده است. در بررسی مذکور زنان با TSH بالای $97/5 \text{ ng/dL}$ پرستایل برای سن حاملگی و $\text{FT4} < 68 \text{ ng/dL}$ به عنوان تحت بالینی در نظر گرفته شدند و در این گروه جداشدن زودرس جفت ۳ برابر و زایمان زودرس ۲ برابر افزایش یافته بود (۱۶). در بررسی دیگری بر روی ۸۷ زن حامله با آنتی‌بادی تیروئید عملکرد طبیعی دیده شد. زنان با (Asymptomatic Autoimmune Thyroid Disorders:AITD) که در اوایل حاملگی یو تیروئید می‌باشند، علی‌رغم کاهش سطح آنتی‌بادی‌ها در معرض خطر بروز کم کاری تیروئید در طی حاملگی می‌باشند. بنابراین غربالگری عمومی کم کاری تیروئید و درمان آن با لوتیروكسین در طی حاملگی پیشنهاد شده است (۳). در بررسی دیگری در سال ۲۰۰۴ به این نتیجه رسیدند که با توجه به عوارض جنینی هیپوتیروئیدی تشخیص داده نشده از جمله افزایش سقط و ضربیت هوشی پایین، تمامی زنان مایل به حاملگی و یا حامله باید از نظر وضعیت تیروئید غربالگری شوند (۹). هدف از انجام این مطالعه تعیین شیوع کم کاری تیروئید

نتایج

هیپوتیروئید ۱۰ نفر (۱۵/۸٪) سابقه مثبت خانوادگی، ۳ نفر (۶/۴٪) دیابت تیپ ۱، ۴ نفر (۶/۳۴٪) سابقه نازایی، ۲ نفر (۱/۳٪) مصرف سیگار، ۴ نفر (۶/۳۴٪) مصرف لیتیم و آمیودارون و ۱۳ نفر (۲۰/۶۳٪) سابقه مصرف قرص‌های ضدبارداری خوراکی داشتند که بین هیچ‌کدام از عوامل خطر ذکر شده در بالا و هیپوتیروئیدی اختلاف معنی‌دار آماری مشاهده نشد (جدول ۲). در گروه سالم ۹۰ نفر (۱۶/۱۵٪) و در گروه هیپوتیروئید ۱۶ نفر (۲۵/۳۹٪) سابقه آلرژی داشتند که ۶ نفر (۴۲/۸۵٪) مربوط به گروه بالینی و بقیه مربوط به گروه تحت بالینی بودند (جدول ۳). بین هیپوتیروئیدی بالینی و آلرژی ارتباط معنی‌دار دیده شد ($P=0.022$) ولی بین هیپوتیروئیدی تحت بالینی و مجموع بالینی و تحت بالینی با سابقه آلرژی اختلاف معنی‌دار مشاهده نشد. سابقه رادیوتراپی به گردن، سابقه کیست تخدمان، میانگین سطح هموگلوبین و شمارش پلاکت با هیپوتیروئیدی ارتباط معنی‌دار آماری نشان دادند (جدول ۲). در مورد آنمی و ترومبوسیتوپنی به دلیل کمبودن تعداد نمونه‌ها تعیین ارتباط آماری مقدور نبود.

شیوع هیپوتیروئیدی در بررسی حاضر ۱۰/۱۵ درصد (۶۳ نفر از مجموع ۶۲۰ نفر) به دست آمد که ۲/۲۵ درصد (۱۴ نفر) شکل بالینی و ۷/۹ درصد (۴۹ نفر) نوع تحت بالینی بودند.

میانگین سن مادران ۲۵/۷۸ سال و در گروه هیپوتیروئید ۲۵/۸۳ سال بود. بین سن مادر و هیپوتیروئیدی ارتباط معنی‌دار آماری مشاهده نشد ($P=0.894$). میانگین سن حاملگی در دو گروه ۱۲/۷۷ هفته و میانگین دفعات زایمان در گروه سالم ۱/۶۴ و در گروه هیپوتیروئید ۱/۶۹ بود. در مجموع ۲۸/۳۶ درصد افراد گروه سالم و ۲۲/۲۲ درصد گروه هیپوتیروئید شاغل بودند. در مجموع متغیرهای سن حاملگی، شاغل بودن یا نبودن مادر و دفعات زایمان با هیپوتیروئیدی ارتباط معنی‌دار آماری نداشتند (جدول ۱). در گروه سالم ۶۸ نفر (۱۲/۲٪) سابقه خانوادگی مثبت کم کاری تیروئید، ۲۹ نفر (۵/۲۰٪) دیابت تیپ ۱، ۴۸ نفر (۸/۶۱٪) سابقه نازایی، دو نفر (۳/۱۷٪) مصرف سیگار، ۱۲ نفر (۲/۱۵٪) مصرف آمیودارون و لیتیم و ۷۸ نفر (۱۴٪) سابقه مصرف قرص‌های ضدبارداری خوراکی و در گروه

جدول ۱. ارتباط بین هیپوتیروئیدی و مشخصات جمعیت‌شناختی مادران مورد بررسی

P value	ندارد	دارد	مشخصات جمعیت‌شناختی	
			کم کاری تیروئید	
۰/۸۹۴	۲۵/۷۷	۲۵/۸۳	میانگین سن مادران (سال)	
۰/۶۴۰	۱۲/۷۱	۱۳/۱۱	میانگین سن حاملگی (هفته)	
۰/۵۴۲	۱/۶۲۹	۱/۶۹۶	میانگین دفعات زایمان	
۰/۱۲۲	۱۲/۷۶	۱۲/۱۹	میانگین سطح Hb	
۰/۲۵۳	۲۴۴/۱	۲۵۳/۸	میانگین پلاکت	

جدول ۲. ارتباط هیپوتیروئیدی بالینی و تحت بالینی با عوامل خطر شناخته شده هیپوتیروئیدی

P value	جمع	ندارد	دارد	کم کاری تیروئید		عوامل خطر
				+	-	
0/۸۸۹	۴۸	۳۸	۱۰	+ سابقه خانوادگی کم کاری تیروئید	-	دیابت نوع I
	۵۷۲	۵۱۹	۵۳			
0/۳۴۵	۳۲	۲۹	۳	+ رادیو تراپی به گردن	-	کیست تخمدان
	۵۸۸	۵۲۸	۶۰			
0/۳۴۵	۱۱	۱۰	۱	+ نازابی	-	صرف سیگار
	۶۰۹	۵۴۷	۶۲			
0/۲۸۷	۸۹	۷۹	۱۰	+ صرف دارو	-	صرف قرص های ضدبارداری
	۵۳۱	۴۷۸	۵۳			
0/۱۰۲	۵۲	۴۸	۴	+ آخر	-	آرژی
	۵۶۸	۵۰۹	۵۹			
0/۱۲۷	۴۳	۴۱	۲	+ آخر	-	سایر نمونه ها
	۵۷۷	۵۱۶	۶۱			
0/۲۸۲	۱۶	۱۲	۴	+ هیپوتیروئیدی بالینی	-	کل
	۶۰۴	۵۴۵	۵۹			
0/۸۷۲	۹۱	۷۸	۱۳	+ آخر	-	دیابت نوع II
	۵۲۹	۴۷۹	۵۰			
0/۰۲۲	۱۰۶	۹۰	۱۶	+ آخر	-	آرژی
	۵۱۴	۴۶۷	۴۷			

جدول ۳. ارتباط بین هیپوتیروئیدی بالینی و سابقه آرژی

گروه	آرژی ندارد	آرژی دارد	کل
سایر نمونه ها	۵۰۶	۱۰۰	۶۰۶
هیپوتیروئیدی بالینی	۶	۴۸	۱۴
کل	۵۱۴	۱۰۶	۶۲۰

P=0/۰۲۲

اختلالات تیروئید با تعدادی از بیماری‌ها مانند سلیاک، درماتیت، هپاتیت مزمن، لوپوس ادیسون، نارسایی تخمدان، آرتربیت روماتوئید، دیابت نوع I و ... ارتباط دارد و همچنین تأثیرات فراوانی بر بیماری‌های زنان و طب باروری دارد.

بحث و نتیجه گیری
کم کاری تیروئید چه به صورت بالینی و چه تحت بالینی تأثیرات فراوانی بر بیماری‌های زنان و طب باروری دارد.

زودرس، جداشدن زودرس جفت، افزایش پذیرش نوزادان در بخش مراقبت های ویژه نوزادان (۱۷)، نازابی، پره اکلامپسی، محدودیت رشد داخل رحمی، وزن کم تولد، زجر جنین، سقط خود به خودی، مرگ جنین (۱۶)، ضربیب هوشی پایین تر نوزاد (۲۳، ۲۴) و سایر عوارض مادری و جنینی توصیه می شود غربالگری بدون در نظر گرفتن وجود عامل مستعد کننده در خانم های باردار در اولین مراجعت برای مراقبت دوران بارداری همراه با آزمایش های رایج بارداری با اندازه گیری TSH و FreeT4 انجام شود. در حال حاضر از غربالگری در دو گروه زنان مسن و زنان حامله به طور روزافزون حمایت می شود و در مطالعات انجام شده با توجه به شیوع نسبتاً بالا، غربالگری حتی در زنان مسن بدون علامت گزارش شده (۴) ولی در زنان باردار هنوز به طور رایج انجام نمی گردد. با توجه به اینکه در زنان باردار این عقیده که کم کاری تحت بالینی تیروئید هیچ اثری بر حاملگی ندارد زیر سؤال رفته است (۱۸-۲۰)، بنابراین غربالگری در زنان باردار به طور روتین جهت درمان به موقع و پیشگیری از عوارض متعدد مادری و جنینی عاقلانه به نظر می رسد.

عوامل متعددی از جمله مصرف سیگار، قرص های ضدبارداری، بعضی داروهای، سابقه کیست تخم‌دان، رژیم غذایی، عوامل اتوایمیون، اشعه، آنمی ترومبوسیتوپنی و دیگر عوامل خطر نامبرده در تحقیق از عوامل مستعد کننده همراه می باشند (۱۳، ۱۴، ۱۵). هدف از این بررسی تعیین و مقایسه شیوع هیپوتیروئیدی در دو گروه با و بدون عوامل خطر مطرح بود تا علاوه بر آگاه شدن از میزان شیوع کم کاری تیروئید، ضرورت غربالگری همه خانم های باردار یا فقط گروه های دارای عوامل خطر را تعیین کنیم. در این بررسی شیوع کم کاری تیروئید به طور کلی ۱۰/۱۵ درصد (۲/۲۵ بالینی و ۷/۹ تحت بالینی) به دست آمد که در مقایسه با مطالعات انجام شده قبلی که شیوع ۲/۵-۷/۵ درصد گزارش شده بسیار بالاتر است (۱۲). در نتایج به دست آمده در این بررسی بین کم کاری تیروئید و هیچ کدام از عوامل همراه به جز سابقه آلرژی ارتباط معنی دار مشاهده نشد. با توجه به شیوع نسبتاً بالا و همچنین عدم مشاهده ارتباط معنی دار با عوامل خطر گفته شده و بیماری های همراه و هم چنین اثرات اثبات شده کم کاری تیروئید بر بارداری و ایجاد عوارض مادری و جنینی نظیر زایمان

References

- Cooper DS. Thyroid hormone and pregnancy. *JAMA* 2000; 259(1): 31-75.
- Biglievi EG, Salton PE. Pregnancy and primary hypothyroidism. *J Clin Endocrinol Metab* 2003; 27(1): 1628-30.
- Franklyn JA. The management of hypothyroidism. *New Engl J Med* 1994; 330(24): 1731-8.
- Berek JS, Berek & Novak's Gynecology, 14th ed., Lippincott Williams & Wilkins, 2007; PP 1069-136.
- Cooper DS. Thyroid hormone treatment: new insights into an old therapy. *GAMA* 1989; 261(18): 2694-5.
- Kaplan MM. Monitoring thyroxine treatment during pregnancy. *Thyroid* 1992; 2(2): 147-52.
- Lafranchi S. Congenital hypothyroidism: etiologies, diagnosis, and Management. *Thyroid* 1999; 9 (7): 735-40.
- Abalovich M, Gutierrez S, Alcaraz G, Maccallini G, Garcia A, Levalle O. Overt and subclinical hypothyroidism complicating Pregnancy. *thyroid* 2002; 12(1): 63-8.
- Roberts CGP, Ladenson PW. Hypothyroidism. *Lancet* 2004; 363:793-803.

10. Buescher MA, MC clark HD. Thyroid in pregnancy. *Obstet Gynecol* 2002; 79(2): 136-9.
11. Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Hauth J, Gilstrap L, Wenstrom R. Williams obstetrics, 22nd ed, Mc Graw-Hill, 2005; pp 1340-8.
12. Leon Speroff – endocrine disease / clinical Gynecology Endocrinology and infertility – 7th ed., 2007; PP 685–701.
13. Burrow GN, Fisher DA, Larsen PR. Maternal and fetal thyroid function. *New Engl J Med* 1994; 331(16): 1072-8.
14. Surks MI, Chopra IJ, Mariash CN, Nicoloff JT, Solomon DH. American Thyroid Association guidelines for use of laboratory tests in thyroid disorders, *JAMA* 1990; 263 (11):1529-32.
15. Braverman L.E, Utiger R.D. Werner & Ingbar's The Thyroid: A Fundamental & Clinical Text, 9th ed., Lippincott Williams & Wilkins, 2005; pp 1095-110.
16. Kasper D.L, Braunwald E, Hauser S, Longo D, Jamesson J.L, Fauci A.S. Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th ed., USA, Mc graw-Hill, 2005; PP1732-52.
17. Zeeman GG, Wendel GD, Cunningham FG: Thyroid disease and pregnancy. *Am J Obstetric Gynecol* 2003; 188(9): 532-54.
18. Dahan M, Charg RJ. Hypothyroidism during pregnancy. *Obstet Gynecol* 2001; 98(9): 9-28.
19. Davis LE, Leveno KJ, Cunningham FG. Hypothyroidism complicating Pregnancy. *Obstet Gynecol* 1988; 72(1):108-12.
20. Lazarus JH. Hypothyroidism. *Lancet* 2006; 349(12): 380-93.
21. Bilezikian JP, Silverberg SJ. Asymptomatic primary hypothyroidism. *N Engl J Med* 2004; 350: 1746-51.
22. Leung AS, Millar LK, Konings PP, Montoro M, Mestman JH. Perinatal outcome in hypothyroid pregnancies. *Obstet Gynecol* 1993; 81(3): 349-53.
23. Wolfberg A, Lee-Parritz A, Cohen A, Holmes L, Lieberman E. Maternal hypothyroid disease is associated with poor obstetric or neonatal outcomes. *AM J Obstet Gynecol* 2003; 189(6): 187.

The Prevalence of Hypothyroidism Based on Risk Factors in Pregnant Women Referred to Shahid Dadbin Clinic, Kerman, Iran

Naderi T., M.D^{1*}, Honarvar Z., M.D², Bahrampour A., Ph.D³, Yousefzadeh Gh., M.D⁴.

1. Associate Professor of Obstetrics & Gynecology, Afzalipour School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

2. Resident of Obstetrics & Gynecology, Afzalipour School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

3. Professor of Biostatistics, School of Health & Physiology Research Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

4. Assistant Professor of Endocrinology, Physiology Research Center & Afzalipour School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

* Corresponding author; e-mail: tayebeh_ndr39@yahoo.com

(Received: 6 June 2011 Accepted: 6 Dec. 2011)

Abstract

Background & Aims: Since at early pregnancy (<20 week) fetal thyroid gland is undeveloped, normal development of the Fetal brain is highly dependent on maternal thyroid hormones. There are excessive adverse perinatal outcomes associated with overt and subclinical hypothyroidism such as increase of Abortion, preeclampsia, placenta Abruptio, LBW, preterm labor, impaired fetal neuropsychological development and low IQ scores. The aim of this study was to determine the prevalence of hypothyroidism and its relationship with some known risk factors among pregnant women with gestational age <20 wk.

Methods: A total of 620 pregnant women referred to Dadbin clinic (Kerman/Iran) for their first prenatal care before the 20th week of gestational age were studied for TSH and FT4 levels by Elexis method. A questionnaire including known risk factors of hypothyroidism was filled out for each participant. The prevalence of both clinical and subclinical hypothyroidism and its probable association with some risk factors were studied.

Results: The prevalence of hypothyroidism was 10.15% (clinical=2.25% and subclinical=7.9%). Except for allergy, no relationship between hypothyroidism and considered risk factors was found.

Conclusion: Due to the high prevalence of hypothyroidism (clinical and subclinical) and its neonatal and maternal outcomes, hypothyroidism screening in all pregnant women as one of the routine prenatal cares is suggested.

Keywords: Hypothyroidism, Pregnancy, Risk factors

Journal of Kerman University of Medical Sciences, 2012; 19(3): 225-232