

## معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان جزیره هرمز

Introduction to the flora, life form and chorology of Hormoz Island plants, S. Iran

محمدامین سلطانی‌پور

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

پذیرش: ۱۳۸۵/۳/۲۲

دریافت: ۱۳۸۴/۶/۲۸

### چکیده

در این بررسی تعداد ۱۹۱ گونه گیاهی از سطح جزیره هرمز جمع‌آوری و شناسایی گردید که به ۴۴ تیره (یک تیره بازدنه، ۴۰ تیره دو لپهای و سه تیره تک لپهای) و ۱۴۲ جنس تعلق دارند. از میان گونه‌های تشخیص داده شده نه گونه (۴/۷ درصد) انحصاری ایران هستند. تیره‌های Papilionaceae با ۲۶ گونه، Gramineae با ۲۳ گونه و Compositae با ۲۰ گونه مهمترین تیره‌های گیاهی منطقه هستند. بررسی شکل زیستی نشان داد که تروفیت‌ها با ۴۷/۶ درصد (۹۱ گونه) فراوانترین شکل زیستی هستند. شکل‌های زیستی کامفیت با ۲۲/۵٪، همی‌کریپتوفت با ۱۷/۳٪ و فانروفیت با ۹٪ در درجه بعدی اهمیت قرار دارند. ژئوفیت‌ها با شش گونه و هلیوفیت‌ها با یک گونه اهمیت کمتری دارند. بررسی پراکنش جغرافیایی این گیاهان نشان داد که ۴۴/۵٪ گونه‌ها (۸۵ گونه) به ناحیه صحارا- سندی و ۴۰/۸٪ گونه‌ها مشترک در این ناحیه با عناصر نواحی دیگر است. ۳/۷٪ گونه‌ها (هفت گونه) جهان وطن و ۲/۶٪ گونه‌ها (پنج گونه) متعلق به ناحیه ایرانو- تورانی هستند.

**واژه‌های کلیدی:** فلور، شکل زیستی، جغرافیای گیاهی، جزیره هرمز، استان هرمزگان

### مقدمه

شناسایی و معرفی رستنی‌های یک منطقه در تعیین پتانسیل قابلیت‌های رویشی، شناسایی گونه‌های مقاوم، در حال انقراض و کمک به حفظ آن‌ها، شناسایی گیاهان دارویی،

امکان دسترسی سریع و آسان به گونه‌های گیاهی، امکان افزایش تعداد گونه‌ها و استفاده اصولی از آن‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد (کاشی بزها و همکاران ۲۰۰۴).

جزیره هرمز بخشی از مناطق دریایی حد فاصل خلیج فارس و دریای عمان می‌باشد که در آبهای حوزه استحفاظی استان هرمزگان و در آبراه بین المللی تنگه هرمز واقع شده است. این جزیره در حد فاصل طول جغرافیایی  $25^{\circ} 56'$  تا  $21^{\circ} 56'$  شرقی و در عرض جغرافیایی  $2^{\circ} 27'$  تا  $6^{\circ} 27'$  شمالی گسترش دارد و یکی از مناطق شهری تابعه شهرستان قشم می‌باشد (شکل ۱).




Fig. 1. The map of Hormoz Island (Hormozgan Province).

جزیره هرمز به شکل تقریبی یک بیضی و در جهت شرقی و غربی قرار گرفته به نحوی که سمت شمالی آن به طرف دریا پیش روی نموده است. قطر بزرگ آن بین  $7/5-9$  کیلومتر و طول کوچک آن  $5/5$  کیلومتر است. مساحت این جزیره حدود  $41$  کیلومتر مربع می باشد. این

جزیره با شهر میناب ۶۵ کیلومتر، شهر بندر عباس ۱۸ کیلومتر، شهر قشم ۱۷ کیلومتر، جزیره لارک ۱۶ کیلومتر بندر تیاب ۳۵ کیلومتر و با جزیره السلامه در کشور عمان ۶۰ کیلومتر فاصله دارد (برکم ۱۹۹۶).

جزیره هرمز جزو اقلیم نیمه گرمسیری خلیج فارس می‌باشد که بنا به گزارش‌های موجود میزان رطوبت و دمای هوا در آن از بندر عباس ملایمتر است. رطوبت نسبی در تابستان زیاد و طول دوره خشکی حدود ۶-۸ ماه است. متوسط دمای هوا در دی ماه ۱۵ و در تیر ماه بیش از ۳۴ درجه سانتی‌گراد است. درجه ابری بودن این جزیره ضعیف بوده و مقدار بارندگی آن کمتر از ۲۰۰ میلی‌متر است که معمولاً در فصل زمستان صورت می‌پذیرد (بختیاری ۱۹۹۰).

سطح جزیره اساساً از رسوبات تخریبی، ماسه سنگ و کنگلومرا و مارن تشکیل شده است که کم و بیش دارای صدف هستند. خاک آن اغلب شور و یا دارای گچ است. به طور کلی جزیره هرمز یک گنبد نمکی است که در مدخل خلیج فارس واقع شده و تقریباً دارای ساختمان متحدم‌المرکزی می‌باشد. این جزیره از داخل به خارج شامل سنگ‌های تبخیری، تشكیلات آهن‌دار و رسوبات میومن و پلیومن است. همراه با سنگ‌های تبخیری، سنگ‌های رسوبی و آتش فشانی نیز یافت می‌شود که مجموعاً در گذشته سری هرمز نامیده می‌شده است. پوشش سطحی جزیره هرمز را اغلب صخره‌ها و زمین‌های گستته و ناپایدار پوشانده است که اغلب کانی‌های خرد شده و پوشش خاکی ضعیفی را تشکیل داده‌اند. کل سطح جزیره را که شامل مناطق شمالی، شمال غربی، شمال شرقی، شرق و جنوب غربی می‌باشد خاک‌های عمیق پوشانده است. اراضی شمال و شمال غربی جزیره و همچنین شرق جزیره ناشی از رسوبات عهد حاضر می‌باشد که بافت و ساختمان آن تحت تاثیر فرسایش رسوبات ناشی از گنبد نمکی هرمز قرار گرفته و در بعضی از نقاط به شدت شور و نمکزار شده است که این وضعیت در شرق جزیره مشهود است و همچنین اراضی غرب جزیره دارای چنین وضعی است. اراضی میان آن‌ها را خاک‌های شنی و آهکی پوشانده است و اراضی جنوبی نیز که ماسه‌ای تاریخی می‌باشد و عمیق ترین خاک‌های جزیره را شامل می‌شوند ناشی از تشكیلات گچسازان می‌باشد که روی سازند آغازگاری قرار می‌گیرند (برکم ۱۹۹۶).

رشینگر (Rechinger 1963-98) در فورا ایرانیکا ۶۶ گونه از جزیره هرمز را ذکر کرده است. مبین (۱۹۷۰-۹۵) در کتاب رستنی‌های ایران تعداد ۱۵۲ گونه از رویشگاه‌های استان هرمزگان و ۲۶ گونه از جزیره هرمز نام برده است. کانکل (Kunkel 1977) ۱۰۲ گونه گیاهی از جزیره هرمز را گزارش کرده است. عطار و همکاران (Attar *et al.* 2004) در بررسی فلور جزیره قشم ۳۱۴ گونه بومی از این جزیره را لیست نموده است. ایشان تروفیت‌ها و کامفیت‌ها را

بالاترین طیف زیستی و عناصر صحارا- سندی را بیشترین پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه می‌داند.

### روش بررسی


جمع آوری نمونه‌ها در فصل رویش گیاهان از اسفند ماه تا خرداد ماه ۱۳۷۴ لغایت ۱۳۷۵ از طریق عملیات زمین گردشی و مسافت‌های صحرایی انجام گرفت. نمونه‌های گیاهی پس از مراحل آماده‌سازی در هر باریوم مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان نگهداری و شناسایی گردید. در شناسایی نمونه‌ها از منابع رشنینگر (1963-98)، اسدی (۱۹۹۰-۲۰۰۴)، قهرمان (۱۹۸۵-۲۰۰۳) و نمونه‌های موجود در هر باریوم مرکز تحقیقات استفاده گردید و جهت تایید نمونه‌ها به موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع مراجعه گردید. در تعیین شکل‌های زیستی از رده‌بندی رانکایر (Raunkier 1934) استفاده شد. این رده‌بندی بر اساس موقعیت و چگونگی حفاظت جوانه‌های مسئول بقای نسل گیاه در فصل نامساعد است. پراکنش جغرافیایی گونه‌ها نیز بر اساس تقسیم‌بندی نواحی رویشی توسط زهری (Zohary 1963، 1973) و تختاجان (Takhtajan 1986) تعیین گردید.

### نتیجه

در این بررسی ۱۹۱ گونه گیاهی از منطقه شناسایی شد که به ۴۴ تیره (یک تیره بازداه، ۴۰ تیره دو لپه‌ای و سه تیره تک لپه‌ای) و ۱۴۲ جنس تعلق دارند. از میان گونه‌های تشخیص داده شده نه گونه (۴/۷٪) انحصاری ایران هستند. اشکال زیستی با عالیم (تروفیت)، Ph (فائزوفیت)، Ch (کامفیت)، He (همی‌کریپتوфیت)، Ge (ژوفیت) و Th (هلوفیت) و پراکنش جغرافیایی با عالیم SS (صحارا- سندی)، IT (ایرانو- تورانی)، M ( مدیترانه‌ای)، ES (اروپا- سیبری) و Cos (جهان وطن) نشان داده شده است.


تیره‌های Gramineae با ۲۶ گونه، Papilionaceae با ۲۳ گونه و Compositae با ۲۰ گونه مهمترین تیره‌ها و جنس‌های با شش گونه، *Launaea* با پنج گونه و *Plantago* با چهار گونه بیشترین گونه منطقه را دارا می‌باشند. ۱۸ تیره دارای یک گونه، شش تیره دارای دو گونه، پنج تیره دارای سه گونه، سه تیره دارای چهار گونه، پنج تیره دارای پنج گونه، دو تیره دارای شش گونه، دو تیره دارای ۱۴ گونه و یک تیره به ترتیب دارای ۲۰، ۲۳ و ۲۶ گونه می‌باشند. بررسی شکل زیستی به روش رانکایر (۱۹۳۴) نشان داد که تروفیتها با ۴۷/۶٪ (۹۱ گونه) فراوانترین شکل زیستی هستند. شکل‌های زیستی کامفیت با ۲۲/۵٪، همی‌کریپتوفیت با ۱۷/۳٪ و فائزوفیت با ۹٪ در درجه

بعدی اهمیت قرار دارند (شکل ۲). بررسی پراکنش جغرافیایی این گیاهان نشان داد که٪.۴۴/۵ گونه‌ها (۸۵ گونه) به ناحیه صحارا- سندی و٪.۴۰/۸ گونه‌ها مشترک در این ناحیه با عناصر نواحی دیگر است.٪.۳/۷ گونه‌ها (هفت گونه) جهان وطن هستند.٪.۲/۶ گونه‌ها (پنج گونه) متعلق به ناحیه ایران تورانی می‌باشند اگرچه عناصر این ناحیه به صورت مشترک با سایر نواحی رویشی از جمله مشترک با ناحیه صحارا- سندی (٪.۱۷/۸)، با ناحیه مدیترانه‌ای (٪.۵/۷) و اروپا- سیبری (٪.۰/۵) دیده می‌شود.٪.۵۷ گونه عنصر مدیترانه‌ای به صورت مشترک با ناحیه صحارا- سندی (٪.۱۱)، مشترک با ایرانو- تورانی (٪.۵/٪.۷)، مشترک با هر دو ناحیه (٪.۸/٪.۴) نیز دیده می‌شوند (شکل ۳). نام علمی، نام تیره، نام فارسی، اشکال زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه در جدول ۱ نشان داده شده است. در ضمن تعداد ۴۸ گونه کاشته شده در سطح جزیره در جدول ۲ درج گردیده است (جدول ۱ و ۲ در انتهای مقاله آورده شده است).



شکل ۲- فراوانی طیف زیستی گیاهان جزیره هرمز.

Fig. 2. Life forms in Hormoz Island. Life form: Th (Therophyte), Ch (Chamaephyte), He (Hemichryptophyte), Ph (Phanerophyte), Ge (Geophyte) and Hel (Helophyte).



شکل ۳- فراوانی پراکنش جغرافیایی گیاهان جزیره هرمز.

Fig. 3. Chorotype of species in Hormoz Island. Chorotype: SS (Saharo-Sindian), IT (Irano-Touranian), M (Mediterranean), ES (Euro-Siberian) and Cos (Cosmopolitan).

### بحث

با نگاهی به تیره‌های گیاهی ملاحظه می‌شود تیره‌های Papilionaceae, Compositae, Chenopodiaceae و Gramineae بیشترین گونه‌های جزیره را شامل هستند. فراوانی گیاهان این تیره‌ها ممکن است به دلیل فراوانی زمین‌های ژراعی، خاک‌های شور و درصد بالای تخریب پوشش گیاهی منطقه باشد (کاشی پرها و همکاران ۲۰۰۴). نتایج حاصل از طبقه‌بندی شکل زیستی نشان‌دهنده این است که گیاهان تروفیت فراوانترین شکل زیستی می‌باشند. سایر شکل‌های زیستی به ترتیب کامفیت، فانروفیت و همی‌کریپتووفیت هستند. ژئوفیت و هلووفیت اشکالی هستند که درصد بسیار کمی از گیاهان منطقه را شامل می‌شوند. شکل زیستی منطقه نشانگر فلور تیپیک مناطق خشک و بیابانی است که در آن تروفیت‌ها بیشترین سهم را دارند. تروفیت‌ها گیاهانی هستند که قبل از رسیدن دوره خشکی دوره زادآوری خود را تکمیل می‌کنند. فانروفیت‌ها و کامفیت‌ها بعد از تروفیت‌ها در درجه بعدی اهمیت قرار دارند. این گیاهان تحمل کننده خشکی هستند. با توجه به تعلق بالای گیاهان جزیره به ناحیه رویشی صحارا-سندي و مشترک با سایر نواحی، نتایج بیان کننده تعلق استان به این ناحیه رویشی است. بالطبع درصد پایین و یا نبود گیاهان سایر نواحی دیگر به علت دوری منطقه از نواحی دیگر است.

مقایسه نتایج این بررسی با با فلور جزیره قشم (عطار و همکاران ۲۰۰۴) نشان می‌دهد که این دو جزیره دارای ۱۶۷ گونه مشترک هستند. تیره‌های گندمیان، پروانه آسیان و کاسنی بیشترین گونه‌ها را دارند و تروفیت، کامفیت، همی‌کریپتوفیت و فانروفیت به ترتیب فراوانترین شکل زیستی و عناصر صحارا-سندي بیشترین پراکنش جغرافیایی دارند. شصت گونه از گیاهان این بررسی با گیاهان فلورا ایرانیکا (Rechinger 1963-98) و ۲۳ گونه با گیاهان کتاب رستنی‌های ایران (مبین ۱۹۷۰-۱۹۹۵) مشترک است. همچنین ۸۵ گونه از نتایج این بررسی با کار کانکل (Kunkel 1977) که ۱۰۲ گونه گیاهی از جزیره هرمز را گزارش کرده است یکسان است. اگرچه ۴۵ گونه دیگر از گیاهان این بررسی توسط ایشان از جزایر قشم، لارک و هنگام گزارش شده است.

جدول ۱- نام علمی، نام تیره، نام فارسی، اشکال زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان عالی جزیره هرمز

Table 1. Scientific, Family, Persian names, Life form and Chorology of Hormoz Island plants

آرایه Taxon	نام فارسی Persian name	شكل زیستی Life form	کوروتیپ Chorotype	شماره هرباریومی Herb. No.
<b>Ephedraceae</b>				
<i>Ephedra foliata</i> Boiss.	ريش بز	Ph	IT, SS	5104
<b>Angiospermae - Dicotyledonae</b>				
<b>Acanthaceae</b>				
<i>Blepharis ciliaris</i> (L.) B.L. Burtt	انجره	He	SS	4744
<b>Aizoaceae</b>				
<i>Aizoon canariense</i> L.	حدق	Th	M, SS	5155
<i>Mesembryanthemum nodiflorum</i> L.	گل نیمروز	Th	M, SS	5499
<b>Amaranthaceae</b>				
<i>Aerva persica</i> (Burm. f.) Merrill	پشموق	Ch	IT, SS	5106
<i>Amaranthus graecizans</i> L.	تاج خروس	Th	ES, M, SS	5453
<b>Asclepiadaceae</b>				
<i>Calotropis procera</i> (Ait.) Ait. f.	استبرق	Ph	SS	5242

Table 1. (contd.)

جدول ۱ (ادامه)

<i>Glossonema varians</i> (Stocks) Hook. f.	-	He	SS	4763
<i>Pentatropis nivalis</i> (Gmel.) Field & Wood	پیچ شمعی	Ph	SS	5260
<i>Pergularia tomentosa</i> L.	لباسیر	Ph	SS	5183
<i>Periploca aphylla</i> Decne.	گیشدر	Ph	SS	4733
<b>Boraginaceae</b>				
<i>Arnebia hispidissima</i> (Lehm.) DC.	گاوزبان وحشی	Th	SS, IT	5315
<i>Gastrocotyle hispida</i> (Forssk.) C.B. Clarke	گاو زبانک	Th	IT, SS	5336
<i>Echiochilon kotschyi</i> (Boiss. & Hohen.) I. Johnst.	-	Ch	SS	5365
<i>Heliotropium bacciferum</i> Forssk.	دفرک	Ch	IT, SS	5111
<i>Moltkiopsis ciliata</i> (Forssk) I. Johnst	-	Ch	SS	37995
<i>Sericostema pauciflorum</i> Stocks & Wight	-	Ch	SS	5131
<b>Caesalpiniaceae</b>				
<i>Cassia italica</i> (Miller) F.W. Andrews	ستای مکی	Ch	SS	5116
<b>Capparaceae</b>				
<i>Capparis cartilaginea</i> Decne.	کور آویز	Ch	SS	4786
<i>Capparis mucronifolia</i> Boiss.	کور	Ch	SS	5110
<i>Cleome noeana</i> Boiss.	تلگ تلalo	Th	SS	5498
<i>Cleome brachycarpa</i> Vahl ex DC.	شاهنگ	Th	IT, SS	5135
<b>Caryophyllaceae</b>				
<i>Cometes surattensis</i> L.	-	Th	SS	5125
<i>Gymnocarpus decander</i> Forssk.	کروچ	Ch	SS	4734
<i>Herniaria cinerea</i> DC.	علف فقط	Th	IT, M, SS	5341
<i>Herniaria hemistemon</i> J. Gay.	علف فقط	He	IT, SS	2398
<i>Paronychia arabica</i> (L.) DC.	عقریک	Th	M, SS	4780
<i>Polycarpha spicata</i> Wight. & Arnold.	چند تخمہ	Th	SS	5637
<i>Polycarpon tetraphyllum</i> (L.) L.	پردانه	Th	ES, IT, M, SS	5601
<i>Silene apetala</i> Willd.	سیلن	Th	IT, M	3394
<i>Silene austero-iranica</i> Rech. f.	سیلن	Th	IT, SS	2594
<i>Silene villosa</i> Forssk.	سیلن	Th	SS	2567

Table 1. (contd.)

جدول ۱ (ادامه)

<i>Spergula falax</i> (Lowe) E.H.L. Krause	افتانی	Th	SS	3927
<i>Spergularia diandra</i> (Guss.) Boiss.	داندلو	Th	M, SS	5515
<i>Sphaerocoma aucheri</i> Boiss.	-	Ch	SS	5316
<i>Telephium imperati</i> L.	سرغند	He	ES, IT	5619
<b>Chenopodiaceae</b>				
<i>Anabasis setifera</i> Moq.	جفته شور	He	IT, SS	5418
<i>Atriplex leucoclada</i> Boiss.	رغل	He	IT, SS	5352
<i>Bienertia cycloptera</i> Bge. ex Boiss.	سمسیل	Th	IT, SS	4692
<i>Chenopodium album</i> L.	سلمه تره	Th	Cosm.	4943
<i>Chenopodium murale</i> L.	سلمک	Th	Cosm.	5232
<i>Cornulaca monacantha</i> Delile	چیپ چاپ	Ch	SS, IT	5123
<i>Hammada salicornica</i> (Moq.) Iljin	ترات	Ph	IT, SS	5584
<i>Halocnemum strobilaceum</i> (Paall.) M.B.	بوته شور	Ch	SS, IT	3046
<i>Halopeplis perfoliata</i> Bunge ex U. Sternb.	-	Ch	SS	5465
<i>Salsola drummondii</i> Ulber.	علف شور	Ch	SS	5420
<i>Salsola imbricata</i> Forssk.	علف شور	Ch	SS	5492
<i>Salsola tomentosa</i> (Moq.) Spach. In Kotschy	علف شور	Ch	IT	5276
<i>Suaeda aegyptiaca</i> (Hasselq.) Zohary	سیاه شور	Th	SS	5501
<i>Suaeda vermiculata</i> Forssk. ex J. F. Gmel	سیاه شور	Ch	SS	5630
<b>Cistaceae</b>				
<i>Helianthemum lippii</i> (L.) Pers.	گراموز	Ch	M, SS	4735
<i>Helianthemum salicifolium</i> (L.) Mill.	دانه گنجشکی	Ch	M, ES, IT	3463
<b>Compositae</b>				
<i>Carthamus oxyacantha</i> M.B.	گلرنگ وحشی	He	IT, SS	39151
<i>Centaurea psuedosinaica</i> Czerep.	گل گندم	Th	SS	4958
<i>Cichorium pumilum</i> Jacq.	کاسنی	Th	IT	1557

Table 1. (contd.)

				جدول ۱ (ادمه)
<i>Echinops gedrosiacus</i> Bornm.	شکر تیغال	He	IT, SS	2508
<i>Filago desertorum</i> Pomel.	-	Th	IT, M	6846
<i>Grantia aucheri</i> Boiss.	-	Ch	SS	5309
<i>Ifloga spicata</i> (Forssk) Sschultz	-	Th	IT, M	3624
<i>Launaea bornmuelleri</i> (Hausskn. ex Bornm.) Bornm.	-	Th	SS	-
<i>Launaea capitata</i> (Spreng) Dandy	-	Th	SS	-
<i>Launaea cassianiana</i> (Jaub.et Spach) Burkill	-	Th	SS	1095
<i>Launaea mucronata</i> (Forssk.) Muschl.	-	Th	SS	1174
<i>Launaea oligocephalla</i> (Hausskn ex Bornm.) Bornm.	-	Th	SS	1222
<i>Launaea procumbens</i> (Roxb.) Ramayya & Raja Gopal	-	Th	SS	3525
<i>Platychaete aucheri</i> (Boiss.) Boiss.	کلاچوک	Ch	IT, SS	2998
<i>Platychaete glaucescens</i> (Boiss.) Boiss.	منگری	Ch	IT, SS	5107
<i>Pulicaria gnaphalodes</i> (Vent.) Boiss.	کک کش	He	IT,SS	5163
<i>Reichardia orientalis</i> (L.) Hochr.	-	Th	IT, SS	1109
<i>Senecio glaucus</i> L.	پیر پهار	Th	IT, M, SS	4762
<i>Sonchus tenerrimus</i> L.	شیر تیغک	Th	M, IT	1070
<i>Urospermum picroides</i> (L.) Desf.	شیر تلخک	Th	M, IT	6719
<b>Convolvulaceae</b>				
<i>Cressa cretica</i> L.	علف مورچه	He	IT, M, SS	5148
<i>Convolvulus cephalophorus</i> Boiss.	پیچک	Ch	SS	5114
<i>Convolvulus glomeratus</i> Choisy.	پیچک	He	SS	4816
<i>Convolvulus leptocladus</i> Boiss.	پیچک	Ch	IT, SS	5385
<i>Convolvulus pilosellaefolius</i> Desf.	پیچک	He	IT, SS	5513
<b>Cruciferae</b>				
<i>Anastatica hierochuntica</i> L.	چنگ مریم	Th	SS	5565
<i>Erucaria hispanica</i> (L.) Druce	مندابی	Th	IT, M, SS	39105
<i>Eruca sativa</i> Miller	منداب	Th	IT, SS	6890

Table 1. (contd.)

				جدول ۱ (ادامه)
<i>Matthiola longipetala</i> (Vent.) DC.	چلیپا	Th	IT, M, SS	4740
<b>Cucurbitaceae</b>				
<i>Citrullus colocynthis</i> (L.) Schrader	حنظل	He	M, SS	5236
<b>Cuscutaceae</b>				
<i>Cuscuta epithymum</i> Murr.	سنس	G.p	IT, M, SS	1187
<b>Euphorbiaceae</b>				
<i>Andrachne telephiooides</i> L.	ناز بیبانی	Th	IT, M, SS	5184
<i>Chrozophora obliqua</i> (Vahl) Juss. ex Spreng.	ازرق	Ch	IT, M	5102
<i>Euphorbia larica</i> Boiss.	پرخ	Ch	SS	37969
<b>Frankeniacae</b>				
<i>Frankenia pulverulenta</i> L.	شبنمی	Th	IT, M, SS	4890
<b>Geraniaceae</b>				
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L' Her.	شمعدانی عطری	Th	ES, IT, M	3527
<i>Erodium laciniatum</i> (Cav.) Willd.	شمعدانی عطری	Th	M, SS, IT	4759
<i>Erodium malacoides</i> (L.) L' Her. ex Aiton	شمعدانی عطری	Th	IT, M	5234
<i>Erodium neoradifolium</i> Delile ex Godron	شمعدانی عطری	Th	SS	4817
<i>Geranium mascatense</i> Boiss.	شمعدانی وحشی	Th	IT, SS	4760
<i>Monsonia heliotropioides</i> (Cav.) Boiss.	-	He	SS	5272
<b>Labiatae</b>				
<i>Salvia aegyptiaca</i> L.	تخم شربتی	Ch	SS	4827
<i>Salvia santolinifolia</i> Boiss.	بوونگ	Ch	SS	4775
<b>Malvaceae</b>				
<i>Abutilon fruticosum</i> Guill. & Perr.	گندکف	Ch	SS	5274
<i>Abutilon hirtum</i> (Lam.) Sweet	توتر	Ch	SS	4769
<i>Malva parviflora</i> L.	پنیرک	Th	IT, M	4809
<b>Mimosaceae</b>				
<i>Acacia ehrenbergiana</i> Hayne	چگرد	Ph	SS	5586
<i>Acacia nilotica</i> (L.) Delile	کرت	Ph	SS	5241
<i>Acacia oerfota</i> (Forssk.) Schweinf.	معیر	Ph	SS	5122
<i>Prosopis cineraria</i> (L.) Druce	کهور	Ph	SS	4764
<b>Molluginaceae</b>				

Table 1. (contd.)

				جدول ۱ (ادامه)
	هزار دانه	Ch	SS	-
<i>Mollugo cerviana</i> (L.) Seringe.				
<b>Nyctaginaceae</b>				
<i>Commicarpus stenocarpus</i> (Chiov) Cuf.	-	Ph	SS	4771
<b>Papilionaceae</b>				
<i>Alhagi graecorum</i> Boiss.	خارشتر	He	IT, M, SS	5358
<i>Argyrolobium roseum</i> (Camb.) Jaub. & Spach	شال باکله	Th	IT, SS	4746
<i>Astragalus corrugatus</i> Bertol.	گون	Th	IT, SS	4747
<i>Astragalus eremophilus</i> Boiss.	گون	Th	SS	4778
<i>Astragalus hauarensis</i> Boiss.	گون	Th	SS	4928
<i>Astragalus tribuloides</i> Del.	گون	Th	IT, SS	5334
<i>Chesneya parviflora</i> Jaub. & Spach.	گونی	He	SS	5381
<i>Crotalaria persica</i> (Burn.) Merill.	نخود شنی	Ch	SS	4758
<i>Hippocrepis bicontorta</i> Loissel.	دریس	Th	SS	4929
<i>Hippocrepis unisiliquosa</i> L.	شبدر نعلی	Th	IT, M	3992
<i>Indigofera intricata</i> Boiss.	نیل	Ch	SS	4789
<i>Lotononis platycarpos</i> (Viv.) Pic	-	Th	M, SS	4930
<i>Lotus halophilus</i> Boiss. & Sprun.	آهو ماش	Th	M, SS	4745
<i>Lotus garcinii</i> DC.	آهو ماش	He	SS	5126
<i>Lotus schimperi</i> Steud.	آهو ماش	Th	SS	5179
<i>Medicago laciniata</i> (L.) Miller	یونجه	Th	IT, M, SS	4740
<i>Medicago polymorpha</i> L.	یونجه	Th	Cosm.	5130
<i>Ononis serrata</i> Forssk.	لوپیای شیطان	Th	M, SS	5134
<i>Scorpiurus muricatus</i> L.	گل عقرب	Th	M, IT	3708
<i>Taverniera cuneifolia</i> (Roth) Arn.	لاتی	Ch	SS	3201
<i>Taverniera sparteia</i> (Burnm. f.) DC.	لاتی	Ch	SS	4739
<i>Tephrosia appollinea</i> (Del.) Link	نیلکی	Ch	SS	4782
<i>Tephrosia persica</i> Boiss.	نیلکی	Ch	SS	5137
<i>Trigonella anguina</i> Del.	شنبلیله	Th	SS	6243

Table 1. (contd.)

				جدول ۱ (ادامه)
<i>Trigonella stellata</i> Forssk.	شنبلیله	Th	SS, IT	5344
<i>Trigonella uncata</i> Boiss. & Noe.	شنبلیله	Th	SS	5335
<b>Plantaginaceae</b>				
<i>Plantago amplexicaulis</i> Cax.	بارهنگ	Th	SS, IT, M	4934
<i>Plantago boisseri</i> Hausskn. & Bornm.	بارهنگ	Th	SS	4719
<i>Plantago ciliata</i> Desf.	بارهنگ	Th	SS, IT, ES	4798
<i>Plantago coronopus</i> L.	بارهنگ	Th	SS, IT	4811
<i>Plantago ovata</i> Forssk.	اسفرزه	Th	ES, IT, M, SS	3018
<b>Plumbaginaceae</b>				
<i>Limonium axillare</i> (Forssk.) O. Kuntze	شصت عروسان	Th	SS	5433
<b>Polygonaceae</b>				
<i>Calligonum comosum</i> L' Her.	اسکنبلیل	Ph	SS, IT	5268
<i>Emex spinosus</i> (L.) Campd.	خار ترشک	Th	M, SS	5129
<i>Rumex dentatus</i> L.	ترشک	Th	M, SS	5244
<i>Rumex vesicarius</i> L.	ترشک	Th	M, SS	5379
<b>Portulacaceae</b>				
<i>Portulaca oleracea</i> L.	خرفه	Th	SS	1893
<b>Primulaceae</b>				
<i>Anagallis arvensis</i> L.	آناغالیس	Th	ES, IT, M	4749
<b>Resedaceae</b>				
<i>Ochradenus baccatus</i> Delile	شمع	Ph	SS	5112
<i>Oligomeris linifolia</i> (Vahl.) Macbr.	-	Th	SS	5343
<i>Reseda aucheri</i> Boiss.	ورث	He	SS	5167
<b>Rhamnaceae</b>				
<i>Ziziphus spina- christii</i> (L.) Willd.	کنار	Ph	SS	5598
<b>Rosaceae</b>				
<i>Neurada procumbens</i> L.	-	Th	SS	5145
<b>Rubiaceae</b>				
<i>Gailonia hymenostephana</i> J. et Sp.	تسکو	Ch	SS	5161

Table 1. (contd.)

				جدول ۱ (ادمه)
		Ch	SS	5118
<i>Oldenlandia retrosa</i> Boiss.	سرسبزو			
<b>Rutaceae</b>				
<i>Haplophyllum tuberculatum</i> (Forssk.) Juss.	سدابی	He	IT, SS	4761
<b>Scrophulariaceae</b>				
<i>Misopates orontium</i> (L.) Rafin.	-	Th	SS	-
<i>Scrophularia striata</i> Boiss.	گل میمونی	He	IT	4777
<b>Solanaceae</b>				
<i>Lycium shawii</i> Roemer & Schultes	دهیر	Ph	IT, SS	5119
<i>Solanum incanum</i> L.	تاجریزی	Ph	SS	4792
<i>Solanum nigrum</i> L.	تاجریزی	Th	Cosm.	5235
<b>Tamaricaceae</b>				
<i>Tamarix mascatensis</i> Bge.	گز	Ph	ES, IT, SS	5359
<b>Umbeliferae</b>				
<i>Ducusia anethifolia</i> DC.	مشک بو	He	IT, SS	5610
<b>Urticaceae</b>				
<i>Parietaria alsinifolia</i> Del.	علف موش	Th	SS	2117
<b>Zygophyllaceae</b>				
<i>Fagonia bruguieri</i> DC.	اسفند رومی	He	IT, SS	5105
<i>Fagonia indica</i> Burn. f.	اسفند رومی	He	SS	4773
<i>Tribulus terrestris</i> L.	خار خسک	He	ES, IT, M, SS	4969
<i>Zygophyllum qatarense</i> Hadidi	هورم	Ch	SS	5117
<i>Zygophyllum simplex</i> L.	قیچ یکساله	Th	SS	4921
<b>Angiospermae-Monocotyledonae</b>				
<b>Cyperaceae</b>				
<i>Bolboschoenus maritimus</i> L.	-	Hel	Cosm.	5239
<i>Cyperus conglomeratus</i> Rettb.	کالج	He	SS, M	5409
<i>Cyperus rotundus</i> L.	اویارسلام	Th	Cosm.	5292
<b>Liliaceae</b>				
<i>Asphodelus tenuifolius</i> Cav.	سریش	Th	M, SS	5141
<b>Gramineae</b>				

Table 1. (contd.)

			جدول ۱ (ادامه)
<i>Aeluropus lagopoides</i> (L.) Trin. ex Thwaites	بونو	Ge	IT, M, SS 4720
<i>Aristida adscensionis</i> L.	سه سیخکی	Th	SS 6542
<i>Cencherus ciliaris</i> L	بوشوک	Ge	M, SS 5124
<i>Cenchrus pennisetiformis</i> Hochst & Steud. ex Steud.	خورنال	He	M, SS 5146
<i>Chloris virgata</i> Swartz	حضیل	He	SS 5466
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	مرغ	Ge	Cosm. 5136
<i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) P. Beauv.	-	Th	M, SS 5437
<i>Dichantium annulatum</i> L.	جوگاره	He	SS 4772
<i>Eragrostis barrelieri</i> Dav.	حلف	Th	M, SS 4810
<i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) Vign. Lut.	تیل	Th	M, SS 4756
<i>Eremopogon faveolatus</i> (Del.) Stapf	-	He	SS 39745
<i>Halopyrum mucronatum</i> (L.) Stapf.	-	He	SS 5632
<i>Hyparrhenia hirta</i> (L.) Stapf	نریشت	He	IT, M, SS 3510
<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Beauv.	زلف شیطان	Ge	ES, IT, M, SS 6864
<i>Lophochloa pumila</i> (Desf.) Bor.	-	Th	IT, SS 4751
<i>Panicum turgidum</i> Forssk.	ارزن	Ch	SS, M 4738
<i>Pennisetum divisum</i> (Gmel.) Henrard	وسه	Ch	SS 4736
<i>Pennisetum orientale</i> L.C. Rich.	پرشنگ	Ge	IT 6157
<i>Schismus arabicus</i> Nees	-	Th	IT, M 3952
<i>Stipa capensis</i> Thunb.	بهمن	Th	IT, M, SS 5108
<i>Stipagrostis plumosa</i> (L.) Munro ex T. Andres	-	He	IT, M, SS 2775
<i>Trachynia distachya</i> (Hasselq ex L.) Link.	-	Th	IT 6109
<i>Tricholaena teneriffae</i> (L.f.) Link.	-	He	M, SS 6165

Life form: Th (Therophyte), Ch (Chamaephyte), He (Hemichryptophyte), Ph (Phanerophyte), Ge (Geophyte) and Hel (Helophyte).

Chorotype: SS (Saharo-Sindian), IT (Irano-Touranian), M (Mediterranean), ES (Euro-Siberian) and Cosm. (Cosmopolitan).

## جدول ۲- گیاهان کاشته شده در جزیره هرمز

Table 2. Cultivated plants of Hormoz Island

آرایه Taxon	تیره Family	آرایه Taxon	تیره Family
<i>Acacia silicina</i> Lindl.	Mimosaceae	<i>Leucaena leucocephala</i> Lam.	Mimosaceae
<i>Albizia lebbeck</i> (L.) Benth.	Mimosaceae	<i>Mangifera indica</i> L.	Anacardiaceae
<i>Aloe littoralis</i> Baker	Liliaceae	<i>Melia indica</i> (Adr. Juss.) D. Brandis	Meliaceae
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	Nyctaginaceae	<i>Millingtonia hortensis</i> L.	Bignoniaceae
<i>Caesalpinia gilliesii</i> (Hook.) Dietr	Caesalpiniaceae	<i>Musa sapientum</i> L.	Musaceae
<i>Canna indica</i> L.	Cannaceae	<i>Nerium indicum</i> Miller	Apocynaceae
<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don.	Apocynaceae	<i>Nerium oleander</i> L.	Apocynaceae
<i>Citrus bigardia</i> L.	Rutaceae	<i>Ocimum sanctum</i> L.	Labiatae
<i>Citrus limon</i> (L.) Burm. f.	Rutaceae	<i>Parkinsonia aculeata</i> L.	Caesalpiniaceae
<i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck	Rutaceae	<i>Phoenix dactylifera</i> L.	Palmae
<i>Clerodendrum phlomidis</i> L.	Verbenaceae	<i>Pithecellobium dulce</i> Benth.	Mimosaceae
<i>Conocarpus erectus</i>	Combretaceae	<i>Pluchea lanceolata</i> (DC.) Oliver & Hiern	Compositae
<i>Cordia myxa</i> L.	Boraginaceae	<i>Prosopis juliflora</i> (Swartz) DC.	Mimosaceae
<i>Dodonaea viscosa</i> (L.) Jacq.	Sapindaceae	<i>Psidium guajava</i> L.	Myrtaceae
<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh	Myrtaceae	<i>Punica granatum</i> L.	Punicaceae
<i>Ficus bengalensis</i> L.	Moraceae	<i>Ricinus communis</i> L.	Euphorbiaceae
<i>Ficus carica</i> L.	Moraceae	<i>Sesbania sesban</i> (L.) Merrill	Papilionaceae
<i>Ficus religiosa</i> L.	Moraceae	<i>Syzygium cumini</i> Skeels	Myrtaceae
<i>Gossypium frutescens</i> Lasteyr.	Malvaceae	<i>Tamarindus indica</i> L.	Caesalpiniaceae
<i>Hibiscus rosa-chinensis</i> L.	Malvaceae	<i>Tamarix aphylla</i> (L.) Krasten	Tamaricaceae
<i>Ipomea crassicaulis</i> (Benth.) Robinson	Gramineae	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss ex H.B. & K.	Bignoniaceae
<i>Ipomea pes-caprae</i> (L.) R. Br.	Convolvulaceae	<i>Terminalia catappa</i> L.	Combretaceae
<i>Jasminum sambac</i> Soland	Oleaceae	<i>Washingtonia filifera</i> H. Wendl.	Palmae
<i>Lawsonia inermis</i> L.	Lythraceae	<i>Ziziphus mauritiana</i> Lam.	Rhamnaceae

## منابع

جهت ملاحظه منابع به صفحه 32 متن انگلیسی مراجعه شود.

نشانی نگارنده: محمدامین سلطانی پور، بندر عباس، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی،  
 صندوق پستی ۷۹۱۴۵ - ۱۵۷۷  
 E-mail: masoltanipoor@yahoo.com

## References

- ASADI, M. 1990-2004. Flora of Iran. Forest & Rangelands Research Institute (in Persian).
- ATTAR, F., HAMZE'EE, B. and GHAHREMAN, A. 2004. A Contributions to the flora of Qeshm Island, Iran, The Iranian Journal of Botany 10: 199.
- BAKHTYARI, M. 1990. Hormozgan Province. Gitashenasi Publication (in Persian).
- BARKAM, N. 1995. Investigation on biophysical resources of Hormoz Island, Azad University of Bandar Abbas (in Persian).
- GHAHREMAN, A. 1973-2003. Flora of Iran in colour, Vols 1-24. Forests & Rangelands Research Institute (in Persian).
- KUNKEL, G. 1977. The vegetation of Hormoz, Qeshm and neighbouring Islands (southern Persian Gulf area). Strauss & Cramer GmbH, 6945 Hirschberg II, Germany.
- KASHIPAZHA, A.H., ASRI, T. and MORADI, H.R. 2004. Introduction to the flora, life form and chorology of Bagh-shad region plants, Pajouhesh & Sazandeghi 63 (in Persian).
- MOBAYEN, S. 1970-1995. Flore des Plantes Vasculaires. Tehran University Publication, Tehran, Iran (in Persian).
- RAUNKIER, C. 1934. Life forms of plants. Oxford University Press. 621p.
- RECHINGER, K.H. 1982. Flora Iranica, Akademische Druke-u. Velagsanstalt. Graz. Austria, Vols 1-174.
- TAKHTAJAN, A. 1986. Florestic regions of the world. University of California Press. Ltd. 552p.
- ZOHARI, M. 1963. On geobotanical structure of Iran. Bulletin of Reseach Council of Israel. Section D, Botany. Supplement. 113p.
- ZOHARI, M. 1973. Geobotanical foundation of the middle east. 2 Vols, Stuttgart. 739p.

---

**Address of the author:** M.A. SOLTANIPOOR, Hormozgan Agricultural & Natural Resource Research Center, P.O. Box 79145-1577, Bandar Abbas, Iran.  
E-mail: masoltanipoor@yahoo.com