

## مروری بر جنس *زالزالک* در شمال شرق و شرق ایران\*

Revision of the genus *Crataegus* in the East and Northeast of Iran

علی اصغر ارجمندی\*\*، حبیله ناظری، حمید اجتهادی و محمد رضا جوهرچی  
پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران و  
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

پذیرش: ۱۳۸۸/۲/۱۵

دریافت: ۱۳۸۷/۶/۱۷

### چکیده

جنس *زالزالک* از نظر ریخت شناسی، تاکسونومی عددی و تاکسونومی شیمیایی در شمال شرق ایران مورد مطالعه قرار گرفت. بیش از ۸۰ نمونه تازه جمع آوری شده از محل های مختلف به همراه ۵۰ نمونه هرباریومی بررسی شدند. در مطالعه ریخت شناسی تمام اندام های رویشی و زایشی مورد مطالعه قرار گرفتند و برای نمونه ها کلید شناسایی تهیه شد. در مطالعه تاکسونومی عددی ۸۵ صفت ریخت شناسی اندازه گیری شدند و با روش UPGMA با نرم افزار NTSYS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در بررسی تاکسونومی شیمیایی از کروماتوگرافی کاغذی استفاده شد و ۴۱ لکه با استفاده از اشعه UV و بخار  $\text{UV}+\text{NH}_3$  تشخیص داده شدند. براساس نتایج این تحقیق، نمونه های مورد مطالعه در ۱۳ آرایه گونه و تحت گونه، پنج سری و یک بخش قرار گرفتند. *C. microphylla* با داشتن صفاتی چون "فرم رویشی درختچه ای، خار های فراوان، گل آذین چتری شکل، شاخه ها و گل آذین فاقد کرک، میوه قرمز رoshن، کاسبرگ ها روی میوه افراشته" از دیگر سری ها کاملاً جدا شده و به عنوان

\* بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده اول به راهنمایی دکتر حبیله ناظری و دکتر حمید اجتهادی ارایه شده به دانشگاه شهید باهنر کرمان  
\*\* مسئول مکاتبه (E-mail: aarjmandy@yahoo.com)

یک سری جدید به نام *Microphyllae Arjmandi* ser. پیشنهاد می شود. همچنین تغییراتی نیز در سطوح مختلف رده بندی آرایه ها حاصل شده است. نتایج مطالعات فلاونوییدی تا حدود زیادی منطبق بر نتایج تاکسونومی عددی بوده و طبقه بندی کریستنسن را تایید می کنند.

**واژه های کلیدی:** ریخت شناسی، تاکسونومی عددی، کموتاکسونومی، فلاونویید، زالزالک، ایران

#### مقدمه

نام جنس *Crataegus* L. از واژه یونانی Kratus به معنی نیرو و استحکام گرفته شده است که اشاره به چوب سخت آن دارد. به دلیل داشتن گل های سفید انبو و زیبا در زبان فارسی به آن زالزالک گفته می شود. جنس زالزالک (*Crataegus*) از طایفه *Crataegeae* از زیرتیره *Maloideae* متعلق به تیره رز (Rosaceae) است. این جنس دارای حدود ۱۵۰ تا ۱۲۰۰ گونه در جهان است که ۱۰۰ تا ۱۱۰۰ گونه آن متعلق به نواحی معتدل آمریکای شمالی و ۵۰ تا ۱۰۰ گونه آن متعلق به دنیای قدیم است. اصلی ترین مرکز تنوع آن در دنیای قدیم، از ترکیه تا ایران است (Christensen 1992).

*Crataegus* به دلیل انجام دو رگه شدن های فراوان، دو رگ گیری درهم، سیستم تولید مثلی آپومیکسی و پلی پلوییدی، یکی از مشکل ترین جنس ها برای گیاه شناسان است، به طوری که در برخی منابع از آن به عنوان کابوس تاکسونومیک و همچنین گیاهی با تنوع بی پایان نام برده شده است. مطالعه این جنس به صورت جدی از قرن ۱۸ آغاز شد. لینه (Linnaeus 1753) برای این جنس نه گونه در نظر گرفت. از زمان لینه (۱۷۵۳) تاکنون تقسیم بندی های زیادی بویژه در قرن بیستم برای این جنس انجام شده است و بخش ها و سری های زیادی معرفی شده اند. براساس طبقه بندی کریستنسن (1992) پنج بخش (سکسیون) برای این جنس در سراسر دنیا در نظر گرفته شده است که عبارتند از:

(دارای یک گونه در جنوب شرق آسیا و یک گونه در مکزیک)  
Sect. *Mexicanae* Loudon  
Sect. *Crataegus* (= Sect. *Oxyacantheae* Loudon)

(دارای ۳۶ گونه در غرب آسیا، شمال آفریقا و اروپا، یک گونه در جنوب شرق آمریکا)

Sect. *Sanguineae* Schneider

(دارای ۱۷ گونه در شرق و مرکز آسیا، یک گونه در مرکز و جنوب شرق اروپا)

Sect. *Cuneatae* Schneider

(دارای دو گونه در شرق آسیا)  
و یک بخش که تا کنون نامگذاری نشده است و شامل: *C. shensiensis* و *C. hupehensis* Sarg از چین است. Pojarkova

برای فلور ایران ثابتی (۱۳۵۵)، ۱۶ گونه، پارسا (۱۹۸۶)، ۱۳ گونه، ریدل (۱۹۸۹)، ۱۷ گونه و خاتم ساز (۱۳۷۱)، ۲۲ گونه و پنج هیبرید در چهار بخش از این جنس گزارش کرده اند. از این تعداد چهار گونه اندمیک، پنج گونه نادر و چهار گونه در حال انقراض می باشند (جدول ۱).

به دلیل وجود تفاوت های ذاتی فراوان، ایجاد دورگ گیری به مقدار زیاد در بین گونه های مجاور، دو رگ گیری درهم، سیستم تولید مثلی آپومیکسی و پلی پلوییدی متوالی در این جنس، تفکیک آرایه ها براساس چند صفت کلیدی کافی به نظر نمی رسد، بنابراین، اندازه گیری صفات بیشتر و استفاده از روش تاکسونومی عددی می تواند برای دسته بندی تاکسون های این جنس مفید باشد. از طرف دیگر به دلیل کوچک بودن کروموزوم ها در اغلب گیاهان چوبی و درختی، مطالعه کاربوتایپ این جنس نیز چندان مفید به نظر نمی رسد. اگر چه این روش می تواند در تعیین والدین یک دو رگ مفید باشد. اما از آن جایی که تنوع بالایی از ترکیبات شیمیایی در اندام های مختلف این جنس وجود دارد، مقایسه نمونه ها با استفاده از ترکیبات شیمیایی آن ها از جمله فلاونویید ها می تواند به درک و شناسایی آرایه های این جنس کمک کند. هم اکنون گروه های بسیاری از گیاهان هستند که ویژگی های تاکسونومی شیمیایی در بهبود رده بندی آن ها نقش داشته است: چالیس (Challice 1973) با مطالعات تاکسونومی شیمیایی در مورد منشا زیرتیره Maloideae اظهار داشت این زیرتیره آلپی پلویید بوده و از دو زیرتیره Spiraeoideae و Prunoideae به وجود آمده است. همچنین مطالعات تاکسونومی شیمیایی روی جنس های *Pyrus* و *Malus* و ... انجام شده است و نتایج قابل توجهی حاصل شده است.

با توجه به وجود مشکلات گیاه شناسی فراوان در این جنس، تنوع زیاد آن در ایران، ارزش های اقتصادی بویژه خواص دارویی و زینتی آن و عدم انجام مطالعات کافی، بر آن شدید تا مطالعه بیوسیستماتیکی روی گونه های این جنس در منطقه شمال شرق و شرق ایران داشته باشیم، چون این جنس در منطقه مذکور از تنوع سیار زیادی برخوردار است و تقریباً نیمی از گونه های این جنس در ایران را در بر می گیرد.

### روش بررسی

رویشگاه های مختلف با توجه به عرصه پراکنش گونه های مختلف این جنس در استان های کرمان، خراسان و گلستان انتخاب گردیدند. از ۱۸ محل در مدت دو سال در طول فصول گل دهی و میوه دهی نمونه برداری شد. بیش از ۸۰ نمونه تازه جمع آوری شدند و به همراه ۵۰ نمونه هرباریوم از هرباریوم پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد ("FUMH") مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفتند. مطالعات صحرایی شامل ویژگی های

اکولوژیکی رویشگاه ها و برخی از صفات مورفولوژیک از قبیل فرم رویشی، ارتفاع گیاه و غیره در محل انجام شده و یادداشت برداری شد. از تمام نمونه ها در فصول گل و میوه عکس تهیه شد. بقیه مطالعات پس از تهیه نمونه ها به صورت هرباریومی انجام شد. نمونه ها با استفاده از کلید های موجود، مورد شناسایی قرار گرفته و نامگذاری شدند. در مطالعه ریخت شناسی کلیه اندام های رویشی و زایشی نمونه ها مورد مطالعه قرار گرفتند و برای نمونه ها کلید شناسایی تهیه شد. در مطالعه تاکسونومی عددی در مجموع ۸۵ صفت کمی و کیفی هر یک با ۱۰ بار تکرار از نمونه های مورد مطالعه اندازه گیری شدند و سپس نمونه ها با استفاده از نرم افزار NTSYS و روش UPGMA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. حالات مختلف صفات مورد استفاده به صورت کدھایی تعریف شد (جدول های ۳ و ۴). در مطالعه تاکسونومی شیمیایی، فلاونوپید های برگی نمونه های مختلف به روش کروماتوگرافی کاغذی دو بعدی نزولی مورد مطالعه قرار گرفتند. استخراج و جدا سازی فلاونوپیدها براساس روش هاربون انجام گرفت. از محلول کوئرستین-۳-روتینوزاید (روتین) به عنوان شاهد استفاده شد. برای مشاهده لکه ها و تعیین سطح هر لکه از نور ماوراء بنفش (UV) و بخار  $\text{NH}_3 + \text{UV}$  استفاده شد. سپس  $\text{R}_f$  لکه ها اندازه گیری شدند. کروماتوگرام های حاصل با نرم افزار CONVAS رسم شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده های فلاونوپیدی، هر لکه به منزله یک صفت در نظر گرفته شد و به دو حالت «حضور/ عدم حضور» در نمونه های مختلف کدگذاری شد. سپس داده ها به صورت دو گزینه ای (۰ و ۱) وارد نرم افزار NTSYS گردیدند و با روش UPGMA مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند و نتایج به صورت دنдрوگرام ارایه گردیدند (شکل های ۱ و ۲).

## نتیجه و بحث

### ۱- ریخت شناسی

در مطالعات ریخت شناسی، از مجموع ۱۳۰ نمونه مطالعه شده تعداد ۱۳ آرایه گونه و تحت گونه متعلق به پنج سری و یک بخش شناسایی شدند و برای آن ها کلید تهیه شد (جدول ۲). کلید شناسایی آرایه ها به شرح زیر است:

### کلید گونه ها

- ۱-a - شاخه ها و گل آذین بدون کرک یا با کرک های مویی نوک تیز پراکنده. برگ ها در امتداد رگبرگ های سطح تحتانی اغلب دارای کرک ..... ۲
- ۱-b - شاخه ها و گل آذین دارای کرک های متراکم، به ندرت متوسط، کرک ها مویی نوک تیز، برگ ها در سطح زیرین سراسر کرک دار، گاهی بدون کرک ..... ۷

- ۲-a - هسته ها ۴-۵(۳). شاخه ها، گل آذین و برگ ها دارای کرک های پشمی درهم یا خمیده نوک تیز. گوشوارک ها کامل یا کم و بیش دندانه ای نامنظم، در برگ های شاخه های گل دار دارای ۰-۴ دندانه، در برگ های شاخه های بلند دارای ۹-۰ دندانه. میوه سیاه، به طول ۱۲-۶ میلی متر،  
*C. pentagyna* .....  
 ۲-b ۱۰-۵ میلی متر ..... ۳
- ۳ - هسته ها (۴)-۳(۱) گیاه متفاوت از ترکیب بالا ..... ۳
- ۳-a - زوج لب های قاعده ای در پهنهک برگ های تقریباً انتهایی شاخه های گل دار دارای ۱۵ دندانه. گوشوارک های برگ های شاخه های گل دار کامل یا دندانه ای- اره ای نامنظم با ۱۰-۱۱ دندانه. گل آذین دیهم. کاسبرگ ها روی میوه برگشته ..... ۴
- ۳-b - زوج لب های قاعده ای در پهنهک برگ های تقریباً انتهایی شاخه های گل دار دارای ۱۴-۲۰ دندانه. گوشوارک های برگ های شاخه های گل دار دندانه ای منظم- اره ای با ۱۰-۳ دندانه. گل آذین چتری شکل، به ندرت دیهم، دارای (۹)-۵-۳ گل. میوه قرمز روشن، کاسبرگ ها روی میوه افراشته یا نیمه افراشته ..... ۵
- ۴-a ۱(-۲) ۵ ..... ۴-b ۶
- ۴-b - هسته ها (۴)-۳(۲)-۱(-۲) ۶
- ۵-a - زوج لب های قاعده ای در پهنهک برگ های تقریباً انتهایی شاخه های گل دار دارای ۰-۳ دندانه. اغلب یا تمام گوشوارک های برگ های شاخه های گل دار کامل یا نیمه کامل. کاسبرگ ها اغلب مثلثی کشیده، طول آن ها تا ۱/۳ برابر عرض آن ها. میوه قرمز، مستطیلی شکل. هسته ها در سطح جانبی- شکمی دارای شیارهای کم عمق ..... ۶
- ۵-b - زوج لب های قاعده ای در پهنهک برگ های تقریباً انتهایی در شاخه های گل دار دارای ۳-۱۵ دندانه. اغلب یا تمام گوشوارک های برگ های شاخه های گل دار کم و بیش اره ای- دندانه ای نامنظم یا دندانه ای. طول آن ها تا ۱/۲ برابر عرض آن ها، نوک تیز یا نوک گرد، میوه قرمز تیره، بیضی تا کروی، هسته ها در سطح جانبی- شکمی دارای شیار های عمیق ..... ۷
- ۶-a - لب های پهنهک در شاخه های گل دار ۳-۴ جفت، با دندانه های درشت یا خیلی درشت. طول کاسبرگ ها ۲-۳ میلی متر. میوه ارغوانی مایل به سیاه، کم و بیش دارای کرک های بلند تا باریک و  
*C. songarica* ..... ۷
- ۶-b - لب های پهنهک در شاخه های گل دار ۲-۴ جفت، دندانه ها متوسط، طول کاسبرگ ها ۱/۵-۳ میلی متر. طول میوه ۸-۱۴ میلی متر، قطر آن ۷-۱۳ میلی متر، میوه قرمز تیره تا ارغوانی مایل به سیاه ..... ۸
- ۷-a - هسته ها (۱)-۲-۳(-۴) ۸

- ۷-b- هسته ها ۱-۲(-۳). برگ ها کم و بیش ازه ای، کرک ها نوک تیز و باریک و بلند. گل آذین دارای  
 ۴-۱۶ گل؛ طول دم گل ها تا ۱۴ میلی متر ..... *C. meyeri*
- ۸-a- برگ ها اغلب در هر دو سطح دارای کرک های خوابیده و متراکم. گل آذین فشرده، با دمگل های  
 کوتاه. میوه زرد تا نارنجی، کروی پهنه در هر دو سطح تا کروی، به قطر ۱۵-۲۵ میلی متر .....  
*C. azarolus*
- ۸-b- برگ ها اغلب در سطح فوقانی دارای کرک های خوابیده و متراکم. گل آذین فشرده یا باز.  
 میوه قرمز، کروی، به قطر ۸-۱۸ میلی متر ..... *C. assadii*

#### کلید زیر گونه های *Crataegus pentagyna*

- ۱- شاخه ها و گل آذین دارای کرک های پشمی درهم یا گاهی فاقد کرک. میوه به طول ۶-۱۲ میلی متر، کم و بیش دارای لایه موومی. هسته ها ۳-۵ .....  
*C. pentagyna* subsp. *pentagyna*
- ۲- شاخه ها و گل آذین دارای کرک های خمیده نوک تیز. میوه به طول ۶-۹ میلی متر، فاقد لایه موومی. هسته ها ۴-(۵) .....  
*C. pentagyna* subsp. *pseudomelanocarpa*

#### کلید زیر گونه های *Crataegus pseudoheterophylla*

- ۱-a- دمگل ها، هیپانتیوم و میوه کم و بیش دارای کرک های باریک و بلند. شاخه ها اغلب دارای کرک های باریک و بلند پراکنده، دمگل ها اغلب در زیر میوه ناگهان بزرگ می شوند .....  
*C. pseudoheterophylla* subsp. *turkestanica*
- ۱-b- دمگل ها فاقد کرک یا کم و بیش دارای کرک های باریک و بلند در روی هیپانتیوم، میوه فاقد کرک یا کم و بیش دارای کرک های باریک و بلند، شاخه ها فاقد کرک، دمگل ها در زیر میوه بزرگ نشده اند ..... ۲
- ۲-a- پهنه ک برگ های تقریباً انتهایی شاخه های گل دار در قاعده گوه ای پهنه یا باریک، بخش فوقانی دمگل ها، هیپانتیوم و میوه کم و بیش دارای کرک های باریک و بلند .....  
*C. pseudoheterophylla* subsp. *pseudoheterophylla*
- ۲-b- پهنه ک برگ های زیر انتهایی شاخه های گل دار در قاعده کم و بیش گرد یا گوه ای باریک، دمگل ها، هیپانتیوم و میوه فاقد کرک .....  
*C. pseudoheterophylla* subsp. *turcomanica*

#### کلید واریته های *Crataegus microphylla*

- ۱- میوه بیضی شکل، در زیر کاسه غیر فشرده .....  
*C. microphylla* var. *microphylla*
- ۲- میوه بطري مانند، در زیر کاسه کمی فشرده .....  
*C. microphylla* var. *dolichocarpa*

## ۲- تاکسونومی عددی

براساس نتایج حاصل از مطالعه تاکسونومی عددی، نمونه های مورد مطالعه را می توان به دو گروه اصلی تفکیک کرد (A و B). هر دو گروه متعلق به sect. *Crataegus* هستند (شکل ۱). گروه اول (A) شامل دو زیرگروه A<sub>1</sub> و A<sub>2</sub> است. زیرگروه A<sub>1</sub> شامل: *C. pseudoheterophylla* subsp. *Turcomanica*, *C. monogyna* var. *lasiocarpa* و *C. pseudoheterophylla* subsp. *turkestanica* است. زیرگروه A<sub>2</sub> شامل: *C. microphylla* var. *microphylla* و *C. microphylla* var. *dolichocarpa* (B) شامل دو زیرگروه اصلی B<sub>1</sub> و B<sub>2</sub> است. زیرگروه B<sub>1</sub> شامل دو زیرگروه فرعی B<sub>3</sub> و B<sub>4</sub> است. زیرگروه B<sub>3</sub> شامل: *C. azarolus* var. *pontica* و *C. assadii* است. زیرگروه B<sub>4</sub> شامل: *C. songarica* و *C. ambigua* subsp. *Ambigua*, *C. meyeri* است. زیرگروه B<sub>2</sub> شامل: *C. pentagyna* subsp. *pseudomelanocarpa* و *C. pentagyna* subsp. *pentagyna*. براساس طبقه بندی کریستنسن (۱۹۹۲)، تمام اعضای زیرگروه A<sub>1</sub> و A<sub>2</sub> متعلق به ser. *Crataegus* subser. *Crataegus* زیرگروه B<sub>4</sub> متعلق به ser. *Pentagynae* زیرگروه B<sub>3</sub> متعلق به ser. *Orientalis* و زیرگروه B<sub>2</sub> متعلق به ser. *Erianthae* هستند. اما با توجه به دندروگرام داده های تاکسونومی عددی (شکل ۱) و خط فنون در نظر گرفته شده برای جدایی سری ها، می توان می توان زیرگروه های A<sub>1</sub> و A<sub>2</sub> و B<sub>4</sub> را به سطح سری ارتقاء داد. بنابراین، زیرگروه A<sub>1</sub> تشکیل ser. *Crataegus* و زیرگروه A<sub>2</sub> تشکیل ser. *Erianthae* و زیرگروه B<sub>4</sub> تشکیل ser. *Microphyllae Arjmandi* جدایی از سایر سری ها تایید می شود.

ویژگی های مهم ser. *Crataegus* "پهنک برگ های شاخه های گل دار با ۱-۳(-۴) چفت لب. گل آذین باز، به ندرت فشرده. برگ ها ریزان، حاشیه کامل یا دندانه ای. کاسبرگ ها کامل یا با ۱-۶ دندانه غده ای. میوه قرمز تا قرمز تیره، بخش خوراکی میوه مایل به زرد. هسته ها (۱-۲)، سطح پشتی و جانبی - شکمی شیاردار".

خاتم ساز (۱۳۷۱)، آرایه های C. turcomanica, C. turkestanica و C. pseudoheterophylla را به صورت سه گونه مجزا در نظر گرفته است، در حالی که کریستنسن (۱۹۹۲) هر سه گونه فوق را به صورت سه زیرگونه از C. pseudoheterophylla شامل: C. pseudoheterophylla subsp. turcomanica و C. pseudoheterophylla subsp. turkestanica در نظر گرفته است. نتایج بررسی های ریخت شناسی و تاکسونومی عددی به نظر کریستنسن (۱۹۹۲) نزدیک تر است. البته در مورد C. pseudoheterophylla subsp. pseudoheterophylla به دلیل عدم دسترسی به نمونه تازه فقط مطالعه ریخت شناسی روی نمونه هرباریومی آن انجام شده است و

نامگذاری آن به صورت زیرگونه مورد تایید است. در بین اعضای گروه A<sub>1</sub> یک نمونه از C. monogyna var. lasiocarpa از بجنورد (رئین) جمع آوری گردید که برای دومین بار از C. monogyna ایران گزارش می شود. در فلورا ایرانیکا و فلور ایران واریته ای به نام C. microphylla var. dolichocarpa به صورت متراծ با C. monogyna var. lasiocarpa آورده شده است، در حالی که کریستنسن (۱۹۹۲) دو آرایه فوق را جدا از هم دانسته است و C. monogyna var. lasiocarpa را متراծ با C. monogyna var. dolichocarpa در نظر گرفته است. نتایج ریخت شناسی و تاکسونومی عددی نشان می دهد که var. lasiocarpa کاملاً مستقل از C. microphylla است. بنابراین، جدایی دو گونه فوق تایید می شود. براساس طبقه بندی کریستنسن (۱۹۹۲) C. monogyna دارای دو واریته است که عبارتند از: C. monogyna var. monogyna و C. monogyna var. lasiocarpa که نمونه جمع آوری شده در C. monogyna var. lasiocarpa قرار می گیرد. این واریته با دارا بودن کرک های ابریشمی در سراسر سطح زیرین برگ، شاخه ها، گل آذین و هیپانتیوم، از واریته دیگر جدا می شود. زیرگروه A<sub>2</sub> شامل C. microphylla است که نسبت به سایر اعضای متعلق به ser. Crataegus در فاصله دورتری قرار گرفته است. بنابراین، پیشنهاد می شود C. microphylla در یک سری جداگانه به نام ser. Microphyllae Arjmandi قرار گیرد.

ویژگی های مهم ser. Microphyllae Arjmandi "فرم رویشی درختچه ای. شاخه ها دارای خارهای فراوان. طول و عرض پهنک برگ ها کوچکتر از سایر گونه های این جنس. اندازه طول پهنک ۴-۵/۱ متر، عرض پهنک ۱-۴ سانتی متر، لب ها ۳-۱ جفت، گل آذین باز، به ندرت فشرده، چتر، به ندرت دیهیم، فاقد کرک. برگ ها ریزان، حاشیه کامل یا دندانه ای. کاسبرگ ها در روی میوه افراشته. کاسبرگ ها کامل یا با ۶-۱ دندانه غده ای. میوه قرمز روشن، بخش خوراکی میوه زرد. هسته ها ۲-۱، سطح پشتی و جانبی- شکمی شیاردار". همچنین در بررسی واحدهای تحت گونه ای، مشخص گردید که نمونه های جمع آوری شده از C. microphylla در دو واریته شامل: C. microphylla var. dolichocarpa و C. microphylla var. microphylla گیرند. اگر چه خاتم ساز (۱۳۷۱) و کریستنسن (۱۹۹۲) از وجود این دو واریته در ایران نامی نبرده اند و آن ها را متراծ با C. microphylla دانسته اند، اما ریدل (۱۹۸۹) و ثابتی (۱۳۵۵)، دو واریته از این گونه برای ایران گزارش کرده اند. نتایج حاصل از این تحقیق نیز وجود دو واریته مجزا را تایید می کند. در واریته C. micriphylla var. microphylla میوه بیضی کشیده و زیر کاسه غیرفشرده است ولی در واریته C. microphylla var. dolichocarpa میوه بطی مانند و زیر کاسه کمی فشرده است.

گروه دوم (B) شامل دو زیرگروه اصلی (B<sub>2</sub> و B<sub>1</sub>) است. زیرگروه B<sub>1</sub> شامل دو زیرگروه فرعی B<sub>4</sub> و B<sub>3</sub> است. زیرگروه B<sub>4</sub> شامل: *C. ambigua* subsp. *ambigua*, *C. meyeri* و *C. songarica* است. براساس طبقه بندی کریستنسن (۱۹۹۲) تمام اعضای این گروه متعلق به *Crataegus* subser. *Erianthae* هستند. با توجه به نتایج تاکسونومی عددی، (شکل ۱)، زیرگروه B<sub>4</sub> به سطح سری (ser. *Erianthae*) ارتقاء می‌یابد.

ویژگی‌های مهم ser. *Erianthae*: "پهنک برگ‌های زیر انتهایی شاخه‌های گل دار با ۱-۳-۴ جفت لب. گل آذین باز، به ندرت فشرده. برگه‌ها ریزان، حاشیه کامل یا دندانه‌ای. کاسبرگ‌ها کامل، به ندرت با ۱-۲ دندانه غده‌ای. بخش خوراکی میوه مایل به زرد. هسته‌ها ۱-۲-۳ یا (۵-۳-۲-۱)، سطح پشتی شیاردار، سطح جانبی-شکمی شیاردار یا صاف."

زیرگروه B<sub>3</sub> شامل: *C. azarolus* var. *pontica* و *C. assadii* است. در فلور ایران *C. pontica* به صورت یک گونه در نظر گرفته شده است، در حالی که در طبقه بندی کریستنسن (۱۹۹۲) به صورت واریته ser. *Orientalis* *C. azarolus* var. *pontica* آورده شده است. نتایج این تحقیق نظر کریستنسن (۱۹۹۲) را تایید می‌کند. براساس طبقه بندی کریستنسن (۱۹۹۲)، *C. azarolus* var. *pontica* به شکل ایجاد شده است. با توجه به قرار گرفتن *C. assadii* در کنار *C. azarolus* var. *pontica* می‌توان آن را در ser. *Orientalis* قرار داد. بنابراین، جدایی این سری از سایر سری‌ها تایید می‌شود.

ویژگی‌های مهم ser. *Orientalis*: "شاخه‌ها کم و بیش دارای کرک‌های پشمی درهم متراکم یا باریک و بلند. طول خارها تا ۳/۵ سانتی متر. دمبرگ‌ها در پهنک برگ‌های تقریباً انتهایی شاخه‌های گل دار ۱۰/۱-۰/۱ برابر طول پهنک. گوشوارک‌ها کامل یا کم و بیش اره‌ای نامنظم، در شاخه‌های گل دار به طول ۳-۱۵ میلی متر، در شاخه‌های طویل به طول ۴-۲۵ میلی متر. گل آذین دارای ۴-۲۵ گل، فشرده، به ندرت باز، کم و بیش دارای کرک‌های پشمی درهم یا باریک و بلند. طول برگه‌ها ۲۶-۲۴/۰ برابر عرض آن‌ها، کامل یا دندانه دار، ریزان. کاسبرگ‌ها کامل، به ندرت با ۱-۲ دندانه غده‌ای یا غیر غده‌ای. میوه زرد، نارنجی یا قرمز، بخش خوراکی مایل به زرد. هسته‌ها ۶-۵-۲(۱)، سطح پشتی شیاردار، سطح جانبی-شکمی صاف، به ندرت شیاردار."

زیرگروه B<sub>2</sub> شامل: *C. pentagyna* subsp. *pentagyna* و *C. pseudomelanocarpa* است. این گروه در ser. *Pentagynae* قرار می‌گیرد و جدایی این سری از سایر سری‌ها کاملاً تایید می‌شود. در فلور ایران *C. pseudomelanocarpa* و *C. pentagyna* به صورت دو گونه مجزا قرار گرفته‌اند، در حالی که در طبقه بندی کریستنسن (۱۹۹۲) این دو گونه به صورت دو زیرگونه *C. pentagyna* subsp. *pentagyna* و *C. pentagyna* subsp. *pentagyna* معرفی شده‌اند.


*pseudomelanocarpa* نامگذاری شده اند. نتایج این تحقیق به نظر کریستنسن (۱۹۹۲) نزدیک تر است.

ویژگی های مهم *Pentagynae* ser. "شاخه ها کرک آلود، دارای کرک های خمیده نوک تیز و پشمی درهم، گاهی فاقد کرک. خارها به طول تا ۱/۷ میلی متر. دمبرگ های پهنک برگ های شاخه های گل دار ۰/۳-۰/۶ برابر طول پهنک. گوشوارک ها کامل یا کم و بیش از ای نامنظم، طول آن ها در برگ های شاخه های گل دار ۱۵-۳ میلی متر، در برگ های شاخه های طوبیل به طول ۱۷-۵ میلی متر، گل آذین دارای ۹-۵ گل، باز، فاقد کرک یا دارای کرک های خمیده نوک تیز یا پشمی درهم. طول برگه ها ۵-۲۱ برابر عرض آن ها، معمولاً کامل. میوه سیاه، بخش خوراکی مایل به قرمز. هسته ها (۶-۵-۳)، سطح پشتی شیاردار، سطح شکمی- جانسی صاف".

با جمع بندی بررسی های ریخت شناسی و تاکسونومی عددی می توان گفت، با توجه با اینکه اغلب گونه های جنس *Zizalik* کمپلکس های پیچیده ای را تشکیل می دهد و نمونه های مورد مطالعه نیز از سطح وسیعی از مکان های مختلف با شرایط اقلیمی بسیار متنوع جمع آوری شده اند. بنابراین، تعریف و تشخیص برخی صفات بویژه صفات کیفی تا حدودی دشوار به نظر می رسد در نتیجه در دندروگرام حاصل، برخی از تاکسون های تحت گونه ای به خوبی از یکدیگر تفکیک نشده اند و در گروه های مجاور تداخل نموده اند. در نهایت با مقایسه بررسی های ریخت شناسی و تاکسونومی عددی با منابع موجود از جمله مونوگراف *Zizalik* (کریستنسن ۱۹۹۲)، می توان گفت نتایج حاصل به طبقه بندی کریستنسن (I.C.) نزدیک تر است. البته برای نتیجه گیری قطعی به مطالعات تکمیلی از جمله شناسایی فلاونوئید ها، بررسی سیتوتاکسونومی و بررسی تاکسونومی عددی تمام گونه های موجود در ایران نیاز است.

### ۳- کمotaکسونومی

در بررسی تاکسونومی شیمیایی ۴۱ لکه تشخیص داده شد (شکل های ۳ و ۴) و دندروگرام حاصل از آن ها رسم شد. براساس دندروگرام داده های فلاونوئیدی (شکل ۲)، آرایه های مورد مطالعه در دو گروه اصلی قرار می گیرند (گروه A و گروه B). هر دو گروه به sect. *Crataegus* تعلق دارند. گروه A شامل دو زیرگروه اصلی است (A<sub>1</sub> و A<sub>2</sub>). زیرگروه A<sub>1</sub> به دو زیرگروه فرعی تقسیم می شود (A<sub>3</sub> و A<sub>4</sub>).




شکل ۱- تجزیه خوشه‌ای صفات ریخت‌شناسی به روی این افزار  
UPGMA با استفاده از نرم افزار NTSYS

Fig. 1. Cluster analysis of morphological characters with UPGMA method and NTSYS software.

زیرگروه فرعی A شامل آرایه‌های زیر است: *C. songarica*, *C. ambigua* subsp. *ambigua*, *C. pseudoheterophylla* subsp., *C. pseudoheterophylla* subsp. *turkestanica*, *C. azarolus* var. *pontica*, *C. meyeri*, *C. monogyna* var. *lasiocarpa*, *C. turcomanica* و *C. assadii*. براساس طبقه بندی کریستنسن (۱۹۹۲)، تمام اعضای زیرگروه *C. assadii* ser. *Crataegus* به جز A<sub>1</sub> در *C. assadii* و *C. azarolus* var. *pontica* قرار می‌گیرند. در بین این اعضاء آرایه‌های *C. pseudoheterophylla* subsp. *C. pseudoheterophylla* subsp. *turcomanica*, *C. monogyna* var. *lasiocarpa*,

قرار می گیرند و آرایه های *Crataegus* subser. *Crataegus turkestanica* ser. *Crataegus* در *C. meyeri*, *C. songarica*, *C. ambigua* subsp. *ambigua* قرار می گیرند. با توجه به دندروگرام داده های فلاونوپیدی (شکل ۲) و مقایسه کروماتوگرام ها (شکل ۴) مشاهده می شود بین برخی از اعضای ser. *Crataegus* subser. *Erianthae* و subser. *Crataegus* مقایسه کروماتوگرام ها (شکل ۴) مشاهده می شود بین برخی از اعضای ser. *Crataegus* subser. *Erianthae* و subser. *Crataegus* جدایی این دو زیرسری از یکدیگر به طور کامل تایید نمی شود، ولی جدایی از ser. *Crataegus* دیگر سری ها تا حدود زیادی تایید می شود. نکته قابل توجه در بین اعضای زیرگروه A<sub>3</sub> قرار گرفتن *C. azarolus* var. *pontica* در مجاورت اعضای ser. *Crataegus* طبقه بندی کریستنسن (۱۹۹۲)، *C. azarolus* var. *pontica* به ser. *Orientalis* تعلق دارد. همچنین در مطالعات تاکسونومی عددی نیز این تاکسون در ser. *Orientalis* قرار گرفت. اما نتایج حاصل از داده های فلاونوپیدی و مقایسه لکه ها جدایی از ser. *Orientalis* را تایید نمی کند. زیرگروه فرعی A<sub>4</sub> شامل گونه *C. assadii* است. در طبقه بندی کریستنسن (l.c.) اشاره ای به این گونه نشده است. در بررسی های تاکسونومی عددی این گونه در مجاورت از *C. azarolus* var. *pontica* در یک شاخه جدا قرار گرفته است. برای نتیجه گیری دقیقتر در مورد *C. assadii* شناسایی دقیق فلاونوپیدهای آن به همراه سایر اعضای ser. *Orientalis* ضروری است. زیرگروه اصلی A<sub>2</sub> شامل: *C. microphylla* var. *dolichocarpa* است. در طبقه بندی کریستنسن (l.c.) *C. microphylla* var. *dolichocarpa* و var. *microphylla* قرار دارد، ولی در مطالعات تاکسونومی شیمیایی (شکل ۲) مشاهده می شود که این تاکسون در فاصله دورتر و کاملاً جدا از سایر اعضای ser. *Crataegus* subser. *Crataegus* قرار گرفته است. این نتایج توسعه مطالعات تاکسونومی عددی نیز تایید شده است. در فلور ایرانیکا و فلور ایران *C. microphylla* var. *dolichocarpa* آورده شده است، در حالی که کریستنسن (l.c.) دو گونه فوق را جدا از هم دانسته است و *C. monogyna* var. *dolichocarpa* را متراffد با *C. monogyna* var. *dolichocarpa* در نظر گرفته است. نتایج تاکسونومی شیمیایی نیز نشان می دهد که var. *lasiocarpa* کاملاً مستقل از *C. microphylla* است و در یک سری جداگانه قرار می گیرد. بنابراین، جدایی دو گونه فوق تایید می شود.



شکل ۲- تجزیه خوشه ای داده های فلاونوییدی به روش UPGMA با استفاده از نرم افزار NTSYS

Fig. 2. Cluster analysis of flavonoid data with UPGMA method and NTSYS software.

گروه B شامل: *C. pentagyna* subsp. و *C. pentagyna* subsp. *pseudomelanocarpa* است. اعضای این گروه در ser. *Pentagynae* قرار می گیرند. که جدایی این سری از سایر سری ها تایید می شود. به طور کلی براساس نتایج تاکسونومی شیمیابی جدایی جدایی واحد های گونه ای و تحت گونه ای نیز در اغلب موارد تایید می شود. نتایج تاکسونومی

شیمیایی تا حدود زیادی توسط مطالعات تاکسونومی عددی تایید می شوند و در نهایت طبقه بندی کریستنسن (I.C.N.) مورد تایید قرار می گیرد.

از مقایسه نتایج تاکسونومی عددی و تاکسونومی شیمیایی می توان نتیجه گرفت، تاکسونومی عددی بهتر از تاکسونومی شیمیایی توانسته است آرایه های این جنس را از هم تفکیک کند. البته نتایج تاکسونومی شیمیایی تا حدود زیادی توسط تاکسونومی عددی تایید می شود ولی برای نتیجه گیری بهتر و دقیق تر نیاز به شناسایی دقیق فلاونوئید ها و بررسی سایر گونه های زالزالک موجود در ایران است.

جدول ۱- پراکنش جنس زالزالک در ایران (براساس Red Data Book of Iran

	نام علمی گیاه	شماره	پراکنش در ایران	گونه اندیمیک	گونه نادر	گونه در حال انقراض
۱	<i>C. sanguinea</i>		مازندران		*	
۲	<i>C. babakhanloui</i>		تهران		*	*
۳	<i>C. pseudomelanocarpa</i>		گلستان-مازندران-گیلان			
۴	<i>C. aminii</i>		اصفهان	*	*	*
۵	<i>C. pentagyna</i>		گلستان-مازندران-گیلان-خراسان			
۶	<i>C. davisi</i>		آذربایجان		*	*
۷	<i>C. orientalis</i>		آذربایجان-کردستان			
۸	<i>C. szovitsii</i>		آذربایجان-کردستان-لرستان-			
۹	<i>C. aronia</i>		کهگیلویه-بختیاری-مرکزی-فارس-آذربایجان-کردستان-آبدان-			
۱۰	<i>C. pontica</i>		اصفهان-کهگیلویه-زنجان-فارس-کرمان-همدان-مرکزی-کرمانشاه-لرستان-بختیاری-تهران-آذربایجان-کردستان-ایلام-			
۱۱	<i>C. assadii</i>		لرستان-کهگیلویه-بختیاری-فارس-کرمان-خراسان		*	*
۱۲	<i>C. meyeri</i>		خراسان-مازندران-گیلان-آذربایجان-کردستان-همدان-تهران-بختیاری-کرمان-لرستان			

شماره	نام علمی گیاه	پراکنش در ایران	گونه اندیمیک	گونه نادر	گونه در حال انفراض
۱۳	<i>C. sakranensis</i>	آذربایجان-کردستان-کهگیلویه- بختیاری-فارس			
۱۴	<i>C. atrosanguinea</i>	مازندران-کردستان-آبادان-لرستان- اصفهان-کرمان- خراسان-قزوین-			
۱۵	<i>C. songarica</i>	گلستان-مازندران-سمنان			تهران
۱۶	<i>C. microphylla</i>	گلستان-مازندران-گیلان-خراسان			
۱۷	<i>C. turkestanica</i>	مازندران-خراسان-تهران			
۱۸	<i>C. sinaica</i>	آبادان-فارس			*
۱۹	<i>C. curvisepala</i>	آذربایجان-کردستان-لرستان- بختیاری			
۲۰	<i>C. pseudoheterophylla</i>	آذربایجان-خراسان-تهران-گلستان- مازندران-همدان-لرستان-قزوین			
۲۱	<i>C. persica</i>	کردستان-اصفهان-بختیاری			*
۲۲	<i>C. turcomanica</i>	خراسان			*
۲۳	<i>C. X armena</i>	مازندران-آذربایجان			
۲۴	<i>C. pontica</i> X <i>C. atrosanguinea</i>	لرستان			
۲۵	<i>C. meyeri</i> X <i>C. pseudoheterophylla</i>	آذربایجان			
۲۶	<i>C. pentagyna</i> X <i>C. songarica</i>	مازندران			
۲۷	<i>C. X pseudoambigua</i> = <i>C. pseudomelanocarpa</i> X <i>C. turkestanica</i>	خراسان			

## جدول ۲- طبقه بندی حاصل از مطالعه جنس زالزالک

Table 2. Classification of the study of the genus *Crataegus*

Sect. <i>Crataegus</i>	
Ser. <i>Crataegus</i>	<i>C. pseudoheterophylla</i> subsp. <i>turkestanica</i>
	<i>C. pseudoheterophylla</i> subsp. <i>turcomanica</i>
	<i>C. monogyna</i> var. <i>lasiocarpa</i>
Ser. <i>Erianthae</i>	<i>C. meyeri</i>
	<i>C. songarica</i>
	<i>C. ambigua</i> subsp. <i>ambigua</i>
Ser. <i>Orientalis</i>	<i>C. azarolus</i> var. <i>pontica</i>
	<i>C. assadii</i>
Ser. <i>Pentagynae</i>	<i>C. pentagyna</i> subsp. <i>pentagyna</i>
	<i>C. pentagyna</i> subsp. <i>pseudomelanocarpa</i>
Ser. <i>Microphyllae</i> (new Ser.)	<i>C. microphylla</i> var. <i>microphylla</i>
	<i>C. microphylla</i> var. <i>dolichocarpa</i>

جدول ۳ - صفات مورفولوژیکی کیفی مورد استفاده در مطالعه تاکسونومی عددی جنس زالزالک

ردیف	صفت	شماره
۱	فرم رویشی	
۲	رنگ شاخه های سال قبل	
۳	پوشش کرکی شاخه های سال جاری	
۴	نوع کرک ها	
۵	وضعیت خار	
۶	برخی شاخه های کوتاه در انتهای تبدیل به خار شده اند	
۷	لب پایینی برگ در شاخه های گلدار نوک تیز یا نوک کند	
۸	پلی مورفیسم برگ	
۹	وضعیت کرک در سطح فوقانی برگ	
۱۰	وضعیت کرک در سطح تحتانی برگ	
۱۱	وضعیت کرک در دمیرگ	
۱۲	رنگ سطح فوقانی و تحتانی برگ	
۱۳	رنگ سطح فوقانی برگ	
۱۴	رنگ سطح تحتانی برگ	
۱۵	شكل پهنگ	
۱۶	بریدگی پهنگ در شاخه های گلدار تا رگبرگ میانی می رسد- نمی رسد	
۱۷	بریدگی پهنگ در شاخه های گلدار	
۱۸	تعداد دندانه های لب پایینی در شاخه های گلدار	
۱۹	تعداد لب های برگ در شاخه های گلدار	
۲۰	تعداد لب های برگ در شاخه های بلند	
۲۱	گوشوارک در شاخه های گلدار	
۲۲	گوشوارک در شاخه های بلند	
۲۳	وضعیت دندانه های گوشوارک در شاخه های گلدار	

شماره	صفت	کد و حالات صفت
۲۴	وضعیت دندانه های گوشوارک در شاخه های بلند	۱: دارای دندانه ۲: فقد دندانه
۲۵	نوع گل آذین	۱: دیپیم ۲: چتری شکل ۳: تک گل ۴: چتر به ندرت دیپیم
۲۶	تعداد گل ها در هر گل آذین	۱: (۱۰-۱۶) ۲: (۱۰-۲۵) ۳: (۱۰-۵۰) ۴: (۲۰-۵۰)
۲۷	وضعیت کرک های گل آذین	۱: کرک آلود ۲: کم کرک ۳: بدون کرک
۲۸	وضعیت کرک های قاعده هیپانتیوم	۱: کرک آلود ۲: کم کرک ۳: بدون کرک
۲۹	شكل حاشیه برآکته	۱: کامل ۲: دندانه دار
۳۰	شكل کاسبرگ ها	۱: مثاثی کشیده ۲: مثاثی پهن ۳: تخم مرغی ۴: مثاثی تا تخم مرغی
۳۱	حاشیه کاسبرگ ها	۱: کامل ۲: دندانه از
۳۲	تعداد پرچم ها	۱: (۲۰-۲۰) ۲: (۱۸-۲۰) ۳: (۱۸-۲۰) ۴: (۱۶-۲۰)
۳۳	تعداد خامه ها	۱: (۲-۴-۵) ۲: (۱-۲-۳) ۳: (۱-۲-۳) ۴: (۱-۲-۳)
۳۴	تعداد دانه ها در هر میوه	۱: (۲-۳-۶) ۲: (۱-۲-۳) ۳: (۱-۲-۳) ۴: (۱-۲-۳) ۵: (۱-۲-۳) ۶: (۱-۲-۳)
۳۵	رنگ میوه	۱: سیاه ۲: ارغوانی تا سیاه ۳: قرمز روشن ۴: قرمز ۵: قرمز پررنگ ۶: قرمز تیره ۷: زرد نارنجی
۳۶	شكل میوه	۱: کروی ۲: بیضی ۳: کروی پهن ۴: مستطیلی ۵: کروی و بیضی
۳۷	شكل دم میوه در زیر قاعده میوه	۱: گوشنی و بزرگ ۲: غیر گوشنی
۳۸	حالات کاسبرگ ها روی میوه	۱: برگشته ۲: بینه برگشته ۳: افرانشه
۳۹	بخش خوراکی میوه	۱: گوششالود و ابدار ۲: خشک
۴۰	رنگ بخش خوراکی میوه	۱: سیز ۲: زرد ۳: قرمز
۴۱	سطح پشتی هسته	۱: صاف ۲: شیار دار
۴۲	تعداد شیارهای پشتی هسته	(۱-۳) ۲: (۳-۵) ۳: (۳-۵) ۴: (> ۵)

جدول ۴ - صفات مورفولوژیکی کمی مورد استفاده در مطالعه تاکسونومی عددی جنس زالزالک

واحد اندازه گیری	صفت	شماره
متر	ارتفاع تقریبی گیاه	۱
میلی متر	طول خارها	۲
درجه	اندازه زاویه خار با شاخه خاردار	۳
سانسی متر	طول پهنهک برگ در شاخه های گلدار	۴
سانسی متر	عرض پهنهک برگ در شاخه های گلدار	۵
-	نسبت طول به عرض پهنهک در شاخه های گلدار	۶
سانسی متر	طول پهنهک در شاخه های کوتاه	۷
سانسی متر	عرض پهنهک در شاخه های کوتاه	۸
-	نسبت طول به عرض پهنهک در شاخه های کوتاه	۹
سانسی متر	طول پهنهک در شاخه های بلند	۱۰
سانسی متر	عرض پهنهک در شاخه های بلند	۱۱
-	نسبت طول به عرض پهنهک در شاخه های بلند	۱۲

شماره	صفت	واحد اندازه گیری
۱۳	طول لب پایینی در شاخه های گلدار	میلی متر
۱۴	عرض لب پایینی در شاخه های گلدار	میلی متر
۱۵	نسبت طول به عرض لب پایینی در شاخه های گلدار	-
۱۶	زاویه لب پایینی با رگبرگ اصلی در شاخه های گلدار	درجه
۱۷	طول گوشوارک در شاخه های گلدار	میلی متر
۱۸	طول گوشوارک در شاخه های بلند	میلی متر
۱۹	طول دمبرگ در شاخه های گلدار	سانتی متر
۲۰	طول دمبرگ در شاخه های کوتاه	سانتی متر
۲۱	طول دمبرگ در شاخه های طویل	سانتی متر
۲۲	نسبت طول پهنک به طول دمبرگ در شاخه های گلدار	-
۲۳	نسبت طول پهنک به طول دمبرگ در شاخه های کوتاه	-
۲۴	نسبت طول پهنک به طول دمبرگ در شاخه های بلند	-
۲۵	قطر گل آذین	سانتی متر
۲۶	طول برآکته	میلی متر
۲۷	عرض برآکته	میلی متر

**واحد اندازه گیری**

شماره	صفت	واحد اندازه گیری
۲۸	نسبت طول به عرض براکته	-
۲۹	قطر گل	میلی متر
۳۰	طول کاسبرگ ها	میلی متر
۳۱	عرض کاسبرگ ها	میلی متر
۳۲	نسبت طول به عرض کاسبرگ ها	-
۳۳	طول گلبرگ ها	میلی متر
۳۴	عرض گلبرگ ها	میلی متر
۳۵	نسبت طول به عرض گلبرگ ها	-
۳۶	طول پرچم ها	میلی متر
۳۷	طول خامه	میلی متر
۳۸	طول میوه	میلی متر
۳۹	قطر میوه	میلی متر
۴۰	نسبت طول میوه به قطر میوه	-
۴۱	طول هسته	میلی متر
۴۲	قطر هسته	میلی متر
۴۳	نسبت طول هسته به قطر هسته	-

جدول ۵- مقادیر Rf و واکنش رنگ فلاونوییدها در جنس زالزالک

لکه	Rf × ۱۰۰		واکنش رنگ	
	BAW	%۱۵	+UV (366)	+UV +NH3
A	۳۹,۰۳	۳۳,۲۱	تیره پررنگ	زرد پررنگ
B	۳۹,۵۹	۱۶,۵۰	تیره پررنگ	زرد متوسط
C	۵۶,۸۰	۲۸,۹۶	تیره کم رنگ	زرد کم رنگ
D	۵۱,۹۰	۴۰,۱۳	تیره متوسط	زرد کم رنگ
E	۵۰,۰۲	۵۵,۵۰	تیره متوسط	زرد متوسط
F	۵۲,۳۰	۶۸,۶۳	تیره متوسط	زرد کم رنگ
G	۵۸,۰۱۶	۷۲,۰۰	تیره متوسط	زرد کم رنگ
H	۸۱,۰۶	۳۲,۹۹	تیره متوسط	زرد کم رنگ
I	۶۶,۷۸	۴۳,۵۹	تیره متوسط	زرد کم رنگ
J	۷۱,۳۴	۵۲,۶۲	تیره کم رنگ	زرد کم رنگ
K	۶۶,۳۰	۷۱,۶۹	آبی متوسط	آبی فیروزه ای

لکه	BAW	Rf × 100 مقدار	اسید استیک %۱۵	+UV (366)	واکنش رنگ	+UV +NH3
L	۶۶,۴۲		۷۹,۵۲	آبی کم رنگ	آبی فیروزه ای	
M	۵۴,۳۶		۷۶,۸۶	آبی کم رنگ	آبی کم رنگ	
N	۳۳,۵۰		۱۶,۸۱	تیره متوسط	زرد متوسط	
O	۳۸,۵۷		۶۳,۰۰	تیره متوسط	زرد متوسط	
P	۴۱,۹۱		۶۹,۷۶	تیره متوسط	زرد کم رنگ	
Q	۸۲,۵۸		۵۳,۵۸	آبی کم رنگ	آبی کم رنگ	
R	۵۹,۲۶		۵۳,۸۶	تیره کم رنگ	بدون تغییر	
S	۲۳,۸۸		۴۱,۴۳	بی رنگ	نارنجی	
T	۶۲,۹۹		۴۲,۰۰	تیره متوسط	زرد پررنگ	
U	۶۱,۱۴		۵۱,۶۳	تیره کم رنگ	زرد کم رنگ	
V	۵۲,۳۹		۷۶,۳۳	آبی کم رنگ	آبی متوسط	
W	۶۴,۷۲		۴۰,۶۸	تیره کم رنگ	زرد کم رنگ	
X	۶۷,۴۶		۲۲,۳۶	تیره متوسط	زرد متوسط	
Y	۲۷,۰۸		۷۸,۹۲	سفید مایل به زرد	زرد کم رنگ	

لکه	<u>Rf × 100</u>			واکنش رنگ	
	BAW	%۱۵ اسید استیک	+UV (366)	+UV +NH3	
Z	۵۴,۰۰	۶۸,۵۳	تیره پررنگ	زرد مایل به سبز	
AA	۷۰,۹۸	۳۰,۳۱	تیره متوسط	بدون تغییر	
AB	۸۱,۸۴	۳۹,۶۰	آبی کم رنگ	آبی متوسط	
AC	۸۱,۸۴	۶۴,۹۳	مایل به بنفش	آبی فیروزه ای	
AD	۶۴,۶۸	۴۲,۴۶	تیره متوسط	زرد متوسط	
AE	۷۳,۲۴	۷۲,۱۴	تیره متوسط	زرد مایل به سبز	
AF	۳۱,۸۶	۴۸,۹۷	تیره کم رنگ	زرد کم رنگ	
AG	۳۴,۴۱	۵۶,۷۹	تیره کم رنگ	زرد کم رنگ	
AH	۵۶,۵۹	۲۵,۴۲	تیره کم رنگ	بدون تغییر	
AI	۲۰,۹۰	۸۳,۶۵	قهقهه ای روشن	سفید مایل به آبی	
AJ	۳۷,۸۰	۷۹,۳۰	آبی کم رنگ	بنفش کم رنگ	
AK	۴۴,۰۵	۳۸,۲۹	تیره کم رنگ	زرد کم رنگ	
AL	۴۲,۸۳	۶۲,۴۱	تیره پررنگ	زرد پررنگ	
AM	۴۴,۸۰	۵۶,۳۰	مایل به صورتی	سفید	
AN	۲۶,۱۳	۶۸,۰۹	تیره کم رنگ	زرد کم رنگ	
AO	۶۳,۴۷	۶۰,۲۲	بی رنگ	آبی کم رنگ	

جدول ۶- فلاؤنوبید های جمعیت های مختلف از جنس زالک

نام گونه	شماره	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
<i>C. assadii</i>	۱	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-
<i>C. assadii</i>	۲	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-
<i>C. assadii</i>	۳	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-
<i>C. assadii</i>	۴	-	+	-	+	+	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-
<i>C. assadii</i>	۵	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-
<i>C. assadii</i>	۶	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-
<i>C. assadii</i>	۷	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-
<i>C. assadii</i>	۸	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-
<i>C. assadii</i>	۹	-	+	-	+	+	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-
<i>C. ambigua</i> subsp. <i>ambigua</i>	۱۰	-	-	-	-	+	-	+	-	-	+	+	+	-	-	-	-

نام گونه	شماره	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
<i>C. ambigua</i> subsp. <i>ambigua</i>	۱۱	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-
<i>C. azarolus</i> var. <i>pontica</i>	۱۲	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-
<i>C. azarolus</i> var. <i>pontica</i>	۱۳	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-
<i>C. azarolus</i> var. <i>pontica</i>	۱۴	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-
<i>C. meyeri</i>	۱۵	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-
<i>C. ambigua</i> subsp. <i>ambigua</i>	۱۶	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-
<i>C. ambigua</i> subsp. <i>ambigua</i>	۱۷	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-
<i>C. microphylla</i> var. <i>dolichocarpa</i>	۱۸	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-
<i>C. microphylla</i> var. <i>dolichocarpa</i>	۱۹	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+	-	-
<i>C. microphylla</i> var. <i>microphylla</i>	۲۰	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-
<i>C. monogyna</i> var. <i>lasiocarpa</i>	۲۱	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-
<i>C. pentagyna</i> subsp. <i>pseudomelanocarpa</i>	۲۲	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-
<i>C. pentagyna</i> subsp. <i>pseudomelanocarpa</i>	۲۳	-	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+
<i>C. pentagyna</i> subsp. <i>pseudomelanocarpa</i>	۲۴	+	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-	-	-

نام گونه	تعداد	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
<i>C. pentagyna</i> subsp. <i>pseudomelanocarpa</i>	۲۵	-	+	-	+	+	-	+	-	-	+	+	+	+	+	-	-
<i>C. pentagyna</i> subsp. <i>pseudomelanocarpa</i>	۲۶	-	+	-	+	+	+	+	-	-	+	+	+	-	+	+	-
<i>C. pentagyna</i> subsp. <i>pentagyna</i>	۲۷	-	-	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>C. pseudoheterophylla</i> subsp. <i>turcomanica</i>	۲۸	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-
<i>C. pseudoheterophylla</i> subsp. <i>turkestanica</i>	۲۹	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-
<i>C. pseudoheterophylla</i> subsp. <i>turkestanica</i>	۳۰	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-
<i>C. pseudoheterophylla</i> subsp. <i>turkestanica</i>	۳۱	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-
<i>C. pseudoheterophylla</i> subsp. <i>turkestanica</i>	۳۲	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-
<i>C. pseudoheterophylla</i> subsp. <i>turkestanica</i>	۳۳	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-
<i>C. pseudoheterophylla</i> subsp. <i>turkestanica</i>	۳۴	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-
<i>C. pseudoheterophylla</i> subsp. <i>turkestanica</i>	۳۵	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-

نام گونه	شماره	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
<i>C. ambigua</i> subsp. <i>ambigua</i>	۳۶	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	
<i>C. ambigua</i> subsp. <i>ambigua</i>	۳۷	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	
<i>C. songarica</i>	۳۸	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	
نام گونه	شماره	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD		
<i>C. assadii</i>	۱	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+		
<i>C. assadii</i>	۲	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+		
<i>C. assadii</i>	۳	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+		
<i>C. assadii</i>	۴	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+		
<i>C. assadii</i>	۵	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+		
<i>C. assadii</i>	۶	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+		
<i>C. assadii</i>	۷	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+		
<i>C. assadii</i>	۸	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-		
<i>C. assadii</i>	۹	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+		


نام گونه	شماره	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
<i>C. ambigua</i> subsp. <i>ambigua</i>	۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+
<i>C. ambigua</i> subsp. <i>ambigua</i>	۱۱	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+
<i>C. azarolus</i> var. <i>pontica</i>	۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+
<i>C. azarolus</i> var. <i>pontica</i>	۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+
<i>C. azarolus</i> var. <i>pontica</i>	۱۴	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+
<i>C. meyeri</i>	۱۵	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+
<i>C. ambigua</i> subsp. <i>ambigua</i>	۱۶	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+
<i>C. ambigua</i> subsp. <i>ambigua</i>	۱۷	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+
<i>C. microphylla</i> var. <i>dolichocarpa</i>	۱۸	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+	-	-	-	-
<i>C. microphylla</i> var. <i>dolichocarpa</i>	۱۹	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-
<i>C. microphylla</i> var. <i>microphylla</i>	۲۰	+	-	-	-	-	-	+	+	+	-	+	+	+	-
<i>C. monogyna</i> var. <i>lasiocarpa</i>	۲۱	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
<i>C. pentagyna</i> subsp. <i>pseudomelanocarpa</i>	۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>C. pentagyna</i> subsp. <i>pseudomelanocarpa</i>	۲۳	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

نام گونه	ردیف	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
<i>C. pentagyna</i> subsp. <i>pseudomelanocarpa</i>	۲۴	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>C. pentagyna</i> subsp. <i>pseudomelanocarpa</i>	۲۵	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>C. pentagyna</i> subsp. <i>pseudomelanocarpa</i>	۲۶	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
<i>C. pentagyna</i> subsp. <i>Pentagyna</i>	۲۷	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>C. pseudoheterophylla</i> subsp. <i>turcomanica</i>	۲۸	-	-	-	-	+	+	-	-	-	+	-	-	-	+
<i>C. pseudoheterophylla</i> subsp. <i>turkestanica</i>	۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+
<i>C. pseudoheterophylla</i> subsp. <i>turkestanica</i>	۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+
<i>C. pseudoheterophylla</i> subsp. <i>turkestanica</i>	۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+
<i>C. pseudoheterophylla</i> subsp. <i>turkestanica</i>	۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+
<i>C. pseudoheterophylla</i> subsp. <i>turkestanica</i>	۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+
<i>C. pseudoheterophylla</i> subsp. <i>turkestanica</i>	۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+
<i>C. pseudoheterophylla</i> subsp. <i>turkestanica</i>	۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+
<i>C. ambigua</i> subsp. <i>ambigua</i>	۳۶	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+
<i>C. ambigua</i> subsp. <i>ambigua</i>	۳۷	-	-	-	-	+	+	-	-	+	-	-	-	-	+
<i>C. songarica</i>	۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+

نام گونه	شماره	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
<i>C. assadii</i>	۱	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>C. assadii</i>	۲	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
<i>C. assadii</i>	۳	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>C. assadii</i>	۴	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>C. assadii</i>	۵	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
<i>C. assadii</i>	۶	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>C. assadii</i>	۷	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-
<i>C. assadii</i>	۸	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>C. assadii</i>	۹	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>C. ambigua</i> subsp. <i>ambigua</i>	۱۰	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-
<i>C. ambigua</i> subsp. <i>Ambigua</i>	۱۱	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	


نام گونه	ردیف	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
<i>C. azarolus</i> var. <i>pontica</i>	۱۲	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>C. azarolus</i> var. <i>pontica</i>	۱۳	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>C. azarolus</i> var. <i>pontica</i>	۱۴	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
<i>C. meyeri</i>	۱۵	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-
<i>C. ambigua</i> subsp. <i>ambigua</i>	۱۶	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
<i>C. ambigua</i> subsp. <i>ambigua</i>	۱۷	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
<i>C. microphylla</i> var. <i>dolichocarpa</i>	۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>C. microphylla</i> var. <i>dolichocarpa</i>	۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>C. microphylla</i> var. <i>microphylla</i>	۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>C. monogyna</i> var. <i>lasiocarpa</i>	۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>C. pentagyna</i> subsp. <i>pseudomelanocarpa</i>	۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>C. pentagyna</i> subsp. <i>pseudomelanocarpa</i>	۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

نام گونه	ردیف	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
<i>C. pentagyna</i> subsp. <i>pseudomelanocarpa</i>	۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>C. pentagyna</i> subsp. <i>pseudomelanocarpa</i>	۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>C. pentagyna</i> subsp. <i>pseudomelanocarpa</i>	۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>C. pentagyna</i> subsp. <i>pentagyna</i>	۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>C. pseudoheterophylla</i> subsp. <i>turcomanica</i>	۲۸	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>C. pseudoheterophylla</i> subsp. <i>turkestanica</i>	۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>C. pseudoheterophylla</i> subsp. <i>turkestanica</i>	۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>C. pseudoheterophylla</i> subsp. <i>turkestanica</i>	۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>C. pseudoheterophylla</i> subsp. <i>turkestanica</i>	۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>C. pseudoheterophylla</i> subsp. <i>turkestanica</i>	۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>C. pseudoheterophylla</i> subsp. <i>turkestanica</i>	۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>C. pseudoheterophylla</i> subsp. <i>turkestanica</i>	۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>C. ambigua</i> subsp. <i>ambigua</i>	۳۶	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
<i>C. ambigua</i> subsp. <i>Ambigua</i>	۳۷	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
<i>C. songarica</i>	۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



شکل ۳- کروماتوگرام کل در جنس ازالک.

Fig. 3. The whole chromatograms in the genus *Crataegus*.



شکل ۴- کروماتوگرام های گونه های مختلف جنس زالک.

Fig. 4. Choromatograms in different species of the genus *Crataegus*.

**منابع**

جهت ملاحظه منابع به متن انگلیسی مراجعه شود.

**نشانی نگارنده‌گان:** علی اصغر ارجمندی و محمد رضا جوهرچی، گروه پژوهشی گیاه شناسی، پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد (کد پستی: ۹۱۷۷۹-۴۸۹۷۴)؛ وحیده ناظری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران و حمید اجتهادی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد.