

فلور قارچ های ماکروسکوپی ارسباران

۳- زیرجنس *Phlegmacium* از جنس *Cortinarius*

Macrofungi of Arasbaran (N.W. Iran)

3. *Cortinarius* subgenus *Phlegmacium*

محمد رضا آصف

بخش تحقیقات رستنی ها، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

دریافت: ۱۳۸۷/۹/۱۱ پذیرش: ۱۳۸۸/۳/۱۰

چکیده

در ادامه معرفی قارچ های ماکروسکوپی منطقه ارسباران، شش گونه متعلق به زیرجنس *C. paracephalixus* از جنس *Phlegmacium* به اسامی: *C. fluryi* و *C. vespertinus* و *C. sublubricus* و *C. subvalidus* و *C. pseudonapus* و *C. fluryi* از *Triumphantes* و *C. subvalidus* به بخش *Phlegmacium* و سه گونه *C. paracephalixus* و *C. vespertinus* و *C. sublubricus* و *C. pseudonapus* و *C. multiformes* از *Myxacium* تعلق دارند. توصیف کلیه گونه های مطالعه شده به همراه تصاویر و ترسیماتی ارایه شده است.

واژه های کلیدی: میکوریز، *Cortinariaceae*, *Myxacium*

مقدمه

جنس (*Cortinarius* (Pers.) Gray (Agaricales, Cortinariaceae) به عنوان بزرگترین گروه از قارچ های ماکروسکوپی (شامل بیش از ۲۰۰۰ گونه)، همچنین به دلیل برقراری ارتباط اکتومیکوریزی با گیاهان مختلف و وجود گونه های سمی خطرناک و مرگبار، از اهمیت خاصی برخوردار است (Kirk *et al.* 2001).

برای نخستین بار فریز (Fries 1821) گروه قارچ های *Phlegmacium* را به عنوان یک قبیله (tribus) از جنس *Agaricus* معرفی کرد. از آن پس وضعیت تاکسونومیکی این گروه از قارچ ها بار ها دچار تغییرات شد تا اینکه در نهایت این گروه به عنوان یک زیرجنس در جنس *Cortinarius* تثبیت گردید (Bidaud *et al.* 1994, Moser 1983).

این زیرجنس در برگیرنده قارچ هایی است با نقش اسپور (spore print) قهوه ای رنگ، بازیدیوسپور هایی معمولاً ناصاف و دارای تزیینات سطحی و وجود بقایای پرده تحت عنوان کورتینا (cortina) که از حاشیه کلاهک به پایه متصل می شود. کلاهک در این گروه از قارچ ها هیگروفانوس (hygrophanus) بوده و در نمونه های جوان و در شرایط آب و هوایی مرطوب، ظاهری کاملاً لزج و خیس به خود می گیرد اما پایه هیگروفانوس نبوده و همیشه خشک می باشد (Peintner *et al.* 2001).

موزر (Moser 1960) در مونوگرافی از این زیرجنس، هفت بخش تحت عناوین: *Phlegmacium Laeticolores Fulvi*, *Calochroi*, *Caerulescentes*, *Amarescentes* و *Triumphantes* برای این زیرجنس معرفی کرد. چند مال بعد موزر (Moser 1983) بخش جدیدی تحت عنوان *Tenuis* به این زیرجنس اضافه کرده و نام بخش *Laeticolores* را نیز به *Scauri* تغییر داد. بعد ها بعضی گونه ها از سایر زیرجنس ها نظیر *Myxacium* و *Sericocybe* به زیرجنس *Phlegmacium* منتقل شدند (Bidaud *et al.* 1994).

در نخستین مقاله از سری مقالات شناسایی فلور قارچ های منطقه ارسباران (Asef 2007)، چهار گونه از زیرجنس *Myxacium* از جنس *Cortinarius* شناسایی و معرفی شد. پیش از آن نیز پنج گونه دیگر از این جنس از جنگل های شمال ایران گزارش شده بود (Saber 1995, 2000, 2004). اما پیش از این تحقیق هیچ گونه ای از زیرجنس *Phlegmacium* از ایران گزارش نشده است.

در این مقاله گونه هایی جدید از زیرجنس *Phlegmacium* از منطقه ارسباران شناسایی و معرفی می گردد.

روش بررسی

به منظور جمع آوری و شناسایی نمونه های قارچی، طی فصول مختلف، مسافت های متعددی به منطقه انجام و نمونه برداری از بخش های مختلف انجام گرفت. در هر مورد به دنبال مشاهده نمونه های قارچی، هر نمونه به شکل سالم، کامل و مناسب برای شناسایی (به شکل موردی) براساس خصوصیات مورفولوژیکی انتخاب شده و سپس کلیه مشخصات ضروری ثبت گردید. در مورد جنس *Cortinarius* و با توجه به اهمیت وضعیت خشک یا لزج و خیس بودن کلاهک و پایه، نمونه ها از این نظر به دقت بررسی و نتایج ثبت گردید. در مورد تمامی نمونه های جمع آوری شده، با هدف تعیین رنگ توده هاگ و نقش اسپوری (spore print) تهیه گردید.

به منظور ثبت بهتر این مشخصات و در کل با هدف تهیه مجموعه تصاویر نمونه های جمع آوری شده، تا حد امکان تصاویری تهیه گردید. نمونه ها پس از انتقال به آزمایشگاه به منظور حذف آلودگی های قارچی، حشره ای و کنه ای به مدت حداقل یک هفته در فریزر نگهداری شدند.

کلیه نمونه های جمع آوری شده، در آزمایشگاه مورد مطالعات میکروسکوپی و ماکروسکوپی قرار گرفتند. به منظور مطالعه، عکسبرداری و ترسیم تصاویر، از میکروسکوپ Olympus BH2، دوربین دیجیتال Olympus C 4000 و نرم افزار Corel DRAW X3 استفاده گردید. بدین ترتیب که پس از انتخاب تصاویر مناسب میکروسکوپی از اندام های مختلف قارچی، تصاویر به وسیله دوربین دیجیتال عکسبرداری شده و سپس این تصاویر به نرم افزار رایانه ای منتقل و به وسیله نرم افزار ترسیم گردیدند. اندازه های ذکر شده در مورد کلیه اندام های قارچی، از اندازه گیری حداقل ۲۵ مورد در آب مقطر به دست آمده است. مشاهدات ماکروسکوپی شامل: رنگ، شکل، اندازه و سایر جزئیات ماکروسکوپی، روی نمونه های تازه و یا با کمک تصاویر تهیه شده انجام گرفت. کلیه تصاویر به وسیله سیستم دوربین دیجیتال Nikon Coolpix 5700 تهیه گردید.

به منظور تشخیص گونه های مختلف قارچی از کتب، مونوگراف ها و یا مقالات مختلف قارچ شناسی استفاده شده است. در خصوص اصطلاحات به کار رفته در مباحث قارچ شناسی و توصیف گونه ها نیز از چاپ نهم فرهنگ قارچ ها (Kirk *et al.* 2001) و سینگر (Singer 1986) استفاده شد.

نتیجه و بحث

در نتیجه شناسایی جدایه های موجود گونه های زیر متعلق به زیرجنس *Phlegmacium* از جنس *Cortinarius* شناسایی گردید. از میان گونه های *C. fluryi* شده، گونه *C. subvalidus*, *Triumphantes*, گونه های *C. pseudonapus*, *C. paracephalixus* و *C. vespertinus* به زیربخش *Phlegmacium* و سه گونه *Multiformes* همگی از زیرجنس *Phlegmacium* تعلق دارند.

***Cortinarius fluryi* (M.M. Moser) M.M. Moser, Kleine Kryptogamenflora, 1967**

کلاهک (pileus) در ابتدا به شکل نیمکروی (hemispherical) تا محدب (convex) و در نهایت صاف تا محدب (plano-convex)، به قطر ۳-۱۰ سانتی متر و به رنگ قهوه ای می باشد. کلاهک در مراحل اولیه رشد، همچنین در شرایط آب و هوایی مرطوب، ظاهری لزج و خیس به خود می گیرد (hygrophanous). تیغه ها (gills) به رنگ آجری و متراکم و دارای اتصال محدودی به پایه (adnate) می باشند.

پایه (stipe) استوانه ای، بدون حلقه (exannulate) و به قطر ۲-۵ سانتی متر و در هیچیک از مراحل رشدی لزج و خیس دیده نمی شود. پایه سفید رنگ بوده و در سطح پایه بقایای پرده (veil remnants) به شکل رشته هایی (cortina) به رنگ قهوه ای آجری نیمه بالایی پایه را به حاشیه کلاهک متصل کرده است.

بازیدیوم ها (basidia) به طول ۴۰-۳۰ میکرومتر و با چهار استریگما و سیستیدیوم ها (cystidia) چماقی شکل و معمولاً اندکی بزرگتر از بازیدیوم ها دیده می شوند. بازیدیوسپور ها (basidiospores) با مشخصات تیپیک بازیدیوسپور های جنس *Cortinarius* بادامی شکل و فاقد سوراخ تنفسی می باشند. سطح بازیدیوسپور ها به طور مشخص ناصاف و زگیل دار (warty) بوده و اندازه بازیدیوسپور ها $6-8 \times 10-14$ میکرومتر می باشد (شکل های ۱A و ۳A). رنگ بازیدیوسپور ها در زیر میکروسکوپ آجری روشن و رنگ نقش اسپوری قارچ (spore print) آجری می باشد. براساس تقسیم بنده ارایه شده توسط موسر (۱۹۶۰) این گونه به بخش *Phlegmacium* تعلق دارد. پایه در اعضای این بخش استوانه ای و بدون هیچگونه تورمی در انتهای می باشد.

نمونه نگهداری شده در هرباریوم: روی خاک، استان آذربایجان شرقی، جنگل ارسباران، کلاله، (IRAN 5074 F).

***Cortinarius paracephalixus* Bohus, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 68: 51. 1978**

کلاهک در ابتدا به شکل نیمکروی (hemispherical) و در نهایت صاف تا محدب (plano-convex) و به قطر ۳-۱۴ سانتی متر و به رنگ آجری، قهوه ای آجری تا زنگاری می باشد. کلاهک در مراحل اولیه رشد، همچنین در شرایط آب و هوایی مرطوب، ظاهری لزج و خیس به خود می گیرد. تیغه ها به رنگ رسی تا آجری و متراکم بوده و با گذشت زمان بهوضوح تیره تر می گردد. تیغه ها دارای اتصال محدودی با پایه (adnate) می باشند. بازیدیوکارپ های جوان کاملا به وسیله پرده عمومی سفید رنگی احاطه شده اند.

پایه استوانه ای در مواردی چماقی شکل، بدون تورم انتهایی، بدون حلقه، به طول ۵-۱۵ سانتی متر و به قطر ۰/۵-۲ سانتی متر بوده و در هیچ یک از مراحل رشدی لزج و خیس دیده نمی شود. پایه سفید رنگ بوده و در سطح پایه بقایای پرده به شکل رشته هایی دیده می شوند. این رشته ها در ابتدا به رنگ سفید و روشن بوده اما به تدریج تیره تر شده و قهوه ای رنگ می شوند.

بازیدیوسپور ها بادامی شکل و فاقد سوراخ تنفس می باشند. سطح بازیدیوسپور ها به طور مشخص ناصاف و زگیل دار (warty) بوده و اندازه بازیدیوسپور ها $10-13 \times 5/5-8$ میکرومتر می باشد (شکل ۳B). رنگ بازیدیوسپور ها در زیر میکروسکوپ آجری روشن و رنگ نقش اسپوری قارچ نیز آجری می باشد. براساس تقسیم بنده ایه شده توسط موزر (۱۹۶۰) این گونه به بخش *Phlegmacium* تعلق دارد.


نمونه نگهداری شده در هرباریوم: روی خاک، استان آذربایجان شرقی، جنگل ارسباران، کلاله، (IRAN 5058 F) ۱۳۸۵/۸/۱۶، آصف و ترابی (IRAN 5058 F).

***Cortinarius pseudonapus* (Rob. Henry ex M.M. Moser) M.M. Moser, Kleine Kryptogamenflora, 1967**

کلاهک به قطر ۶-۱۴ سانتی متر، به رنگ قهوه ای زنگاری دیده می شود. کلاهک در ابتدا به شکل نیمکروی (hemispherical) تا محدب (convex) و در نهایت صاف تا محدب (plano-convex) و در حاشیه معمولاً دارای پیچ خورده ای می باشد. تیغه ها از نوع بوده و به رنگ رسی روشن دیده می شوند.

پایه چماقی و با تورم انتهایی، بدون حلقه، به طول ۱۲-۳ سانتی متر و به قطر ۱-۰/۵ سانتی متر و در هیچیک از مراحل رشدی لزج و خیس دیده نمی شود. اندازه پایه در مقایسه با اندازه کلی قارچ کوتاهتر به نظر می رسد. پایه کاملا سفید رنگ می باشد. بقایای پرده در این گونه به شکل محدود تشکیل می گردد.

بازیدیوم ها به طول ۲۵-۳۸ میکرومتر و با چهار استریگما و سیستیدیوم ها چماقی



شکل ۱- A. بازیدیوم و سیستیدیوم در *Cortinarius flurryi*, B. بازیدیوم و سیستیدیوم در *C. pseudonapus*

Fig. 1. A. Basidium and cystidium of *Cortinarius flurryi*, B. Basidium and cystidium of *C. pseudonapus*.

شکل و معمولاً بزرگتر از بازیدیوم ها ($30\text{--}45$ میکرومتر) دیده می شوند. بازیدیوسپور ها بادامی شکل و فاقد سوراخ تنفسی، ناصاف و زگیل دار (warty) بوده و اندازه بازیدیوسپور ها $5\text{--}7 \times 9\text{--}11/5$ میکرومتر می باشد (شکل های ۱B و ۳C). رنگ بازیدیوسپور ها در زیر میکروسکوپ آجری روشن و رنگ نقش اسپوری قارچ نیز آجری می باشد. براساس تقسیم بندی ارایه شده توسط موذر (۱۹۶۰) این گونه به زیربخش *Multiformes* از بخش *Phlegmacium* تعلق دارد. پایه در اعضای این بخش چماقی بوده و با تورمی در انتهای همراه می باشد.

نمونه نگهداری شده در هرباریوم: روی خاک، استان آذربایجان شرقی، جنگل ارسباران، مکیدی، (IRAN 5617 F)، ۱۳۸۲/۸/۱، آصف.

Cortinarius sublubricus (Jul. Schäff. ex M.M. Moser) M.M. Moser, Kleine Kryptogamenflora, 1967


کلاهک به قطر $2\text{--}5$ سانتی متر و به رنگ قهوه ای زرد روشن، در ابتداء نیمکروی و در مراحل بعدی رشد صاف تا محدب دیده می شود. کلاهک در مراحل اولیه رشد، همچنین در شرایط آب و هوایی مرطوب، ظاهری لزج و خیس به خود می گیرد. تیغه ها به رنگ قهوه ای زنگاری می باشند. بقایای پرده در حاشیه کلاهک از گستردگی برخوردار نبوده و به شکل محدودی تشکیل می گردند.

پایه معمولاً چماقی شکل و با تورم انتهایی، بدون حلقه و به طول ۳-۶ سانتی متر و به قطر ۱۵-۲۰ سانتی متر بوده و در هیچیک از مراحل رشدی لزج و خیس دیده نمی شود. پایه سفید رنگ بوده و در سطح پایه بقایای پرده به شکل رشته هایی محدود دیده می شود. بازیدیوسپور ها بادامی شکل و فاقد سوراخ تنفس می باشند. سطح بازیدیوسپور ها به طور مشخص ناصاف و زگیل دار (warty) بوده و اندازه بازیدیوسپور ها $6.5-8 \times 4-6$ میکرومتر می باشد (شکل های ۲ و ۳E). رنگ بازیدیوسپور ها در زیر میکروسکوپ آجری روشن و رنگ نقش اسپوری قارچ نیز آجری می باشد. براساس تقسیم بندی ارایه شده توسط موزر (۱۹۶۰) این گونه به زیربخش *Phlegmacium Multiformes* از بخش *Multiformes* تعلق دارد. نمونه نگهداری شده در هرباریوم: روی خاک، استان آذربایجان شرقی، جنگل ارسباران، (IRAN 5061 F)، ۱۳۸۵/۸/۱۶ آصف و ترابی



شکل ۲- Cortinarius sublubricus: A. کلاهک های بالغ، B. اتصال پایه به حاشیه کلاهک از طریق رشته های کورتینا، C. بازیدیوسپورها.

Fig. 2. *Cortinarius sublubricus*: A. Mature basidiocarps, B. Stipe with woolly remnants of veil, C. Basidiospores.



شکل ۳- شکل و اندازه بازیدیوسپورها در شش گونه معرفی شده از جنس *Cortinarius*: A. *C. fluryi*, B. *C. paracephalixus*, C. *C. pseudonapus*, D. *C. subvalidus*, E. *C. sublubricus*, F. *C. vespertinus*.

***Cortinarius subvalidus* Rob. Henry, 1958**

کلاهک به قطر ۶-۱۲ سانتی متر و به رنگ آجری روشن تا قهوه ای زرد می باشد. کلاهک در مراحل اولیه رشد، همچنین در شرایط آب و هوایی مرطوب، ظاهری لزج و خیس به خود می گیرد. کلاهک به شکل صاف تا محدب بوده و در حاشیه معمولاً دارای پیچ خورده‌گی می باشد. تیغه‌ها دارای اتصال محدودی به پایه (adnate) بوده، ابتدا به رنگ آجری روشن و سپس تیره تر می گرددند. بقایای پرده در حاشیه به رنگ کلاهک دیده می شود.

پایه استوانه ای، بدون حلقه، به طول ۵-۱۲ سانتی متر و به قطر ۰/۵-۲/۰ سانتی متر و در هیچ یک از مراحل رشدی لزج و خیس دیده نمی شود. بقایای پرده در سطح پایه به شکل کمرنگی پیرامون پایه را احاطه کرده است.

بازیدیوسپور ها بادامی شکل و بدون سوراخ تنفس بوده و سطح آن ها به طور مشخص ناصاف و زگیل‌دار (warty) می باشد (شکل های ۴A و ۳D). اندازه بازیدیوسپور ها ۵-۶ × ۹-۱۲ میکرومتر و رنگ بازیدیوسپور ها در زیر میکروسکوپ آجری روشن و رنگ نقش اسپوری قارچ نیز آجری می باشد. براساس تقسیم بندی ارایه شده توسط موزر (۱۹۶۰) این گونه به بخش *Triumphantes* تعلق دارد.

نمونه نگهداری شده در هرباریوم؛ روی خاک، استان آذربایجان شرقی، جنگل ارسباران، کلاله، (IRAN 5059 F) ۱۳۸۵/۸/۱۶، آصف و ترابی.

***Cortinarius vespertinus* (Fr.) Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 272, 1838**

کلاهک به قطر ۲-۵ سانتی متر و به رنگ قهوه ای مایل به زرد روشن دیده می شود. کلاهک در مراحل اولیه رشد، همچنین در شرایط آب و هوایی مرطوب، ظاهری لزج و خیس به خود می گیرد. تیغه‌ها به رنگ قهوه ای زنگاری می باشند. بقایای پرده در حاشیه کلاهک از گستردگی برخوردار نبوده و به شکل محدودی تشکیل می گرددند.


پایه معمولاً چماقی شکل، در مواردی با تورم انتهایی، بدون حلقه و به طول ۳-۶ سانتی متر و به قطر ۰/۵-۱ میکرومتر بوده و در هیچیک از مراحل رشدی لزج و خیس دیده نمی شود. پایه سفید رنگ بوده و در سطح پایه بقایای پرده به شکل رشته هایی محدود مشاهده می شود.

بازیدیوم ها به طول ۲۰-۳۵ میکرومتر و با چهار استریگما و سیستیدیوم ها چماقی شکل و بزرگتر از بازیدیوم ها (۲۵-۴۵ میکرومتر) دیده می شوند. بازیدیوسپور ها بادامی شکل و قادر سوراخ تنفس بوده و سطح آن ها به طور مشخص ناصاف و زگیل‌دار (warty) می باشد. اندازه بازیدیوسپور ها ۴-۶ × ۶/۵-۸ میکرومتر می باشد (شکل های ۴B و ۳F).

رنگ بازیدیوسپور ها در زیر میکروسکوپ آجری روشن و رنگ نقش اسپوری قارچ نیز آجری می باشد. طبق نظر موzer (۱۹۶۰) این گونه به زیربخش *Multiformes* از بخش *Phlegmacium* تعلق دارد.

نمونه نگهداری شده در هریاریوم: روی خاک، استان آذربایجان شرقی، جنگل ارسباران، آینالو، (IRAN 5371 F)، آصف و ترابی ۱۳۸۵/۸/۱۶.

گونه های معروفی شده از زیرجنس *Phlegmacium* براساس رنگ کلاهک، فرم پایه (استوانه ای یا چماقی، با یا بدون تورم انتهایی) همچنین اندازه بازیدیوسپور ها از همدیگر قابل تمایزند. پایه در اعضای بخش *Multiformes* چماقی بوده و با تورمی در انتهای همراه می باشد. در حالی که در اعضای بخش *Phlegmacium* پایه صاف و استوانه ای و بدون تورم انتهایی می باشد. دو گونه *C. sublubricus* و *C. vespertinus* با توجه به اندازه ریز بازیدیوسپور ها از سایر گونه ها قابل تشخیص اند.



شکل ۴- A. ردیفی از بقایای پرده در گونه *Cortinarius subvalidus* که به شکل کمربندی دور پایه را احاطه کرده است، B. لایه هیمنیوم در گونه *C. vespertinus*.

Fig. 4. A. Stipe with belt like veil remnants in *Cortinarius subvalidus*, B. Hymenial layer of *C. vespertinus*.

منابع

جهت ملاحظه منابع به متن انگلیسی مراجعه شود.

نشانی نگارنده: محمد رضا آصف، بخش تحقیقات رستنی ها، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
کشور، صندوق پستی ۱۴۵۴، تهران ۱۹۳۹۵.
(E-mail: asef_iran@yahoo.com)