

$$S = /$$

(دریافت مقاله: ۱۳۹۰/۹/۱۲؛ دریافت نسخه نهایی: ۱۳۹۱/۳/۳)

$$S = 2/2$$

$$SU(4)$$

(۴)

برانگیختگی‌های بزرگتر می‌تواند در سیستم‌های نانو و یا توصیف دقیق‌تر آن داشته باشد برای اسپین‌بزرگتر از $1/2$ ($S > 1/2$) مخصوصاً برای تبادل‌های تک یونی^۱، باید برانگیختگی‌های چندقطبی را در نظر گرفت، در نتیجه برهم‌کنش همسانگرد به عبارت خطی ذکر شده خلاصه نمی‌شود و باید جملات بیشتری را به صورت $J(\hat{S}_i \cdot \hat{S}_j)^n$ در نظر گرفت که n تا $2S$ افزایش می‌یابد [۶].

با توجه به این که هر حالت اسپینی را می‌توان به صورت ترکیب خطی از حالت‌های مؤلفه z اسپین، نوشت ($| \psi \rangle = \sum_{i=1}^{2S+1} m_i | \psi_i \rangle$) ضرایب بسط است) در نتیجه

تا به حال، مگنت‌ها در فرومناطیس‌های هایزنبرگی، که دینامیک ماکروسکوپی آنها با استفاده از معادله لاندو- لیف شیتز برای بردار مغناطش با اندازه ثابت توصیف شده، به طور مفصل بررسی شده است [۱-۵]. در این بررسی‌ها فقط برانگیختگی‌های دو قطبی در نظر گرفته شده و از برانگیختگی‌های بالاتر صرفنظر شده است. از دیدگاه میکروسکوپی، این تصور متناظر با هامیلتونی‌های هایزنبرگی تبادلی، با برهم‌کنش اسپین خطی به صورت $(\hat{S}_i \cdot \hat{S}_j)^n J$ است که J ثابت تبادل و i و j نزدیکترین همسایه‌ها در جایگاه^۱ مورد نظر هستند. با پیشرفت علم ریاضی و صنعت و سهمی که

به شاخه‌های دوقطبی و چهارقطبی را به دست می‌آوریم.

$$S = \frac{3}{2}$$

حالات‌های همدوس یک نوع خاصی از حالات‌های کوانتومی هستند که دینامیک آنها خیلی نزدیک به رفتار سیستم کلاسیکی مربوطه می‌باشد. این که چه نوع حالت همدوسی را در یک مسئله مورد استفاده قرار دهیم به تقارن عملگرها م وجود در هامیلتونی مسئله بستگی دارد. با توجه به تقارن موجود در عملگرها هامیلتونی (۱) برای توصیف دقیق و در نظر گرفتن تمام برانگیختگی‌های چندقطبی از حالات‌های همدوس در گروه $SU(4)$ استفاده می‌شود که در این گروه حالت خلاء به صورت $^{(1,0,0,0)}$ در نظر گرفته و حالت همدوس تک جایگاه^۱ آن به صورت زیر نوشته می‌شود [۸]

$$|\psi\rangle = D^{3/2}(\theta, \phi, \gamma) \exp(i g \hat{Q}^{xy}) \exp(-i \beta \hat{S}^z) \exp(-i k \hat{F}^{xyz}). \quad (2)$$

در رابطه فوقتابع $(\theta, \phi, \gamma)^{3/2}$ ، تابع ویگنر برای اسپین $S = 3/2$ ، عملگر \hat{Q}^{xy} مربوط به گشتاور چهارقطبی و عملگر \hat{F}^{xyz} مربوط به گشتاور هشت قطبی می‌باشد. دو زاویه θ و ϕ که زوایای اویلر هستند، جهت‌گیری بردار اسپین را مشخص می‌کنند و زاویه‌های γ و β چرخش گشتاورهای چندقطبی (چهارقطبی و هشت قطبی) حول بردار اسپین را مشخص می‌کنند. پارامترهای g و k تغییر طول مقدار میانگین گشتاورهای چندقطبی (چهارقطبی و هشت قطبی) و اسپین را تعیین می‌کنند. قابل ذکر است که دامنه تغییرات زاویه‌های β, γ, ϕ بین صفر تا 2π و زاویه θ بین $-\pi$ تا π است. با توجه به رابطه (۲) و استفاده از انتگرال مسیر فایمنن برای حالت همدوس می‌توان لاگرانژی را به صورت زیر محاسبه کرد [۸]

$$L = \cos^2 k \cos^2 g (\gamma_t + \cos \theta \phi_t + \sin \theta \beta_t) - H(\theta, \phi, g, \gamma). \quad (3)$$

که در آن $x_t = \partial / \partial t$ شامل همه متغیرهای لاگرانژی یعنی θ, ϕ, γ و g است و H هامیلتونی کلاسیکی سیستم است. البته

تعداد $+1$ پارامتر مختلط برای توصیف هر حالت اسپینی لازم است و این معادل با $+2$ درجه آزادی است که یک درجه به خاطر شرط بهنجارش $= |\psi_i\rangle$ و یک درجه به خاطر دلخواه بودن فاز کاهش می‌باشد. پس $4S$ درجه آزادی در نتیجه $4S$ پارامتر برای توصیف آن لازم می‌باشد که در این مقاله برای توصیف کامل سیستم با اسپین $3/2$ ، شش پارامتر لازم است [۷]. برای این اسپین شکل کلی مدل همسانگرد با در نظر گرفتن برهم‌کنش نزدیکترین همسایه، با هامیلتونی زیر توصیف می‌شود

$$\hat{H} = - \sum_i \left(J(\hat{S}_i \hat{S}_{i+1}) + K(\hat{S}_i \hat{S}_{i+1})^2 + L(\hat{S}_i \hat{S}_{i+1})^3 \right), \quad (1)$$

که در آن \hat{S}_i عملگر اسپین در جایگاه مورد نظر، J و K و L ثابت‌های تبادل متناظر با برهم‌کنش‌های خطی، مجدوری و مکعبی است و جمع روی نزدیکترین همسایه‌های تبادلی می‌باشد. این هامیلتونی مربوط به یک زنجیره اسپینی یک بعدی فرومغناطیسی بوده و علامت ضریب J مثبت و ضریب K انتگرال مبادله برای گشتاور چهارقطبی و ضریب L انتگرال مبادله برای گشتاور هشت قطبی است.

در این مقاله هدف به دست آوردن معادلات کلاسیکی برای هامیلتونی بالا و پیدا کردن جواب موج اسپین در برانگیختگی‌های خطی کوچک، بالاتر از حالت خلاء (پایه) است. با توجه به اینکه حالات‌های همدوس اصل عدم قطعیت را کمینه می‌کند، این حالات‌ها نزدیکترین تصویر به حالت کلاسیکی یعنی شبه کلاسیکی را به ما می‌دهند. برای این منظور در قسمت دوم حالات‌های همدوس برای اسپین $S = 3/2$ که همان حالات‌های همدوس در گروه $SU(4)$ است را می‌نویسیم. برای به دست آوردن هامیلتونی کلاسیکی به مقادیر متوسط عملگرهای اسپینی احتیاج است، در قسمت سوم این مقادیر همراه با رابطه کلاسیکی اسپین نوشته شده است. در قسمت چهارم هامیلتونی که در قسمت قبل محاسبه شده است را در معادلات کلاسیکی حرکت، که با استفاده از انتگرال مسیر فایمنن روی حالات‌های همدوس به دست آمده، جایگذاری می‌کنیم و در نهایت برای برانگیختگی‌های خطی کوچک بالاتر از حالت پایه، معادلات موج اسپینی و معادلات پاشندگی مربوط

۱. Single-site coherent state

$$\begin{aligned} q^z &= \frac{9}{4}(1-4\cos^2 g)^z \sin^2 2k, \\ S^z + q^z &= \frac{9}{4}(1-4\cos^2 g)^z. \end{aligned} \quad (8)$$

در رابطه (۸)، S^z مربوط به گشتاور دوقطبی و q^z مربوط به گشتاور چهارقطبی می باشد. با صرف نظر از گشتاور هشت قطبی، ($g = 0^\circ$) و در نظر گرفتن فقط گشتاور چهارقطبی داریم:

$$S^z + q^z = \text{const}. \quad (9)$$

اگر از عبارات فوق برای هامیلتونی (۱) در حد کلاسیک استفاده نماییم، هامیلتونی کلاسیک در حد پیوسته به صورت زیر به دست می آید:

$$\begin{aligned} H = -\int \frac{dx}{a_0} \times & \left(-\frac{9}{4}JA^z \cos^2 2k + \frac{81}{16}KA^z \cos^4 2k \right. \\ & + \frac{729}{64}LA^z \cos^6 2k - \frac{a_0^z}{2} \left(J + \frac{9}{2}KA^z \cos^2 2k \right. \\ & \left. \left. + \frac{243}{16}LA^z \cos^4 2k \right) \times (36g_x^z \cos^2 2k \sin^2 2g \right. \\ & \left. + 9k_x^z A^z \sin^2 2k + \frac{9}{4}A^z \cos^2 2k (\theta_x^z + \sin^2 \theta \phi_x^z)) \right), \end{aligned} \quad (10)$$

که در آن a_0 فاصله تعادلی دو جایگاه در زنجیره اسپینی می باشد و $A = (1-4\cos^2 2g)$.

برای محاسبه معادلات کلاسیکی، از لاغرانژی (۳) استفاده می کنیم. بدین ترتیب که گشتاور هشت قطبی را نزدیک حالت پایه حذف کرده و فقط گشتاور چهارقطبی را در نظر می گیریم، برای این منظور در هامیلتونی (۱۰) باید $g = 0^\circ$ باشد. معادلات به دست آمده در ضمیمه این مقاله می باشد.

معادلات ارائه شده در ضمیمه به طور کامل دینامیک غیرخطی را تا برانگیختگی چهارقطبی هامیلتونی مسئله توصیف می کند. جواب این معادلات سالیتون های مغناطیسی است. با صرف نظر کردن از برانگیختگی های چهارقطبی و هشت قطبی ($g = 0^\circ, k = 0^\circ$ ، این معادلات به معادله لانداؤ-لیف شیتز تبدیل می شود. بنابراین این معادلات در مقایسه با معادله لانداؤ-لیف شیتز کامل تر بوده و درجات آزادی بیشتری را شامل می شود. قابل توجه است که جواب این معادلات شکل های مختلف سالیتونی را در بر می گیرد.

هنگام به دست آوردن لاغرانژی سیستم اسپینی از طریق انتگرال مسیر، دو جمله دیگر نیز ظاهر می شود، جمله جنبشی که ویژگی های فاز "بری" دارد از تداخل کوانتمی مسیرهای اینستانتون^۱ به دست می آید و در پدیده هایی کوانتمی مانند توپل زنی اسپین سهم بسزایی دارد و جمله مرزی که به مقادیر مرزی مسیر بستگی دارد. این دو جمله در دینامیک کلاسیک برانگیختگی های اسپین نقشی ندارند و در این مقاله این دو جمله درنظر گرفته نشده است.

$SU(3)$

در اینجا معادل کلاسیکی عملگرهای اسپین موجود در هامیلتونی (۱) در نظر گرفته می شود. بردار

$$\vec{S} = \langle \psi | \hat{\vec{S}} | \psi \rangle, \quad (4)$$

را به عنوان بردار اسپین کلاسیک و

$$Q^{ij} = \frac{1}{3}(\hat{S}_i \hat{S}_j - \hat{S}_j \hat{S}_i - \frac{4}{3}\delta_{ij}I), \quad (5)$$

را به عنوان مؤلفه های گشتاور چهارقطبی در نظر می گیریم. با توجه به اینکه حالت همدوس را می توان به صورت حاصل ضرب حالت های همدوس تک جایگاهی نوشت، یعنی $\prod_i |\psi_i\rangle = |\psi\rangle$ ، در نتیجه عملگرهای اسپین در حالت پایه کلاسیکی در هامیلتونی های غیر تک یونی در جایگاه های مختلف با هم جایه جا می شوند، پس [۶]

$$\langle \psi | \hat{S}_n^i \hat{S}_{n+1}^j | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{S}_n^i | \psi \rangle \langle \psi | \hat{S}_{n+1}^j | \psi \rangle \quad (6)$$

که در آن $= |\psi\rangle_n |\psi\rangle_{n+1}$ است.

عبارت های مقدار میانگین در گروه $SU(4)$ برای حالت همدوس (۲) به صورت زیر محاسبه می شود:

$$S^+ = \frac{3}{2}e^{i\phi}(1-4\cos^2 g)\cos 2k \sin \theta, \quad (7)$$

$$S^- = \frac{3}{2}e^{-i\phi}(1-4\cos^2 g)\cos 2k \sin \theta, \quad (7)$$

$$S^z = \frac{3}{2}(1-4\cos^2 g)\cos 2k \cos \theta.$$

همچنین

$$S^z = \frac{9}{4}(1-4\cos^2 g)^z \cos^2 2k,$$

۱. Instanton

است. این معادلات نشان می‌هد که برای فرومغناطیس‌های همسانگرد، طول مقدار میانگین گشتاور چهارقطبی تغییر نکرده و دینامیک آنها فقط شامل دینامیک چرخشی می‌باشد و چرخش نیز حول بردار اسپین کلاسیک است.

حال پاشندگی امواج اسپینی که نزدیک حالت پایه متشر می‌شوند را بررسی می‌کنیم. برای انجام این کار دوتابع θ و ϕ را به صورت دو موج تخت زیر در نظر می‌گیریم:

$$\begin{aligned}\phi &= \phi_0 e^{i(\omega t - kx)} + \bar{\phi}_0 e^{-i(\omega t - kx)} \\ \theta &= \theta_0 e^{i(\omega t - kx)} + \bar{\theta}_0 e^{-i(\omega t - kx)}\end{aligned}\quad (17)$$

با جایگذاری روابط فوق در معادلات (۱۵) داریم:

$$\begin{aligned}\omega_r^r &= (J + 2K + 2L)^r a_0^r \omega_0^r k^r, \\ \omega_r &= \frac{2}{3} \Lambda \omega_0, \\ \omega_r &= -4\Lambda \omega_0.\end{aligned}\quad (18)$$

این رابطه‌ها نشان می‌دهند که علاوه بر شاخه صوتی پاشنده دو شاخه نوری غیر پاشنده مربوط به برانگیختگی‌های دوقطبی وجود دارد.

اگر در هامیلتونی (۱) فقط جمله خطی بر حسب $(\hat{S}_i \cdot \hat{S}_j)$ در نظر گرفته شود در این صورت فقط یک شاخه صوتی پاشنده وجود خواهد داشت. اگر به جمله فوق جمله مجذوری اضافه گردد، $(\hat{S}_i \cdot \hat{S}_j)$ ، علاوه بر شاخه صوتی یک شاخه نوری غیر پاشنده نیز مشاهده خواهد شد. در نهایت اگر جمله مکعبی نیز اضافه گردد، $(\hat{S}_i \cdot \hat{S}_j)$ ، علاوه بر شاخه صوتی پاشنده دو شاخه نوری غیر پاشنده مشاهده می‌شود که این دو شاخه دارای گافی به بزرگی $\Delta\omega = \omega_r - \omega_0$ می‌باشند. این چنین گافی بین شاخه‌های نوری در بلورهایی با پایه بسیط دو تایی مانند NaCl مشاهده شده است [۱۰].

در این مقاله سیستم کوانتمی با اسپین $S = 3/2$ با استفاده از حالت‌های همدوس اسپین در گروه $SU(4)$ ، بررسی شد که در حد پیوسته کلاسیکی در هامیلتونی (۱) تبادل‌های خطی، مجذوری و مکعبی وجود داشت. وابستگی معادلات پاشنده صوتی و نوری به ضرایب K و L و تغییری که در بسامد

برای بررسی فرومغناطیس‌ها با چنین هامیلتونی‌های همسانگرد، ضروری است تا حالت پایه کلاسیکی را برای این مگنت‌ها محاسبه نماییم. برای این منظور در هامیلتونی (۱۰) فقط جملات بدون مشتق را در نظر می‌گیریم:

$$H_0 = -\int \frac{dx}{a_0} \left[\left(\frac{9}{2} \right)^r J \cos^r 2k + \left(\frac{9}{2} \right)^r K \cos^r 2k + \left(\frac{9}{2} \right)^r L \cos^r 2k \right]. \quad (12)$$

این عبارت در $k = \pi/2$ یا $k = 0$ کمینه می‌شود در نتیجه مقدار کمینه هامیلتونی (۱۲) برابر با

$$H_0 = -\frac{1}{a_0} \left\{ \left(\frac{9}{2} \right)^r J + \left(\frac{9}{2} \right)^r K + \left(\frac{9}{2} \right)^r L \right\}, \quad (13)$$

خواهد شد.

حال معادلات حرکت را در نزدیکی حالت پایه بررسی می‌کنیم. برای این منظور متغیر k را به صورت زیر تغییر می‌دهیم

$$2k \rightarrow \pi + k \quad (14)$$

در نقطه $\theta = \pi/2$ ، برای برانگیختگی‌های خطی کوچک معادلات حرکت به صورت زیر به دست می‌آید:

$$\begin{aligned}\frac{1}{\omega_0} \phi_t &= \Lambda \theta_{xx} a_0^r, \\ \frac{1}{\omega_0} \theta_t &= -\Lambda \phi_{xx} a_0^r, \\ \frac{1}{\omega_0} \gamma_t &= -4\Lambda, \\ \frac{1}{\omega_0} \beta_t &= \frac{2\Lambda}{3}, \\ \frac{1}{\omega_0} k_t &= 0, \\ \frac{1}{\omega_0} g_t &= 0,\end{aligned}\quad (15)$$

که در آن $\omega_0 = \hbar a$ و

$$\Lambda = \frac{81}{64} (16J + 648K + 19682L). \quad (16)$$

همچنین اندیس t در متغیرهای معادلات بالا، $\frac{\partial}{\partial t}$ می‌باشد.

اگر چه انتگرال‌های تبادل K و L کوچک هستند ولی مقادیر عددی ضرب شده در آنها در رابطه (۱۶) نشان می‌دهد که سهم برانگیختگی‌های چهارقطبی و هشت قطبی در مسئله قابل توجه

$$\begin{aligned} \frac{1}{\omega_*} \beta_t &= \frac{27}{32} (16J \cos 2k + 64K \cos^3 2k \\ &\quad + 19683L \cos^5 2k) \\ &\quad + \frac{27}{64} (39366k_{xx} \cos^4 2k \sin 2k \\ &\quad + \lambda k_{xx} \sin 2k (4J + 81K + 81K \cos 4k) \\ &\quad + 19683L \cos^5 2k (4k_x^2 - 2\theta_x^2 - 2\phi_x^2 \sin^2 \theta) \\ &\quad + 648 \cos^3 2k (4Kk_x^2 - 2K\theta_x^2 - 243Lk_x^2 \sin^2 2k \\ &\quad - 2K\phi_x^2 \sin^2 \theta) - 16 \cos 2k (162Kk_x^2 \sin^2 2k \\ &\quad + J(-4k_x^2 + \theta_x^2 + \phi_x^2 \sin^2 \theta)))a^\circ \\ \frac{1}{\omega_*} \gamma_t &= -\frac{81}{16} (16J \cos 2k + 64K \cos^3 2k \\ &\quad + 19683L \cos^5 2k) - \frac{81}{64} (19683L \cos^5 2k \\ &\quad \times (\lambda k_x^2 - 6\theta_x^2 + 1/2(-5 + \sqrt{\cos 2\theta + \theta_{xx} \cot \theta})\phi_x^2) \\ &\quad + 64Jk_{xx} \sin 2k + 78732Lk_{xx} \sin 2k \cos^5 2k \\ &\quad + \lambda \cos 2k (J(16k_x^2 - 4\theta_x^2 - \phi_x^2 + 2\phi_x^2 \cos 2\theta \\ &\quad + 2\theta_{xx} \cot \theta) - 648Kk_x^2 \sin^2 2k) + 648 \cos^3 2k \\ &\quad \times (\lambda Kk_x^2 - 4K\theta_x^2 + K(1/2\phi_x^2(-3 + 5 \cos 2\theta) \\ &\quad + \theta_{xx} \cot \theta) - 486Lk_x^2 \sin^2 2k) + 648Kk_{xx} \\ &\quad \times (\sin 2k + \sin 4k))a^\circ \\ \frac{1}{\omega_*} k_t &= 0 \\ \frac{1}{\omega_*} g_t &= 0 \end{aligned}$$

زاویه‌ای با در نظر گرفتن این جملات ایجاد می‌شود، از نتایج این تحقیق است که شرح داده شده است. از مقدار عددی ضرب شده در این ضرایب متوجه می‌شویم که این برانگیختگی‌ها سهم مهمی در معادلات موج اسپینی دارند. دانستن ساختار چنین گروه‌هایی ما را قادر خواهد ساخت تا نتایج جدید و دقیق‌تری، با در نظر گرفتن تمامی برانگیختگی‌های چندقطبی، به دست آوریم. بررسی مدل کلاسیکی مناسب اجازه می‌دهد تا جواب‌های سالیتونی مختلف با انرژی‌های معین را به دست آورده و همچنین توزیع فضایی گشاورهای دوقطبی، چهارقطبی و هشت قطبی اسپین را به صورت سالیتون‌های دوقطبی، چهارقطبی، هشت قطبی و دوقطبی- چهارقطبی، دوقطبی- هشت قطبی و چهارقطبی- هشت قطبی به دست آورد.

معادلات حرکت کلاسیکی به صورت زیر به دست می‌آید:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\omega_*} \dot{\phi}_t &= \frac{81}{512} (\cos 2k (128J + 81(32K + 729L) \\ &\quad + 324(\lambda K + 243L) \cos 4k \times 19683L \cos 8k) \\ &\quad \times (\theta_{xx} \csc \theta + \phi_x^2 \cos \theta))a^\circ \\ \frac{1}{\omega_*} \dot{\theta}_t &= -\frac{81}{64} \phi_{xx} \cos 2k (16J + 648K \cos^3 2k \\ &\quad + 19683L \cos^5 2k) \times \sin \theta a^\circ \end{aligned}$$

5. B A Ivanov, *Low Temp. Phys.* **31** (2005) 635.
6. B A Ivanov, A Yu Galkin, R S Khymyn, and A Yu Merkulov, *Phys. Rev. B* **77** (2008) 064402.
7. V O Ostrovskii, *Sov. Phys. JETP* **64** (5) (1986) 999.
8. Kh O Abdulloev, Kh Muminov, “Coherent states of $SU(4)$ group in real parameterization and Hamiltonian equations of motion”, Reports of Tajikistan Academy of science **36** (1993) 6.
9. Kh O Abdulloev, Kh Kh Muminov, *Phys. Solid State* **36** (1994) 93.
10. C Nayak, “Solid State Physics”, University of California (2000).

1. V G Baryakhtar, B A Ivanov, and M V Chetkin, *Sov. Phys. Usp.* **28** (1985) 563; V G Baryakhtar, M V Chetkin, B A Ivanov, and S N Gadetskii, “Dynamics of topological magnetic solitons. Experiment and theory”, Springer-Verlag, Berlin, (1994).
2. A M Kosevich, B A Ivanov, and A S Kovalev, *Phys. Rep.* **194** (1990) 117.
3. H J Mikeska, and M Steiner, *Adv. Phys.* **40** (1991) 191.
4. V G Bar'yakhtar, and B A Ivanov, “Solitons and Thermodynamics of Low-Dimensional Magnets”, Soviet Scientific Reviews, Section A. Physics, I. M. Khalatnikov (ed.) (1992).