

پژوهشی

مجله محیط شناسی، شماره ۳۷، بهار ۱۳۸۴، صفحه ۷۷-۸۸

گیاهان دارویی، معطر، مرتعی و نادر مناطق حفاظت شده

کالمند بهادران و کوه بافق

استان یزد

* مهندس علی اکبر کریمیان

چکیده

در این مطالعه، گیاهان دارویی، معطر، مرتعی، خوشخوارک و نادر در دو منطقه حفاظت شده کالمند بهادران واقع در ۳۰ تا ۱۰۵ کیلومتری جنوب شرقی یزد و کوه بافق در ۱۱۰ کیلومتری شرق یزد جمع آوری و شناسایی شد. بررسی فلور این مناطق نشان داد که ۱۴۸ گونه گیاهی در منطقه حفاظت شده کالمند بهادران و ۱۳۹ گونه گیاهی در منطقه کوه بافق وجود دارد. نتیجه این مطالعات نشان داد که در مجموع ۶۰ گونه گیاه دارویی، معطر و صنعتی، ۱۵ گونه گراس، ۸ گونه لگوم، ۲۶ گونه علفی چندساله و یکساله و ۲۳ گونه درختی و درختچهای در این مناطق حفاظت شده رویش دارد. این گونه‌ها به طور عمده دارای طیف زیستی همی کریپتوفت و تروفیفت هستند. علاوه بر این، گونه‌های تهدید شده مناطق مزبور براساس معیارهای سازمان IUCN و با استفاده از کتاب Red data Book of Iran تعیین گردید که بر همین اساس، چهار رسته گونه‌های در معرض خطر انقراض، گونه‌های آسیب پذیر، گونه‌های با خطر کمتر و کمیود داده‌ها در مناطق مورد مطالعه تعیین و فهرست گونه‌های تهدید شده ارائه شد. این مطالعه نشان می‌دهد که در مجموع حدود ۴۱ گونه گیاهی در رسته گونه‌های گیاهی تهدید شده در مناطق فوق وجود دارد که بیشتر از رسته گونه‌های با خطر کمتر (Lower risk) می‌باشد.

کلیدواژه

فلور، شکل‌های زیستی، گیاهان دارویی و معطر، گیاهان مرتعی، گونه‌های نادر، کالمند بهادران، کوه بافق.

تاریخ پذیرش: ۱۳۸۳/۱۰/۲۱

تاریخ دریافت: ۱۳۸۲/۱۰/۳

* عضو هیأت علمی دانشگاه یزد.

گرفته است. در استان یزد نیز بررسی‌هایی درباره فلور کل استان (مظفریان، ۱۳۷۸) و مناطق مختلف از جمله منطقه حفاظت شده کالمند بهادران (کریمیان، ۱۳۸۰) و کوه بافق (مصلح آرانی، ۱۳۸۰) و غیره انجام شده است. ولی تاکنون مجموعه گیاهان مناطق حفاظت شده استان یزد به طور مدون در یک گزارش ارائه نشده است.

معرفی اجمالی مناطق مورد بررسی

۱- منطقه حفاظت شده کالمند بهادران

منطقه حفاظت شده کالمند بهادران با مساحتی حدود ۲۵۵ هزار هکتار در فاصله ۳۰ تا ۱۰۵ کیلومتری جنوب شرقی یزد در حاشیه جاده یزد-کرمان در ۳۱ درجه و ۲۰ دقیقه عرض شمالی و ۵۴ درجه و ۳۰ دقیقه طول شرقی قرار دارد (شکل شماره ۱). ارتفاع متوسط منطقه ۱۶۱۶ متر از سطح دریاست و در سال ۱۳۷۳ به عنوان منطقه حفاظت شده کالمند بهادران اعلام گردید. بلندترین نقطه این منطقه کوه مدوار با ارتفاع حدود ۳۲۹۰ متر و پستترین بخش آن در کفه مهدی آباد با ارتفاع ۱۴۰۰ متر است. بر اساس آمار هواشناسی ایستگاه مهریز، متوسط بارندگی سالانه منطقه، ۱۰۰ میلیمتر است. بیشترین میزان بارش در بهمن ماه (۲۲/۲۱ میلیمتر) رخ می‌دهد و ماههای دی و اسفند بعد از آن قرار دارند. (شکل شماره ۲) همان طور که در منحنی آمبروترومیک مشاهده می‌شود، دوره خشکی در این منطقه از اوایل فروردین ماه آغاز و تا اوایل آذرماه ادامه می‌باید. متوسط دمای حداکثر گرمترین ماه و حداقل سردترین ماه منطقه به ترتیب ۲۹/۴۴ و ۵/۲۲ درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت سالانه ۳۰ درصد است.

۲- منطقه حفاظت شده کوه بافق

منطقه حفاظت شده کوه بافق با مساحتی در حدود ۱۴۰،۰۰۰ هزار هکتار در ۱۱۰ کیلومتری شرق یزد و در شمال شرق شهرستان بافق، در حد فاصل ۵۵ درجه و ۳۰ دقیقه تا ۵۵ درجه و ۵۵ دقیقه طول شرقی و ۳۱ درجه و ۱۵ دقیقه تا ۳۱ درجه و ۴۵ دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است (شکل شماره ۱). ارتفاع متوسط منطقه ۱۹۶۰ متر از سطح دریاست و در سال ۱۳۵۷ به عنوان منطقه حفاظت شده کوه بافق در کنترل سازمان محیط زیست قرار گرفته است. بلندترین نقطه این منطقه، ارتفاعات شادکام و باجگان با ارتفاع ۲۸۷۹ متر و پست ترین نقطه منطقه، دشت جیری با ارتفاع ۱۱۵۰ متر است. بر اساس آمار هواشناسی ایستگاه بافق، متوسط بارندگی سالانه منطقه، ۷۰ میلیمتر است (شکل شماره ۲). بیشترین میزان بارش در بهمن ماه (۲۷/۷۸)


سرآغاز

بررسی، شناسایی، حفظ و نگهداری گونه‌های گیاهی، بویژه گونه‌های مفید و نادر در دنیا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پایه و اساس توسعه پایدار و هرگونه بهره برداری اصولی و منطقی از طبیعت و منابع طبیعی، حفظ و حراست گونه‌های گیاهی و گنجینهٔ ژئی است. به همین دلیل سازمانی به عنوان (IUCN)^(۱) تشکیل شده که هدف آن شناسایی و معرفی گونه‌های گیاهی و جانوری نادر و مفید در کلیه مناطق دنیا و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از انهدام آنهاست.

از مطالعاتی که در سطح کشور درباره جمع آوری و شناسایی گیاهان توسط گیاه شناسان ایرانی و خارجی صورت گرفته است، می‌توان به فلور ایران (60- ۱۹۴۸ و Parsa, 1978-80 و Parsa, 1975)، فلور ایرانیکا (Rechinger, 1963-93)، فلور اوریانتالیس (Boissier, 1975)، رستنی‌های ایران (مبین، ۱۳۷۳ و ۱۳۵۴)، فلور ایران (اسدی و همکاران، ۱۳۶۷-۸۲)، گونه‌های ایران (مصطفوی، ۱۳۶۵ و ۱۳۷۴)، مطالعه فلور و رستنی‌های کویری ایران (Leonard, 1981-92) و غیره اشاره کرد. ضمناً برای تعدادی از استان‌ها و مناطق کشور فلور اختصاصی منتشر شده، از جمله فلور یزد (مظفریان، ۱۳۷۸)، فلور خوزستان (مظفریان، ۱۳۷۸). ولی از یک سو فلورهای مدونی برای بسیاری از مناطق مختلف کشور انتشار نیافتد، در حالی که این نوع فلورها برای مسائل آموزش و پژوهش مفید و ضروری است؛ از سوی دیگر گیاهان دارویی، صنعتی، مرتعی، چوبی و بویژه گونه‌های نادر مطابق الگوها و معیارهای سازمان IUCN، در مناطق مختلف کشور کمتر بررسی شده‌اند.

به منظور نیل به این هدف، دو منطقه حفاظت شده استان یعنی منطقه حفاظت شده کالمند بهادران و کوه بافق برای بررسی حاضر انتخاب گردید. علت انتخاب مناطق مذبور این است که گیاهان مناطق حفاظت شده تاحدودی از چرای دام و تخریب توسط انسان در امان بوده و مطالعه فلور این مناطق سودمند و عملی‌تر است. تاکنون فلور برخی از مناطق حفاظت شده کشور، از جمله مناطق حفاظت شده توران و Rechinger and wendelbo 1976; Rechinger, 1977 کویر ()، و عصری، ۱۳۸۲)، پارک ملی گلستان (حسن زاده کیابی و همکاران، ۱۳۷۲)، پارک ملی خبر و پناهگاه حیات وحش روچون (ایران نژاد، ۱۳۷۹)، منطقه حفاظت شده کلاه قاضی و موتنه (آریاوند، ۱۳۸۰ و ۱۳۸۳)، پناهگاه حیات وحش قمیشلو (آریاوند، ۱۳۸۰ و یوسفی، ۱۳۷۵) و منطقه حفاظت شده ارسپاران (Assadi, 1988) مورد بررسی قرار

گذشته توسط گیاه شناسان دانشگاه یزد، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و سایر گیاه شناسان به مور جمع‌آوری و شناسایی شده است (مصلح آرani، ۱۳۸۰؛ کریمیان، ۱۳۸۲ و مظفریان، ۱۳۷۸). برای تکمیل مطالعات گذشته مجدداً طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ گیاهان مناطق مزبور در فصول مناسب بررسی گردید. تعدادی از گونه‌های گیاهی در صحرا شناسایی شدند و تعداد دیگر برای شناسایی دقیق تر به آزمایشگاه منتقل گردید و سپس با استفاده از فلورهای موجود و کتابهای مرجع نام علمی آنها تعیین شد.




شکل شماره (۳): نمودار آمبرووترمیک ایستگاه بافق

ضمون شناسایی گونه‌های گیاهی جمع‌آوری شده، شکل زیستی گونه‌ها براساس سیستم رانکیه (با توجه به اصلاحات براون- بلانکه روی آن) (مدیرشانه چی، ۱۳۷۲) مشخص شد. همچنین نوع استفاده و بهره‌وری گیاهان با توجه به بررسی‌های انجام شده توسط متخصصان مربوط و کتابهای مرجع (زرگری، ۱۳۶۸-۷۰) و استفاده‌های محلی و مشاهدات شخصی تعیین گردید.


ب: روش بررسی گونه‌های نادر (۲) و درمعرض خطر انقراض

پژوهشگران از معیارهای گوناگونی برای تشخیص، بررسی و طبقه‌بندی گونه‌های نادر استفاده می‌کنند. از معیارهای مهم می‌توان انتشار جغرافیایی محدود و جمعیت کم را نام برد. Grime در سال ۱۹۸۵، علاوه بر معیارهای فوق، شرایط سخت زیست محیطی و تغییرات شدید محیط زیست را برای تشخیص گونه‌های نادر مورد توجه قرار داده است. Rabinowitz در سال ۱۹۸۱ انواع کمیابی را بر حسب دامنه انتشار جغرافیایی، ویژگی زیستگاه و اندازه جمعیت تعیین می‌کند. Ahouse و Fielder در سال ۱۹۹۲ رده‌های کمیاب را بر حسب پراکندگی مکانی و پایداری زمانی گونه‌ها تعریف و توصیف می‌کنند. برخی از پژوهشگران از وضعیت تاکسونومیکی، کورولوژیکی، آندمیسم،

میلی‌متر) رخ می‌دهد و ماه‌های اسفند و دی بعد از آن قرار داردند (شکل شماره ۳). همان‌طور که در منحنی آمبرووترمیک مشاهده می‌شود، دوره خشکی در این منطقه از نیمه دوم اسفند ماه آغاز و تا اوایل آذرماه ادامه می‌یابد. متوسط دمای حداکثر گرمترین ماه و حداقل سردترین ماه منطقه، به ترتیب $32/8$ و $5/2$ درجه سانتی‌گراد و میانگین رطوبت سالانه، ۲۴ درصد است.



شکل شماره (۱): نقشه استان یزد با جانمایی مناطق حفاظت شده مورد مطالعه



شکل شماره (۲): نمودار آمبرووترمیک ایستگاه کالمند

مواد و روش کار
الف: روش بررسی گونه‌های گیاهی
برخی گونه‌های گیاهی در مناطق مورد بررسی طی سالهای

گیاهان دارویی، صنعتی و معطر مناطق مورد مطالعه با توجه به منابع علمی و استفاده‌های محلی و مشاهدات شخصی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. این بررسی نشان داد که تعداد ۳۶ گونه گیاه دارویی معطر و صنعتی در منطقه کالمند بهادران و ۳۴ گونه در منطقه کوه بافق وجود دارد که تعداد ۱۰ گونه از آنها در هر دو منطقه مشترک‌اند (جدول شماره ۱).

گیاهان مرتئی و خوشخوارک مناطق مورد مطالعه که شامل سه گروه اصلی گراس‌ها، فورب‌ها و بوته‌ها هستند نیز مورد شناسایی قرار گرفتند. در مجموع از کل گونه‌های شناسایی شده، ۴۹ گونه مرتئی در دو منطقه تشخیص داده شد (جدول شماره ۱). شایان ذکر است که خوشخوارکی گیاهان نسبی بوده و در مقایسه با سایر گیاهان موجود در هر منطقه بررسی می‌گردد.

گونه‌های درختی، یا درختچه‌های بومی و غیر بومی هر منطقه‌ای، بویژه در مناطق خشک و نیمه خشک توان اکولوژیکی ناحیه را بخوبی نشان می‌دهند. در جدول شماره ۱ گونه‌های درختی و درختچه‌ای موجود در هر منطقه معرفی گردیده است. شکل زیستی این گونه‌ها فانروفیت و نانوفانروفیت هستند. وجود این گونه‌ها می‌بین این نکته است که در برخی از نقاط هر منطقه در گذشته، اجتماعات چوبی مستقر بوده ولی در اثر کندن و سوزاندن بیشتر این گونه‌ها از بین رفته است.

با توجه به اینکه اطلاعات کاملی از فلور مناطق از سالهای گذشته در دست نیست و همچنین با توجه به این نکته که هنوز بررسی‌های دقیقی در مورد کمیابی بسیاری از گونه‌ها در سطح کشور به عمل نیامده است، بنابراین با مطالعات انجام شده و با توجه به منابع موجود، بویژه کتاب Red data book of Iran، حدود ۴۱ گونه گیاهی در رسته گونه‌های گیاهی تهدید شده در مناطق فوق تشخیص داده شد که بیشتر از رسته گونه‌های با خطر کمتر (Lower risk) هستند. جدول شماره ۱ فهرست گونه‌های نادر و آسیب پذیر مناطق مذبور را نشان می‌دهد.

چگونگی استقرار و تکثیر طبیعی، چگونگی بهره برداری گیاهان توسط انسان، دام و حیات وحش و سرانجام، بیماری و آفات، فقدان موتاآسمیم کلیدی به عنوان واکنش‌های زیستی که باعث کاهش جمعیت و در نتیجه زوال گونه‌ها می‌شوند، برای تعیین و طبقه‌بندی گونه‌های نادر استفاده می‌کنند (آریاوند، ۱۳۸۰).

در همین زمینه، اخیراً جلیلی و جمزاد (۱۹۹۹) در کتاب خود به عنوان Red data book of Iran گونه‌های نادر ایران را بر طبق روش طبقه‌بندی IUCN بررسی و معرفی کرده‌اند. این پژوهشگران به منظور تشخیص و معرفی گونه‌های نادر ایران از معیارهایی مانند طول عمر، شکل زیستی، انتشار جغرافیایی و بهره برداری گیاهان توسط انسان استفاده کرده‌اند. بنایه مندرجات این کتاب، انتشار جغرافیایی محدود عامل تعیین کننده در تعیین ۹۳٪ از گونه‌های در معرض خطر و آسیب پذیر در ایران است و ۳۳٪ از گونه‌ها در اثر دخالت انسان مورد تهدید واقع شده‌اند.

جلیلی و جمزاد از ۸ رسته گونه‌های نادر، طبق اصول طبقه‌بندی IUCN، فقط چهار رسته به شرح زیر را در ایران تشخیص داده‌اند.

۱- گونه‌های در معرض خطر انقراض (EN)^(۳)

۲- گونه‌های آسیب پذیر (VU)^(۴)

۳- گونه‌های با خطر کمتر (LR)^(۵)

۴- گونه‌های با کمبود داده‌ها (DD)^(۶)

یافته‌ها

بررسی اجمالی گیاهان مناطق حفاظت شده کالمند بهادران و کوه بافق نشان می‌دهد که به ترتیب حدود ۱۴۸ و ۱۳۹ گونه گیاهی در هر یک از این مناطق وجود دارد. از بین آنها، گونه‌های دارویی، معطر، صنعتی، مرتئی و نادر استخراج شده و به تفکیک منطقه پس از تعیین اشکال زیستی در جدول شماره (۱) آمده است.

جدول شماره (۱): فهرست گیاهان دارویی معطر صنعتی، مرتئی و نادر مناطق حفاظت شده کالمند - بهادران و کوه بافق؛

شکل‌های زیستی شامل: Th - تروفیت، Ph - فانروفیت، Nph - نانوفانروفیت، He - همی کریپتوفت، Ch - کامفت، Cr - کریپتوفت. وضعیت

گونه براساس طبقه‌بندی IUCN - گونه‌های با خطر کمتر، LR - گونه‌های آسیب پذیر، VU - گونه‌های با کمبود داده‌ها.

مناطق: ۱- کالمند بهادران، ۲- کوه بافق.

نام فارسی	شکل زیستی	وضعیت گونه	موتهی	دارویی، معطر، صنعتی	منطقه	نام علمی
تاج خروس	Th.		*		۱	Amaranthaceae <i>Amaranthus retroflexus</i> L.

ادامه جدول شماره (۱): فهرست گیاهان دارویی معطر صنعتی، مرتعی و نادر مناطق حفاظت شده کالمند - بهادران و کوه بافق؛

<i>Anacardiaceae</i>						
<i>Pistacia vera L.</i>	۱	*			<i>Ph.</i>	پسته
<i>Pistacia atlantica Desf</i>	۲	*			<i>Ph.</i>	بنه
<i>Pistacia khinjuk Stocks</i>	۱	*			<i>Ph.</i>	خینچوک - بنه
<i>Apiaceae</i>						
<i>Aphanopleura breviseta</i> Boiss.	۲	*		<i>LR</i>	<i>Th.</i>	—
<i>Bunium persicum</i> (Boiss.) B.Fedtsch.	۲	*			<i>Cr.</i>	زیره کرمانی
<i>Dorema ammoniacum</i> D.Don	۲	*			<i>He.</i>	وشق
<i>Eryngium bungei</i> Boiss.	۱	*			<i>He.</i>	زول خراسانی
<i>Eryngium noeannum</i> Boiss.	۲	*	*		<i>He.</i>	زول کرندی
<i>Ferula oopoda</i> Boiss.	۲	*	*		<i>He.</i>	کمای غلاف دار
<i>Ferula ovina</i> Boiss.	۱	*	*		<i>He.</i>	کما
<i>Prangos cheilanthifolia</i> Boiss	۱	*	*	<i>LR</i>	<i>He.</i>	جاشیر آذربایجانی
<i>Psammogeton canescens</i> (DC.)	۲	*	*	<i>LR</i>	<i>Th.</i>	شن جار
<i>Asteraceae</i>						
<i>Achillea wilhelmsii</i> C.koch	۱	*			<i>He.</i>	بومادران
<i>Artemisia aucheri</i> Boiss.	۱ و ۲	*	*		<i>He.</i>	درمنه کوهی
<i>Artemisia sieberi</i> Besser.	۱ و ۲	*	*		<i>He.</i>	درمنه دشتی
<i>Centaurea gaubae</i> (Bornm.) wagenitz	۱	*		<i>LR</i>	<i>He.</i>	گل گندم
<i>Centaurea ispahanica</i> Boiss.	۱	*		<i>LR</i>	<i>He.</i>	گل گندم اصفهانی
<i>Cirsium spactabilis</i> DC.	۱	*		<i>LR</i>	<i>He.</i>	-
<i>Cousinia neurocentra</i> Bunge	۲	*		<i>LR</i>	<i>Ch.</i>	هزار خار رگه مرکزی
<i>Cousinia piptocephala</i> Bunge.	۱	*		<i>LR</i>	<i>He.</i>	هزار خار کوپیری
<i>Echinops ceratophorus</i> Boiss.	۱	*		<i>LR</i>	<i>He.</i>	شکر تیغال
<i>Hertia angustifolia</i> (DC.) O.Kuntze.	۱ و ۲	*			<i>Ch.</i>	کرقیچ سگ میر
<i>Hertia intermedia</i> (DC.) D.kuntz	۱ و ۲	*			<i>Nph.</i>	کرقیچ
<i>Jurinea bungei</i> Boiss.	۱	*		<i>DD</i>	<i>He.</i>	سوگند اصفهانی
<i>Jurinea radians</i> Boiss. Subsp radians	۱	*		<i>DD</i>	<i>He.</i>	سوگند تماشایی
<i>Onopordon caramanicum</i> Bornm.	۲	*			<i>He.</i>	خار پنبه کرمانی
<i>Scariola orientalis</i> (Boiss.) Sojak	۱ و ۲	*			<i>He.</i>	چزه - گاوچاق کن
<i>Scorzonera intricata</i> Boiss.	۲	*	*		<i>He.</i>	شنگ اسبی کم گل
<i>Scorzonera leptophylla</i> DC.	۱	*	*		<i>He.</i>	شنگ
<i>Scorzonera mucidu</i> Rech.f.& Lipsch	۲	*	*	<i>LR</i>	<i>He.</i>	شنگ اسبی کپکی
<i>Scorzonera pusilla</i> Pall.	۲	*	*		<i>Cr.</i>	شنگ اسبی کوتوله
<i>Scorzonera tortuosissima</i> Boiss.	۱	*	*		<i>He.</i>	شنگ
<i>Berberidaceae</i>						

ادامه جدول شماره (۱): فهرست گیاهان دارویی معطر صنعتی، مرتعی و نادر مناطق حفاظت شده کالمند - بهادران و کوه بافق؛

<i>Berberis integerrima</i> Bunge	۲	*		<i>Nph.</i>	زرشک زر افشاری
<i>Boraginaceae</i>					
<i>Nonnea caspica</i> (Willd.) G.Don.	۱		*	<i>Th.</i>	چشم گربه‌ای
<i>Heliotropium aucheri</i> DC.	۱			<i>He.</i>	آفتاب پرست
<i>Onosma stenosiphon</i> Boiss.	۱			<i>LR</i>	زنگوله‌ای
<i>Paracaryum persieam</i> (Boiss.) Boiss.	۱			<i>He.</i>	-
<i>Trichodesma aucheri</i> DC.	۱			<i>He.</i>	فانوس آبی
<i>Brassicaceae</i>					
<i>Alyssum bracteatum</i> Boiss. & Buhse	۱	*		<i>LR</i>	قدمه
<i>Erysimum crassicaule</i> (Boiss.) Boiss	۱ و ۲	*		<i>He.</i>	خاکشیر تلخ بیابانی
<i>Isatis rugulosa</i> Bge. ex Boiss.	۱		*	<i>LR</i>	وسمه یزدی
<i>Sameraria elegans</i> Boiss.	۱			<i>LR</i>	سالاری
<i>Savignia parviflora</i> (Delile) Webb.	۲	*		<i>Th.</i>	ترنیزک بیابانی
<i>Sterigmostemum longistylum</i> (Boiss.) Bornm.	۱			<i>LR</i>	-
<i>Campanulaceae</i>					
<i>Campanula incanescens</i> Boiss.	۱		*	<i>He.</i>	-
<i>Caryophyllaceae</i>					
<i>Acanthophyllum bracteatum</i> Boiss.	۲	*		<i>Ch.</i>	چوبک تماشایی
<i>Acanthophyllum chloroleucum</i> Rech.f.& Aell.	۱			<i>DD</i>	نوعی چوبک
<i>Acanthophyllum sorduum</i> Bunge ex Boiss.	۲	*		<i>Ch.</i>	چوبک چرک
<i>Dianthus crinitus</i> Sm.	۲	*		<i>He.</i>	میخک کرمانی
<i>Dianthus macranthus</i> Boiss..	۲	*		<i>He.</i>	میخک اصفهانی
<i>Chenopodiaceae</i>					
<i>Atriplex dimorphostegia</i> Kar. & Kir.	۱		*	<i>Th.</i>	اسفناج وحشی
<i>Cornulaca monacantha</i> Delile.	۱ و ۲		*	<i>Ch.</i>	کارون - علف شتر
<i>Eurotia ceratoides</i> (L.)C.A.Mey	۲		*	<i>Ch.</i>	برگ نقره‌ای
<i>Haloxylon persicum</i> Bge. ex Boiss.	۱			<i>Nph.</i>	سیاه تاغ
<i>Hammada salicorniaca</i> (Moq.) Iljin.	۱ و ۲			<i>Nph.</i>	ترات
<i>Kochia stellaris</i> Moq.	۱		*	<i>Th.</i>	جارو
<i>Noeae mucranata</i> (Forssk) Aschers. et Schweint	۲		*	<i>He.</i>	خارگونی
<i>Salsola kali</i> L.	۱		*	<i>Th.</i>	علف شور
<i>Salsola nitraria</i> pall.	۲	*		<i>Th.</i>	شور سودی
<i>Salsola yazdiana</i> Assadi	۱ و ۲		*	<i>LR</i>	علف شور
<i>Seidlitzia rosmarinus</i> (Ehrh.) Bge.	۱ و ۲	*	*	<i>Ch.</i>	اشنان

ادامه جدول شماره (۱): فهرست گیاهان دارویی معطر صنعتی، مرتعی و نادر مناطق حفاظت شده کالمند - بهادران و کوه بافق؛

<i>Suaeda acuminata</i> (C.A.Mey) Moq.	۱		*		<i>Th.</i>	-
Convolvulaceae						
<i>Convolvulus lieocalycinus</i> Boiss	۲				<i>Nph.</i>	سگ جاز
Cucurbitaceae						
<i>Citrullus colocynthis</i> (L.) Schrad.	۲	*	*		<i>He.</i>	هندوانه ابوجهل
Dipsacaceae						
<i>Scabiosa olivieri</i> Coult.	۱		*		<i>He.</i>	طوسک
Ephedraceae						
<i>Ephedra intermedia</i> Schr	۲				<i>Nph.</i>	ارمک ریش بزر
<i>Ephedra strobilacea</i> Bge.	۱ و ۲		*		<i>Ch.</i>	ریش بزر
Euphorbiaceae						
<i>Andrachne fruticosa</i> Boiss.	۲			LR	<i>Ch.</i>	ناز بیابانی
<i>Euphorbia connata</i> Boiss.	۱	*			<i>He.</i>	فرفیون بیابانی
<i>Euphorbia erythradenia</i> Boiss.	۱	*			<i>He.</i>	فرفیون شیرازی
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	۱	*			<i>Th.</i>	شیرسگ
Lamiaceae						
<i>Marrubium vulgare</i> L.	۱ و ۲	*			<i>He.</i>	فراشیون
<i>Nepeta ispanonica</i> Boiss.	۱	*			<i>Th.</i>	پونه‌سای بیابانی
<i>Nepeta saccarata</i> Bunge	۱	*			<i>Th.</i>	پونه‌سای شیرین
<i>Nepeta satureioides</i> Boiss.	۱	*		LR	<i>Th.</i>	پونه سای مرزهای
<i>Salvia eremophila</i> Boiss.	۱	*		LR	<i>He.</i>	مریم گلی بیابانی
<i>Stachys inflate</i> Benth.	۱ و ۲	*	*		<i>He.</i>	سنبله بادکنکی
<i>Teucrium polium</i> L.	۱ و ۲		*		<i>Ch.</i>	کلپوره-مریم نخودی
<i>Zataria multiflora</i> Boiss.	۱ و ۲			LR	<i>Ch.</i>	آویشن شیرازی
<i>Ziziphora tentur</i> L.	۱	*			<i>Th.</i>	کاکوتی
Liliaceae						
<i>Allium bungei</i> Boiss.	۱	*			<i>Cr.</i>	پیاز کویری
<i>Allium chloroneurum</i> Boiss.	۱	*		LR	<i>Cr.</i>	پیاز رگه رنگی
<i>Asparagus breslerianus</i> Schults fil.	۲	*			<i>He.</i>	مارچوبه گچ دوست
<i>Colchicum persicum</i> Baker	۱	*			<i>Cr.</i>	گل حسرت
<i>Colchicum schimperi</i> Janka	۱	*			<i>Cr.</i>	گل حسرت یزدی
Malvaceae						
<i>Alcea aucheri</i> (Boiss.) Alef.	۱	*			<i>He.</i>	ختمی جنوبی
Moraceae						
<i>Ficus johannis</i> Boiss.	۱ و ۲	*			<i>Ph.</i>	انجیر کوهی
Papilionaceae						

ادامه جدول شماره (۱): فهرست گیاهان دارویی معطر صنعتی، مرتعی و نادر مناطق حفاظت شده کالمند - بهادران و کوه بافق؛

						خارشتر
<i>Alhagi persarum</i> Boiss. & Buhse	۱ و ۲	*			<i>He.</i>	گون درختچه ای
<i>Astragalus (Ammodendron) squarrosum</i>	۲			<i>Vu</i>	<i>Nph.</i>	گون
<i>Bge.</i>						نوعی گون
<i>Astragalus (choronopuse) jesdianus</i>	۱	*		<i>LR</i>	<i>He.</i>	گون
Boiss. & Buhse						نوعی گون
<i>Astragalus (Caprini) pelitus</i> Bunge	۲		*		<i>He.</i>	گون
<i>Astragalus (Choronopus) vanilla</i> Boiss.	۲		*	<i>LR</i>	<i>He.</i>	گون
<i>Astragalus (Malacothrix) heterodoxus</i> Bge.	۲				<i>He.</i>	گون
<i>Astragalus bakaliensis</i> Bge.	۱		*	<i>LR</i>	<i>Th.</i>	نوعی گون
<i>Astragalus biovulatus</i> Bge.	۱		*	<i>LR</i>	<i>Th.</i>	نوعی گون
<i>Astragalus campylanthus</i> Boiss.	۱		*	<i>LR</i>	<i>He.</i>	نوعی گون
<i>Astragalus eriostomus</i> Bornm.	۱			<i>Vu</i>	<i>Ch.</i>	گون
<i>Astragalus glaucacanthus</i> Fisch.	۱			<i>LR</i>	<i>Nph.</i>	نوعی گون
<i>Astragalus kahiricus</i> DC.	۱		*		<i>He.</i>	نوعی گون
<i>Astragalus microphysa</i> Boiss.	۱			<i>LR</i>	<i>Ch.</i>	نوعی گون
<i>Glaucium calycinum</i> Boiss	۱	*			<i>He.</i>	شقایق کوهی
<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	۱	*			<i>He.</i>	شیرین بیان
<i>Trigonella elliptica</i> Boiss.	۱	*	*	<i>LR</i>	<i>He.</i>	شبکلیله شیرازی
Papaveraceae						
<i>Hypecoum pendulum</i> L.	۲	*			<i>Th.</i>	شاتره وحشی
Plumbaginaceae						
<i>Acantholimon aspadanum</i> Bunge.	۱			<i>DD</i>	<i>Ch.</i>	کلاه میرحسن
<i>Acontholimon scorpius</i> Boiss.	۲			<i>LR</i>	<i>Ch.</i>	کلاه میرحسن دم عقری
Poaceae						
<i>Avena sativa</i> L.	۱		*		<i>Th.</i>	جو دوسر
<i>Bromus sericeus</i> Drobov	۱		*		<i>Th.</i>	جارو علفی
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	۱ و ۲		*		<i>He.</i>	مرغ
<i>Eremopyrum bonaepartis</i> (Spreng.) Nevski.	۲		*		<i>Th.</i>	بیابان گندمی مصری
<i>Eremopyrum confusum</i> Melderis.	۲		*		<i>Th.</i>	بیابان گندمی مشکورک
<i>Eremopyrum distans</i> (C.koch) Nevski.	۲		*		<i>Th.</i>	بیابان گندمی تنگ
<i>Hordeum vulgare</i> L.	۱		*		<i>Th.</i>	جو
<i>Lolium rigidum</i> Gaudin	۱		*		<i>Th.</i>	چچم
<i>Melica persica</i> Kunth	۱ و ۲		*		<i>He.</i>	ملیکا
<i>Pennisetum orientale</i> L.c.Rich.	۲		*		<i>He.</i>	ریش پری
<i>Phalaris minor</i> Retz.	۲		*		<i>Th.</i>	دانه قناری
<i>Poa bulbosa</i> L.	۱ و ۲		*		<i>He.</i>	چمن پیازدار

ادامه جدول شماره (۱): فهرست گیاهان دارویی معطر صنعتی، مرتعی و نادر مناطق حفاظت شده کالمند - بهادران و کوه بافق؛

<i>Stipa barbata</i> Desf.	۱ و ۲		*	<i>He.</i>	استپی - گیس پیرزن	
<i>Stipagrostis pennata</i> (Trin.) De Winter	۱ و ۲		*	<i>He.</i>	سبط پابلند	
<i>Stipagrostis plumosa</i> (L.) Munro ex T.Anders	۱ و ۲		*	<i>He.</i>	سبط پاکرتاه	
Polygonaceae						
<i>Atraphaxis spinosa</i> L.	۱			<i>Nph.</i>	کاروانکش	
<i>Calligonum bungei</i> Boiss.	۱			<i>LR</i>	<i>Nph.</i>	اسکنیل
<i>Calligonum polygonoides</i> L.	۲				<i>Nph.</i>	اسکنیل
<i>Pteropyrum aucheri</i> Juub & spach	۱ و ۲				<i>Nph.</i>	پرند
<i>Rumex vesicarius</i> L.	۲	*		<i>Th.</i>		ترشک
Primulaceae						
<i>Dionysia janthina</i> Bornm. & winkler	۱			<i>Vu</i>	<i>He.</i>	عروس سنگ
Rubiaceae						
<i>Asperula setosa</i> Jaub. & Spach	۲	*			<i>Th.</i>	زیرینه
Resedaceae						
<i>Reseda macrobotrys</i> Boiss.	۱			<i>LR</i>	<i>He.</i>	ورث
Rosaceae						
<i>Amygdalus lycioides</i> Spach	۲	*			<i>Ph.</i>	تنگرس
<i>Amygdalus scoparia</i> Spach	۱ و ۲	*			<i>Ph.</i>	بادام کوهی
<i>Amygdalus lycioides</i> Spach var. <i>lycioides</i>	۱ و ۲				<i>Nph.</i>	تنگرس
Solanaceae						
<i>Hyoscyamus insanus</i> Stocks.	۱	*			<i>He.</i>	بذر الیج
<i>Lycium ruthenicum</i> Murr.	۱	*			<i>Nph.</i>	گرگ تیغ
Tamaricaceae						
<i>Reaumuria oxiana</i> (Ledch.) Boiss.	۱			<i>LR</i>	<i>Ch.</i>	گل گزی
<i>Tamarix rosea</i> Bge.	۱			<i>Vu</i>	<i>Ph.</i>	گز
Thymelaeaceae						
<i>Daphne stapfii</i> Bornm. & Keissler	۲				<i>Nph.</i>	دافنه - توربید کرمانی
Valerianaceae						
<i>Valerianella oxyrhyncha</i> Fisch. & C.A.Mey	۲	*			<i>Th.</i>	شیرنک نوک تیز
<i>Valerianella triplaris</i> Boiss. & Buhse	۱	*			<i>Th.</i>	شیرینک
Zygophyllaceae						
<i>Fagonia bruguieri</i> DC.	۱	*			<i>He.</i>	اسفتند رومی
<i>Peganum harmala</i> L.	۱ و ۲	*			<i>He.</i>	اسفتند
<i>Zygophyllum eurypterium</i> Boiss & Buhse	۱ و ۲		*		<i>Nph.</i>	قیچ

Archive of SID

ژئوفیت و فانروفیت هستند و این یافته‌ها با نتایج به دست آمده توسط آریاوند (۱۳۸۰) در مناطق حفاظت شده کلاه قاضی، موته و قمیشلو در استان اصفهان اनطباق دارد.

سپاسگزاری

هزینه اجرای این تحقیق توسط معاونت پژوهشی دانشگاه یزد تأمین شده است. بدین وسیله از حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه یزد و دانشکده منابع طبیعی که امکان اجرای این تحقیق را فراهم کردند تشکر و قدردانی می‌شود.

یادداشت‌ها

1. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources
2. Rare Species
3. Endangered
4. Vulnerable
5. Lower Risk
6. Data Deficient

منابع مورد استفاده

آریاوند، احمد. ۱۳۸۰. معرفی گیاهان آوندی دارویی، معطر، مرتعی و نادر مناطق حفاظت شده کلاه قاضی، قمیشلو و موته (استان اصفهان). مجله پژوهش و سازندگی جلد ۱۴ شماره ۱: ۲۵-۱۷.

آریاوند، احمد. ۱۳۷۳. بررسی مقدماتی فلور و اجتماعات گیاهی منطقه حفاظت شده کلاه قاضی واقع در جنوب شرقی اصفهان (ایران). مجله زیست‌شناسی، جلد دوم: ۳۰-۷.

اسدی، مصطفی؛ محبوبه خاتم‌ساز؛ ولی ... مظفریان و علی اصغر معصومی، (ویراستاران). ۱۳۸۲-۱۳۶۷. فلور ایران، جلد های ۴۱-۱. انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مرتع، تهران.

ایران نژاد، محمد حسین. ۱۳۷۹. ساختار و تنوع پوشش گیاهی پارک ملی خبر و پناهگاه حیات وحش روچون، رساله دکتری جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، ۲۶۵ صفحه.

بحث و نتیجه گیری

مناطق مورد مطالعه در قلب فلات مرکزی ایران قرار داشته و جزء ناحیه رویشی ایرانی - تورانی محسوب می‌شوند. به طور کلی، مناطق مذبور از نظر رستنی‌ها از غنای کمتری نسبت به کل کشور برخوردارند. وجود تعداد محدودی گونه درختی و درختچه‌ای، آن هم به صورت تنک و پراکنده نشان می‌دهد که این منطقه از لحاظ تنوع و میزان گونه‌های چوبی فقیر است. عدمه اشکال زیستی گیاهان این مناطق را به ترتیب همی‌کریپتوفت با ۴۳/۳ درصد، تروفیت با ۲۳/۷ درصد و سپس کامفتیت با ۱۳/۳ درصد تشکیل می‌دهند که این نارسایی با طیف زیستی آب و هوای مناطق خشک تطبیق می‌کند. براساس اطلاعات حاصل از این تحقیق، بیشتر گونه‌های گیاهی دو منطقه را در وهله اول گونه‌های چندساله بوته‌ای و علفی تشکیل می‌دهند که تحمل کننده خشکی اند و با توجه به کمی بارندگی می‌توانند به بقای خود ادامه داده و در سال‌های پرباران بخوبی تکثیر شوند و بعد از آن گونه‌های یکساله هستند که از خشکی گریزان بوده و با حاکم شدن شرایط خشک از نظر زیستی به حالت خفته در می‌آیند.

گونه‌های گیاهی این مناطق عمدها به تیره‌های Chenopodiaceae، Poaceae، Papilionaceae، Asteraceae و Lamiaceae تعلق دارند.

به علت حفاظت هر دو منطقه توسط سازمان حفاظت محیط زیست در چند سال گذشته و خارج کردن دامداران از مناطق، گونه‌های گیاهی بخصوص گیاهان دارویی تا حدودی از گزند تخریب در امان مانده، ولی به علت خشکسالی‌های اخیر جمعیت و فراوانی آنها کاهش زیادی داشته است. همچنین خشکسالی‌های ایجاد شده بیشترین تأثیر را بر روی گیاهان یکساله داشته، به طوری که به دلیل خشکی گریز بودن این گیاهان، برخی از آنها همچنان به حالت خفته باقی مانده و در عرصه دیده نشده اند.

طبق نظر زهری، مناطق مهم ایران از لحاظ غنای فلورستیک، درصد گونه‌های انحصاری و نادر، رشته کوه‌های البرز و زاگرس و برخی کوه‌های منفرد مانند کرکس، شیرکوه و کوه‌های جنوب کرمان هستند. مناطق مورد مطالعه فاصله به نسبت کمی از شیرکوه دارند و گونه‌های مورد تهدید آن طبق جدول ۱ چندان زیاد نیست. گونه‌های مورد تهدید این مناطق بیشتر از رسته گونه‌های با خطر کمتر (Lower risk) بوده و دارای شکل زیستی همی‌کریپتوفت (۴۱/۵ درصد) و کامفتیت (۲۴/۳ درصد)، تروفیت (۲۱/۸ درصد) و بندرت

مصطفیریان، ولی‌ا... . ۱۳۷۸. فلور خوزستان. جلد اول. از انتشارات مرکز تحقیقات منابع و امور دام خوزستان.

مصطفیریان، ولی‌ا... . ۱۳۷۸. فلور یزد، انتشارات مؤسسه انتشارات یزد، ۴۷۳ صفحه.

معصومی، علی‌صغر. ۱۳۶۵-۷۴. گون‌های ایران، جلد‌های ۱-۳. انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، تهران.

یوسفی نجف‌آبادی، مهدی. ۱۳۷۵. بررسی فلور و تهیه نقشه پوشش گیاهی منطقه حفاظت شده قمیشلو (به روش فیزیونومیک). پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم گیاهی دانشگاه شهید بهشتی، تهران. ۸۷ صفحه.

Assadi, M. 1988. Plants of Arasbaran Protected area, N.W. of Iran (Part II). Iran. J. Bot.4(1): 1-59.

Boissier, E. 1975 (1810-1885). Flora Orientalis, Vol. 1-5. A. Asher and Co. B. V. Amesterdam.

Fielder, P.L. and Ahouse, J.J. 1992. Hierarchies of cause: toward an understanding of rarity in vascular plant species. In: Fieldr, P.L. and Jain, S.K. (eds.), Conservation Biology, The Theory, and Practice of Nature Conservation, Preservation and Management. Chapman and Hall, New-York.

Grime, P.P. 1985. The C-S-R model of primary plant strategies- Origins, implications and tests. In Gottlieb, L.D. and Jain, S.K. (eds.), Plant Evolutionary Biology. Chapman and Hall, London. IUCN. 1981. How to use the IUCN Red Data Book Categories. Threatened Plants Committee Secretariat. IUCN, Kew.

Jalili, A. and Jamzad, Z. 1999. Red data book of Iran. Research Institut of Forests and Rangelands. Tehran, 748 P.

Leonard, J. 1981 – 1992. Contribution a' l' etude de la Flore et de la Vegetation des deserts de l'

حسن‌زاده کیابی، بهرام؛ بهرام زهزاده؛ بیژن فرهنگ دره شوری؛ هنریک مجذوبیان، و حمید گشتاسب میگونی. ۱۳۷۲. پارک ملی کلستان. انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، تهران، ۲۰۳ صفحه.

زرگری، علی. ۱۳۶۸-۱۳۷۰. گیاهان دارویی. سه جلد. چاپ پنجم. انتشارات دانشگاه تهران.

کریمیان، علی‌اکبر. ۱۳۸۰. بررسی و شناسایی گونه‌های گیاهی منطقه حفاظت شده کالمند بهادران، اداره کل محیط زیست استان یزد، منتشر نشده، ۵۴ صفحه.

کریمیان، علی‌اکبر. ۱۳۸۲. بررسی و شناسایی گیاهان دارویی، معطر، مرتعی و نادر مناطق حفاظت شده کالمند بهادران و کوه بافق (استان یزد). دانشگاه یزد، منتشر نشده، ۴۴ صفحه

عصری، یونس. ۱۳۸۲. تنوع گیاهی در ذخیره گاه بیوسفر کویر، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع. شماره ۳۲۶، ۳۰۵ صفحه.

مبین، صادق. ۱۳۵۴-۷۳. رستنی‌های ایران (فلور گیاهان آوندی)، جلد اول تا چهارم. انتشارات دانشگاه تهران.

مدیر شانه چی، محسن. ۱۳۷۲. (متترجم) اکولوژی گیاهی، انتشارات دانشگاه امام رضا (ع)، ۵۰۹ صفحه.

مصلح آرانی، اصغر. ۱۳۸۰. بررسی و شناسایی گونه‌های گیاهی منطقه حفاظت شده کوه بافق، اداره کل محیط زیست استان یزد، منتشر نشده، ۳۲ صفحه.

Iran. Fasc. 1-10. Jard, Botanique National de Belgique.

Parsa, A. 1948-60. Flore de l' Iran. Vol. 8, Ministere de l'Education. Tehran.

Parsa, A. 1978-80. Flora of Iran, Vol. 1-2, Ministry of Culture and Higher Education of Islamic Republic of Iran., Tehran.

Rabinowitz, D. 1981. Seven forms of rarity, In: Synge, H. (ed.), The Biological aspects of rare plant conservation. John Wiley and Sons, New-York; 205-217.

Rechinger, K.H.(ed.). 1963-1993. Flora Iranica, nos. 1-172. Akademische Druck-U Verlagsanstalt, Graz, Austria.

Rechinger, K. H. 1977. Plants of the Touran protected Area (Iran). *Iran. J. Bot.* 1(2): 155-180.

Rechinger, K.H. and Wendelbo, P. 1976. Plants of the Kavir protected region (Iran). *Iran. Journ. Bot.* 1: 23-56.

Archive of SID