

*

- ۱- دانشجوی دکتری جنگلداری دانشگاه تربیت مدرس نور
 - ۲- دانشیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس نور
 - ۳- دانشیار گروه مرتعداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس نور
- تاریخ دریافت: ۸۵/۸/۷ تاریخ پذیرش: ۸۶/۸/۲۳

خسارت‌هایی که داروهای پاکوتاه به جنگل‌های سوزنی‌برگ و صنعتی جهان وارد آورده‌اند، محققان سراسر دنیا را بر آن داشته تا روش‌هایی برای ارزیابی شدت آلودگی و به تصویر کشیدن پراکنش مکانی و فضایی داروهای پاکوتاه جهت مدیریت جنگل، حفظ حیات وحش و تنوع زیستی و افزایش دقت مطالعات داروهای پاکوتاه ایجاد کنند. دو روش بررسی شدت آلودگی DMR و BVR که از متداول‌ترین روش‌های مطالعه ابتلا به داروهای پاکوتاه در جهان است و نسبت به سایر روش‌ها آسان‌تر، کاراتر، معتبرتر و کم‌هزینه‌تر است، در این مقاله آورده شده است. جهت انجام مطالعه ابتلا به داروهای پاکوتاه در پارک جنگلی نور و مقایسه دو روش نام‌برده، تعداد ۳۰ پلات انتخابی ۱۰ آری در مناطق آلوده پیاده شد. از آنجا که ۹۴٪ گونه‌های آلوده در داخل پلاتها از گونه انجیلی بوده‌است، بنابراین تنها گونه انجیلی مورد ارزیابی قرار گرفت. از ۳۲۹ انجیلی آلوده در کل پلاتها، ۲۴۳ درخت به‌طور تصادفی مورد تجزیه تحلیل و مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ۶۷٪ درختان، با این دو روش رتبه یکسانی گرفتند و ۳۱٪ آنها، DMR بیشتری داشتند. در کل نحوه اجرای روش DMR و دقت ارزیابی آن نسبت به BVR بهتر به نظر می‌رسید. بنابراین در توده‌هایی با درصد آلودگی فراوان، به لحاظ تعیین فشار داروهای پاکوتاه بر اکوسیستم جنگل، ساختار توده، میزان تولید و رویش جنگل و حتی اثر بر زادآوری پایه‌های آلوده می‌توان از روش DMR در مطالعات استفاده کرد. همچنین بررسی آلودگی در بین سه بخش تاج نشان داد که شدت آلودگی در بخش فوقانی تاج، به ترتیب بیشتر از بخش‌های میانی و تحتانی بوده است که علت آن وابستگی انتشار بذر داروهای پاکوتاه به مکان‌های نشست و گشت و گذار پرندگان تغذیه‌کننده از میوه‌های داروهای پاکوتاه است.

داروهای پاکوتاه- ارزیابی شدت آلودگی- پلات انتخابی- پراکنش مکانی و فضایی

گسترش بیشتر داروهای پاکوتاه می‌شود (Reid, 2005). داروهای پاکوتاه در آلودگی‌های کم، باعث کاهش رویش و کجی و تورم در محل آلودگی می‌شوند و به‌طور کلی باعث ایجاد نقص فیزیولوژیک و بدشکل شدن درختان می‌شوند؛ اما در آلودگی‌های خیلی شدید یعنی زمانی که قسمت اعظم تاج میزبان با کپه‌های داروهای پاکوتاه جایگزین شود، باعث مرگ یکباره درخت می‌شوند (Perry and Elmore, 2001) مقاومت درختان سالم و واقع در توده‌های حاصلخیز در برابر ابتلا به داروهای پاکوتاه بیشتر است. اما ممکن است دچار خشکیدگی سرشاخه‌ها شوند. به هرچه‌ت، درختان مبتلا به داروهای پاکوتاه، به‌خصوص درختان به‌شدت مبتلا، نسبت به حمله

در اراضی کشاورزی، جنگل‌ها، چراگاه‌ها و حتی پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های غالب نقاط جهان، کپه‌های بزرگ داروهای پاکوتاه بسیاری از درختان کنار جاده‌ها و حاشیه‌ها را آلوده می‌سازد. در برخی مواقع به قدری فراوان و شایع می‌شود که باعث مرگ درختان میزبان می‌شود (Reid, 2005). اگرچه در هر منطقه بذر درختان و سایر گیاهان علفی و حتی جانداران کوچک، منابع غذایی مناسبی برای پرندگان محسوب می‌شوند، اما میوه‌های کوچک، شیرین و چسبناک داروهای پاکوتاه نیز در طی فصول سرد و یخبندان سال، منبع غذایی پرندگان خاصی را تشکیل می‌دهد که این خود باعث

به‌طور معمول این روش برای طبقه‌بندی و تیپ‌بندی پوشش گیاهی به‌کار می‌رود. اگر چه برای مساحی داروایش می‌توان از این روش زمانی که خصوصیات بسیار بارزی از قبیل مرگ و میر درختان یا مراکز آلودگی وجود داشته‌باشد نیز استفاده نمود. عکس‌برداری هوایی بزرگ مقیاس، برای توده‌های منفرد جهت بازرسی درختان آلوده با جاروهای جادگری بزرگ یا مشخص‌کردن گونه‌های درختی حساس و برآورد پایه‌های حساس به مرگ و میر بر اساس خصوصیات مختلف تاج استفاده می‌شود. به‌طور معمول داروایش‌ها با ایجاد لکه‌های تیره‌تر نسبت به تاج، در عکس‌های هوایی قابل تمایزاند (Hawksworth et al., 2002).

عمومی‌ترین روش تشریح و کسب اطلاعات قابل قبول جهت تعیین فشار داروایش بر رویش جنگل است. پلاتها معمولاً در قالب یک طرح مونه‌بندی در جنگل پیاده می‌شوند که اگر به درستی اجرا گردد می‌تواند نتایج مناسبی ارائه‌دهد. داخل پلاتها معمولاً مشخصه‌های مربوط به رویش جنگل و درجه‌بندی شدت آلودگی (DMR و یا BVR) برداشت می‌شود (Hawksworth et al., 2002).

ارزیابی‌های کنتر جاده، در بسیاری از جنگل‌های شمال غربی آمریکا که جاده‌های دسترسی با گسترش مناسبی دارند به‌کار می‌رود. بهترین نتیجه در جنگل‌های تقریباً "خالص"، توده‌های همسال با حداقل سن ۲۰ سال حاصل می‌شود. یک راننده و فرد همراه، در میان توده‌های جنگل با سرعت کم (۳۰ تا ۴۰ کیلومتر) حرکت کرده و میزان آلودگی را در فواصل ثابت ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر در طول جاده تخمین می‌زنند.

آلودگی درختان در طول جاده معمولاً با استفاده از درصد، طبقه‌بندی می‌شود. به‌این‌صورت که صفر درصد، بدون آلودگی قابل‌رویت باشد، آلودگی کم یعنی ۱ تا ۳۳ درصد از درختان آلوده باشند، آلودگی متوسط یعنی ۳۴ تا ۶۶ درصد از درختان آلوده باشند و آلودگی شدید، یعنی ۶۷ تا ۱۰۰ درصد درختان آلوده باشند. علاوه بر این پلاتهایی با فاصله ۵۰ متر از جاده، در فواصل حداقل ۵ تا ۱۰ کیلومتر در طول جاده مستقر می‌شوند. می‌توان از پلاتهایی با شعاع ثابت استفاده کرد و یا با استفاده از پریسم پلاتها را پیاده نمود. DMR⁶ متوسط برای هر درخت، محاسبه شده و با استفاده از اطلاعات ارزیابی کنتر جاده نتیجه کلی به صورت

آفات، امراض، سوسک‌های پوست‌خوار، خشکی و سایر فشارهای محیطی ضعیف‌تر از سایرین عمل می‌کنند (Reid, 2005; Hadfield and Flanagan, 2000).

به جهت کمی‌کردن شدت ابتلا به داروایش‌ها در مدیریت توده و ارزیابی کاهش رویش و مرگ و میر و نیز شناسایی و حفظ درختانی که باید به عنوان مبدأ بذر در جنگل باقی بمانند، به روش‌هایی برای ارزیابی میزان ابتلا در سطح کل جنگل و حتی تک درختان نیاز می‌شود (Hawksworth et al., 2002).

جهت دستیابی به اطلاعاتی درباره گسترش و وسعت آلودگی در توده، درصد درختان مبتلا، درصد مرگ و میر، شدت ابتلا به داروایش، برای مدیریت پایه‌های سالم و آلوده در توده و رویشگاه به استفاده و انتخاب تکنیک‌ها و روش‌های صحیح نمونه‌برداری نیاز است. بسته به نوع مطالعه، هدف، امکانات و سطح مورد مطالعه روش‌های ارزیابی داروایش متفاوت است. روش‌های متعددی تاکنون برای این منظور به کار گرفته شده است (Ciesla, 1997) که عبارتند از:

این روش در جنگل‌های سوزنی برگ نوتل سیاه و کاج جک کانادا گاه تا سطحی بیش از ۹۸ میلیون هکتار به کار گرفته شده است. ارزیابی هوایی اغلب در زمین‌هایی با پستی و بلندی‌های کم صورت می‌گیرد ولی در نواحی کوهستانی، هلیکوپتر وسیله مناسبی است.

هلیکوپتر در خطوط پرواز ۵ تا ۱۰ کیلومتری با سرعت ۱۵۰ کیلومتر از بالای منطقه عبور می‌کند دو نفر همراه در هر سمت هلیکوپتر، نقاط آلوده و حساس به مرگ و میر و در معرض خطر را بر روی نقشه (که ممکن است نقشه توپوگرافی، تیپ جنگل یا آماربرداری باشد) مشخص می‌کنند. در برخی موارد با داشتن یک رایانه‌دستی^۲ و نقشه دیجیتالی خصوصیات تیپ جنگل یا توپوگرافی، اطلاعات به‌طور مستقیم بر روی نقشه موجود در صفحه رایانه درج می‌شود. این روش که امروزه در حال گسترش روزافزون است، بهترین تکنیک در بازرسی کلی جنگل‌های وسیع با آلودگی شدید و جاروهای زیاد به همراه مراکز آلودگی مجزا و مرگ و میر فراوان است. همچنین در این روش می‌توان با استفاده از GPS مراکز آلوده را بر روی نقشه مکان‌یابی نمود (Hawksworth et al., 2002).

تخمین حجم و رویش گونه‌ها، کاهش حجم ناشی از حمله دارویش ارائه می‌شود (Hawksworth et al., 2002).

طور مختصر به قرار زیر است: (Ciesla, 1997; Hawksworth et al., 2002). اصول این دو روش به

DMR

نام DMR به معنی "روش درجه بندی دارویش پاکوتاه" است؛ چرا که اولین بار، در اوایل دهه ۱۹۵۰ توسط Frank Hawksworth برای درجه بندی شدت ابتلا به دارویش‌های پاکوتاه ارائه گردید؛ اما بعدها برای سایر گونه‌های دارویش نیز بکار گرفته شد (Tsopelas et al., 2004). در این روش ابتدا تاج زنده درخت به صورت بصری به سه بخش فوقانی، میانی و تحتانی تقسیم می‌شود. سپس برای هر بخش از تاج به طور جداگانه و به صورت زیر درجه بندی اعمال می‌شود:

رتبه صفر، یا "بدون آلودگی"، رتبه ۱، برای "آلودگی اندک" یا زمانی که کمتر از نصف شاخه‌ها آلوده باشند و رتبه ۲، برای "آلودگی شدید" یا زمانی که بیشتر از نصف شاخه‌ها آلوده باشند. شدت آلودگی در هر درخت از جمع رتبه‌های ثبت شده برای هر یک از این سه بخش تاج حاصل می‌گردد. مثلاً "DMR درختی با آلودگی شدید در بخش فوقانی، آلودگی اندک در بخش میانی و بدون آلودگی در پایین، برابر با $(3+1+0=3)$ می‌شود. در این روش DMR درختی با آلودگی شدید در هر یک از سه بخش تاج (بیش از نصف شاخه‌ها آلوده باشند) ۶ و درخت فاقد حتی یک کانون آلودگی در هر یک از سه بخش تاج، صفر خواهد بود (Hawksworth and Wiens, 1996; Ciesla, 1997; Hawksworth et al., 2002).

BVR

در مواردی که دارویش‌ها (معمولاً دارویش‌های پاکوتاه) بر روی درختان، کپه‌های حجیمی (که اصطلاحاً "جاروهای جادوگری" می‌نامند) ایجاد کرده باشند، تعیین شدت آلودگی، به روش DMR با مشکل مواجه می‌شود. به همین خاطر Robert Tinnin در سال ۱۹۹۸ روش BVR را که بر اساس حجم جاروها (نه تعداد شاخه‌های آلوده) عمل می‌کند، به وجود آورد. در این روش نیز تاج زنده به سه بخش تقسیم شده و هریک جداگانه رتبه‌دهی می‌شوند.

رتبه صفر، برای فاقد آلودگی، رتبه ۱ برای آلودگی کم، یعنی زمانی که حجم جاروهای کمتر از نصف حجم تاج باشد و رتبه ۲ برای آلودگی شدید یعنی زمانی که حجم جاروها بیشتر از نصف حجم تاج باشد. مانند

نمونه برداری‌هایی که به طور سیستماتیک پراکنده می‌شوند مانند ترانسکت‌های نواری و یا ترانسکت‌های روی شبکه، روش دیگری است که برای ارزیابی دارویش در مقیاس چشم انداز^۱ استفاده شده است؛ اما غالباً در سطح توده به کار می‌روند. استفاده از آنها عمدتاً با پلاتهای پوشش گیاهی یا پلاتهای آماربرداری جایگزین شده است (Hawksworth et al., 2002).

تکنیک دیگری که در ارزیابی دارویش‌ها تاکنون به کار گرفته شده، سیستم نمونه برداری با پلات دائمی است. این پلاتها که عموماً "بزرگتر از پلاتهای معمولی آماربرداری در جنگل هستند، دارای مرزهای ثابت و نقشه وضعیت تمامی درختان موجود هستند و برای مطالعه جنبه‌های فضایی پراکنش دارویش و مدل‌های شبیه سازی آن بسیار با ارزش‌اند. پلاتهای دائمی همچنین، جهت ارزیابی مدیریت جنگل بسیار مفید بوده، اما هزینه نسبتاً زیاد استقرار و اندازه‌گیری‌های بعدی باعث شده که از این پلاتها کمتر استفاده شود (Hawksworth et al., 2002).

این نوع ارزیابی جهت اندازه‌گیری شدت ابتلا در درختان است که اولین بار برای دارویش‌های پاکوتاه^۱ اجرا شد. در حال حاضر یک مشخصه ضروری و بسیار مفید در مطالعات دارویش محسوب شده و در اندازه‌گیری پلاتهای آماربرداری، دائمی و ترانسکت و. به کار می‌رود. تاکنون روش‌های مختلفی جهت کمی کردن و بررسی شدت ابتلا به دارویش ارائه شده که اغلب آنها مشکلات اجرایی خاصی دارند. برخی از آنها کمتر از ۴ کلاسه و برخی دیگر بیش از ۱۸ کلاسه طبقه‌بندی دارند. اکثر آنها ذهنی بوده و درجه‌بندی و رتبه‌دهی‌های تعریف نشده‌ای چون کم، متوسط و شدید دارند. دو سیستم مشهور طبقه‌بندی شدت ابتلا به دارویش وجود داشته که بیش از سایر روش‌ها به کار برده می‌شوند. سیستم DMR و BVR^۱ که هر دو از برخی جهات شبیه به هم عمل می‌کنند و دارای شش کلاسه ۱ تا ۶ برای پایه‌های آلوده و کلاسه صفر برای درخت غیر آلوده هستند (Hawksworth and Wiens, 1996;)

و شرق آن را رودخانه هاشم رود و جنگل‌های ایزده تشکیل می‌دهد. این رویشگاه جزء آخرین بقایای جنگل‌های جلگه‌ای کرانه دریای خزر است. وسعت فعلی پارک حدود ۳۶۸۲ هکتار بوده که ارتفاع حداکثر و حداقل آن بین ۲۰- تا ۴۳ متر و شیب عمومی آن بین ۰ تا ۳ درصد است (برزه کار، ۱۳۷۴).

از آنجایی که درختان آلوده به دارویش در سطح پارک پراکنده‌اند، از قطعات نمونه انتخابی جهت مطالعات استفاده شد (Lopez, et al., 2001; Watson, 2002; Martinez, et al., 1996; Mathiasen, 1999; Parks, et al., 1998). تعداد ۳۰ قطعه نمونه ۱۰ آری دایره‌ای شکل در پاییز ۸۳ به طور انتخابی در مناطقی که تجمعی از درختان آلوده به دارویش وجود داشت، پیاده شد. برای تمامی درختان آلوده داخل قطعات نمونه، DMR, BVR و نام گونه ثبت شد. به دلیل این که ۹۲٪ از درختان آلوده (۳۲۳ درخت) گونه انجیلی بودند، بنابراین تنها انجیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

از ۶۳۸ اصله درخت واقع در ۳۰ پلات ۳۵۲ اصله آلوده به دارویش بودند که از این تعداد ۳۲۳ اصله، گونه انجیلی آلوده و ۲۹ اصله از سایر گونه‌ها (ممرز، سفید پلت، توسکا، ون و پلت) بودند. ۱۲۴۳ اصله انجیلی آلوده، به طور تصادفی از بین ۳۲۳ اصله انتخاب شده و تجزیه و تحلیل شدند (Tinnin, 1998).

جدول شماره (۱) الف، رتبه‌دهی درختان آلوده و تعداد آنها را در هر طبقه آلودگی به دو روش DMR و BVR نشان می‌دهد. تعداد ۱۶۴ اصله (۶۷/۵٪) از ۲۴۳ درخت آلوده، توسط هر دو روش DMR و BVR در کلاس‌های یکسانی قرار گرفتند. ۷۳ اصله (۳۰٪) DMR بیشتر و ۶ اصله BVR بیشتری داشتند. ۸۷٪ از اختلاف رتبه‌بندی در دو روش، تنها یک رتبه تفاوت داشتند. همچنین میانگین شدت آلودگی درختان در روش DMR، ۲/۱۷ و در BVR، ۱/۸۸ بود (نمودار شماره ۱).

با توجه به رتبه‌دهی صفر، ۱ و ۲ در دو روش DMR و BVR برای هر یک از سه بخش تاج، نمودار ب، ج و د مقایسه این رتبه‌ها (یا شدت‌های فاقد آلودگی، آلودگی اندک و آلودگی شدید) را در تعداد اصله درخت نشان می‌دهد. اختلاف شدت آلودگی در سه بخش فوقانی، میانی و تحتانی تاج درختان را در هر دو روش نشان می‌دهد.


روش DMR رتبه هر یک از سه بخش تاج جمع شده و BVR هر درخت که عددی است بین ۰ تا ۶ حاصل می‌شود (Tinnin, 1998).

گونه دارویش مورد مطالعه در تحقیق حاضر، دارویش اروپایی یا *Viscum album L.* از خانواده Viscaceae بوده (Briggs, 2003; Procházka, 2004) که تنها یکی از ۱۳۰۶ گونه ثبت شده دارویش است. گونه نام برده، از راسته Santalales^{۱۳} است که اکثر گونه‌های آن نیمه انگل ریشه و یا ساقه‌اند (Milius, 2000; Nickrent, 2002).

این بوته نیمه‌انگلی همیشه سبز، ریشه‌های واقعی نداشته اما به جای آن اندام مکند ریشه ماندی به نام هاستوریوم^{۱۴} دارد که از بافت پارانشیم تشکیل شده و از طریق آن هم به تنه میزبان اتصال می‌یابد و هم آب و مواد معدنی مورد نیاز خود را جهت انجام فتوسنتز از درخت میزبان می‌رباید (Lopez et al., 2001; Briggs, 2003; Perry and Elmor, 2001). میوه آن پس از رسیدن به رنگ سفید مایل به سبز در می‌آید که دارای ماده چسبناکی به نام ویسکین^{۱۵} بوده و از طریق آن به شاخ و برگ میزبان جدید می‌چسبد (Mathiasen, 1998; Perry and Elmor, 2001).


میوه این گیاه در فصل زمستان می‌رسد و غذای مناسبی برای پرندگان است (Watson, 2001; Perry and Elmor, 2001). از عمده راه‌های تکثیر آن این است که بذرها پس از خورده شدن توسط پرندگان، به صورت فضله بر درختان دیگر به جای مانده و با مساعد شدن شرایط و جذب رطوبت کافی جوانه می‌زنند. بنابراین پراکنش آن تحت تأثیر رفتار پرندگان است (Christenson, 2003; Watson, 2001; Lopez et al., 2001). تا کنون ۴۵۲ گونه گیاهی در جهان به عنوان میزبان دارویش اروپایی ثبت شده‌اند که اغلب آنها از پهن‌برگان هستند (Perry and Elmor, 2001; Barberak and Kintzios, 2002). در ایران بر روی گونه‌های انجیلی، ملج، اوجا، نمدا، پلت، آلوچه، توسکا، سفید پلت، جل و گاهی بید هم می‌روید (ثابتی، ۱۳۵۶؛ زرگری، ۱۳۶۹؛ قهرمان، ۱۳۷۳).

پارک جنگلی نور در ۳۴° و ۳۶° عرض جغرافیایی و ۵۰° و ۵۱° طول جغرافیایی، در ۵۰ کیلومتری شرق نوشهر و ۵۵ کیلومتری غرب بابلسر واقع است. حد شمالی آن را جاده آسفالت‌ه ساحلی و اراضی شالیزار، غرب آن جاده نور- چمستان، جنوب آن اراضی شالیزار روستاهای مجاور پارک



() :

BVR DMR



() :


BVR DMR

۶۷٪ از درختان در هر دو روش رتبه یکسانی اتخاذ نمودند که در پژوهش Tinnin (1998) این میزان ۷۷٪ بوده است. ۹۴ درصد از درختان مورد اختلاف که وی اندازه‌گیری نموده بود، BVR بیشتری داشتند. در حالی که در این تحقیق ۹۱٪ از درختان مورد اختلاف در دو روش DMR بیشتری داشتند. علت این امر، تفاوت نوع آلودگی در داروهای پاکوتاه و اروپایی است. به این معنی که کپه‌های داروهای اروپایی حجم زیادی ایجاد نمی‌کنند اما به تعداد زیادی دیده می‌شوند؛ در حالی که داروهای پاکوتاه تشکیل جاروهای مترکم و حجیمی می‌دهند که حجم آنها را به راحتی می‌توان با حجم تاج مقایسه نمود و BVR دقیقی بدست آورد. اما برآورد ذهنی مجموع حجم کپه‌های کوچک داروهای


() :

BVR DMR

	DMR	BVR
۱	۹۴	۱۱۳
۲	۶۸	۶۴
۳	۴۲	۵۰
۴	۲۵	۱۴
۵	۱۳	۲
۶	۱	۰



() :



() :

BVR DMR

روش DMR در جنگل‌های نوئل یونان، برای گونه *V. album* استفاده شد و نتایج مناسبی به دست آمد (Tsopeles, et al., 2004).

لزوم استفاده از روش‌های طبقه‌بندی شدت آلودگی DMR و BVR در مدیریت جنگل امروزه در حال تشدید است. به‌گونه‌ای که در جنگل‌های با تولید چوب صنعتی، پایه‌های شدیداً آلوده به داروآش با DMR یا BVR کلاسه ۶، چاره‌ای جز قطع و خروج به موقع از توده و یا سوزاندن برای مدیران باقی نمی‌گذارد؛ چرا که وجود آنها باعث گسترش مراکز آلودگی در توده می‌شود. اما در جنگل‌هایی که تنوع زیستی و حفظ حیات وحش اهمیت به‌سزایی دارد، تلاش برای حفظ داروآش‌ها ارجح می‌شود. زیرا هم کاربرد و آموزش آن آسان است و هم در صورت افزایش مهارت، سرعت به‌کارگیری این روش‌ها زیاد می‌شود. امروزه در اغلب پروژه‌های تحقیقاتی داروآش و حتی مدیریت جنگل‌های صنعتی، تعیین DMR یا BVR یکی از مشخصه‌های عمده و اولیه است.

با تشکر فراوان از آقایان مهندس پیمان قبادی‌فر، هادی درودی، صادق علوی‌یگانه که زحمت نمونه‌برداری را بر ما هموار کردند، همچنین از آقایان دکتر سید غلامعلی جلالی، دکتر مسلم اکبری‌نیا و مهندس علیرضا علی‌عرب سپاسگزاریم.

- 1-Aerial Survey
- 2-Lap-Top
- 3-Aerial Photography
- 4-Forest Inventory Plots
- 5-Road side and Plot Survey
- 6-Dwarf Mistletoe Rating System
- 7-Transects and Grids
- 8-Landscape-Scale
- 9-Permanent Plots
- 10-Dwarf Mistletoe Survey
- 11-Broom Volume Rating System
- 12-Witches Broom
- 13-Sandal Wood
- 14-Haustorium
- 15-Viscin

اروپایی در هر یک سوم از تاج و مقایسه آن با حجم تاج درخت، کاری مشکل و تقریبی محسوب می‌شود. البته در مواردی که میزان آلودگی کم باشد در همان نگاه اول می‌توان به راحتی رتبه ۱ یعنی آلودگی اندک را در هر دو روش تشخیص داد؛ اما این دو روش در زمانی که میزان آلودگی بیشتر شود اختلاف پیدا می‌کنند.

در روش DMR، شاید شمارش شاخه‌ها کمی مشکل به‌نظر برسد، اما به مراتب از موارد ذکر شده دقیق‌تر و حتی با کسب کمی تجربه شاید راحت‌تر هم باشد. نکته دیگر اینکه در روش BVR، کمتر درخت شدیداً آلوده‌ای ممکن است رتبه ۶ کسب نماید که این مورد با مشاهده برخی درختان شدیداً آلوده در عرصه نیز غیرمعمول می‌نماید. ۹۵٪ درختان آلوده، در بخش فوقانی تاج نیز دارای آلودگی بودند. همچنین درصد شدت آلودگی (آلودگی شدید با رتبه ۲ در هر دو روش) در بخش فوقانی تاج درختان به ترتیب بیشتر از میانی و پایینی بود. علت این امر وابستگی پراکنش داروآش به مناطق تفرجی پرندگان را می‌رساند. چرا که پرندگان معمولاً ترجیح می‌دهند در نقاط مرتفع درختان که غالباً آفتاب‌گیر و باز است بنشینند و استراحت کنند که نتیجه آن گذاشتن فضله‌های دارای بذر داروآش و افزایش درصد وقوع داروآش در نقاط بلند و آفتاب‌گیر درختان است.

این نتایج با یافته‌های Watson, Lopez و Elmor و Perry در سال ۲۰۰۱ مشابه است. خطایی که در هر دو روش وجود دارد، تقسیم تاج به سه بخش است که هر چه شخص اندازه‌گیر در این مرحله، دقت و حوصله بیشتری به خرج دهد، دقت درجه‌بندی افزایش می‌یابد (Tinnin, 1998). علاوه بر این ممکن است درختی با سه بوته داروآش در قسمت فوقانی، میانی و تحتانی تاج در هر دو روش رتبه ۳ محسوب شود، اما درختی با بیش از ۴۰ بوته داروآش در بخش فوقانی رتبه ۱ اتخاذ نمایند. این گونه خطاها تنها با افزایش تعداد نمونه کاهش خواهند یافت.

در کل روش DMR برای ارزیابی سطح آلودگی در جنگل‌های ایران روش مناسبی به نظر می‌رسد. چرا که در برخی موارد به لحاظ داشتن اهدافی چون تعیین فشار امراض بر اکولوژی جنگل، ساختار توده، میزان تولید و رویش جنگل و حتی اثر بر زادآوری پایه‌های آلوده نیاز به ارزیابی‌هایی از داروآش در جنگل خواهیم داشت که البته این موضوع زمانی که آلودگی سطحی وسیع را فرا می‌گیرد بیشتر نمود می‌یابد. از

ثابتی، ح. ۱۳۷۴. جنگل‌ها، درختان و درختچه‌های ایران، یزد، دانشگاه یزد، ۷۸۴ صفحه.

برزه‌کار، ق. ۱۳۷۴. شناسایی گونه‌ها و جوامع گیاهی پارک جنگلی نور و پراکنش آنها با توجه به نیاز اکولوژیک، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، ۱۶۰ صفحه.

قهرمان، ا. ۱۳۷۳. کورموفیتهای ایران (سیستماتیک گیاهی)، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دوم، ۳۵۰ صفحه.

زرگری، ع. ۱۳۶۹. گیاهان دارویی، جلد چهارم، تهران، دانشگاه تهران، چاپ چهارم، ۹۲۳ صفحه.

Ciesla, W. M. 1997. Dwarf Mistletoe in Balochistan: A Literature Review. Balochistan Natural Resources and Conservation Project. Online at : http://www.rms.nau.edu/publications/ciesla_bal/

Hadfield, J.S., Mathiasen, R.L. and Hawksworth, F.G. 2000. Douglas-Fir Dwarf Mistletoe. Forest Insect & Disease Leaflet 54, U.S. Department of Agriculture , Forest Service.

Haldeman, J. 2000. Under the Mistletoe Myth, Medicine, and More!. Online at: <http://www.sciencenews.org/articles/20001223/bob9.asp>.

Hawksworth, F.G. and Wiens, D. 1996. Dwarf Mistletoes: Biology, Pathology and Systematic. Agri. Handb. 709, Washington, DC: USDA For. Serv. 410 pp.

Hawksworth, F.G., et al. 2002. Mistletoe of North American Conifers. U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station. 123 p.

Hadfield, J.S. and Flanagan, P.T. 2000. Dwarf Mistletoe Pruning May Induce Douglas-Fir Beetle Attacks. West. J. Appl. For. 15(1): 34-6.

Martinez del Rio, C., Silva, A., Medel, R. and Hourdequin, M. 1996. Seed Disperser as Diseasevector: Bird Transmition of Mistletoe Seeds to Plant Hosts. Ecology 77:912-21.

Milius, S. 2000. Botany Unther the Mistletoe. Week of Dec.23, 2000; 158(26/27), Online at : <http://www.sciencenews.org/articles/20001223/bob9.asp> .

Muir, J.A. Robinson, D.C.E. and Geils, B.W. 2004. Charactrizing the Effect of Dwarf Mistletoe and Other Diseases for Sustainable Forest Management. BC Journal of Ecosystem and Management, 3(2):1-7, Online at: <http://www.forrex.org/jem/2004/vol3/no2/art6.pdf> .

()

Nickrent, D.L. 2001. Santalales (Mistletoe). Encyclopedia of Life Sciences. pp. 1-5.

Nickrent, D.L. 2002. Mistletoe Phylogenetics: Current Relationships Gained from Analysis of DNA Sequences. Western International Forest Disease Work Conference. Waikoloa Hawai'i. 253 pp.

Nickrent, D.L. and Musselman, L.J. 2004. Introduction to Parasitic Flowering Plants. The Plant Health Instructor, pp. 1-16.

Parks, C.G., et al. 1999. Wildlife Use of Dwarf Mistletoe Brooms in Douglas-Fir in Northeast Oregon. Western J. Applied Forestry, 14(2): 100-105.

Perry, E.J. and Elmore, C.L. 2001. Mistletoe. IPM Education and Publication, University of California, Online at: <http://www.ipm.ucdavis.edu> .

Tinnin, R.O. 1998. An Alternative to the 6-Class Dwarf Mistletoe Rating System. Western Journal of Applied Forestry, 13(2): 64-65.

Tsopelas P., et al. 2004. Mistletoe (*Viscum album*) in the Fir Forest of Mount Parnis, Greece. Forest Ecology and Management, 202(2004): 59-65.

Watson, D.M. 2001. Mistletoe –A Key Stone Resource in Forests and Woodlands Worldwide. Annual Review of Ecology and Systematic, 32(3), 219-249.

Archive of SID