

معرفی نشانگرهای ژنتیکی جهت شناسایی انگل‌های

لرنه آ سپریناسه آ (*Lernaea cyprinacea*) و

لرنه آ کتنوفارینگودونی (*L. ctenopharyngodon*)

با استفاده از روش RAPD

محمد پورکاظمی^(۱)*؛ حمید اسدیان^(۲)؛ جمیله پازوکی^(۳)؛ محمود معصومیان^(۴) و
حسینعلی ابراهیمزاده موسوی^(۵)

pkazemi_m@yahoo.com

۱- انتستیتو تحقیقات بین‌المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان، رشت صندوق پستی: ۴۱۶۲۵-۳۴۶۴

۲- دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد کرج

۳- گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه شهید بهشتی، تهران

۴- موسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۱۶۱۱۶

۵- دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۴۵۳

تاریخ دریافت: اردیبهشت ۱۳۸۵ تاریخ پذیرش: مهر ۱۳۸۶

چکیده

این تحقیق بمنظور مقایسه مولکولی دو انگل لرنه آ سپریناسه آ (*Lernaea cyprinacea*) و انگل لرنه آ کتنوفارینگودونی (*L. ctenopharyngodon*) با استفاده از روش (Random Amplified Polymorphic DNA) یا RAPD و امکان معرفی نشانگرهای مولکولی صورت گرفت. برای این منظور ۴۳ نمونه انگل لرنه آ از دو گونه فوق از استانهای خوزستان و گیلان جمع‌آوری و DNA آنها به روش فنل-کلروفرم استخراج گردید. پس از بررسی کیفیت و کمیت DNA بوسیله الکتروفورز ژل آگارز ۱ درصد و دستگاه اسپکتوفوتومتر، تحت شرایط خاصی PCR گردید و محصول PCR بر روی ژل پلی آکریلامید ۶ درصد الکتروفورز شد و سپس با نیترات نقره رنگ‌آمیزی و در پایان اندازه و تعداد نوارهای DNA با استفاده از دستگاه مستند سازی ژل ثبت و آنالیز آماری آن با برنامه کامپیوتری 32 POP GEN مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این تحقیق از ۴۲ آغازگر ۱۰ نوکلئوتیدی استفاده گردید که در مجموع ۳۹۷ باند DNA تولید شد که از این بین ۳۴۹ باند مشخص و چند شکلی در بین دو گونه شناسایی گردید که تعدادی از آنها را می‌توان بعنوان نشانگر مولکولی جهت شناسایی دو گونه مزبور بکار برد. تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از محصول PCR نشان داد که میزان تنوع ژنتیکی در لرنه آ کتنوفارینگودونی استان گیلان (۱۵/۱ درصد) بیشتر از خوزستان (۱/۱ درصد) بوده ولی در لرنه آ سپریناسه آ در استان خوزستان (۴۶/۲۷ درصد) به میزان ۲۶/۷ برابر استان گیلان (۷۸/۳ درصد) بوده است. از طرف دیگر حدود ۸۸ درصد تفاوت ژنتیکی بین دو گونه انگل لرنه آ مشاهده شد که می‌توان به اطمینان اعلام نمود که از لحاظ ژنتیکی گونه لرنه آ کتنوفارینگودونی یک گونه مستقل از لرنه آ سپریناسه آ می‌باشد.

لغات کلیدی: RAPD، لرنه آ سپریناسه آ، *Lernaea cyprinacea*، لرنه آ کتنوفارینگودونی، *L. ctenopharyngodon*

*نویسنده مسئول

مقدمه

از ماهیان دریای مدیترانه تعیین شد (Desdevives *et al.*, 2000) از سال ۱۹۹۴ میلادی تحقیقات گستردگی نیز بر روی انگلها میکسوسپوره آنجام و نهایتاً با آزمایشات مولکولی جایگاه طبقه‌بندی شاخه میکسوزوا (Myxozoa) در بین انگل‌های پریاخته مشخص گردید. اغلب مطالعات روى زن ۱۸S rRNA ۱۸S انجام شده است و تقریباً ۲۰ توالی در بانک ژن میکسوبولوها (Myxobolus) موجود می‌باشد (Smother *et al.*, 2001; Bush *et al.*, 2001; Kent *et al.*, 2001; Kent *et al.*, 1994) در سال ۲۰۰۲ میلادی نیز ۱۱ گونه از انگل‌های آسکاریده در ماهیان دریایی، آب شرین و پرنده‌گان ماهیخوار با روش مولکولی PCR-RFLP شناسایی شدند (Kijewska *et al.*, 2002).

بدلیل دامنه میزبانی وسیع، ویژگیهای متغیر مرفولوژیک، شناسایی و طبقه‌بندی گونه‌های مختلف لرنها بهمراه با مشکلاتی روبرو بوده و برغم توسعه و گسترش روز افزون مطالعات مولکولی در شناسایی و تفکیک انواع باکتریهای بیماریزا، مطالعات مولکولی در خصوص انواع انگل‌های بیماریزا در آذربایجان گزارش شده و این مطالعه اولین گزارش مولکولی در تعیین تنوع و فاصله ژنتیکی ذو گونه از انگل لرنها در ایران می‌باشد. هدف از این بررسی معرفی نشانگر ژنتیکی، امکان شناسایی مولکولی ذو گونه انگل لرنها و تعیین میزان تنوع و فاصله ژنتیکی لرنها سیبریناسه (Lernaea cyprinacea) و انگل لرنها کنتوفارینگودونی (Lernaea cetenopharyngodoni) در استانهای گیلان و خوزستان با استفاده از روش مولکولی RAPD بوده است.

مواد و روش کار

در این بررسی جمماً ۴۳ نمونه انگل لرنها مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد ۲۱ نمونه انگل لرنها کنتوفارینگودونی از ماهی آمور (۱۱ نمونه در استان گیلان و ۱۰ نمونه از استان خوزستان) و ۲۲ نمونه از لرنها سیبریناسه از گونه‌های کپور معمولی، کپور نقره‌ای و سس ماهی (۱۱ نمونه استان گیلان، ۱۱ نمونه استان خوزستان) به روش استریل جمع‌آوری (جدول ۱) و در کل اثانول ۹۵ درصد نگهداری و سپس به آزمایشگاه ژنتیک انسیتو تحقیقات بین‌المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان (رشت) منتقل گردید.

DNA ژنومی انگل لرنها با استفاده از روش فنل کلروفرم (Pourkazemi, Hillis & Moritz, 1990) تعدیل شده توسط (1996) استخراج گردید. کیفیت و کمیت DNA استخراجی با

جنس لرنها (Lernaea) متعلق به شاخه بندپایان (Arthropoda)، رده سختپوستان (Crustacea) راسته کوبه‌پودا (Copepoda) و خانواده لرنیده (Lernaeidae) می‌باشد. تاکنون ۴۰ گونه از این جنس در جهان شناسایی شده که ۳۲ گونه آن نامگذاری گردیده است (Hoffman & Meyer, 1976). لرنها سیبریناسه (Lernaea cyprinacea) و لرنها کتنوفارینگودونی (L. ctenopharyngodoni) خصوصیات مورفو‌لوجیک نزدیک بهم دارند و تنها در چند صفت با هم متفاوت هستند، گونه لرنها آکتنوفارینگودونی از ماهی آمور جداسازی و معرفی شده است و لرنها آسیبریناسه آ تعداد زیادی از کپور ماهیان را آلوده می‌سازد. در ایران مطالعات متعددی در خصوص شناسایی و پراکنش انگل لرنها صورت گرفته است. آلدگی ماهی گامبوزیا به انگل لرنها در استان مازندران (Mokhayer, 1983) گونه لنوسیسکوس (Leusiscus sp.) در دریاچه زریوار (Jazebizadeh, 1983)، در انواع کپور ماهیان شامل ماهی سیم، کپور سرگنده، کپور علفخوار در سه استان شمالی کشور و گونه‌های کپور معمولی، کپور نقره‌ای و کاراس در استان خوزستان (Jalali, 1987) شیزوسیپرس (Schizothorax altidorsalis) و شیزوتوراکس (zarudnyi) در تالاب هامون (روحانی، ۱۳۷۴) و در گونه‌های کاراس، سیاه ماهی و آمور در آبگیرهای آذربایجان غربی (میرهاشمی نسب و بازوکی، ۱۳۸۱) گزارش شده است.

در گذشته روش‌های شناسایی و تشخیص قارچ‌ها، باکتریها، ویروس‌ها و انگل‌ها بر مبنای خصوصیات ظاهری آنها بوده که در بعضی از گونه‌ها با رنگ‌آمیزی اختصاصی و یا با استفاده از پروفیل آنزیم، مقاومت به آنتی‌بیوتیک و یا تعزیز اسیدهای چرب استفاده می‌گردید (Tang *et al.*, 1997) ولی در چند سال اخیر با ابداع و توسعه روش‌های مولکولی، دریچه‌ای نو برای شناسایی طیف وسیعی از میکروگانیسم‌ها بویژه باکتریها و انگل‌های بیماریزا باز گردید (Leon; Cerro *et al.* (2002); Huys & Swings (1999); *et al.* (1994) Jensen; Tirola *et al.* (2002); Jinu & Goodwin, (2004) Welker *et al.* (2005) ; *et al.* (2002) در خصوص انگلها در سالهای اخیر تحقیقات متعددی انجام گرفته، L0 و همکاران در سال ۱۹۹۴ انگل تک یاخته بیماریزا گونه Pleistophora anguillarum در مل ماهی زاپن (Abguilla japonica) را به روش RAPD شناسایی (Abguilla japonica) در مل ماهی زاپن (Abguilla japonica) را به روش RAPD شناسایی و مطالعه کردند. در تحقیقی دیگر توالی rDNA ریبوزومی (rDNA) در چهار گونه از انگل‌های مونوزنه، جنس Lamellodiscus در سه گونه

مدل TC341) انجام گرفت. برنامه تکثیر DNA در دستگاه ترموسایکلر برای واسرته سازی اولیه (Denaturation) بمدت ۱ دقیقه در ۹۴ درجه سانتیگراد، سپس برای مرحله دوم برای اتصال (Annealing) در درجه حرارت ۹۴ درجه سانتیگراد به مدت یک دقیقه، ۳۷ درجه سانتیگراد به مدت یک دقیقه و ۷۲ درجه سانتیگراد به مدت دو دقیقه همراه با ۳۵ چرخه حرارتی، و در مرحله نهایی بسط (Extention) در ۷۲ درجه سانتیگراد به مدت پنج دقیقه انجام شد. برای ارزیابی و بررسی الگوی باندهای تولید شده، مقدار ۷ میکرولیتر از هر محصول PCR بر روی ژل پلی اکریلامید ۶ درصد (۱۵۰ ولت به مدت ۴ ساعت) الکتروفورز شد سپس ژل پلی اکریلامید با نیترات نقره با روش Creste *et al.*, (2001) رنگ آمیزی گردید.

الکتروفورز ژل آگارز یک درصد و همچنین با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر (Cecil model CE2040) ارزیابی گردید. برای یکسان سازی غلظت DNA نمونه ها، سه خزانه از DNA ژئومی لرنآ با رقت مشابه تهیه گردید. در هر واکنش PCR با حجم نهایی ۰.۵ میکرولیتر از ۲ میکرولیتر DNA (۰.۰۵ پیکامول)، ۰.۵ میکرولیتر محلول بافر ۱ درصد PCR، ۱ میکرولیتر dNTP mix با غلظت ۰.۰۲ μM، ۰.۰۲ μM میکرولیتر کلرید منیزیم (۰.۵ mM) (شرکت سیناژن)، ۱ میکرولیتر آغازگر (۰.۵ pM) (شرکت IBA آلمان) و ۱۶/۳ میکرولیتر آب مقطر استفاده شد. در این بررسی در مجموع از ۴۲ آغازگر ۱۰ نوکلئوتیدی با توالیهای مختلف استفاده گردید (جدول ۲).

واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) در تیوبهای ۰.۵ میلی لیتری Amersham Pharmacia و با استفاده از دستگاه ترموسایکلر

جدول ۱: پراکنش نمونه های جمع آوری شده از انگل لرنآ کنتوفارینگودونی و لرنآ سپریناسه آ در استانهای گیلان و خوزستان بر حسب گونه میزان و محل آلدگی به انگل

جمع	استان		محل آلدگی به انگل	گونه میزان (ماهی)	گونه انگل لرنآ	ردیف		
	خوزستان	گیلان						
۳	۳	۰	روی بدن	آمور	لرنآ کنتوفارینگودونی	۱		
۳	۰	۳	منطقه شکمی	آمور				
۸	۰	۳	باله دمی	آمور				
۲	۱	۱	باله پشتی	آمور				
۲	۱	۱	باله مخرجی	آمور				
۳	۰	۳	باله سینه ای	آمور				
۲۱	۱۰	۱۱	-	-	جمع			
۵	۵	۰	روی بدن	کپور معمولی	لرنآ سپریناسه آ	۲		
۳	۳	۰	باله دمی					
۱	۱	۰	باله مخرجی					
۲	۱	۱	باله پشتی					
۱	۱	۰	دور چشم	کپور نقره ای				
۲	۰	۲	منطقه دهان	سین ماهی				
۱	۰	۱	منطقه شکمی					
۲	۰	۲	باله مخرجی					
۳	۰	۳	باله پشتی					
۲	۰	۲	باله سینه ای	جمع				
۲۲	۱۱	۱۱						

تصاویر ژلهای بدست آمده نیز با استفاده از دستگاه مستند سازی ژل (شرکت Vilber Lourmat) ثبت و تعداد و اندازه باندها تعیین گردید.

جهت محاسبات آماری از روش امتیازدهی صفر (فاقد باند) و یک (دارای باند DNA) استفاده شد. فاصله ژنتیکی براساس روش Nei (1972) و میزان تنوع ژنتیکی درون و بین گونه‌ای با استفاده از برنامه ژنتیکی Pop Gen 3.2 (Popgen Microsoft, 1999) محاسبه گردید.

نتایج

بررسی باند DNA پس از الکتروفورز بروزی ژل آگارز نشان داد که کیفیت آنها برای آزمایشات PCR مناسب می‌باشد. از بین ۴۲ آغازگر استفاده شده در این مطالعه، دو آغازگر D2 و B2، گوی باندی یکسان (Monomorph) در هر دو گونه نشان دادند.


از ۴۰ آغازگر دیگر، باند DNA در هر دو گونه و دز دو منطقه مورد بررسی تکثیر شد که در مجموع ۳۴۹ نوار چندشکلی (Polymorphism) شمارش گردید که بیشترین نوار حاصل مربوط به آغازگر D8 با ۲۸ باند DNA و کمترین نوار تولید شده مربوط به آغازگر D14 با ۸ باند بوده است (جدول ۲). تعدادی از آغازگرها نوارهای DNA اختصاصی و مشخص جهت تفکیک دو گونه لرنه آ سیپریناسه آ و لرنه آ کتونفارینگودونی تولید نمودند (شکل ۱) که از آنها می‌توان بعنوان نشانگر ژنتیکی جهت شناسایی گونه‌های فوق استفاده نمود.

میزان تنوع ژنتیکی درون گونه‌ای متفاوت بوده بطوریکه میزان آن در نمونه‌های جمع‌آوری شده گونه لرنه آ کتونفارینگودونی در استان خوزستان صفر و در ۳۹۷ نوار DNA بررسی شده ۱۰۰ درصد تشابه ژنتیکی داشتند ولی در استان گیلان تنوع ژنتیکی اندکی در حد ۵۱/۱ درصد مشاهده گردید و با ۳۹۷ نوار DNA بررسی شده ۴۹/۹۸ درصد تشابه ژنتیکی برآورد شده است. گونه کتونفارینگودونی در دو استان گیلان و خوزستان از لحاظ ژنتیکی به میزان ۳ درصد با همدیگر اختلاف دارند و تنوع ژنتیکی در نمونه‌های بررسی شده در استان گیلان بیشتر از استان خوزستان بوده است.

از ۳۹۷ نوار DNA بررسی شده لرنه آ سیپریناسه آ در استان گیلان، به میزان ۷۸/۳ درصد تفاوت ژنتیکی مشاهده گردید ولی در استان خوزستان این مقدار خیلی بیشتر و به ۴۶/۲۷ درصد رسید. این امر بیانگر آن است که میزان تنوع ژنتیکی در نمونه لرنه آ سیپریناسه آ استان خوزستان بمیزان ۲۶/۷ برابر میزان تنوع ژنتیکی این گونه در استان گیلان می‌باشد. اما در مقایسه گونه‌ای از لحاظ ژنتیکی، با شمارش ۳۹۷ نوار DNA در دو گونه لرنه آ سیپریناسه آ و لرنه آ کتونفارینگودونی، در ۴۹/۳ درصد مورد، حالت پلی‌مورفیسم (چندشکلی) مشاهده گردید که به میزان ۹۱/۸۷ درصد تفاوت ژنتیکی با یکدیگر داشته و این بیانگر آن است که در زنوم دو گونه لرنه آ سیپریناسه آ و لرنه آ کتونفارینگودونی، تمایز ژنتیکی بالایی وجود دارد.

جدول ۲: اسامی، توالی آغازگرها و تعداد باند DNA تولید شده پس از الکتروفورز محصول PCR بر روی ڈل پلی آکریلامید

شماره	نام آغازگر	توالی آغازگر	تعداد باند شمارش شده
۱	B-01	5'-GTT TCG CTC C- 3'	۱۵
۲	B-03	5'-CAT CCC CCT G- 3'	۱۵
۳	B-04	5'-GGA CTG GAG T- 3'	۲۰
۴	B-05	5'-TGC GCC CTT C- 3'	۱۴
۵	B-06	5'-TGC TCT GCC C- 3'	۱۲
۶	B-07	5'-GGT GAC GCA G- 3'	۱۵
۷	B-10	5'-CTG CTG GGA C- 3'	۲۰
۸	B-11	5'-GTA GAC CCG T- 3'	۲۱
۹	B-15	5'-GGA GGG TGT T- 3'	۱۵
۱۰	B-16	5'-TTT GCC CGG A- 3'	۱۱
۱۱	B-17	5'-AGG GAA CGA G- 3'	۲۱
۱۲	D-05	5'-TGA GCG GAC A- 3'	۱۶
۱۳	D-07	5'-TTG GCA CGG G- 3'	۲۳
۱۴	D-08	5'-GTG TGC CCC A- 3'	۲۸
۱۵	D-09	5'-CTC TGG AGA C- 3'	۱۶
۱۶	D-10	5'-GGT CTA CAC C- 3'	۱۳
۱۷	D-12	5'-CAC CGT ATC C- 3'	۱۴
۱۸	D-13	5'-GGG GTG ACG A- 3'	۱۰
۱۹	D-14	5'-CTT CCC CAA G- 3'	۸
۲۰	D-15	5'-CAT CCG TGC T- 3'	۱۹
۲۱	D-16	5'-AGG GCG TAA G- 3'	۱۸
۲۲	D-18	5'-GAG AGC CAA C- 3'	۱۴
۲۳	D-19	5'-CTG GGG ACT T- 3'	۲۴
۲۴	D-20	5'-ACC CGG TCA C- 3'	۲۱
۲۵	N-01	5'-CTC ACG TTG G- 3'	۱۲
۲۶	N-02	5'-ACC AGG GGC A- 3'	۲۳
۲۷	N-03	5'-GGT ACT CCC C- 3'	۹
۲۸	N-04	5'-GAC CGA CCC A- 3'	۱۱
۲۹	N-05	5'-ACT GAA CGC C- 3'	۱۰
۳۰	N-06	5'-GAG ACG CAC A- 3'	۲۲
۳۱	N-07	5'-CAG CCC AGA G- 3'	۲۲
۳۲	N-08	5'-ACC TCA GCT C- 3'	۱۹
۳۳	N-09	5'-TGC CGG CTT G- 3'	۲۱
۳۴	N-10	5'-ACĀ ACT GGG G- 3'	۲۱



شکل ۱: محصول PCR الکتروفورز شده بر روی ژل پلی آکریلامید ۶ درصد و رنگ آمیزی با نیترات نقره با استفاده از آغازگر N-09 [ستونهای ۱-۷ مربوط به لرنهآ کنوفارینگودونی، ستون M مارکر مولکولی 100 bp) و بقیه ستونها مربوط به لرنهآ سپریناسهآ میباشد. مارکر اختصاصی شناسایی گونه با پیکان نشان داده شده است].

بحث

جایگاه طبقه بندی آنها مشاهده شده است. بطوریکه میکسوسپورهآ که مدت‌ها در گروه تک یاخته‌ها طبقه بندی شده بودند، بعد از مطالعات مولکولی انجام شده به نظر گروهی از محققین مشخص گردیده که این انگلها به شاخه پر یاخته‌ها نزدیک هستند.

نتایج این بررسی نشان داده است که میزان تنوع ژنتیکی انگل لرنهآ کنوفارینگودونی در استان گیلان (۱/۵۱ درصد) بیشتر از استان خوزستان (صفر) است ولی در خصوص انگل لرنهآ سپریناسهآ میزان تنوع ژنتیکی در نمونه‌های جمع‌آوری شده استان خوزستان (۲۷/۴۶ درصد) به میزان ۷/۲۶ برابر بیشتر از استان گیلان (۳/۷۸ درصد) بوده است. علت این تفاوت می‌تواند مربوط به میزان گسترش و پراکندگی انگل لرنهآ در استان خوزستان باشد. زیرا بچه ماهیان مورد نیاز پرورش خود را از استانهای مختلف تأمین می‌نماید. علاوه بر پراکنش جغرافیایی، گونه میزبان می‌تواند مؤثر باشد اکثر نمونه‌های انگل لرنهآ سپریناسهآ جداسازی شده در استان گیلان از گونه سس ماهی (۱۰ نمونه) بوده و ۱ نمونه انگل از ماهی کپور معمولی جداسازی

کیفیت و کمیت DNA بدست آمده از انگل‌های لرنهآ کنوفارینگودونی و لرنهآ سپریناسهآ با استفاده از روش فل - کلروفرم بیانگر آن است که می‌توان DNA ژنومی انگلها را بخوبی به روش فوق استخراج کرد و بر روی ساختار ژنتیکی آنها مطالعات مولکولی انجام داد. استفاده از روش RAPD برای شناسایی و تفکیک انگل‌ها موفقیت‌آمیز بود و نتایج این بررسی نشان داد که آغازگرهای تصادفی (Random Primers) می‌توانند بخش‌هایی از DNA هسته را تکثیر و نوارهای DNA را تولید نمایند که در تشخیص گونه و یا جمعیت‌های مختلف آن کاربرد داشته باشند. استفاده از روش‌های مولکولی در مورد شناسایی تک یاخته بیماری‌ای *P. anguillarum* در مار ماهی ژاپن موفقیت‌آمیز بوده است (Lo et al., 1994) همچنین با استفاده از این روش تعداد زیادی از انگل‌های پر یاخته مانند مونوژنه آ Smother et al., (Desderves et al., 2000) میکسوسپورهآ (Bush et al., 2001; Kent et al., 2001; 1994) و اسکاریدها (Kijewska et al., 2002) مطالعه شده اند و تغییرات زیادی در

منابع

- روحانی، م. ، ۱۳۷۴. بررسی آلودگیهای انگلی ماهیان تلاطم هامون، مهندسین مشاور آبزی گستر، تهران.
- میرهاشمی نسب، ف. و پازوگی، ج. ، ۱۳۸۱. شناسایی انگلهای سخت پوست برخی از ماهیان دریاچه مخزنی مهاباد. مجله علمی شیلات ایران، شماره ۴، صفحات ۱۲۳ تا ۱۴۸.
- Bush, A.O. ; Fernandez, J.C. ; Esch, G.W. and Seed, J.R. , 2001.** Parasitism: The diversity and ecology of animal parasites. Cambridge University Press. 516P.
- Cerro, A.D. ; Marquez, I. and Guijarro, J.A. , 2002.** Simultaneous detection of *Aeromonas salmonicida*, *Flavobacterium psychrophilum*, and *Yersinia ruckeri*, Three Major Fish Pathogens, by Multiplex PCR. Applied and environmental microbiology. pp.5177-5180.
- Creste, S. ; Tulmann Neto, A. and Figueira A. , 2001.** Detection of single sequence repeat polymorphisms in denaturing polyacrylamide sequencing gels by silver staining. Olan Molecular Biology Reporter 19:pp. 299-306.
- Desdevines, Y.; Jovelin, R.; Jousson, O. and Morand, S. , 2000.** Comparison of ribosomal DNA sequences of *Lamellodiscus spp.* (Monogenea, Diplectanidae) parasitising *Pagellus* (Sparida, Teleostei) in the North Mediterranean Sea: species divergence and coevolutionary inter-action. International Journal of Parasitology, Vol.30, No. 6, pp.741-746.
- Eisenstein, B.I. , 1990.** The polymerase chain reaction: A new method of using molecular genetics for medical diagnosis. N. Engl. J. Med., Vol. 322, pp.78-183.

و مورد بررسی قرار گرفت و برای نتایج قطعی‌تر در مطالعات آتی، توصیه می‌گردد از نمونه انگل لرنه آ ماهی کپور معمولی بیشتری در استان گیلان جمع آوری گردد. انگل لرنه آ کتنوفارینگوودونی از ماهی آمور جداسازی گردید.

در مقایسه ژنتیکی ۲ گونه انگل لرنه آ کتنوفارینگوودونی و سپرنسه آ مشخص گردید که به میزان ۸۷/۹ درصد تفاوت ژنتیکی دارند لذا به آسانی می‌توان با انجام PCR دو گونه را از همدیگر تفکیک نمود و از باندهای DNA تولید شده برای شناسایی هر گونه استفاده کرد.

روش RAPD استفاده شده در این بررسی با ۴۲ آغازگر، بعنوان اولین تحقیق در زمینه ژنتیک مولکولی انگلهای آبزیان در ایران است. برای تداوم مطالعات مولکولی می‌توان از آغازگر های بیشتر (۳۰۰ آغازگر)، و نمونه‌های انگل زیادتر در استانهای مختلف استفاده کرد و یا سایر روش‌های مولکولی از قبیل AFLP, RFLP, RT-PCR, Microsatellite (Gil et al. 2004) که حساسیت بیشتر و قابلیت تکرارپذیری دقیق‌تری دارند (Eisenstein, 1990 ; Tang et al. 1997

با توجه به نوپا بودن بررسی مولکولی انگلهای انجام مطالعات جامع ضروری است تا جایگاه تاکسونومی آنها مشخص گردد. مطمئناً با انجام مطالعات مولکولی در زمینه شناسایی انواع بیماریهای آبزیان علاوه بر دستیابی به دانش پایه و بنیادی، می‌توان از لحاظ کاربردی، نقش مؤثری در افزایش راندمان تولید در آبزی پروری کشور از طریق کاهش تلفات ماهی و میگو ایفاء نمود.

تشکر و قدردانی

این تحقیق با حمایت مالی مؤسسه تحقیقات شیلات ایران در آزمایشگاه ژنتیک مولکولی انسٹیتو تحقیقات بین‌المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان به انجام رسید. از مسئول و کارشناسان محترم بخش ژنتیک انسٹیتو تحقیقات و بخش آبزی پروری مرکز تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور (استان خوزستان) که در آزمایشات مولکولی و جمع آوری نمونه‌ها کمک نمودند، قدردانی می‌گردد.

- Gil, B.G. ; Rodriguez, S. ; Gasca, A.G. ; Roque, A. ; Juarez, R.V. ; Fabiano, L. ; Mpson, T. and Swings, J. , 2004. Molecular identification of *Vibrio harveyi* related isolates associated with diseased aquatic organisms. Micro-biology. Vol. 150, pp.1769-1777.
- Hillis, D.M. and Moritz, C. , 1990. Molecular taxonomy. Sinauer Association. Inc. Publishers. Massachusetts.
- Hoffman, G.L. and Meyer, E.P. , 1976. Parasites of freshwater fishes. The anchor worm and related species. Fish disease leaflet. T.F.H. Publication, U.S.A.
- Huys, G. and Swings, J. , 1999. Evaluation of a fluorescent amplified fragment length polymorphism (FAFLP) methodology for the genotypic discrimination of *Aeromonas* taxa. FEMS Microbiology Letters 177, pp.83-92.
- Jalali, B. , 1987. Lernaeasis in Cyprinid cultured fish in Iran. University of Goldolo, Hungary. Presented as a thesis as one year training course on fish disease. 39P.
- Jazebizadeh, K. , 1983. Study on parasitic diseases in lake of Zarivar fishes (In Persian). Environmental Protection Organization of Iran.
- Jensen, S. ; Bergh, O. ; Enger, O. and Hjeltnes, B. , 2002. Use of PCR-RFLP for genotyping 16s rRNA and characterizing bacteria cultured from halibut fry. Can. J. Microbiol. Vol. 48, pp.379-386.
- Jinu, S. T.,and Goodwin, A. E. 2004. Morphological and genetic characteristics of *Flavobacterium columnare* isolates: correlations with virulence in fish. Journal of fish diseases. 27,pp. 29-35.
- Kent, M.I. ; Andree, K.B. ; Bartholomew, J.L. ; El-Matbouli, M. ; Desser, S.S. ; Devlin, R.H. ; Stephen, W.F. ; Hedrik, R.P. ; Hoffmann, R.W. ; Khattri, J. ; Mallett, S.L. ; Siddall, M.E. ; Lester, R.J.G. ; Longshaw, M. ; Palenozeula, O. and Xiao, C. , 2001. Recent advances in our knowledge of the Myxozoa. The Journal Eukaryotic Microbiology. Vol. 84, No. 4, pp.593-314.
- Kijewska, A. ; Rokicki, J. ; Sitko, J. and Wegrzyn, G. , 2002. Ascarioidea: A simple DNA assay for identification of 11 species infecting marine and freshwater fish, mammals, and fish-eating birds. Experimental Parasitology. Vol. 101, No. 1, pp.35-39.
- Leon, G. ; Martinez, M.A. ; Etchegaray, J.P. ; Figueroa. M.I.V.J. and Krauskopf, M. , 1994. Specific DNA probes for the identification of the fish pathogen. *Renibacterium salmoninarum*. World J. Microbiol. Biotech. Vol. 10, pp.149-153.
- Lo, CF. ; Lieu, J. ; Leu, J.H. ; Wang, C.H. and Kou, GH. , 1994. The molecular pathogenesis of *Pleistophora anguillarum* in Japanese eel (*Anguilla japonica*). Proceeding of the International Symposium on Biootechnology in Aquaculture, December 5-10th, Taipei, Taiwan.
- Mokhayer, B. , 1983. Parasites and parasitic diseases of fish. The first international symposium of Ichthyoparasitology, Ceeske Budejovice, 8-13 Aug.
- Nei, M. , 1972. Genetic distance between populations, American Naturalist. Vol. 106, pp.283-292.
- Popgene Microsoft Window-based for Population Genetic Analysis , 1999. A joint Project

- Development by Francis C. Yeh and Rong-cai Yang, University of Alberta and Tim Boyle, Centre for International Forestry Research,
- Pourkazemi, M.** , 1996. Molecular and biochemical genetic analysis of sturgeon stocks from the South Caspian Sea. Ph.D. Thesis. 266P.
- Smother, J.F. ; Von Dohlen, C.D. ; Smith, Jr. L. H. and Kent, M.L.** , 1994. Molecular evidence that the Myxooan Protists are metazoan. Sciences. Vol. 265, pp.1719-1721.
- Tang, Y.W. ; Procop, G.W. and Persing, D.H. , 1997.** Molecular diagnostics of infectious diseases. Clinical chemistry. Vol. 43, pp.2021-2038.
- Tiirola, M. ; Valtonen, E.T. ; Kinnunen, P.R. and Kulomaa, M.S.** , 2002. Diagnosis of flavor-bacteriosis by direct amplification of rRNA genes. Dis. Aquat. Org. Vol. 51, pp.93-100.
- Welker, T.L. ; Shoemaker, C.A. ; Arias, C.R. and Klesius, P.H.** , 2005. Transmission and detection of *Flavobacterium columnare* in channel catfish *Ictalurus punctatus*. Dis. Aquat. Org. Vol. 63, pp.129-138.

Introducing molecular markers for *Lernaea cyprinacea* and *Lernaea ctenopharyngodoni* using RAPD technique

Pourkazemi M.^{(1)*}; Asadyan H.⁽²⁾; Pazooki J.⁽³⁾; Masoumian M.⁽⁴⁾ and
Ebrahimzadeh Mossavi H.A.⁽⁵⁾

pkazemi_m@yahoo.com

1- International sturgeon Research Institute, P.O.Box: 41635-3464 Rasht, Iran

2- Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Karaj Branch

3- Biological Science Faculty of Shahid Beheshti University, Tehran

4- Iranian Fisheries Research Organization, P.O.Box: 14155-6116 Tehran, Iran

5- Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, P.O.Box: 14155-6453 Tehran, Iran

Received: May 2006

Accepted: September 2007

Keywords: RAPD, PCR, *Lernaea cyprinacea*, *Lernaea ctenopharyngodoni*, Guilan Province, Khouzestan Province

Abstract

Molecular comparison of two parasites *Lernaea cyprinacea* and *Lernaea ctenopharyngodoni* was carried out using RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) technique. A total of 43 *Lernaea* specimens belonging to the two species were collected from the Guilan and Khouzestan Provinces. DNA was extracted using the Phenol-chloroform method. The quality and quantity of DNA was assessed using 1% Agarose gel electrophoresis and spectrophotometer. Polymerase Chain Reaction (PCR) was conducted on the target DNA under specific conditions and PCR products were subjected to electrophoresis on polyacrylamide gels (6%). Polyacrylamide gels were stained using silver nitrate and DNA bands were analyzed with BioCapt software. The genetic analysis was conducted using POP GEN 32 software.

Forty two primers, 10 nucleotides each were used for PCR reaction. Totally, 397 RAPD loci were counted on polyacrylamide gel where 349 identical loci were polymorphic of which some bands may be used as genetic markers for the identification of both *Lernaea* species. Data analysis on PCR products showed higher genetic variation (1.15%) of *Lernaea ctenopharyngodoni* in the Guilan Province as compared to that of the Khouzestan (0.0%). However, genetic variation (27.46%) of *Lernaea cyprinacea* in the Khouzestan province was 7.26 times higher than that of the Guilan province (3.78%). The two species showed a genetic differentiation of approximately 88%. Based on the observed molecular differences, we state that *Lernaea ctenopharyngodoni* is a genetically independent species from *Lernaea cyprinacea*.

* Corresponding author