

میزان تاثیر اسانس مرزه (*Satureja hortensis*) در جلوگیری از

تولید سم آفلاتوکسین در غذای آبزیان

لاله یزدانپناه گوهرریزی^{(۱)*}؛ ابوالفضل سپهداری^(۲)؛ عیسی شریف پور^(۳)؛

مصطفی شریف روحانی^(۴) و داوود درویشی^(۵)

I_yazdanpanah@yahoo.com

۱ و ۵- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بخش تحقیقات شیلات، کرمان صندوق پستی: ۷۶۱۷۹۱۳۷۳۹

۲، ۳ و ۴- موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران، تهران صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۱۶

تاریخ دریافت: آبان ۱۳۹۰ تاریخ پذیرش: شهریور ۱۳۹۱

چکیده

این تحقیق بمنظور بررسی امکان استفاده از مواد طبیعی از قبیل اسانس مرزه در جلوگیری از تولید آفلاتوکسین در خوراک آبزیان در سال ۹۰-۱۳۸۹ انجام گردید. پس از تهیه اسانس مرزه و اندازه گیری میزان مواد موثره از قبیل تیمول و کارواکرول با روش GC، ابتدا میزان بالاترین اثرگذاری اسانس را بر علیه قارچ آسپرژیلوس فلاووس در محیط کشت PDA بررسی و سپس در خوراک آبزیان مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا میزان ۳۰۰ گرم از نمونه خوراک آبزیان را در ظروف درب دار ریخته و سپس نمونه ها توسط دستگاه اتوکلاو استریل گردیدند و مقدار ۲ سی سی از سوسپانسیون قارچ به نمونه های خوراک اسپری شد. سپس غلظت های مختلف اسانس (۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۵۰۰ و ۶۰۰ ppm) به میزان ۳ سی سی در ۳ تکرار به خوراک افزوده گردید. نمونه ها در دمای با میانگین (\pm انحراف معیار) 28 ± 2 درجه سانتیگراد انکوبه گردیدند. پس از اتمام هر دوره در مقاطع ۲۰، ۴۰ و ۶۰ روزه بصورت تصادفی از ظروف نمونه برداری و برای اندازه گیری میزان تولید آفلاتوکسین های B_1 ، B_2 ، G_1 و G_2 به آزمایشگاه ارسال گردید. نتایج نشان دادند که اسانس مرزه در غلظت های ۵۰۰ ppm و بالاتر، دارای خاصیت ضد قارچی قوی بر علیه آسپرژیلوس فلاووس می باشد و میزان تولید آفلاتوکسین B_1 را پس از ۶۰ روز به حدود صفر می رساند.

کلمات کلیدی: تغذیه آبزیان، گیاهان دارویی، سموم قارچی

* نویسنده مسئول

مقدمه

آفلاتوکسین B₁ یکی از قویترین آفلاتوکسین‌های عامل ایجاد کننده سرطان بطور طبیعی در حیوانات می‌باشد. اولین شیوع آفلاتوکسیکوزیس ماهی در تخم‌گشایی ماهی قزل‌آلا در سال ۱۹۶۰ اتفاق افتاد. در ماهی قزل‌آلای رنگین کمان پرورشی که با غذاهای دان آماده شده با ترکیب تخم پنبه آلوده به آفلاتوکسین‌ها تغذیه شده بودند تومورهای کبدی گسترش یافت (مسکوکوی و مرتضوی، ۱۳۸۳). اگرچه تخم پنبه آلوده به مدت طولانی بعنوان اجزای اصلی در ترکیب غذا استفاده نشده بود با وجود این بیش از ۸۵ درصد ماهی‌ها در این تخم‌گشایی تلف شدند. انبار کردن نادرست همه مواد غذایی و تغذیه با غذاهای آلوده باعث آلودگی به آفلاتوکسین‌ها می‌شود. آفلاتوکسیکوزیس اکنون در صنعت ماهی قزل‌آلای رنگین کمان بدلیل مقررات سخت اداره دارو و غذای ایران (F.D.A) بعلت غربالگری آفلاتوکسین در دانه‌های روغنی، ذرت و سایر اجزای خوراکی محدود شده است. به هر حال این سم ماهیان پرورشی گرمابی مانند تیلاپیا و گربه ماهی را بدلیل اجزای گیاهی نسبت به اجزای حیوانی، بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهد. به این دلیل افزایش پتانسیل گسترش آفلاتوکسیکوزیس ماهیان گرمابی سریع مورد توجه قرار گرفت که اجزای گیاهی پتانسیل بالاتری نسبت به اجزای حیوانی برای آلودگی با آفلاتوکسین‌ها دارند. در شرایط گرمسیری و نیمه گرمسیری، پتانسیل گسترش آفلاتوکسیکوزیس بعلت انبار کردن مواد غذایی تحت شرایط رطوبت و حرارت بالا افزایش می‌یابد. غذای آلوده به سم آفلاتوکسین علاوه بر ضربه اقتصادی، باعث تلفات شدید در حیوانات می‌شود (Irkin & Korukluoglu, 2007). غلظت‌های مختلف آفلاتوکسین B₁ روی تیلاپپای نیل ۲/۷ گرمی بررسی شد (Gowda et al., 2004). ماهی‌هایی که با جیره غذایی محتوی ۲/۵، ۱۰ یا ۱۰۰ میلی‌گرم آفلاتوکسین B₁ در هر کیلوگرم غذا به مدت ۸ هفته تغذیه شده بودند کاهش وزن و کاهش شمار سلولهای خونی را نشان دادند. ماهیان تغذیه شده به میزان ۱۰ میلی‌گرم آفلاتوکسین B₁ در هر کیلوگرم غذا ناهنجاری کبدی را نشان دادند و ماهیانی که با ۱۰۰ میلی‌گرم آفلاتوکسین B₁ در هر کیلوگرم غذا تغذیه شده بودند کاهش وزن به همراه آسیب کبدی مشاهده شد. ۶۰ درصد ماهی‌ها نیز در پایان آزمایش تلف شدند. ماهی قزل‌آلای رنگین کمان تغذیه شده با جیره حاوی ۰/۰۰۰۴ میلی‌گرم آفلاتوکسین B₁ در هر کیلوگرم غذا (۰/۴ppb) به مدت ۱۵ ماه احتمالاً به

۱۳۸

میزان ۱۴ درصد تومورها گسترش می‌یابند در ماهی قزل‌آلای رنگین کمان تغذیه شده با جیره حاوی ۰/۰۲ آفلاتوکسین B₁ در هر کیلوگرم غذا (۲۰ ppb) به مدت ۸ ماه میزان شیوع تومورهای کبدی ۵۸ درصد و با ادامه تغذیه به مدت ۱۲ ماه میزان شیوع تومورها به ۸۳ درصد رسید. گربه ماهی تغذیه شده با جیره حاوی ۱۰ میلی‌گرم آفلاتوکسین B₁ در هر کیلوگرم غذا (۱۰۰۰۰ ppb) به مدت ۱۰ هفته کاهش سرعت رشد و زخم‌های داخلی خفیف را نشان دادند (Gowda et al., 2003).

انبار کردن نامناسب مواد غذایی یکی از متداولترین عوامل مستعد کننده برای رشد آفلاتوکسین و تولید کپک می‌باشد و می‌تواند توسط پرورش‌دهنده ماهی کنترل شود (Dikbas et al., 2008).

امروزه در پی افزایش مقاومت میکروبی و هزینه‌های سنگین درمان بیماری همراه با فشار مصرف‌کنندگان به تولید فرآورده‌های عاری از دارو و محدودیت استفاده از این فرآورده‌ها در بسیاری از کشورها محققین بدنبال ترکیباتی هستند که بتوان از آنها به جای آنتی بیوتیک‌ها در رژیم غذایی آبزیان استفاده کنند (Rasooli et al., 2006). گیاه مرزه گیاهی است که در تمامی کشور قابل کشت و برداشت بوده و بالغ بر ۳۰ هکتار سطح زیر کشت در کشور موجود است و دارای خاصیت ضد قارچی قوی می‌باشد (Sanchez et al., 2005; Razzaghi- Abyaneh et al., 2008) و از هر ۱۰۰ گرم مرزه تقریباً ۲ تا ۵ سی‌سی اسانس بدست می‌آید.

هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر بخشی اسانس مرزه در جلوگیری از رشد قارچ و تولید آفلاتوکسین روی خوراک آبزیان است. لذا با افزودن اسانس مرزه به خوراک آبزیان و آنالیزهای انجام شده اثر بخشی این اسانس در جلوگیری از تولید توکسین بررسی گردید.

مواد و روش کار

در این طرح از اسانس مرزه (*Satureja hortensis*) و سوش قارچ اسپرژیلوس فلاووس PTCC5006IR6 و خوراک آبزیان که از کارخانه چینه تهیه شده بود، استفاده گردید. اسانس از گیاه مرزه که در باغ کشاورزی شرکت گلکاران کاشان کاشت شده بود توسط دستگاه اسانس‌گیر با بخار آب تهیه و در

گذشت ۴۰ روز و سومین نمونه برداری نیز پس از گذشت ۶۰ روز انجام گردید و نمونه‌ها به آزمایشگاه منتقل و نتایج دریافت شد. آفلاتوکسین با استفاده از دستگاه HPLC و با روش آزمون ISIRI6872 انجام گرفت.

برای شناسایی ترکیب‌های اسانس از دستگاه GC (گاز کروماتوگرافی) و گاز کروماتوگرافی متصل شده به طیف سنج جرمی (GC/MS) استفاده شد. پس از تزریق اسانس به دستگاه‌های فوق، با استفاده از زمان بازداری ترکیبات (tr) اندیس بازداری (RI) طیف جرمی و مقایسه این مولفه‌ها با ترکیب‌های استاندارد یا با اطلاعات موجود در کتابخانه‌ها و نرم‌افزار Saturn ترکیب‌های تشکیل دهنده اسانس‌ها مورد بررسی کیفی و کمی قرار گرفت.

کروماتوگراف گازی مدل Shinadzu-9A مجهز به دتکتور F.I.D (یونیزاسیون شعله هیدروژن) و داده پرداز Chromatepac ستون DB-5 و بطول ۳۰ متر و قطر ۰/۲۵ میکرون و ضخامت لایه فاز ساکن برابر ۰/۲۵ میکرون گاز حامل هلیوم سرعت جریان گاز حامل ۲۲/۷ سانتیمتر در ثانیه و انرژی یونیزاسیون در طیف‌سنج جرمی معادل ۷۰ الکترون ولت بود. برنامه حرارتی ۱۰۰ تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد با سرعت ۲ درجه سانتیگراد در دقیقه و دمای محفظه تزریق ۲۳۰ درجه سانتیگراد بود.

از گاز کروماتوگراف گازی Varin-3400 متصل شده به طیف سنج جرمی (Saturn 2) مجهز به ستون DB-5 بطول ۳۰ متر و قطر ۰/۲۵ میلی‌متر و ضخامت لایه فاز ساکن برابر ۰/۲۵ میکرون استفاده شد. دتکتور Ion trap گاز حامل هلیوم سرعت جریان گاز حامل ۵۰ سانتیمتر در ثانیه و انرژی یونیزاسیون در طیف‌سنج جرمی معادل ۷۰ الکترون ولت بوده است. برنامه حرارتی ۶۰ تا ۲۴۰ درجه سانتیگراد با سرعت ۳ درجه سانتیگراد در دقیقه و دمای محفظه تزریق ۲۵۰ درجه سانتیگراد بود.

اطلاعات جمع‌آوری شده در نرم‌افزار Excel و SPSS ثبت، تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS14 از طریق ANOVA (آنالیز واریانس یکطرفه و مقایسه میانگین‌ها به روش LSD) انجام شده و جهت رسم منحنی‌ها و نمودارها از نرم‌افزار Excel استفاده گردید.

نتایج

نتایج در شرایط *In vitro* نشان داد که اسانس گیاه مرزه دارای خاصیت ضد قارچی قوی بر علیه قارچ آسپرژیلوس فلاووس ۱۳۹

یخچال در دمای ۴ درجه سانتیگراد در طول انجام آزمایش نگهداری گردید.

قارچ پاتوژن آسپرژیلوس فلاووس PTCC5006 که ایزوله‌ای از مغز پسته شهرستان رفسنجان در استان کرمان بود و در بخش کلکسیون قارچ‌ها و باکتری‌های صنعتی ایران توسط متدهای مورفولوژیک استاندارد شناسایی و تحت عنوان قارچ با توکسین‌زایی بالا و بصورت لیوفیلیزه برای انجام طرح در اختیارمان قرار گرفت. ابتدا قارچ را در محیط کشت PDA به مدت ۱۰ روز در دمای با میانگین (\pm انحراف معیار) 28 ± 2 درجه سانتیگراد گرم خانه‌گذاری کرده تا تولید اسپور کند. از این محیط کشت پس از ۴ مرحله پاساژ و تهیه کشت خالص استفاده گردید. پس از انجام آزمایش در محیط کشت در شرایط *In vitro* و تعیین موثرترین غلظت بازدارندگی رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس مرحله بعدی کار که بررسی نقش اسانس مرزه در خوراک آبزیان جهت جلوگیری از تولید آفلاتوکسین بود، انجام گردید. بدین صورت که ابتدا خوراکیها را با اوزان مساوی به مقدار ۳۰۰ گرم در ظروف دربدار توزین و برای هر غلظت ۳ تکرار در نظر گرفته شد. ظروف آماده شده را در دستگاه اتوکلاو قرار داده و در حرارت ۱۲۱ درجه سانتیگراد به مدت ۱۵ دقیقه استریل گردید. پس از استریل شدن خوراکیها ظروف در دسته‌های ۱۸ تایی تقسیم شدند، سپس میزان‌های مختلف غلظت اسانس (۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۵۰۰ و ۶۰۰) بسته به وزن خوراک با ۳ سی سی آب مقطر استریل (جهت تامین میزان رطوبت) در شرایط کاملا استریل و زیر هود میکروبی مخلوط گردید. برای نمونه‌های شاهد بعنوان جایگزین اسانس مرزه فقط از آب مقطر استریل استفاده گردید. سوسپانسیون اسپور نیز پس از آماده نمودن به میزان ۲ سی سی به تمامی نمونه‌های خوراک اضافه گردید. سپس ظروف را در انکوباتور با میانگین (\pm انحراف معیار) دمای 28 ± 2 درجه سانتیگراد قرار داده و پس از هر ۲۴ ساعت یکبار محیطها را تکان داده تا از نظر اکسیژن رسانی کل محیط در شرایط یکسان قرار گیرند و با توجه به اینکه اسانس مرزه حالت فرار دارد میزان ماده‌ای که در سطح قرار گرفته بود با تکان دادن در سراسر محیط پخش شود. همچنین آلودگی قارچی نیز در تمام محیط یکسان پخش گردد. شرایط نور، دما، اکسیژن برای تمامی نمونه‌ها یکسان بود. اولین نمونه برداری پس از گذشت ۲۰ روز بصورت تصادفی انجام شد و هر ظرف بصورت سربسته سریعا به آزمایشگاه برای اندازه‌گیری میزان آفلاتوکسین ارسال گردید. دومین نمونه برداری پس از

در شرایط آزمایشگاهی می باشد. پس از انجام این عملیات نتایج بدست آمده نشان دادند که غلظت ۵۰۰ ppm و بالاتر بیشترین تاثیر را در کاهش میزان آفلاتوکسین در خوراک دام دارد. جدول ۱ تا ۳ تاثیر پذیری میزان تولید آفلاتوکسین را در دوره های مختلف زمانی و غلظت های مختلف استفاده از اسانس مرزه و نمونه شاهد نشان می دهند.

اثر غلظت اسانس روی میزان آفلاتوکسین B₁ در سطح ۱ درصد معنی دار است یعنی با احتمال ۹۹ درصد اطمینان یا عبارتی با احتمال کمتر از ۱ درصد خطا می توان گفت که بین میانگین تیمارهای مورد بررسی (چهار غلظت + شاهد) اختلاف معنی دار وجود دارد. با مقایسه میانگین به روش دانکن در جدول ۴ و ۵ مشخص شد بین تاثیر غلظت های مختلف اسانس در این آزمایش (غلظت های ۴۰۰، ۵۰۰ و ۶۰۰ ppm) اختلاف معنی داری وجود ندارد و در یک گروه قرار می گیرند ولی بین این ۳ غلظت و غلظت های ۳۰۰ ppm و شاهد، اختلاف در سطح ۱ درصد وجود دارد بطوریکه شاهد و غلظت ۳۰۰ ppm نیز در یک گروه

جداگانه قرار گرفت. همچنین با توجه به نتایج آنالیز در جدول ۱ اثر زمانها (۲۰، ۴۰ و ۶۰ روز) روی آفلاتوکسین B₁ در سطح ۵ درصد معنی دار است که بیانگر تاثیر مدت زمان مواجهه اسانس بر تولید آفلاتوکسین در تیمارهای آزمایشی است. فاکتور زمان روی میزان اسانس بر آفلاتوکسین در تیمارهای آزمایشی می باشد و اختلاف معنی داری را در سطح ۵ درصد ایجاد می نماید که با توجه به مقایسه میانگین زمانهای مختلف مشخص شد که زمان ۲۰ روز و ۶۰ روز اختلاف معنی دار مشخصی در سطح ۵ درصد داشتند که در دو گروه جداگانه (A و B) قرار گرفتند و اثر تیمار ۴۰ روز در گروه حد واسط این دو گروه یعنی AB قرار می گیرد که اختلاف این گروه با هر کدام از دو گروه A و B به تنهایی معنی دار نیست. چون مقادیر آفلاتوکسین B₂ در غلظت ها و در زمانهای مختلف همگی صفر بودند لذا تجزیه واریانس برای این صفت انجام نگردیده است که مویید تاثیر مثبت غلظت مختلف بکار گرفته شده از اسانس برای حذف آفلاتوکسین B₁ در تیمارهای آزمایشی است.

جدول ۱: مقایسه میزان آفلاتوکسین B₁ پس از ۳ دوره زمانی ۲۰، ۴۰ و ۶۰ روز در غلظت های مختلف ۴۰۰، ۵۰۰ و ۶۰۰ ppm اسانس مرزه و نمونه شاهد (میکروگرم در گرم)

زمان (روز) ↓		غلظت اسانس مرزه (ppm)	
۲۰	۴۰	۶۰	
۰/۵۳	۰/۵۸	۰	غلظت ۴۰۰
۰/۵۶	۰/۲۲	۰	غلظت ۵۰۰
۰/۵۶	۰/۱۵	۰	غلظت ۶۰۰
۰/۲۳	۰/۵۷	۱/۱۳	نمونه شاهد بدون افزودن اسانس مرزه

جدول ۲: مقایسه میزان آفلاتوکسین G₁ پس از ۳ دوره زمانی ۲۰، ۴۰ و ۶۰ روز در غلظت های مختلف ۴۰۰، ۵۰۰ و ۶۰۰ ppm اسانس مرزه و نمونه شاهد

زمان (روز) ↓		غلظت اسانس مرزه (ppm)	
۲۰	۴۰	۶۰	
۲/۱۰	۱/۱۱	۰/۴۸	غلظت ۴۰۰
۱/۱۹	۰/۶۴	۰/۲۴	غلظت ۵۰۰
۰/۸۷	۰/۴۴	۰/۱۵	غلظت ۶۰۰
۰/۲۰	۱/۲۱	۱/۴۹	نمونه شاهد بدون افزودن اسانس مرزه

جدول ۳: مقایسه میزان کل آفلاتوکسین‌های B_1, B_2, G_1, G_2 پس از ۳ دوره زمانی ۲۰، ۴۰ و ۶۰ روز در غلظت‌های مختلف ۴۰۰، ۵۰۰، ۶۰۰ ppm اسانس مرزه و نمونه شاهد

زمان (روز) ◀			
۶۰	۴۰	۲۰	غلظت اسانس مرزه (ppm)
۰/۸۲	۰/۸۲	۲/۵۲	غلظت ۴۰۰
۰/۵۲	۰/۸۶	۱/۷۵	غلظت ۵۰۰
۰/۱۵	۰/۸۴	۱/۴۶	غلظت ۶۰۰
۲/۶۲	۱/۷۸	۰/۴۳	نمونه شاهد بدون افزودن اسانس مرزه

جدول ۴: جدول آنالیز تجزیه واریانس آفلاتوکسین B_1

منبع تغییرات	مجموع مربعات	درجه آزادی	میانگین مربعات	F
تکرار	۰/۲۴۲E-۰۲	۲	۲/۶۲۱E-۰۲	۱/۲۷۷ ^{ns}
تیمار	۰/۹۳۴	۳	۰/۳۱۱	۱۵/۱۷۱ ^{**}
زمان	۰/۲۱۵	۲	۰/۱۰۷	۵/۲۳۳ [*]
تیمار × زمان	۲/۶۳۹	۶	۰/۴۴۰	۲۱/۴۲۱ ^{**}
خطا	۰/۴۵۲	۲۲	۲/۰۵۳E-۰۲	---

جدول ۵: آنالیز داده‌های غلظت اسانس و مدت زمان تاثیر آن روی میزان آفلاتوکسین به روش آزمون دانکن

غلظت (ppm)	تکرار	زمان (روز)	تکرار
۶۰۰	۰/۲۳۶۷ ^a	۶۰	۰/۲۸۲۵ ^a
۵۰۰	۰/۲۶۲۲ ^a	۴۰	۰/۳۸۱۷ ^{ab}
۴۰۰	۰/۳۷۲۲ ^a	۲۰	۰/۴۷۱۷ ^b
۰	۰/۶۴۳۳ ^b	---	---

حروف لاتین غیرمشابه در هر ردیف نشان‌دهنده معنی‌دار بودن می‌باشد.

بحث

دارویی از جمله اثرات ضد میکروبی آنها ایجاد شده است بطوریکه مطالعات بسیار زیادی روی اثرات ضد میکروبی اسانس‌های گیاهان مختلف صورت می‌گیرد (Sefidkon et al., 2006). این مطالعه نیز با هدف یافتن راه حلی برای مهار رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس انجام گرفت.

نتایج روی محیط کشت (*In vitro*) نشان داد که اسانس گیاه *Satureja hortensis* دارای اثرات ضد قارچی قوی بر علیه آسپرژیلوس فلاووس می‌باشد. در این تحقیق حداقل غلظت بازدارندگی از رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس توسط اسانس مرزه ۵۰۰ ppm بود. با توجه به منحنی‌ها و داده‌های بدست آمده این نتایج نشان می‌دهد که بین نمونه شاهد و استفاده از ۳۰۰ ppm اسانس مرزه با غلظت‌های ۴۰۰ ppm به بالا تفاوت‌هایی وجود دارد و هر چه غلظت اسانس استفاده شده بالاتر رود اثر مهارکنندگی روی رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس بیشتر و

اهمیت آسپرژیلوس‌ها از دیدگاه بهداشتی و بیماری‌زایی بدلیل تولید آفلاتوکسین می‌باشد. این سموم اگر بطور مستمر استفاده شوند روی انسان و دام اثرات سوء خواهند گذاشت که این اثرات به ۳ حالت تولید سم، اثرات آلرژی‌زایی و عامل عفونت می‌تواند ایجاد بیماری کند (دادار و همکاران، ۱۳۸۵). تاکنون حدود ۱۲۰ قارچ شناسایی شده‌اند که قادر به تولید سم می‌باشند و یکی از آنها آسپرژیلوس فلاووس است (Gulluce et al., 2003). تاکنون نزدیک ۱۲ نوع آفلاتوکسین شناسایی شده است. بسیاری از کپک‌ها آفلاتوکسین تولید می‌کنند اما مهمترین کپک‌های توکسین‌زا *A. parasiticus* و *A. flavus* است (محبوبی و فیض آبادی، ۱۳۸۸). برخی از این سوشها روی غلات تا ۲۰۰۰ میکروگرم در گرم توکسین تولید می‌کنند (Ashok et al., 2010). امروزه رویکردهای جدیدی نسبت به استفاده از گیاهان

قابلیت جلوگیری از رشد قارچ‌های آلوده کننده محصولات غذایی و محصولات باغی و زراعی را داراست و قادر به جایگزینی مواد ضد قارچی شیمیایی کنونی می‌باشند (مسکوکوی و مرتضوی، ۱۳۸۳). نتایجی دیگر حاکی از امکان استفاده از اسانس‌های گیاهی در کنترل رشد قارچ و پیشگیری از تولید آفاتوکسین بدست آوردند (رسولی و همکاران، ۱۳۸۷). نتایج بدست آمده نشان داد که اسانس مرزه تفاوت معنی‌داری نسبت به دیگر اسانس‌های مورد استفاده در تحقیق در قطر هاله عدم رشد نشان می‌دهد. بیشترین قطر هاله عدم رشد مربوط به ترکیبات مرزه و آویشن بود (محبوبی و فیض‌آبادی، ۱۳۸۸). Lakman (۲۰۱۰) روی اثرات ممانعتی اسانس بر فعالیت آفاتوکسین تحقیق نموده و به این نتیجه رسید که فعالیت‌های ضد قارچی اسانس‌های گیاهان دارویی می‌تواند مربوط به عوامل کارواکرول و تیمول باشد. همچنین دریافتند که بیوسنتز آفاتوکسین‌ها، تولید آفاتوکسین‌ها و در کل رشد قارچ اسپرژیلوس رابطه متقابلی با وجود اسانس‌های گیاهی دارد که این اثرات متقابل قابل اندازه‌گیری می‌باشد.

با توجه به تحقیقات سایر محققین، در این بررسی نیز این نتیجه بدست آمد که با توجه به خاصیت ضد قارچی اسانس مرزه، استفاده از غلظت‌های مختلف این اسانس می‌تواند از رشد قارچ اسپرژیلوس فلاووس (در بیماری‌های گیاهی، خوراکی‌های انسان، دام، آبزیان) و کنترل تولید آفاتوکسین توسط این قارچ جلوگیری بعمل آورد.

منابع

رسولی، ا.؛ یادگاری نیا، د.؛ گچکار، ل.؛ رضایی، م.ب.؛ فکور، م.ه. و علامه، ع.ا.، ۱۳۸۷. مهار تولید آفاتوکسین قارچ *Spergillus parasiticus* توسط روغن‌های اسانسی. مجله پژوهش و سازندگی، دوره ۲۱، طمستان ۱۳۸۷، صفحات ۱۴۶ تا ۱۵۵

محبوبی، م. و فیض‌آبادی، م.م.، ۱۳۸۸. بررسی اثر ضد میکروبی اسانس‌های آویشن، مرزنجوش، مرزه و اکالیپتوس بر باکتریهای اشرشیا کلی، سالمونلا تیفی موریوم و قارچ‌های اسپرژیلوس نایچر و اسپرژیلوس فلاووس. فصلنامه گیاهان دارویی، سال هشتم، دوره ۲، بهار ۱۳۸۸، صفحات ۱۳۷ تا ۱۴۴.

مسکوکوی، م.ع. و مرتضوی، س.ع.، ۱۳۸۳. کنترل رشد قارچ اسپرژیلوس پارازیتیکوس توسط اسانس‌های طبیعی در محیط کشت مصنوعی. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، سال یازدهم، شماره ۳، صفحات ۶۱ تا ۷۰.

معنی‌دارتر می‌شود بطوریکه غلظت ۳۰۰ ppm تفاوت چندانی با نمونه شاهد از نظر رشد قارچ (بر طبق رسم منحنی) وجود ندارد، ولی هر چه غلظت از ۴۰۰ ppm بالاتر می‌رود تفاوت معنی‌دارتر می‌گردد. بطوریکه غلظت ۵۰۰ ppm اسانس مرزه کاملاً روی محیط کشت اثرات بازدارندگی از رشد را روی قارچ در بردارد. این اثرات ضد قارچی اسانس مرزه را می‌توان به ۲ ماده موثره تیمول و کارواکرول مربوط نمود. همانطور که Gowda و همکاران (۲۰۰۴) و Gulluce و همکاران (۲۰۰۳)، Boyraz و Ozcan (۲۰۰۶) در گزارشات خود به این مطلب اشاره کرده‌اند.

البته Neslihan (۲۰۰۸) نیز به این نتیجه رسید که کارواکرول اثر ممانعت‌کنندگی بیشتری از تیمول بر آفاتوکسین دارد. وی همچنین در زمینه اثرات اسانس مرزه روی وزن خشک و خیس میسلیوم قارچ پاتوژن اسپرژیلوس فلاووس تحقیقاتی انجام داده و نتایج معنی‌داری بر کاهش وزن میسلیوم‌ها بدست آورد. البته غلظت ۶/۲۵ میکرولیتر بر میلی‌لیتر اسانس باعث افزایش وزن میسلیوم‌های خشک و تر قارچ گردید که دلیل آن نیز مربوط به دمای انکوباسیون یا ترکیبات شیمیایی اسانس متانولی است. وی همچنین در سال ۲۰۰۸ در نتایج بدست آمده در این طرح روی میوه لیمو در شرایط انبارداری استفاده نمود. Boyraz و Ozvan (۲۰۰۶) و Askok و همکاران (۲۰۱۰) روی خاصیت ضد قارچی تعدادی اسانس گیاهی و بررسی اثرات این اسانس‌ها بر تولید آفاتوکسین B₁ در خوراکی‌ها تحقیق نمود و به این نتیجه رسیدند که کارواکرول می‌تواند مانع مهمی برای رشد قارچ‌های اسپرژیلوس فلاووس در محیط مایع و اسپرژیلوس پارازیتیکوس در تولید آفاتوکسین باشد.

Razzaghi-Abyaneh و همکاران (۲۰۰۸) و Omidbeygy و همکاران (۲۰۰۷) و Dikbas و همکاران (۲۰۰۸) طی تحقیقاتی گزارش کردند که ماده موثره کارواکرول می‌تواند برای کنترل غلظت آفاتوکسین در غلات مفید باشد. Razzaghi-Abyaneh و همکاران (۲۰۰۸) نیز در تحقیقی که روی اثرات ممانعت‌کنندگی اسانس مرزه روی رشد و تولید آفاتوکسین روی قارچ اسپرژیلوس پارازیتیکوس داشتند به این نتیجه رسیدند که اسانس مرزه یک پتانسیل ممانعت‌کننده مهم بر تولید آفاتوکسین B₁ و G₁ تولید شده از قارچ اسپرژیلوس پارازیتیکوس می‌باشد و در جداسازی مواد موثره که توسط RP-HPLC انجام دادند آنها نیز تائیدی بر اثرات مواد موثره تیمول و کارواکرول داشتند.

Sadeghinejad (۲۰۱۰) روی برگ‌های مرزه گونه خوزستانیکا تحقیق نمود و به خاصیت ضد قارچی آن اشاره نمود. در تحقیقی دیگر گزارش گردید که اسانس‌های آویشن و مرزه

- Ashok K., Ravindra S., Priyanka S., Anuradha N. and Dubay K., 2010.** Efficacy of extract and essential oil of *Lantana indica* Roxb against food contaminating moulds and aflatoxin B₁ production. *International journal of Food Science and Technology*, 45(1):179-185.
- Boyras N. and Ozcan M., 2006.** Inhibition of phytopathogenic fungi by essential oil, hydrosol, ground material and extract of summer savory (*Satureja hortensis* L.) growing wild in Turkey. *International Journal of Food Microbiology*, 107:238-242.
- Dikbas N., Kotan R., Dadasoglu F. and Sahin F., 2008.** Control of *Aspergillus flavus* with essential oil and methanol of food microbiology. *International Journal of Microbiology*, 124:179-182.
- Güllüce M., Sökmen M., Daferera D., Agar G., Ozkan H., Kartal N., Polissiou M., Sökmen A. and Sahin F., 2003.** *In vitro* antibacterial, antifungal, and antioxidant activities of the essential oil and methanol extracts of herbal parts and callus cultures of *Satureja hortensis* L. *Journal of Agriculture and Food Chemistry*, 51(14):3958-3965.
- Gowda N.K.S., Malathi V. and Suganthi R., 2003.** Screening for aflatoxin and effect of moisture, duration of storage and from of feed on fungal growth and toxin production in livestock feeds. *Animal Nutrition Feed Technology*, 3:45-51.
- Gowda N.K.S., Melathi V. and Saganthi R., 2004.** Effect of some chemical and herbal compounds on growth of *Aspergillus parasiticus* and aflatoxin production. *Animal Feed Science and Technology*, 116:281-291.
- Irkin R. and Korukluoglu M., 2007.** Control of *Aspergillus niger* with garlic, onion and leek extracts. *African Journal of Biotechnology*, 6(4):384-387.
- Lokman A., 2010.** Inhibitory effect of essential oil on aflatoxin activities. *African Journal of Biotechnology*, 9(17):2474-2481.
- Neslihan D., Recep K., Fatih D. and Fikrettin S., 2008.** Control of *Aspergillus flavus* with essential oil and methanol extract of *Satureja hortensis*. *International Journal of Food Microbiology*, 124:179-182.
- Omidbeygi M., Barzegar M., Hamidi Z. and Naghdibadi H., 2007.** Antifungal activity of thyme, summer savory and clove essential oils against *Aspergillus flavus* in liquid medium and tomato paste. *Food Control*, 18:1518-1523.
- Rasooli I., Rezaei M. and Allameh A., 2006.** Growth inhibition and morphological alterations of *Aspergillus niger* by essential oils from *Thymus eriocalyx* and *Thymus x-porlok*. *Food Control*, 17:359-64.
- Razzaghi-Abyaneh M., Ghahfarokhi S., Yoshinari M., Rezaei T., Jaimand M.B., Nagasawa K. and Sakuda S., 2008.** Inhibitory effects of *Satureja hortensis* L. essential oil on growth and aflatoxin production by *Aspergillus parasiticus*. *International Journal of Food Microbiology*, 123:228-233.
- Sadeghinejad B., 2010.** Antifungal activity of *Satureja Khuzestanica* Leaves. *Journal of Microbiology*, 3:36-40.
- Sanchez E., Heredia N. and Garcia S., 2005.** Inhibition of growth and mycotoxin production of *Aspergillus flavus* and *Aspergillus parasiticus* by extracts of Agave species. *International Journal of Food Microbiology*, 98:271-279.
- Sefidkon F., Abbasi K. and Khaniki G., 2006.** Influence of drying and extraction method on yield and chemical composition of the essential oil of *Satureja hortensis*. *Food Chemistry*, 99:19-23.

Evaluation inhibitory effect of essential oil *Satureja hortensis* in food fish

Yazdanpanah Goharrizi L.^{(1)*}; Sepahdari A.⁽²⁾; Sharifpour E.⁽³⁾;
Sharifrohani M.⁽⁴⁾ and Darvishi D.⁽⁵⁾

l_yazdanpanah@yahoo.com

1,5- Fisheries Research Department, Agriculture & Natural Resource Research Center,
P.O.Box: 76179-13739 Kerman, Iran

2,3,4-Iranian Fisheries Research Organization, P.O.Box: 14155-6116 Tehran, Iran

Received: November 2011

Accepted: September 2012

Keywords: Aquatic organism, Food, Medicine plants, Fungal poisons

Abstract

Aflatoxins are a group of fungal metabolites that are produced by the growth of fungi on food. These toxins cause illness in animals and humans, and are important in economic and humans health. In this investigation, inhibitory effects of *savory* (*Satureja hortensis* L.) essential oil were evaluated on the growth of *Aspergillus flavus* in fish food. A gas chromatograph apparatus linked to a mass spectrometer (GC/MS) was used to identify the effective components in *Satureja hortensis* essential oil after extraction. Essential oils against *Aspergillus flavus* incubated in PDA media and antifungal properties of essential oil *Satureja hortensis* was investigated. About of 300g of food samples was weighted and samples were sterilized by autoclave. Fungal suspension (3cc) was spraiied into the feed samples, and various concentrations of essential oils (0, 300, 400, 500, 600ppm) added to samples. The samples were incubated at temperature of (\pm SD) $28\pm 2^{\circ}\text{C}$. After 20-40 and 60 days period, randomly, some sampled were taken from containers and the production of aflatoxin B₁, B₂, G₁, and G₂ was measured in the laboratory. This result confirms that 500ppm concentrations of oil *savory* have antifungal properties against *Aspergillus flavus*.

*Corresponding author