

کاریولوزی ماهی خیاطه (*Alburnoides bipunctatus*) منطقه زابل

علی خسروانی زاده^(۱)*؛ محمد پورکاظمی^(۲)؛ محمدرضا نوروزفشاوی^(۳)

akhosravanizadeh@gmail.com

۱ - پژوهشکده تالاب بین المللی هامون دانشگاه زابل، زابل صندوق پستی ۵۳۸-۹۸۶۱۵

۲ و ۳ - انسستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان، رشت صندوق پستی ۳۴۶۴-۴۱۶۳۵

تاریخ پذیرش: شهریور ۱۳۸۹

تاریخ دریافت: بهمن ۱۳۸۹

کلمات کلیدی: کاریوتایپ، ماهی خیاطه، *Alburnoides bipunctatus*، زابل

چکیده

خسروشاهی، ۱۳۷۴) آغاز گردید. این مطالعات بعدها در مورد ماهی سیم *Abramis brama* (نهانندی و همکاران، ۱۳۸۰)، ماهی کپور نقره ای *Hypophthalmichthys molitrix* (وارسته *Ctenopharyngodon*، ۱۳۸۱)، کپور علفخوار *idella* (نوروزفشاوی و همکاران، ۱۳۸۱)، ماهی انجک *Schizothorax zarudnyi* (حسینی و کلیاسی، ۱۳۸۱)، سس ماهی بزرگ *Barbus capito* ماهی باربوس *Barbus mursa* (پورعلی دارستانی و همکاران، ۱۳۸۴)، ماهی گل چراغ *Garra rufa* (اسماعیلی و پیارور، ۱۳۸۶)، ماهی سنگ لیس *Garra persica* (Esmaeili et al., 2009)، ماهی سر مخروطی پارسی جنوب ایران (Esmaeili & Piravar, 2006) *Petroleuciscus pradis* ماهی سیاه کولی *Vimba vimba persa* (پورکاظمی و همکاران، ۱۳۸۹)، ماهی نازک *Chondrostoma regium* (Pourkazemi et al., 2010) *Blicca bjoerkna* (Esmaeili et al., 2010)، ماهی سیم نما *Alburnus alburnus* (Khosravanizadeh et al., 2011)، مروارید ماهی کورا *Alburnus filippii* (Nazari et al., 2011)، مروارید ماهی کورا (al., 2011) ادامه پیدا کرد. ولی تاکنون هیچ گزارشی در مورد تعداد و نوع کروموزوم‌های ماهی خیاطه در منطقه زابل ایران منتشر نشده است. لذا پژوهش حاضر با هدف تهیه گسترش کروموزومی، تعیین تعداد و نوع کروموزوم‌ها و کاریوتایپ این گونه و مقایسه نتایج حاصله با نتایج بدست آمده در سایر نقاط

ماهی خیاطه با نام علمی *Alburnoides bipunctatus* (Bloch, 1782) به رده ماهیان استخوانی Teleostei، راسته کپور ماهی شکلان Cypriniformes، رده شعاع بالگان Actinopterygii، خانواده کپور ماهیان Cyprinidae و جنس *Alburnus* تعلق دارد. یکی از فراوانترین ماهیان به لحاظ تعداد در رودخانه‌های حوضه جنوب دریای خزر و حوضه کویر نمک (روdxانه کرج، جاجرم، حبله رود، قره چای) می‌باشد که توسط انسان به دریاچه هامون نیز معرفی شده است (عبدلی، ۱۳۷۸؛ نادری جلودار و عبدالی، ۱۳۸۳).

در میان مهره‌داران، ماهیان بیشترین گونه را به خود اختصاص می‌دهند. این در حالی است که از بین بیش از ۲۳۰۰۰ گونه ماهی شناسایی شده تنها کاریوتایپ استاندارد برای حدود ۱۰/۴ درصد (۲۴۰۰ گونه) تهیه شده است. این در حالی است که مطالعات کروموزومی ماهیان در بررسی‌های تاکسونومیک، اصلاح نژاد و فناوری زیستی کاربردهای فراوانی داشته و از سوی دیگر انجام هر گونه دستکاری کروموزومی شامل القا ماده‌زایی، تولید ماهیان تریپلوفیلیدی و غیره در ماهیان مستلزم دانستن تعداد و نوع کروموزوم‌های والدین می‌باشد (حسینی و کلیاسی، ۱۳۸۱؛ Gold et al., 1990؛ Al-Sabti, 1991؛ Khosravanizadeh et al., 2011؛ ۱۹۹۱).

در ایران مطالعات سیتوژنتیکی کپور ماهیان با مطالعه بر روی ماهی سفید *Rutilus frisii kutum* (نوروزفشاوی و

*نویسنده مسئول

میکروسکوپ نوری بررسی و تعداد کروموزوم در هر گسترش ثبت شد، و با انجام محاسبات آماری تعداد کروموزوم ها تعیین گردید. پس از اندازه گیری طول بازو های کوچک و بزرگ هر کروموزوم و محاسبه طول کل، طول نسبی و شاخص سانترومی برای هر کروموزوم از روابط توصیف شده توسط Levan و همکاران (۱۹۶۴) جهت تعیین نوع کروموزوم ها استفاده گردید. Adobe Photoshop cs (Middle Eastern Version) و در نهایت کاریوتایپ ماهی خیاطه در برنامه Microsoft Office Excel 2003 ایدیوگرام مربوطه در برنامه

صورت گرفت.

با شمارش ۳۴ عدد گسترش کروموزومی جهت تعیین تعداد کروموزوم های ماهی خیاطه (*Alburnoides bipunctatus*) نتایجی به این شرح بدست آمد. تعداد کروموزوم ها در ۳ درصد از گسترش های شمارش شده ($2n=47$)، در ۸ درصد ($2n=48$)، در ۱۸ درصد ($2n=49$)، در ۶۲ درصد ($2n=50$)، در ۶ درصد ($2n=51$) و در ۳ درصد ($2n=52$) بود که بیشترین فراوانی در دسته ($2n=50$) مشاهده شد (جدول ۱ و نمودار ۱). همچنین از نظر تعداد کروموزوم تفاوتی بین جنس نر و ماده مشاهده نشد.


جهان صورت پذیرفته است.

به منظور انجام این پژوهش تعداد ۱۰ عدد (۵ عدد نر و ۵ عدد ماده) بچه ماهی انگشت قد خیاطه با میانگین (\pm انحراف معیار) وزنی ($4/2 \pm 0/6$) از آب های اطراف زابل با مختصات جغرافیایی^۱ $32^{\circ} 61^{\prime}$ طولی و $31^{\circ} 31^{\prime}$ عرضی، بوسیله تور سید و به آزمایشگاه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل منتقل گردید. از تکنیک له کردن بافت به روش تزریق کلشی سین به بچه ماهیان (Reddy & John, 1986) برای تهیه گسترش کروموزومی استفاده گردید.

بدین منظور هر بچه ماهی پس از توزین به ازای هر ۱۰۰ گرم وزن بدن با $0/5$ میلی لیتر محلول $0/01$ درصد کلشی سین تزریق شد. بعد از گذشت ۲۰۰ دقیقه بافت های کلیه و آبشش ماهی خارج و حدود ۳۰ دقیقه در معرض محلول هیبوتونیک کلرید پتاسیم (KCl) $0/75$ مولار له گردیدند. بافت های له شده در ۳ مرحله (40 ، 30 ، 15 دقیقه ای) توسط محلول کارنوی ($1:3$) تثبیت شدند. سپس با پرتاب قطراتی از سوسپانسیون بدست آمده بر روی لامهای گرم اقدام به تهیه گسترش های کروموزومی گردید که توسط گیمسا 20 درصد با $pH = 6/8$ به مدت 20 دقیقه رنگ آمیزی شدند، لام های رنگ آمیزی شده با

جدول ۱: فراوانی و پراکنش تعداد کروموزوم های شمارش شده در ماهی خیاطه

تعداد متافازهای شمارش شده						
$2n = 52$	$2n = 51$	$2n = 50$	$2n = 49$	$2n = 48$	$2n = 47$	
۱	۲	۲۱	۶	۳	۱	۳۴




نمودار ۱: پراکنش تعداد کروموزوم های شمارش شده در ۳۴ متافاز از ماهی خیاطه

ساب تلوسانتریک یا آکروسانتریک و فاقد کروموزومهای تلوسانتریک ((St/A) $M + 2$) $14Sm + 9M$ می‌باشد و تعداد بازو های کروموزومی آن نیز $NF=96$ می‌باشد (شکل ۲ و ۳).

نتایج حاصل از اندازه‌گیری طول بازو های کوچک و بزرگ کروموزوم ها (جدول ۲) نشان داد ماهی خیاطه دارای ۹ جفت کروموزوم متاسانتریک، ۱۴ جفت ساب متاسانتریک، و ۲ جفت کروموزوم

جدول ۲: طول بازو های بزرگ و کوچک، طول کل، شاخص سانترومری، طول نسبی و نوع کروموزوم های همولوگ در ماهی خیاطه = متابانتریک، Sm = ساب متاسانتریک، A = ساب تلوسانتریک یا آکروسانتریک)

شماره جفت کروموزوم	طول بازو کوچک کروموزوم (μm)	طول بازو بزرگ کروموزوم (μm)	طول کل کروموزوم (μm)	شاخص سانترومری	طول نسبی کروموزوم	نوع کروموزوم
۱	۱۲/۷۸۰	۱۳/۴۹۷	۲۶/۲۷۷	۰/۴۸۶	۰/۰۲۶	M
	۱۰/۷۰۱	۱۵/۸۴۷	۲۶/۴۹	۰/۳۹۱	۰/۰۲۶	M
۲	۱۱/۱۴۶	۱۴/۰۶۱	۲۵/۱۸۸	۰/۴۴۲	۰/۰۲۵	M
	۱۰/۵۴۷	۱۲/۶۴۰	۲۳/۱۸۷	۰/۴۵۴	۰/۰۲۳	M
۳	۹/۳۳۴	۱۳/۱۰۹	۲۲/۴۴۴	۰/۴۱۵	۰/۰۲۲	M
	۸/۰۷۷	۱۳/۶۸۲	۲۱/۷۶۰	۰/۳۷۵	۰/۰۲۲	M
۴	۸/۶۵۳	۱۱/۴۹۹	۲۰/۱۰۲	۰/۴۳۰	۰/۰۲۰	M
	۷/۸۲۶	۱۲/۲۱۲	۲۰/۰۳۸	۰/۳۹	۰/۰۲۰	M
۵	۷/۸۲۳	۱۲/۰۲۸	۱۹/۸۵۱	۰/۳۹۴	۰/۰۲۰	M
	۹/۰۵۲	۱۰/۷۷۰	۱۹/۸۲۲	۰/۴۵۶	۰/۰۲۰	M
۶	۸/۰۴۸	۱۱/۵۰۳	۱۹/۵۳۱	۰/۴۱۱	۰/۰۱۹	M
	۷/۸۸۴	۱۱/۵۸۷	۱۹/۵۷۲	۰/۴۰۴	۰/۰۱۹	M
۷	۷/۴۶۷	۱۱/۳۰۱	۱۸/۷۶۹	۰/۳۹۷	۰/۰۱۹	M
	۷/۲۴۲	۱۰/۳۴۰	۱۷/۵۸۲	۰/۴۱۱	۰/۰۱۷	M
۸	۶/۶۹۱	۱۰/۷۲۲	۱۷/۴۱۳	۰/۳۸۴	۰/۰۱۷	M
	۷/۵۲۷	۹/۸۸۴	۱۷/۴۱۱	۰/۴۳۲	۰/۰۱۷	M
۹	۶/۴۵۱	۹/۱۲۴	۱۵/۵۷۵	۰/۴۱۴	۰/۰۱۵	M
	۶/۷۹۵	۸/۰۶۵	۱۴/۸۶۱	۰/۴۵۷	۰/۰۱۵	M
۱۰	۸/۰۸۵	۱۰/۴۰۳	۲۰/۲۲۸	۰/۳۱۲	۰/۰۲۸	Sm
	۸/۱۱۲	۱۰/۴۳۶	۲۰/۰۳۸	۰/۳۲۷	۰/۰۲۵	Sm
۱۱	۸/۰۷۶	۱۰/۶۲۲	۲۰/۰۹۱	۰/۳۶۱	۰/۰۲۳	Sm
	۸/۰۰۰	۱۰/۷۲۰	۲۰/۰۷۰	۰/۳۵۲	۰/۰۲۳	Sm
۱۲	۷/۱۱۱	۱۰/۰۵۴	۲۰/۰۶۱	۰/۳۱۴	۰/۰۲۳	Sm
	۷/۷۸۳	۱۰/۰۷۵	۲۰/۰۵۸	۰/۳۵۱	۰/۰۲۲	Sm
۱۳	۶/۰۰۰	۱۰/۰۵۰	۲۰/۰۵۰	۰/۳۰۸	۰/۰۲۲	Sm
	۶/۷۰۸	۱۰/۰۴۰	۲۱/۲۱۲	۰/۳۱۶	۰/۰۲۱	Sm
۱۴	۶/۰۲۶۴	۱۰/۰۱۰	۲۰/۰۱۰	۰/۳۱۰	۰/۰۲۰	Sm
	۷/۰۲۰۲	۱۰/۰۷۹	۱۹/۰۷۳۲	۰/۳۶۵	۰/۰۲۰	Sm
۱۵	۶/۰۱۰۳	۱۰/۰۴۰	۱۹/۰۴۳	۰/۳۱۵	۰/۰۱۹	Sm
	۶/۱۶۱	۱۰/۰۹۰	۱۸/۰۵۲	۰/۳۲۶	۰/۰۱۹	Sm
۱۶	۵/۰۶۰۳	۱۰/۰۵۸	۱۸/۰۶۲	۰/۳۰۶	۰/۰۱۸	Sm
	۶/۰۰۶۳	۱۰/۰۸۶	۱۹/۰۵۰	۰/۳۳۷	۰/۰۱۸	Sm
۱۷	۴/۰۹۳۶	۱۰/۰۹۶	۱۷/۰۴۲	۰/۲۷۶	۰/۰۱۸	Sm
	۵/۰۸۵۲	۱۱/۰۵۷	۱۷/۰۸۹	۰/۳۲۸	۰/۰۱۸	Sm
۱۸	۶/۰۳۶۳	۱۱/۰۴۳۳	۱۷/۰۷۸۶	۰/۳۵۷	۰/۰۱۸	Sm
	۵/۰۸۸۵	۱۰/۰۷۸	۱۷/۰۷۶۴	۰/۳۲۰	۰/۰۱۸	Sm
۱۹	۶/۰۲۶۸	۱۱/۰۲۸	۱۷/۰۴۷۷	۰/۳۵۸	۰/۰۱۷	Sm
	۷/۰۵۶۹	۱۲/۰۱۴	۱۷/۰۲۸۳	۰/۲۶۴	۰/۰۱۷	Sm
۲۰	۵/۰۲۸۱	۱۱/۰۹۸	۱۷/۰۲۹	۰/۳۰۶	۰/۰۱۷	Sm
	۶/۰۰۰۷	۱۰/۰۷۹۱	۱۶/۰۷۹۸	۰/۳۵۷	۰/۰۱۷	Sm
۲۱	۴/۰۸۸۲	۱۱/۰۸۸۶	۱۶/۰۷۶۹	۰/۲۹۱	۰/۰۱۷	Sm
	۴/۰۲۰۴	۱۰/۰۴۰۱	۱۶/۰۶۸۵	۰/۲۵۱	۰/۰۱۷	Sm
۲۲	۵/۰۴۰۸	۱۰/۰۹۰۹	۱۶/۰۴۶۷	۰/۳۴۰	۰/۰۱۶	Sm
	۵/۰۶۶۴	۱۰/۰۶۰	۱۶/۰۳۱۵	۰/۳۴۷	۰/۰۱۶	Sm
۲۳	۴/۰۳۰۱	۱۰/۰۵۹۲	۱۶/۰۸۹۴	۰/۲۸۸	۰/۰۱۵	Sm
	۵/۰۴۳۴	۹/۰۹۶	۱۶/۰۷۳۰	۰/۳۶۸	۰/۰۱۵	Sm
۲۴	۶/۰۴۰۰	۱۰/۰۴۰۳	۱۶/۰۹۹۳	۰/۲۴۹	۰/۰۲۷	A
	۳/۰۵۹۰	۱۰/۰۱۰۳	۱۷/۰۹۹۳	۰/۲۰۲	۰/۰۱۸	A
۲۵	۳/۰۵۰۰	۱۰/۰۰۰۳	۱۷/۰۵۰۳	۰/۱۹۹	۰/۰۱۷	A
	۳/۰۱۹۵	۱۱/۰۷۷۲	۱۶/۰۸۶۷	۰/۲۱۴	۰/۰۱۵	A



شکل ۱ - گسترش کروموزومی ماهی خیاطه ($2n=50$) (بزرگنمایی $\times 1000$)



شکل ۲ : کاریوتایپ ماهی خیاطه ($2n=50$)



نمودار ۳ : ایدیوگرام ماهی خیاطه ($2n=50$)

و خسروشاهی، ۱۳۷۴)، سیم *Abramis brama* (نهادنی و همکاران، ۱۳۸۰)، سر مخروطی پارسی جنوب ایران (Esmaeli & Piravar, 2006) *Petroleuciscus persicus* گل چراغ *Garra rufa* (اسماعیلی و پیراور، ۱۳۸۶)، شاه کولی (پورکاظمی و همکاران، ۱۳۸۹) *Vimba vimba persica* (باقر زاده و کازرونی منفرد، ۱۳۸۶) سیاه کولی *Blicca bjoerkna* نما (Pourkazemi et al., 2010) *transcaucasica* *Khosravani zadeh et al.*, *Alburnus alburnus* ماهی *Nazari et al.* *Alburnus filippii* ۲n=۵۰ (al., 2011) کروموزوم، ماهی نازک *Chondrostoma* ۲n=۵۲ (Esmaeili et al., 2010) *regium* (Kalbassi et al., 2008) *Schizothorax zarudnyi* ۲n=۹۸ کروموزوم، ماهیان باربوس *Barbus capito* (پورعلی دارستانی و همکاران، ۱۳۸۴) ۲n=۱۰۰ کروموزوم و سیاه ماهی *Copoeta copoeta* ۲n=۱۵۰ (پورعلی دارستانی و همکاران، ۱۳۸۴) کروموزوم دارد. برغم پژوهش‌های منتشر نشده بسیار تنها با مقایسه نتایج بالا می‌توان نتیجه گرفت که در ایران بیشتر گونه‌های کپورماهیانی که به لحاظ سیتوژنتیکی مورد مطالعه قرار گرفته اند عدد کروموزومی ۲n=۵۰ را نشان می‌دهند.

براساس نتایج بدست آمده توسط *Cataudella* و همکاران (۱۹۷۷) گونه‌های جنس *Alburnus* مانند *Alburnus heckeli*، *A. bipunctatus* *alburnus* ۲n=۵۰ را نشان می‌دهند. در مطالعه حاضر تعداد کروموزوم ها برای گونه خیاطه (*Alburnus bipunctatus*) ۲n=۵۰ تعیین گردید که با نتایج بدست آمده در دیگر مطالعات مطابقت دارد (جدول ۳).

عنوان شده تعداد نرمال کروموزوم‌های ماهیان ۲n=۵۰ می‌باشد، در اکثر کپور ماهیان (حدود ۷۰ درصد) که تاکنون مطالعه شده‌اند نیز همین عدد کروموزومی مشاهده گردیده است (Kirpichnikov, 1981 ; Khuda-Bukhsh et al., 1986) با وجود این، مطالعات گوناگون در خصوص خانواده کپور ماهیان (Cyprinidae) حاکی از وجود الگوهای کروموزومی متفاوتی در میان گونه‌های مختلف این خانواده می‌باشد، به عنوان مثال چندین گونه از باربوس‌های بزرگ آفریقا (*Barbus ethiopicus*, *B. intermedius*, *B. bynni*) کروموزومی ۲n=۱۴۸ یا ۲n=۱۵۰ را نشان می‌دهند (Oellerman & Skelton, 1990). کپور معمولی (*Cyprinus carpio*) دارای ۲n=۹۸ یا ۲n=۱۰۰ کروموزوم و برخی گونه‌ها مانند *Schizothorax richardsonii* و *Lakara et al.* ۲n=۹۸ کروموزوم هستند (Chalcalburnus ۱۹۹۷). همچنین گونه‌هایی مانند (*Kilic-Demirok & Unlu, 2001*) *mossulensis* علفخوار ۲n=۴۸ *Ctenopharyngodon idella* کروموزوم دارند (Reddy, 1991).

مطالعات سیتوژنتیکی صورت گرفته در ایران نیز بیانگر این گستره تنوع کروموزومی در میان کپور ماهیان می‌باشد، آن چنان که نتایج منتشر شده از مطالعات نشان داده کپور سرگنده (*Aristichthys nobilis* (عقلی و مسرور رودسری، ۱۳۸۰)، ماهی کپور علفخوار (*Ctenopharyngodon idella*) (نوروزفشنامی و همکاران، ۱۳۸۱)، کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix (وارسته و همکاران ۱۳۸۱)، تیزکولی (*Hemiculter leucisculus* (بهنام، ۱۳۸۴) و سنگ لیس (Esmaeili et al., 2009) *Garra persica* ۲n=۴۸ (*Rutilus frisii kutum* (نوروزفشنامی کروموزوم، ماهیان سفید (*Rutilus frisii kutum* (نوروزفشنامی

جدول ۳: مقایسه گزارشات ارائه شده در خصوص کاریوتایپ *A. bipunctatus*

تعداد بازوهای کروموزومی	نوع کروموزومها				تعداد کروموزومها	منبع
	آکروسانتریک- ساب	تاب	متاسانتریک	متاسانتریک		
۸۸	۱۲	۳۸			۲n=۵۰	Cataudella <i>et al.</i> , 1977
۸۸	۱۲	۳۸			۲n=۵۰	Sofradzija <i>et al.</i> , 1979
۹۶	۱۰	۲۴	۱۶		۲n=۵۰	Rab, 1981
-	-	-	-		۲n=۵۰	Collares-Periera, 1989
۹۶-۹۲	۸-۴	۲۸-۲۴	۱۶-۱۲		۲n=۵۰	Rab & Collares-Periera, 1995
۹۰	-	-	-		۲n=۵۰	Gul <i>et al.</i> , 2004
۸۸	۱۲	۲۲	۱۶		۲n=۵۰	Kilic-Demirok & Unlu, 2004

دانشگاه زابل کمال تشکر و قدردانی بعمل می آید.

منابع

- اسماعیلی، ح.د. و پیراور، ز.، ۱۳۸۶. بررسی کاریوتایپ ماهی *Garra rufa* (Actinopterygii: Cyprinidae) گل چراغ، ف. و کازرونی منفرد، ف.، ۱۳۸۶. بررسی کاریوتایپ ماهی *Chalcalburnus chalcooides* در استان فارس. مجله علمی شیلات ایران، سال شانزدهم، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۶، صفحات ۱۱ تا ۱۷.
- باقرزاده، ف. و کازرونی منفرد، ف.، ۱۳۸۶. بررسی امکان تهیه گسترش کروموزومی و کاریوتایپ لارو و بچه ماهی شاه کولی (*Vimba vimba persa*). دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان. (Vimba vimba persa). دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان.
- بهنام، ش.، ۱۳۸۴. تهیه گسترش کروموزومی و کاریوتایپ ماهی تیزکولی (*Hemiculter leucisculus*). دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان.
- پورعلی دارستانی، ص؛ بازیار لاکه، ا.ع. و حسن زاده کیابی، ب.، ۱۳۸۴. مطالعه کاریولوژیک ماهیان *Barbus capoeta* و *Barbus mursa, capito* شمال ایران. مجله منابع طبیعی ایران، جلد ۵۸، شماره ۴، صفحات ۸۳۱ تا ۸۴۲.
- پورکاظمی، م.؛ کازرونی منفرد، ف.؛ باقر زاده، ف. و نوروزفخامی، م.ر.، ۱۳۸۹. تهیه کاریوتایپ ماهی سیاه

تعداد بازوهای کروموزومی در گونه *A. bipunctatus* عمدتاً بین NF=۹۶ تا NF=۸۸ متغیر می باشد (Kilic-Demirok & Unlu, 2004). در این بررسی تعداد بازوهای کروموزومی NF=۹۶ تعیین شد که از این نظر با نتایج حاصل از مطالعات Rab (۱۹۸۱) و Collares-Periera (۱۹۹۵) مشابه است. با توجه به اینکه بیشتر محققین نوع کروموزوم ها و در نهایت تعداد بازوهای کروموزومی را بر اساس روش Levan و همکاران (۱۹۶۴) تعیین می کنند لذا تفاوت در فرمول کروموزومی و در نتیجه بازوهای کروموزومی می تواند به علل مختلف از جمله از دست رفتن کروموزوم ها در موقع تهیه گسترش (حذف کروموزومی)، جابجایی نادرست سلولهای تثبیت شده در حین تهیه گسترش، اضافه شدن کروموزومها از سلولهای مجاور، عدم تشخیص و تفکیک بازوهای بسیار ریز، عدم تشخیص صحیح گونه مورد مطالعه، کافی نبودن تعداد نمونه های مورد مطالعه، تفاوت جمعیت ها و زیر گونه های موجود در هر منطقه، تفاوت در روش کار، خطاهای موجود در اندازه گیری بازوهای کروموزومی و تعیین نوع کروموزومها، حالت پلی مورفیسم درون گونه ای و ...

تشکر و قدردانی

بدینوسیله از زحمات و مساعدت های دکتر حسن صالحی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات شیلات ایران، دکتر اسحاق زکی پور مدیر گروه شیلات دانشگاه زابل، مهندس حیدری کارشناس آزمایشگاه شیلات دانشگاه زابل و کارکنان مرکز بیوستر دانشگاه زابل کمال تشکر و قدردانی بعمل می آید. شیلات دانشگاه زابل و کارکنان مرکز بیوستر

- and fish chromosomes. Ljubljana, 97P.
- Cataudella S., Sola L., Accame Muratori R. and Capanna E., 1977.** The chromosomes of 11 species of Cyprinidae and one Cobitidae from Italy, with some remarks on the problem of polyploidy in the cypriniformes. *Genetica*, 47:161-171.
- Collares-Pereira M.J., 1989.** Hybridization in European Cyprinids: Evolutionary potential of unisexual populations. In: Dawley RM (ed). Bulletin 466, New York, USA, pp.281-287.
- Esmaeili H.R., Ebrahimi M., Ansari T.H., Teimory A. and Gholamhosseini G.A., 2009.** Karyotype analysis of Persian stone lapper, *Garra persica* Berg, 1913 (Actinopterygii: Cyprinidae) from Iran. *Current Sciences*, 96(7):959-962.
- Esmaeili H.R. and Piravar Z., 2006.** Karyotype of Persian Chub, *Petroleuciscus persidis* (Coad, 1981) (Actinopterygii: Cyprinidae) from Southern Iran. *Turkish Journal of Zoology*, 30:137-139.
- Esmaeili H.R., Zareian H., Gholamhosseini A., Ebrahimi M., Gholami Z., Teimori A. and Ansari T.H., 2010.** Karyotype Analysis of the King Nase Fish, *Chondrostoma regium* (Heckel, 1843) (Actinopterygii: Cyprinidae) from Iran. *Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 10:477-481.
- Gold J.R., Li Y.C., Shipley N.S. and Powers P.K., 1990.** Improved methods for working with fish chromosomes with a review of metaphase chromosome banding. *Journal of Fish Biology*, 37:563-575.
- کولی (Vimba vimba persa). مجله علمی شیلات ایران، شماره ۲، سال نوزدهم، صفحات ۱۹ تا ۳۰.
- حسینی، و. و کلپاسی، م.ر. ۱۳۸۱. مطالعه کاریولوژیک کاهی انجک *Schizothorax zarudnyi* در منطقه زهک استان سیستان و بلوچستان. مجله علوم دریایی ایران، دوره ۲، شماره ۱، صفحات ۱۳ تا ۲۱.
- عبدلی، ا. ۱۳۷۸. ماهیان آبهای داخلی ایران. انتشارات نقش مانا. تهران، ۳۷۸ صفحه.
- عقیلی، س.ر. و مسروور رودسری، م. ۱۳۸۰. بررسی کروموزوم های ماهی کپور سرگنده (Aristichthys nobilis) و تهیه کاریوتایپ آن. دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان.
- نادری جلودار، م. و عبدلی، ا. ۱۳۸۳. اطلس ماهیان حوزه جنوبی دریای خزر (آب های ایران). موسسه تحقیقات شیلات ایران. تهران، ۸۰ صفحه.
- نوروزفشنامی، م.ر؛ پور کاظمی، م. و کلپاسی، م.ر. ۱۳۸۱. تهیه کاریوتایپ ماهی کپور علفخوار *Ctenopharyngodon idella* از طریق کشت گلبولهای سفید خون. مجله علمی شیلات ایران، شماره ۳، سال یازدهم، پاییز ۱۳۸۱، صفحات ۱۳۷ تا ۱۴۴.
- نوروزفشنامی، م.ر. و خسروشاهی، م. ۱۳۷۴. مطالعه کروموزومی ماهی سفید از طریق کشت گلبولهای سفید خون. مجله علمی شیلات ایران، سال چهارم، شماره ۱، بهار ۱۳۷۴، صفحات ۶۴ تا ۷۱.
- نهادنی، ر.؛ امینی، ف. و رضوانی، س. ۱۳۸۰. بررسی سیتوژنتیکی ماهی سیم *Abramis brama* حوزه جنوبی دریای خزر. مجله علمی شیلات ایران، سال دهم، شماره ۳، صفحات ۸۹ تا ۱۰۰.
- وارسته، ا؛ حسین زاده مقدم، م؛ پور کاظمی، م. و نوروزفشنامی، م.ر. ۱۳۸۱. بررسی تعداد کروموزومی ماهی کپور نقره ای *Hypophthalmichthys molitrix* و تهیه کاریوتایپ آن. مجله علمی شیلات ایران، سال یازدهم، شماره ۱، بهار ۱۳۸۱، صفحات ۱۰۷ تا ۱۱۴.
- Al-Sabti K. , 1991.** Hand book of genotoxic effects

- Gul S., Colak A., Sezgin I. and Kaloglu B., 2004.** Karyotype analysis in *Alburnus heckeli* (Battalgil, 1943) from Lake Hazer. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, 28:309-314.
- Kalbassi M.R., Hosseini S.V. and Tahergorabi R., 2008.** Karyotype analysis in *Schizothorax zarudnyi* from Hamoon Lake, Iran. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 8:335-340.
- Kilic-Demürok N. and Unlu E., 2001.** Karyotypes of Cyprinid fish *Capoeta trutta* and *Capoeta capoeta umbra* (Cyprinidae) from the Tigris River. Turkish Journal of Zoology, 25:389-393.
- Kilic-Demürok N. and Unlu E., 2004.** Karyotypes of the Cyprinid fish *Alburnoides bipunctatus* (Cyprinidae) from the Tigris River. Folia Biologica (Krakow), 52:57-59.
- Khosravanzadeh A., Pourkazemi M. and Nowruzfashkhami M.R., 2011.** Karyology study on Bleak (*Alburnus alburnus*) from the south Caspian Sea region. Caspian Journal of Environmental Sciences, 9(1):27-36.
- Khuda-Bukhsh A.R., Chanda T. and Barat A., 1986.** Karyomorphology and evolution in some Indian hillstream fishes with particular references to polyploidy in some species. In: Uyeno T, Arai R, Taniuchi T, Matsuura K (eds) Indo-Pacific fishes,). Ichthyological Society of Japan, Tokyo, Japan. pp.886-898.
- Kirpichnikov V.S., 1981.** Genetic bases of fish selection. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 342P.
- Lakara W.S., John G. and Barat A., 1997.** Cytogenetic studies on endangered and threatened fishes karyotypes of two species of Snow-trout, *Schizothorax richardsonii* (Gray) and *S. kumaonensis* (Menon). Proceedings of the National Academy of Sciences India, section B: Biological Science, 67(1):79-81.
- Levan A., Fredga K. and Sandberg A.A., 1964.** Nomenclature for centromeric positions on chromosomes. Hereditas, 52:201-202.
- Nazari S., Pourkazemi M. and Porto J.I.R., 2011.** Chromosome description and localization of nucleolus organizing regions (NORs) by Ag-staining technique in *Alburnus filippii* (Cyprinidae, Cypriniformes) in Anzali Lagoon, North Iran. Iranian Journal of Fisheries Science, 10(2):352-355.
- Oellerman L.K. and Skelton P.H., 1990.** Hexaploidy in yellowfish species (Barbus, Pisces, Cyprinidae) from southern Africa. Journal of Fish Biology, 37:105-115.
- Pourkazemi M., Nazari S. and Bakhshalizadeh S., 2010.** Karyotype analysis in white bream (*Blicca bjoerkna transcaucasica*) from north coast of Iran. Iranian Journal of Fisheries Science, 9(3):454-463.
- Rab P., 1981.** Karyotypes of some cyprinid species. In: Reproduction, genetics and hybridization of fishes. Vodnany, 181-183.
- Rab P. and Collares-Pereira M.J., 1995.** Chromosomes of European cyprinid fishes (Cyprinidae, Cypriniformes): A review. Folia Zoology, 44:193-214.

Reddy P.V.G.K., 1991. A comparative study of the Karyomorphology of Grass crap, *Ctenopharyngodon idella*, Silver crap, *Hypophthalmichthys molitrix* and their hybrids. Aquaculture, 1:31-47.

Reddy P.V.G.K. and John G., 1986. A method to increase miotic metaphase spreads and permanent chromosome preparation for karyotype studies in fishes. Aquaculture Hungrica, 5:31-36.

Sofradzija A., Berberovic L. and Hadziselimov R., 1979. Hromosomske garniture vrsta *Alburnus alburnus* L. (1758) *Alburnoides bipunctatus* (Bloch, 1782), Cyprinidae, Pisces. Ichthyologia, 11:33-42.

Ünlü E., Kilic-Demürok N., Cengiz E.I. and Karadede H., 1997. Karyology of *Garra rufa* (Cyprinidae) in River Tigris (Turkey). Ninth International Congress of European Ichthyologists (CE19) "Fish Biodiversity". Italy 1997 (Napoli-Trieste). Book of Abstracts. 95P.

Karyology study of Spirlin (*Alburnoides bipunctatus*) in Zabol region

Khosravanzadeh A.^{(1)*}; **Pourkazemi M.**⁽²⁾; **Nowrozfashkhami M.R.**⁽³⁾
akhosravanzadeh@gmail.com

1- Institute of Hamoon international wetland of Zabol University, P.O.Box: 98615-538 Zabol, Iran
2,3- International Sturgeon Research Institute, P.O.Box: 41635-3464 Rasht, Iran

Received: September 2011

Accepted: February 2011

Keywords: Zabol, Karyotype, Spirlin, *Alburnoides bipunctatus*

Abstract

The chromosomal spread and karyotype of Spirlin (*Alburnoides bipunctatus*) from Zabol region were identified using tissue squashing techniques with injection of 0.5ml/100g body weight of 0.01% Colchicines solution in fish fingerlings. Kidney and gill tissues were extracted and chopped in KCl 0.075M for 30 min and fixed in Carnoy solution in 3 stages. The chromosomal spreads were stained in 20% Gimsa for 20 min. From 34 chromosomal spread counts, the results showed diploid chromosome number of this species $2n=50$. Karyotype composed of 9 metacentric, 14 submetacentric and 2 acrocentric or subtelocentric chromosome pairs, and the number of chromosome arms (NF) was determined as $NF=96$.

*Corresponding author