

## بررسی تاکسونومی زنبورهای قبیله Scoliini (Hym.: Scoliidae) در استان تهران

پروانه آزمایش فرد<sup>۱</sup>، مقصومه چهارطاقی آینه<sup>۲</sup>، ابراهیم ابراهیمی<sup>۳</sup> و احمد عاشوری<sup>۴</sup>

۱، ۲، ۴، دانشیار، دانشجوی سابق کارشناسی ارشد و استادیار پردازش کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

۳، استادیار پژوهشی مؤسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی

تاریخ پذیرش مقاله ۸۳/۷/۸

### خلاصه

زنبورهای خانواده Scoliidae به عنوان پارازیتوئیدهای لاروهای سخت بالپوشان بخصوص سوسکهای خانواده Scarabaeidae و بعضی از گونه‌های خانواده Curculionidae می‌باشند. به منظور بررسی رده‌بندی خانواده Scoliidae اقدام به جمع‌آوری این حشرات طی سال‌های ۱۳۷۸-۱۳۸۰ گردید و علاوه بر این نمونه‌های کلکسیون بخش حشره‌شناسی کشاورزی دانشگاه تهران و بخش تحقیقات رده‌بندی حشرات مؤسسه بررسی آفات و بیماری‌های گیاهی که قبلاً جمع‌آوری شده بودند نیز مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی‌های میکروسکپی و ماکروسکپی از بال، قفس سینه، شکم و آلت زاد آوری نمونه‌های نر و با استفاده از کلیدهای معتبر دنیا و تأیید نام علمی گونه‌ها و زیر گونه‌ها توسط متخصصین مجموعاً ۷ گونه و زیر گونه از جنس Scolia F. 1775 به شرح زیر برای اولین بار از ایران گزارش شده است:

Scolia (Scolia) fallax Eversmann, 1849

Scolia (Scolia) galbula (Pallas, 1771)

Scolia (Scolia) sexmaculata orientalis (Steinberg, 1962)

Scolia (Scolia) luciformis Scopoli, 1786

Scolia (Scolia) flaviceps flaviceps, Eversmann, 1846

Scolia (Scolia) flaviceps mangichlakensis (Radoskovsk, 1879)

Scolia (Scolia) tukestanica Betrem, 1935

واژه‌های کلیدی: جنس *Scolia* آلت زادآوری، *Megascolia*، مرغولژی، زنبورهای پارازیتوئید.

ایران تحقیق مستقل و جامع بر روی زنبورهای این خانواده تاکنون صورت نگرفته است (۱).

منابع مربوط به مطالعه این زنبورها نسبتاً محدود بوده و در اغلب منابع موجود رده‌بندی این گروه از حشرات مورد توجه قرار گرفته است و بیولوژی، ویژگی‌های دقیق رفتاری، تعیین میزبان‌ها و نحوه فعالیت آنها کمتر مورد بررسی قرار گرفته است (۹). فابریسیوس برای اولین بار در سال ۱۷۷۵ جنس *Scolia* را معرفی نمود (به نقل از بتریم ۱۹۶۲).

ساپوسور این جنس را به سه زیر جنس *Scolia* F. 1775 و *Campsomeris* Betrere 1941 و *Lacosi*

### مقدمه

زنبورهای خانواده Scoliidae در کنترل طبیعی آفاتی نظری کرم‌های سفید ریشه، سوسک‌های گرده‌خوار، سرخرطومی حنایی خرما و سوسک کرگدنی خرما نقش دارند. ماده‌ها با کمک آرواره‌ها و پاهای جلویی خاک را حفر کرده و در داخل زمین به دنبال لارو میزبان می‌گردند و با فرو بردن نیش خود آن را فلنج کرده و سپس یک عدد تخم روی بدن آن می‌گذارند. با توجه به اهمیت این زنبورها در پارازیته کردن لارو بعضی از سخت بالپوشان و نقش آنها در گردهافشانی بعضی از گیاهان، انجام مطالعات بیشتر در مورد آنها ضروری به نظر می‌رسد. در

آنها توصیف می‌کردند، علاوه بر اینکه آنها در نامگذاری از الگوی واحدی پیروی نمی‌کردند. امروزه توجه به آناتومی یا تشريح درونی این زنبورها و ویژگی‌های اندام زادآوری نوعی رده‌بندی پایدار را در بین اعضای این خانواده بوجود آورده است.

استن (۱۹۹۹ a) جایگاه زنبورهای جنس *Scolia* را در طبقه‌بندی جدید بترتیب زیر ذکر کرده است.

Order : Hymenoptera suborder: Apocrita  
Group: Aculeata superfamily: Vespoidea  
Family: Scoliida subfamily: Scoliinae  
Trib: Campsomerini scoliini Genus: *Scolia*

اسماعیلی و رستگار (۱۳۵۳) با همکاری بوهارت با مطالعه زنبورهای Aculeata از خانواده *Scoliidae* ۴ جنس و ۶ گونه برای ایران گزارش کردند. علاوه بر این اسامعیلی (۱۳۷۵) در کتاب آفات مهم درختان میوه ذکر کرده که احتمالاً گونه‌هایی از جنس *Scolia* و *Tipha* وجود دارند که پارازیت مؤثر کرم‌های سفید ریشه، سوسک کرگدنی خرما و سرخرطومی خنابی خرما می‌باشد.

در این تحقیق اقدام به شناسایی گونه‌ها و زیر گونه‌های زنبورهای خانواده *Scoliidae* و قبیله *Scoliini* در مناطق مختلف استان تهران گردید تا امکان انجام مطالعات وسیع تر بعدی بمنظور استفاده از این زنبورها در کنترل بیولوژیک بعضی از آفات مهم به ویژه کرم‌های سفید ریشه را هموار سازد.

### مواد و روش‌ها

این تحقیق به روش صحرایی و آزمایشگاهی انجام گردید. ظهور حشرات کامل در کرج از اواسط خرداد تا اواخر شهریور ماه و انبوی آنها در ماه‌های تیر و مرداد و اوج پرواز آنها در ساعات گرم و آفتابی روز (بین ساعت ۱۱ صبح تا ۳ بعدازظهر) بود. حشرات کامل غالباً از روی گیاهان خودرو با گلهایی برنگ قرمز و آبی و از سطح خاکهایی با بافت شنی (جهت جستجوی میزان) با تور حشره‌گیری جمع‌آوری شدند. تاریخ نمونه‌برداری، محل و وضعیت پوشش گیاهی نیز ثبت شد.

نمونه‌های جمع‌آوری شده در آزمایشگاه به داخل دسیکاتور منتقل و پس از اتاله شدن در جعبه‌های کلکسیون قرار داده

سال ۱۹۸۳ برای اولین بار تاکسون‌های *Triscolia Saussure* 1864 و *Discolia Saussure* 1864 را ارائه نمود (به نقل از برادلی، ۱۹۷۴). اسکروتیکی ۲۰ گونه از این خانواده را از آرژانتین و پاراگوئه در سال ۱۹۱۰ معرفی کرد. (به نقل از برادلی، ۱۹۷۴). چارموی (۱۹۲۲) در یک سفر طولانی تلاش گسترده‌ای را برای شناسایی زنبورهای *Scoliidae* از ماداگاسکار تا موریتانی انجام داد و تا حدودی به مطالعه میزانها و رفتارشناسی این حشرات نیز پرداخت.

تریم (۱۹۶۳) گونه‌های زنبورهای خانواده *Scoliidae* را در ایندو- استرالین به صورت یک مونوگراف مورد بررسی قرار داد ولی کار او دارای یک سری اشکالات بود. وی ۲۵ تاکسون را از ایسلند گزارش نمود ولی بعضی از این تاکسونها در واقع فازهای رنگی بودند که ویژگی‌هایی برای شناسایی تاکسونها محسوب نمی‌شوند.

کرومباين (۱۹۷۸) مطالعه بیوسیستماتیک زنبورهای منطقه سیلون را انجام داد و برای تهیه کلید شناسایی گونه‌ها از اندام زادآوری نوها استفاده نمود. پورتر (۱۹۸۱) زنبورهای خانواده *Scoliidae* دره ریوگراند و جنوب تکراس در آمریکا را مطالعه و ۷ گونه از آنها را معرفی نمود. پایک (۱۹۷۸) در زهر زنبورهای دو خانواده *Scoliidae* و *Vespidae* یک رشته پلی پیتید را مشخص نمود که تشابه این دو خانواده را تایید می‌نماید. برادرز و کارپنتر (۱۹۹۳) تشابه دو خانواده *Scoliidae* و *Vespidae* را به علت فرم تگولا و رسیدن آن به پیش قفس سینه می‌دانند. یو Scoliinae (۱۹۸۳) با مطالعه زنبورهای زیر خانواده در کره، کلیدی برای شناسایی گونه‌های آن ارائه نمود.

چانگ مینگ (۱۹۹۹) ۲۶ گونه زنبور پارازیت از این خانواده را از ایالت شاندانگ چین گزارش و سیکل زندگی و میزانهای آنها را معرفی نمود. در مورد نامگذاری و طبقه‌بندی زنبورهای *Scoliidae* اختلاف نظرهای زیادی به چشم می‌خورد. گاهی یک گونه توسط محققین مختلف با نامهای متفاوت نامگذاری شده است و بنابراین یک گونه ممکن است دارای چندین هنام باشد. این امر را می‌توان چنین توجیه نمود که محققین در ابتداء، گونه‌های مربوط به خانواده *Scoliidae* را تنها بر اساس خصوصیات ظاهری بویژه لکه‌ها و علامت ظاهری و رنگ بندی

خانواده Scoliinae و قبیله Scoliini شناسایی شد. نام علمی این گونه‌ها توسط متخصصین زنبورهای این خانواده مورد تأیید قرار گرفت. از نمونه‌های مشخص شده، ۷ گونه و زیر گونه برای اولین بار از ایران گزارش می‌شوند و یک گونه و دو زیر گونه دیگر که با نام علمی قدیمی در کلکسیون‌های حشره‌شناسی موزه جانورشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران و موزه حشرات هایک میرزاپارس وجود دارند در این بررسی با نام‌های علمی جدید معرفی شدند و خصوصیات گونه‌های شناسایی شده بر اساس ترتیب فیلوجنی آنها ذکر گردیده است.

### Scoliini

اکثر گونه‌های خانواده Scoliidae در این قبیله قرار می‌گیرند. حشرات نر دارای جثه‌ای کمی کوچکتر از ماده‌ها هستند. در نرها شاخک‌ها بلند و کشیده و ۱۳ بندی ولی ماده‌ها دارای شاخص ۱۲ بندی، کوتاه و کمی خمیده می‌باشد. این قبیله در تمام منطقه پاله آرکتیک دارای ۲ جنس بدنهای *Megascolia* و *Scolia* می‌باشد.

جنس *Megascolia* تنها دارای یک زیر جنس بنام *Regiscola* Betrem & Bradly, 1964 می‌باشد. این جنس شامل بزرگترین زنبورها در راسته بال غشائیان است. بعضی گونه‌ها در بعضی نقاط دنیا طولشان به ۸ سانتی‌متر هم می‌رسد (۹). ماده‌ها دارای نیش بسیار قوی هستند. از این جنس زیر گونه *Megascolia maculata maculata* (Drury, 1773)

Syn = *Sphex maculata* Drury, 1773

در کرج از اکثر مناطق از جمله طالقان، کردان، کمال آباد، ارنگه، اغشت، برغان و محوطه دانشکده کشاورزی جمع‌آوری شده است و در بعضی از کلکسیون‌های حشرات گونه‌ای با نام علمی *Scolia flavifrons* مشاهده می‌شود، در حالی که در طبقه‌بندی جدید گونه‌ای با این نام وجود ندارد و به عنوان زیر گونه *Megascolia maculata flavifrons* (F., 1775) نامگذاری شده که با زیر گونه *maculata* (Drury, 1773) نامگذاری شده که با زیر گونه *maculata* (Drury, 1773) می‌باشد.

در زیر گونه اول دستگاه تناسلی نر درشت و اسکلروتینه (سخت) شده است در حاشیه بیرونی *Volsellea* دندانه‌های ریز

شدن. همچنین نمونه‌هایی که طی سال‌های گذشته توسط محققین دیگر گردآوری و در کلکسیون بخش حشره‌شناسی کشاورزی و موزه جانورشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران و همچنین در موزه حشرات هایک میرزاپارس در مؤسسه بررسی آفات و بیماری‌های گیاهی نگهداری شده‌اند مورد مطالعه قرار گرفتند. در تشخیص این زنبورها، مهمترین ویژگی‌ها که در کلید استن (۱۹۹۹) به آنها اشاره شده از جمله: طرز رگ‌بندی وجود یا عدم وجود سلوهای *Submarginal*، *Marginal* و *Submedian* در بال جلو، ساختمان سه قسمتی پروپوپodium، درزهای افقی یا عمودی روی سر، خارهای پاهای جلو و عقب، رنگ‌بندی و طرح و الگوی لکه‌ها و یا نوارهای رنگی روی بدن، مورد مطالعه قرار گرفت.

بمنظور تشخیص دقیق گونه‌ها و زیر گونه‌ها از اندام زادآوری حشرات نر پرپاراسیون تهیه گردید، به این ترتیب که دو بند انتهایی شکم حشره نر قطع و در پطاس ۱۰ درصد بمدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه جوشانده و سپس توسط سوزن و اسکالپل آلت زادآوری بگونه‌ای که قطعات *Volsellea* و *Penis valve* که در شناسایی گونه‌ها اهمیت دارند صدمه نبینند از بدن آنها بیرون آورده شد. سپس این قطعات به الکل‌های ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۹۶ درصد منتقل و آبگیری شد و برای تشییت به گزیلول منتقل و نهایتاً روی لام یک قطره کانادا بازلام قرار داده و پس از حالت دادن به قطعه مورد نظر، لام را با دقت روی آن قرار داده و سپس لام‌ها به مدت چند روز داخل آون قرار داده شد تا کاملاً خشک شوند و اطراف لام برای جلوگیری از نفوذ هوا با لاص بیرنگ مسدود شد. شکل آلتزادآوری با استفاده از استریومیکروسکپ بر روی کاغذ کالک و با تعیین مقیاس اندازه‌ها رسم گردید. با مقایسه شکل قطعات زادآوری با منابع موجود (کرومباين ۱۹۷۸ و استن ۲۰۰۰) گونه‌ها تا حد ممکن شناسایی و نام علمی تمام نمونه‌ها توسط تیل استن در موزه Stuttgart Staatliches در شهر آلمان مورد تایید قرار گرفت.

### نتایج

پس از بررسی تاکسونومیک نمونه‌های مورد مطالعه، ۱۰ گونه و زیر گونه در دو جنس *Megascolia*، *Scolia* از زیر

جنس به دو زیر جنس تقسیم می‌شود که در طبقه‌بندی قدیم به عنوان جنس مطرح بودند. در زیر جنس *Scolia* F., 1775 قاعده قطعه *Volsellea* در اندام تناسلی نر مجهر به موها متراکم (شکل ۲) و در زیر جنس *Discolia* Saussure, 1863 دارای موها پراکنده است (شکل ۳). (۱۲).

مشخصات گونه‌های جنس *Scolia* که برای اولین بار از ایران گزارش شده‌اند در جدول ۱ ارائه شده است.

و متراکم و در قاعده نیز موها متراکم وجود دارد و دندانهای سخت و متراکم است (شکل ۱). این گونه بیشتر روی گونه‌های *Lucanus cervus* و *Polyphilla* spp. فعالیت پارازیتی دارد.

### *Scolia* F., 1775


اندازه گونه‌های این جنس متوسط تا بزرگ، بال‌ها تک رنگ یا دو رنگ و دارای دو سلول کوبیتال در بال جلو می‌باشد. این

جدول ۱- مشخصات تاکسونومی زنبورهای قبیله *Scoliini* استان تهران


نام علمی گونه و زیر گونه	طول بدن به میلیمتر	رنگ عمومی بدن و ترتیبات سر و شاخک	اسکاپولا	رنگ آمیزی بال‌ها	ترزیت‌های شکم (سطح پشتی حلقه‌های شکم)	لکه‌ها و نواهای روی Volsellea (اندام‌زاد آوری جنس نر)	محل جمع آوری	
<i>Scolia (Scolia) fallax</i> Eversmann, 1849	*۲۱-۱۸ **۱۸-۱۰	حشره ماده به رنگ سیاه یکنواخت و تازک شاخک به رنگ قهوه‌ای مایل به سیاه . پراکندگی یکنواخت بال‌ها به رنگ آبی تیره حشره نر به رنگ سیاه و ترزیت و سوم شکم سیاه با نوارهای پهن زرد رنگ (شکل ۴)	درازی نقطه‌ای با سیاه یکنواخت و در نر سطح پشتی حلقه‌های دوم یکنواخت و سوم شکم سیاه با نوارهای پهن زرد رنگ	سطح پشتی شکم در ماده بال‌ها به رنگ آبی تیره یکنواخت نمی‌باشد، قاعده پوشیده شده (شکل ۶)	سطح پشتی شکم در هردو بال‌ها به رنگ آبی تیره جنس پوشیده از موها متراکم سیاه با دو نوار ولبه کاری زرد رنگ عريف زرد رنگ روی ترزیت دوم و سوم شکم	سیاه جنس پوشیده از موها متراکم سیاه با دو نوار ولبه کاری زرد رنگ عريف زرد رنگ روی ترزیت دوم و سوم شکم	فرورفتگی حاشیه بیرونی <i>Volsellea</i> رسید کرده و شهریار و ملارد دارای موها متراکم (شکل ۵)	نمرک و ارتفاع آغشته و برگان مراه و دانشکده کشاورزی کرج و ماهدشت است (شکل ۷)
<i>Scolia (Scolia) galbula</i> (Pallas, 1771)	* ۲۱-۱۸ ** ۲۰-۱۱	حشره ماده به رنگ سیاه با نوارهای زرد روی پیشانی تاسیس‌سهای چشمی، حشره نر سیاه رنگ و بدون نقش و نگار روی پیشانی	ندرتاً منقوط می‌باشد	بال‌ها دو رنگ (نصف یکنواخت سطح بال به رنگ زرد و شکم نوارهای زرد متمایل به خاکستری یا نارنجی)	دو جنس هم رنگ (آبی تیره) و شاخکها سیاه مایل به قهوه‌ای به رنگ یکنواخت سطح بال به رنگ زرد و شکم نوارهای زرد متمایل به دیگر آبی تیره)	بال‌ها به رنگ آبی تیره یکنواخت نمی‌باشد، قاعده پوشیده شده (شکل ۶)	سطح پشتی شکم در هردو بال‌ها به رنگ آبی تیره یکنواخت نمی‌باشد، قاعده پوشیده شده (شکل ۶)	نمرک و ارتفاع آغشته و برگان مراه و دانشکده کشاورزی کرج و ماهدشت است (شکل ۷)
<i>Scolia (Scolia) sexmaculata orientalis</i> (Steinberg, 1962)	* ۱۵-۱۰ ** ۱۴-۹	دو جنس به رنگ قهوه‌ای روشن با لکه‌های زرد یا نارنجی - سر باریک و کشیده و شاخکها طویل	زرد رنگ مشاهده می‌شود	به رنگ کهربایی روشن و دارای نقش و نگار بخش زرد رنگ بال طویل گاهی چهارم دو لکه بریگ زرد	به رنگ کهربایی روشن و دارای نقش و نگار بخش زرد رنگ بال طویل گاهی چهارم دو لکه بریگ زرد	روی ترزیت دوم و سوم روی ترزیت دوم تا چهارم شکم و بندرت نوار شکسته زرد رنگ روی ترزیت پنجم دارای نوارهای زرد روی ترزیت دوم تا چهارم شکم و بندرت نوار شکسته زرد رنگ روی ترزیت پنجم دارای نوارهای زرد روی ترزیت دوم تا چهارم شکم و بندرت نوار شکسته زرد رنگ روی ترزیت دوم	پوشیده از موها طویل و متراکم و حاشیه بیرونی آن دارای دندانهای ریز (شکل ۸)	مزروعه دانشکده کشاورزی کرج و ماهدشت است (شکل ۷)
<i>Scolia (Scolia) lucifomris</i> Scopoli, 1786	* ۲۲-۱۶ ** ۲۹-۱۳	بردن به رنگ سیاه متمایل به قهوه‌ای با نوارهای زرد روی شکم - سر کاملاً زرد رنگ و پیشانی و فرق سر دارای نقش و نگار زرد رنگ	زرد رنگ مشاهده می‌شود	به رنگ کهربایی روشن و دارای نقش و نگار بخش زرد رنگ بال طویل گاهی چهارم دو لکه بریگ زرد	به رنگ کهربایی روشن و دارای نقش و نگار بخش زرد رنگ بال طویل گاهی چهارم دو لکه بریگ زرد	روی ترزیت دوم تا چهارم شکم و بندرت نوار شکسته زرد رنگ روی ترزیت پنجم دارای نوارهای زرد روی ترزیت دوم تا چهارم شکم و بندرت نوار شکسته زرد رنگ روی ترزیت دوم	پوشیده از موها طویل و متراکم و حاشیه بیرونی آن دارای دندانهای ریز (شکل ۸)	آغشته و برگان مراه و دانشکده کشاورزی کرج و ماهدشت است (شکل ۷)
<i>Scolia (Scolia) flaviceps</i> Eversmann, 1846	* ۲۲-۲۰ ** ۲۱-۱۱	بردن به رنگ سیاه متمایل به قهوه‌ای با نوارهای زرد روی شکم - سر کاملاً زرد رنگ و پیشانی و فرق سر دارای نقش و نگار زرد رنگ	بال‌ها به رنگ سیاه یکنواخت	بال‌ها به رنگ سیاه یکنواخت	بال‌ها به رنگ سیاه یکنواخت	به قوه‌ای و پیشانی و فرق سر زرد رنگ، شاخکها طویل و قرمز رنگ	سطح پشتی شکم در هردو بال‌ها به رنگ سیاه یکنواخت	آغشته و برگان مراه و دانشکده کشاورزی کرج و ماهدشت است (شکل ۷)
<i>Scolia (Scolia) mangichlakensis</i> (Radoskovsk, 1879)	* ۲۴-۱۹ ** ۲۰-۱۲	رنگ عمومی بدن قرمز متمایل به قوه‌ای و پیشانی و فرق سر زرد رنگ، شاخکها طویل و قرمز رنگ	به رنگ یکنواخت	به رنگ یکنواخت	به رنگ یکنواخت	به قوه‌ای و پیشانی و فرق سر زرد رنگ، شاخکها طویل و قرمز رنگ	در وسط دارای طلاقان، ولیان و کردن	آغشته و برگان مراه و دانشکده کشاورزی کرج و ماهدشت است (شکل ۷)
<i>Scolia (Scolia) (Discolia) turkestanica</i> Betrem, 1935	* ۱۳ ** ۱۲-۱۰	رنگ عمومی بدن قرمز یا قرمز آبی متالیک سر به رنگ قرمز متمایل به نارنجی و تیره با جلای آبی متالیک به رنگ قوه‌ای یکنواخت موها تیره و قاعده آن پهن اوین و شمیران روی آن یکنواخت و نگار سیاه و زرد	بال‌ها به جلای آبی متالیک سر به رنگ قرمز متمایل به نارنجی و تیره با جلای آبی متالیک به رنگ قوه‌ای یکنواخت موها تیره و قاعده آن پهن اوین و شمیران روی آن یکنواخت	بال‌ها به جلای آبی متالیک سر به رنگ قرمز متمایل به نارنجی و تیره با جلای آبی متالیک به رنگ قوه‌ای یکنواخت موها تیره و قاعده آن پهن اوین و شمیران روی آن یکنواخت	بال‌ها به جلای آبی متالیک سر به رنگ قرمز متمایل به نارنجی و تیره با جلای آبی متالیک به رنگ قوه‌ای یکنواخت موها تیره و قاعده آن پهن اوین و شمیران روی آن یکنواخت	رنگ عمومی بدن قرمز یا قرمز آبی متالیک سر به رنگ قرمز متمایل به نارنجی و تیره با جلای آبی متالیک به رنگ قوه‌ای یکنواخت موها تیره و قاعده آن پهن اوین و شمیران روی آن یکنواخت	آغشته و برگان مراه و دانشکده کشاورزی کرج و ماهدشت است (شکل ۷)	

\*\* = اندازه حشرات کامل ماده


\* = اندازه حشرات کامل ماده




شکل ۴- قطعه Scapula در گونه *Scolia (Scolia) fallax* (Original)




شکل ۱- آلت زادآوری نر در زیر گونه *Megascolia maculat maculat* (Original)




شکل ۵- آلت زادآوری نر در گونه *Scolia (Scolia) fallax* (Original)




شکل ۲- قطعه *Scolia (Scolia) Volsellea* در زیر جنس (Original)




شکل ۶- آلت زادآوری نر در گونه *Scolia (Scolia) galbula* (Original)




شکل ۳- قطعه *Discolia* در زیر جنس *Volsellea* (Original)




شکل ۱۰- آلت زادآوری نر در زیر گونه  
*flaviceps mangichlakensis* (Original)




شکل ۷- آلت زادآوری نر در گونه  
*orientalis* (Original)



شکل ۱۱- آلت زادآوری نر در گونه  
*turkestanica* (Original)



شکل ۸- آلت زادآوری نر در گونه  
*luciformis* (Original)



شکل ۹- آلت زادآوری نر در گونه  
*flaviceps* (Original)

**بحث**  
زنپورهای خانواده Scoliidae در برخی نقاط دنیا در کنترل آفاتی از خانواده Scarabaeidae و حتی بعضی گونه‌های خانواده Curculionidae نقش موقتی داشته‌اند. از آنجایی که این زنپورها بیشتر در مناطق گرمسیر فعل هستند و نمونه برداریهای صورت گرفته مؤید این نظریه می‌باشد، لذا جستجوی گسترده‌تر در استانهای گرم کشور نظیر سیستان، بلوچستان، کرمان، هرمزگان و ... پیشنهاد می‌گردد.

در سال‌های اخیر در کرج، افزایش بی‌رویه مصرف سوموم حشره‌کش در باغ‌های میوه هسته‌دارها و دانه‌دارها بر علیه کرم‌های سفید ریشه و سرخرطومی‌های گیلاس و غیره سبب کاهش جمعیت بسیاری از پارازیت‌های از جمله گونه‌های متعلق به خانواده Scoliidae گردیده است و هم‌چنین از بین رفتان پوشش گیاهی، به ویژه گیاهانی که زنپورهای بالغ

- پیدا کردن راههای حمایت و افزایش جمعیت این زنبورهای مفید می‌باشد.

### سپاسگزاری

این تحقیق در قالب طرح تحقیقاتی مصوب امور پژوهشی دانشگاه تهران اجرا شده و هزینه آن از طرف معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران تأمین گردیده است که بدینوسیله نهایت سپاسگزاری به عمل می‌آید. از دکتر تیل استن متخصص راسته زنبورها در موزه Staatliches در اشتوتکارت آلمان که نام علمی گونه‌ها و زیرگونه‌ها را تایید نموده‌اند تشکر و قدردانی می‌شود.

Scoliidae روی آن فعال هستند و تخریب زمین‌های کشاورزی و استفاده از آن برای ساختمان‌سازی، زیستگاه طبیعی این حشرات را از بین برده و در نهایت سبب کاهش تنوع و تراکم گونه‌های این خانواده گردیده است. معرفی ۷ گونه و زیر گونه جدید از این خانواده برای ایران گام کوچکی در جهت معرفی این دسته از حشرات مفید بوده است و جهت کاربرد مطلوب این زنبورهای مفید نیاز به :

- مطالعه گستردہ‌تر برای شناسایی گونه‌های بیشتر در کل استانهای کشور
- بررسی بیولوژی، خصوصیات رفتاری و تعیین درصد پارازیسمی آنها

### REFERENCES

1. اسماعیلی، م. و ر. رستگار. ۱۳۵۳. معرفی گونه‌هایی از زنبورهای *Aculeata*. نامه انجمن حشره‌شناسان ایران، ۲(۱) : ۴۱-۵۲.
2. اسماعیلی، م. ۱۳۷۵. آفات مهم درختان میوه - چامپ سوم انتشارات سپهر - تهران - ۵۷۸ ص.
3. Betrem, J.G. 1963. A new neotropical subgenus of *Campsomeris* (Hym. Scoliidae). Entomol. News, 74(1): 70-73.
4. Betrem, J. G. 1962. The taxon *Trielis* (Hym. Scoliidae) and its type. Entomol. News, 73(1) 146-147.
5. Bradley, T.C. 1974. *Scolia* (*Clypeiscola*, N. SUBG.) *cleypealis*. N.SP.(Hym. Scoliidae). Entomol. News. 85(5): 186-187.
6. Brothers, D.J. & J.M. Carpenter. 1993. Phylogeny of Aculeata : Chryridoidea and Vespoidea (Hymenoptera). J. Hym. Research, 2(1) : 227-303.
7. Changming, Ch. 1999. Limiting damage to Scoliid parasitoids of larvae by appropriate application of soil insecticides. J. Chinese. Bio Control, 15(3) : 123-126.
8. Charmoy, D. E. 1922. An attempt to introduce scoliid wasp from Madagascar to Mauritius. Bull. Entomol. Research, 8(4) : 245-254.
9. Grissel, E. E. 1977. The Scoliid wasps of florida. I. Introduction, biology and key to nearctic genera (Hym. Scoliidae). Ent. Circular, 1(179) : 1-2.
10. Krombein, K. V. 1978. Biosystematic studies of Ceylonese wasps, II : a monograph of the scoliidae (Hymenoptera : Scolioidea). Smithsonian Institution press, Washington (USA). 56P.
11. Osten, T. 1999a. Beritrag Zur kenntnis der scoliiden fauna der turkei (ohnzypern) mit an mer kungen zur systematick und taxonomie (Hym. Scoliidae). Entomofauna, 20 (28) : 429-444.
12. Osten, T. 1999b. Dritter beitrag zur kenntnis der scoliiden fauna von zypern (Hym. Scoliidae). Entomofauna, 20 (26) : 401-421.
13. Osten, T. 1999c. Kritische liste der palaearktischen scoliiden (Hym. Scoliidae) Entomofauna, 20 (27) : 422-428.
14. Osten, T. 2000. Die Scoliiden des Mittelmeer Gebietes und Angrenzender Regionen (Hymenoptera) ein besti.
15. Piek, T. 1987. Block of synaptic transmission in insect CNS by toxins from the venom of the wasp *Megastola flavifrons* (Fab) Comp -Bio. Play. Comp. Pharm. Toxicol. 87(2) : 287-295.
16. Porter, C.C. 1981. Scoliidae (Hymenoptera) of the Lower Rio Grande Valley. Florida. Entomologists. 64(3): 441-453.
17. Yeo, F.F. & S.A. Corbet. 1983. Solitary wasps. Cambridge University Press, Cambridge, UK. 65.