مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی سال دوازدهم، شماره ششم، بهمن– اسفند ۱۳۸۴ www.magiran.com/jasnr

فون بندپایان شکارگر سفید بالکها (Homoptera: Aleyrodidae) در استانهای مازندران و گلستان و ارزیابی قدرت شکارگری آنها

حسن محقاری و هادی استوان

دانشجوی دوره دکترا و استادیار حشره شناسی دانشگاه آزاد آسلامی واحد علوم و تحقیقات تاریخ دریافت: ؛ تاریخ پذیرش:

چکیده

بر اساس نمونهبرداریهای انجام شده طی سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ از مناطق مختلف استانهای مازندارن و گلستان در رابطه با شناسایی بندیایان شکارگر سفید بالکها (Homoptera: Aleyrodidae)، ۲۶ گونه شکارگر از دو ردهی کنهها (Acarina) و حشرات به عنوان دشمنان طبیعی سفید بالکها جمع آوری و شناسایی شدند و توسط متخصصین صاحبنظر مورد تأیید قرار گرفتند. کنه های جمع آوری شده شامل ٤ گونه بود که همگی به خانوادهی Phytoseiidae از راستهی Mesostigmata تعلق داشتند. حشرات شكار گر به راسته هاى سخت باليوشان (Coleoptera)، سين ها (Hemiptera)، بالتورىها (Neuroptera)، دوبالان (Diptera) و بال ريشكداران (Thysanoptera) مربوط بو دنيد. سخت باليوشيان شکارگر که همگی به خانوادهی Coccinellidae یا کفشدوزکها تعلق داشتند شامل ۲۵ گونه، سنهای شکارگر شامل ۲۱ گونه، ترییسهای شکارگر شامل ٤ گونه، بالتوریهای شکارگر شامل ۳ گونه و مگسهای شکارگر شامل ٥ گونه بودند. از میان شکار گرهای فوق، ٤ گونه سن Anthlocoris flavipes Reuter Anthlocoris confusus Reuter هیان شکار گرهای فوق، ٤ گونه سن Geocoris ningal Linnavuori براى بای گونه مگس Geocoris ningal Linnavuori برای اولین بار از ایران گزارش می گردند. در پژوهش حاضر، علاوه بر شناسایی شکارگرهای سفید بالکها، میزان تغذیه هر یک از آنها نیز روی مراحل مختلف زیستی سفید بالک پنبه (Bemisia tabaci Gennadius) در شرایط آزمایشگاه بررسی شد. نتایج آزمایش های تغذیهای نشان داد که از میان گروه های مختلف شکارگران، بالتوری سبز (Stephens)، كفشـدوزك هفـتنقطـهاي.(Coccinella septempunctata (L)، مگـس Loew و سن Nabis palifer Seidenstucker به ترتیب با دارا بودن قدرت تغذیه ای ۷۲/۱±۳۷/۰ ، ۸۸/۲±۵۰/۶ ، ۸۸/۲±۵۰/۶ ۲۷/م±۲۷/۹ و ۲۹/۹±۲/۱ عدد طعمه، دارای بیشترین کارآیی در تغذیه از مراحل مختلف زیستی سفید بالک پنبه بودند.

واژههای کلیدی: دشمنان طبیعی، شکارگر، سفیدبالک، مازندران و گلستان

مقدمه

سفید بالکها (Aleyrodidae)، که از اهمیت اقتصادی فراوانی برخوردار میباشند، دارای پراکنش بسیار وسیعی هستند و نقش

مهمی در ایجاد خسارت به گیاهان و کاهش عملکرد محصول دارند (بیرن و بیلاس، ۱۹۹۱). از ۱۲۰۰ گونه Bemisia سفید بالک شناسایی شده در دنیا، دو گونه Trialeurodes و tabaci Gennadius

vaporariorum Westwood بهدلايل انتقال طيف وسیعتری از عوامل بیماریزای ویروسی و دامنه میزبانی وسیع تر، از اهمیت اقتصادی به مراتب بیشتری در مقایسه با سایر گونهها برخوردارنـد (بـراون و همكـاران، ۱۹۹۵). تراكم جمعيت اين حشرات در طول سال تحت تأثير عوامل مختلفی قرار می گیرد که در این میان شرایط آب و هوایی به عنوان عوامل مستقل از تراکم'، و دشمنان طبیعی به عنوانعوامل وابسته به تراکم ٔ دارای اهمیت بسیار زیادی می باشند (دی باخ و رزن، ۱۹۹۱). قارچهای بیماری زا و بندپایان شکارگر و پارازیتوئید از مهم ترین دشمنان طبیعی سفید بالکها محسوب می گردند (گرلینگ، ۱۹۹۰). از بندیایان شکارگر سفید بالکها می توان کنه های شکارگر خانواده Phytoseiidae (جنسهای) spp., Phytoseulus)، كفشدوزكها (Coleoptera: Coccinellidae)، سن های شکار گر (Hemiptera) خـــانو ادههـــای (Diptera) دویـــالان (Nabidae Miridae خانواده های Dolichopodidae ،Cecidomyiidae Drosophilidae و Empididae و بالتوري هاي (Neuroptera) خــانوادههـای Chrysopidae و Coniopterigidae را نام برد (برین و همکاران، ۱۹۹٤؛ استیونس و همکاران، ۲۰۰۰). پرورش انبوه و عرضه تجاری پارازیتوئیدها و شکارگران به دلیل دارا بودن کارآیی مطلوب در کنترل بیولوژیک سفید بالکها، جهت رهاسازی اشباعی " یا تلقیحی ن در گلخانهها و کشتهای زیر پوشش، در بسیاری از کشورها دنیا معمول می باشد. با توجه به تنوع بسيار وسيع دشمنان طبيعي سفيد بالكها که در اغلب مناطق دنیا پراکنده می باشند (استیونس و همكاران، ۲۰۰۰)، با حمايت و حفاظت مي توان باعث تقویت کو امل مزبور در کنترل طبیعی سفید بالک ها شد

که این امر کاهش استفاده از سموم شیمیایی و یا استفاده بهینه از آنها را در قالب برنامههای مدیریت تلفیقی آفات به دنبال خواهد داشت (هودل و همکاران، ۱۹۹۸).

با توجه به این که در رابطه با شناسایی دشمنان طبیعی سفید بالکها در استانهای مازندران و گلستان که دارای تنوع وسيعي از سفيد بالكها مي باشند، پژوهشي اجرا نشده است و تحقیقات انجام شده در سایر مناطق ایران نیز محدود می باشد، در پژوهش حاضر، فون دشمنان طبیعی سفید بالکها در استان های مازندارن و گلستان بهعنوان كانونهاي كشاورزي ايران مورد بررسي قرار گرفته است. از آنجایی که اغلب دشمنان طبیعی به خصوص شکار گرها دارای تخصص میزبانی نبوده و از طیف وسیعی از میزبانها (آفات) تغذیه مینمایند (وت و وایت، ۱۹۹۲)، بنابراین بر اساس نتایج پــژوهش حاضــر، مى توان دشمنان طبيعى ساير أفات موجود در منطقه بخصوص حشرات راسته جوربالان (Homoptera) را نیز شناسایی نمود. شناسایی دشمنان طبیعی آفات، گام مهمی در راستای کنترل آفات بر اساس طرح های کنترل بیولوژیک کلاسیک و کاربردی و نیز مدیریت تلفیقی آفات با هدف توسعه کشاورزی پایدار محسوب می گردد (دیباخ و رزن، ۱۹۹۱).

مواد و روشها

مطالعه فون شکارگران سفید بالکها با نمونهبرداری از روی گیاهان مختلف بخصوص پنبه و گیاهان جالیزی از مناطق مختلف استانهای مازندارن و گلستان طی سالهای ۱۳۸۲ - ۱۳۷۸ انجام شد. پس از جمع آوری دشمنان طبیعی و شناسایی مقدماتی آنها با استفاده کلیدهای تشخیص معتبر (لیناوری، ۱۹۸۶؛ ماژروس، ۱۹۹۶؛ پلانت، ۱۹۹۶؛ گوردون و وندنبرگ، ۱۹۹۵)، نمونهها جهت تأیید و یا تشخیص برای متخصصین صاحبنظر در خارج از کشور ارسال گردیدند.

با توجه به این که شکارگران معمولاً فاقد تخصص میزبانی و روی طیف وسیعی از میزبانها (طعمه) فعالیت تغذیهای دارند (دیباخ و رزن، ۱۹۹۱؛ وت وایت، ۱۹۹۲)،

¹⁻ Density independent

²⁻ Density dependent

³⁻ Inundative release

⁴⁻ Inoculative release

⁵⁻ Conservation

⁶⁻ Manipulation

⁷⁻ Augmentation

به منظور اثبات تغذیه شکارگران جمع آوری شده در پژوهش حاضر از سفید بالکها، برای اغلب شکارگران جمع آوری شده آزمایش تغذیهای صورت گرفت. برای این منظور از سفید بالک پنبه (Bemisia tabaci Gennadius) بـهدليـل سـهولت پـرورش انبـوه، دامنـه میزبانی و پراکندگی بسیار وسیع به عنوان شاخص سفید بالکها در نظر گرفته شد. پرورش انبوه سفید بالک پنبه در شرایط گلخانه و با دمای ۲±۲۵ درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی ۵±۰۵ درصد و ۱۶ ساعت روشنایی در شبانهروز، روی گیاه شاه پسند درختی (Lantana camara, Verbenaceae) انجام شد. به این ترتیب تمام مراحل زیستی سفید بالک پنبه از تخم تا حشره کامل به تعداد کافی در دسترس بودند. جهت انجام آزمایش تغذیهای برای شکارگران، از ظروف پتری پلاستیکی به قطر ۱۵ و عمق ۳ سانتی متر و با دریوش منفذدار استفاده گردید. برگهای حاوی سنین مختلف یورگی سفید بالک پنبه از تخم تا شفیره در داخل ظروف پتـری مزبـور قـرار گرفته و گروههای مختلف شکارگران بهطور جداگانه برای مدت ۷۲ ساعت داخل ظروف پتری و در مجاورت مراحل مختلف زیستی بالکهای شمارش شده، قرار گرفتند. تمام گونههای مربوط به یک گروه از شکارگران، بهطور همزمان و در شرایط یکسان مورد بررسی قرار گرفتند. در پایان میزان تغذیه شکارگران از هر یک از مراحل زیستی سفید بالکها تعیین گردید. تفکیک هر یک از مراحل زیستی سفید بالک پنبه بر اساس خصوصیات مرفولوژیک ارائه شده توسط گرلینگ (۱۹۹۰) بود. در این رابطه با توجه به این که امکان تفکیک سریع تمام مراحل زیستی شامل تخم، چهار سن پورگی، پیششفیره و شفیره وجود نداشت در نتیجه، مراحل زیستی مورد بررسی، به چهار گروه سنی شامل تخم، سنین اول و دوم پورگی، سنین سوم و چهارم پورگی و شفیره تقسیم گردیدنـد. بـه این ترتیب سه عدد برگ آلوده به مراحل مختلف زیستی سفيد بالک پنبه يک مثلث متساوي الاضلاع داخل هر ظرف پتری قرار گرفته و پنج عدد حشرهی کامل شکارگر (در رابطه با بالتوریها و مگسهای شکارگر از لاروهای سن آخر استفاده گردید) داخل هر ظرف پتری رهاسازی

گردید. تعداد تخمها و شفیرههای مستقر روی هر برگ ۲۰ عدد در نظر گرفته شد و تعداد اضافی با استفاده از سوزن ظریفی حذف گردید. بنابراین داخل هر ظرف پتری ٦٠ عدد از مراحل مختلف زیستی سفید بالک ینبه برای مدت ۷۲ ساعت در اختیار ۵ عدد شکارگر قرار گرفت و در پایان تعداد طعمههای خورده شده شمارش شدند و یا یوسته های خالی طعمه ها که همولنف آنها توسط شکارگران مورد تغذیه قرار گرفته بود، در زیر استرئومیکروسکوپ بهطور دقیق مورد بررسی قرار گرفت. تمام آزمایشها در داخل گلخانه و در قالب طـرح کـاملاً تصادفی با ٤ تيمار (مراحل مختلف زيستي سفيد بالک ينبه شامل تخم، پورههای سنین اول و دوم، پورههای سنین سوم و چهارم و شفیره) و در ٥ تكرار انجام شد. در پایان از دادههای حاصل از میزان تغذیه شکارگران از هر یک از مراحل زیستی سفید بالک پنبه، با استفاده از نرمافزار SAS (۱۹۹٤) تجزیه و تحلیل آماری بهعمل آمد و میانگین ها با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن مقایسه و گروهبندی گردیدند.

نتایج و بحث

بر اساس بررسی های انجام شده روی فون شکارگران سفید بالکها در مناطق استانهای مازندران و گلستان، ٦٤ گونه شکارگر از دو رده کنهها و حشرات به عنوان دشمنان طبیعی سفید بالکها جمع آوری و شناسایی گردیدند. از بین شکارگران جمع آوری شده از مناطق نمونه برداری، کفشدوزکها با دارا بودن ۲۵ گونهی شناسایی شده جزو مهمترین و کارآمدترین تریت شکارگران بودند که این شکارگران به دلیل فعالیت تغذیهای توام لاروها و حشرات کامل آنها و نیز تنوع گونهای وسیع و تراکم در اغلب مناطق تحت نمونه برداری، احتمالاً نقش به مراتب بیشتری در مقایسه با سایر شکارگران در کاهش تراکم جمعیت الرودها ایفاء می نمایند که انجام تحقیقات جامع در این رابطه ضروری می باشد. سنهای شکارگر نیز با دارا بودن رابطه ضروری می باشد. سنهای شکارگر نیز با دارا بودن

تنوع گونهای را در پژوهش حاضر دارا بودند. هـر یـک از شکارگران شناسایی شده در پژوهش حاضر بهطور جداگانه معرفی میشوند و مورد بررسی قرار می گیرند. کنه های شکارگر (Acarina): چهار گونه ی کنهی شکارگر از جنسهای Eharius ، Amblyseius Phytoseius و Phytoseiulus همگي از خانوادهي Phytoseiidae به عنوان دشمن طبيعي سفيد بالكها جمع آوری و شناسایی گردیدند. بر اساس گزارش گرلینگ (۱۹۹۰) و برین و همکاران (۱۹۹٤)، تمام گونههای مزبور بهطور فعال از مراحل زیستی نابالغ سفید بالکها و نیـز سایر جوربالان تغذیه مینمایند و در صورت دارا بودن تراکم مطلوب، می توانند نقش مؤثری در کاهش تراکم جمعیت این گروه از آفات ایفاء نمایند. با توجه به این که در رابطه با کارآیی کنههای شکارگر جمع آوری شده در پژوهش حاضر روى سفيد بالكها تاكنون تحقيقات جامعی صورت نگرفته است، در نتیجه انجام بررسی های دقیق در این رابطه و تعیین کارآیی این کنهها و امکان تلفيق أنها با ساير عوامل كنترل بيولوژيك ضروري می باشد. کنه های شکار گر گزارش شده در تحقیق حاضر عبار تند از: Amblyseius largoensis Muma Eharius (=Amblyseius libanesi Dosse) Banks *libanesi* macropilis Dosse Phytoseiulus persimilis , Phytoseius .Athias-Henriot

کفشدوزی ها (Coleoptera:Coccinellidae):
بیست و پنج گونه کفشدوزی شکارگر از ۱۳ جنس شامل (میست و پنج گونه کفشدوزی شکارگر از ۱۳ جنس شامل (Coccinellidae) مردوزی شامل (Coccinellinae) میستده (Coccinellinae) میستده (Coccinellinae) میستده (Coccinellinae) میستده (Coccinellinae) میستده (Coccinellinae) میستده (Chilocorinae) میستده (Scymninae) میستده اوری و شناسایی گردیدند.

بر اساس بررسی های انجام شده در مناطق مختلف استانهای مازندارن و گلستان، مناطق مزبور دارای فون بسیار غنی و کارآمد از انواع گونههای کفشدوزکها

می باشند که به طور طبیعی جمعیت سفید بالک ها و دیگر آفات را کنترل می نمایند. وجود عوامل کنترلی مذکور که یکی از مؤثرترین دشمنان طبیعی آفات محسوب می گردند (ابریکی و کرینگ، ۱۹۹۸) اغلب در مزارع سمپاشی نشده مشاهده گردید، در حالیکه تراکم این شکارگران در مزارع مختلف سمپاشی شده بسیار پایین بود و حتی در مواردی نیز اثری از آنها وجود نداشت. نمونهبرداریهای انجام شده در مزارع پنبه و جاليز مناطق مختلف استانهاي مزبور نشان داد که تمام گونههای جمع آوری شده، در مزارع فوق وجود داشته و نقش مهمی در کاهش تـراکم جمعیت آفات مختلف از جمله سفید بالکها ایفاء مىنماينىد. اگر چە شىكارگران بىرخلاف پارازىتوئىلىدھا معمولاً فاقد ویژگی تخصص میزبانی بوده و از طیف وسیعی از حشرات تغذیه مینمایند (سیندر و وایز، ١٩٩٩)، برخى شكارگران مانند كفشدوزكها تـا حـدودي دارای ترجیح غذایی می باشند و تا مادامی که میزبان های ترجیحی آنها در محیط زیست وجود داشته باشند به تغذیه از سایر منابع غذایی روی نمی آورند (فوفولو و ابریکی، ۱۹۹۷). بنابراین اگرچه در پژوهش حاضر، بررسی هایی در رابطه با کارآیی تغذیهای این شکارگران به عمل آمده است، اما جهت نیل به نتایج دقیق تر در رابطه با عملكرد تغذيهاي اين حشرات روى سفيد بالكها، انجام تحقيقات جامع حضور ساير ميزبانها بهخصوص شتهها (شرایط انتخابی) حائز اهمیت میباشد. بـا ایـن حـال بـر اساس نتایج جدول ۱ که عملکرد تغذیهای کفشـدوزکهـا را در شرایط غیرانتخابی و فقط در حضور سفید بالک ها به عنوان میزبان نشان می دهد، نقش این شکارگران در كنترل جمعيت سفيد بالكها را نمي توان ناديده گرفت.

بر اساس جدول ۱، کفشدوزکهای C. arcuatus و بر اساس جدول ۱، کفشدوزکهای C. septempunctata در مقایسه با سایر گونهها، دارای رفتار تخم خواری بیشتری بوده و اختلاف آنها با سایر تیمارها در سطح آماری ۱ درصد معنی دار می باشد. $(F=79/\Lambda \epsilon, df=r)$. مقایسه تعداد پورهها و شفیرههای مورد تغذیه قرار گرفته توسط گونههای

¹⁻ Choice Experimental Method

²⁻ No-choice Experimental Method

³⁻ Oophage

مختلف کفشدوزکها نشان می دهد که کفشدوزک هفت مختلف کفشدوزک هفت می (Coccinella septempunctata) با هفت نقطه ای (Coccinella septempunctata) بیشترین میانگین قدرت تغذیه ای 1×100 عدد دارای بیشترین عملکرد تغذیه ای از پورهها و شفیره های سفید بالک پنبه Stethorus بنوده و بعد از آن، به ترتیب گونه های مفید بالک پنبه Exochomus (۱۰۵ عدد)، مازمان و تاکه مازمان و تاکه این از آن به ترتیب گونه های gilvifrons Exochomus (۱۰۵ عدد)، nigromaculatus Hippodamia میل و تاکه این و

نقطهای بیشترین تراکم جمعیت را در بین تمام انواع کفشدوزکهای گزارش شده در پژوهش حاضر دارا بوده و به طور فعال از تمام مراحل زیستی و حتی از حشرات کامل سفید بالکها که به تازگی از شفیره خارج شده و فاقد قدرت پرواز سریع می باشند نیز تغذیه می نماید. کفشدوزکها به دلیل تغذیه توام لاروها و حشرات کامل از آفات مختلف، اهمیت به سزایی در کنترل آفات دارند (ماژروس، ۱۹۹۶). کفشدوزک هفتنقطهای بیشترین تراکم را در مناطق مختلف نمونه برداری بویژه در مزارع پنبه دارا بوده است.

جدول ۱- میانگین میزان تغذیه پنج عدد حشره کامل گونههای مختلف کفشدوزکهای شکارگر (Coccinellidae) از مراحل مختلف زیسـتی سفیدبالک پنبه در مدت ۷۲ ساعت (n=۲۵).

کفشدوزک شکارگر	خطای معیار \pm میانگین تعداد طعمه خورده شده			
ففسدورک سکار کر	تخم	پورههای سنین ۱–۲	پورههای سنین ۳–۶	شفيره
Adalia bipunctata L.	•	ヽ・/で ±^/\d	$\Lambda/\Lambda\pm \mathbb{I}/Vf$	٥/١±٤/٣ h
Anisostica bitriangularis Say	£7/7±7/Vbc	1 • / 9 ± 9 / V d	$V/1\pm09/9f$	۳/۲±۲/٦ i
Brumus octosignatus Gebl.	•/9o±•/o∧e	1 {/1±17/•cd	19/V±17/Vb	$\text{1}\text{7/3} \pm \text{1/0} f$
Brumus undecempunctata (L).	•/٣٧±•/٢٢e	11/8±V/9d	10/9±9/Ecd	$4/\Lambda \pm 0/1g$
Chilocorus bipustulatus (L).	•	ヽ・/v ±ヘ/でd	$1A/V\pm17\%bc$	77/7±10/9C
Chilocorus stigma Say	7/7±7/7c	1 {/7±17/Ecd	$4/2\pm 7/4ef$	$V/1\pm \Psi/\epsilon h$
Clitostethus arcuatus (Rossi)	9/r±v/9a	\V/A±\0/\c	\ \ / ξ±V/Λe	$1/v\pm \epsilon/rh$
Coccinella septempunctata (L).	1/7±0/9a	70/0±77/7a	$77/7\pm1A/Va$	17/8±18/1e
Exochomus flavipes (Thunb).	•	۸/۲±٦/٥e	10/7±11/·cd	۳۱/۲±۱۹/۰a
Exochomus nigromaculatus (G)	•	11/m±4/vd	$V/\Lambda \pm 4/\Lambda c$	۲9/ε±γ·/0a
Exochomus nigripennis Erich.	1/9±1/0de	٩/٤±٧/٥de	1 E/Y±1 ·/9d	$17/1\pm1\cdot/1f$
Exochomus pubescens Kuster	7/1±1/7d	71/7±11/rd	17/9±17/2c	$\text{I/A} \pm \text{o/V} h$
Exochomus quadripustulatus L.	•	11/5±10/4bc	\\/\±\7/\c	1./r±9/2g
Hippodamia variegata (Goeze)	•/00±•/£9e	17/0±1·/9d	19/A±18/9b	Υ٣/٤±Υ \/٣c
Nephus biguttatus M.	0/Y±£/0b	$1/V\pm \epsilon/1e$	٤/٧±٣/٥g	v/a±z/tgh
Nephus bipunctatus (Kug.)	۳/۸±۲/٤bc	$\Lambda/V\pm 1/1e$	$7/0\pm \epsilon/7g$	$4/\cdot \pm V/\cdot g$
Oenopia conglobata L.	•	o/v±e/va	9/9±1/Ve	19/V±17/7d
Oenopia oncina (Oliver)	•	٧/٦±٥/٢e	11/Y±9/1e	77/7±77/Vb
Scymnus apetzi Mulsant	۳/٤±۲/٩c	$19/7\pm1V/\Lambda b$	17/v±11/7d	v/l±l/agh
Scymnus flavicollis Redten.	0/£1/0b	YE/V±Y·/oa	10/·±17/ma	٤/٨±٤/٥i
Scymnus levaillanti Mulsant	\/V±\/\d	17/9±12/0C	18/r±11/0d	$\Lambda/1\pm \pi/Vgh$
Scymnus rubromaculatus (G.)	٤/٨±٤/٢bc	10/W±1W/1C	11/9±10/Va	11/o±9/rf
Scymnus subvillosus (Goeze)	Y/9±1/でd	$7\cdot/\cdot\pm17/\wedge b$	1 {/1±1 }/\d	v/a±o/ygh
Scymnus syriacus Marseul	٣/0±٢/9c	$1 \text{A/V} \pm 1 \text{ o/} \text{Tbc}$	\\/\text{\\def} \/ode	\·/A±V/\fg
Stethorus gilvifrons (Muksant)	7/7±1/7d	77/7±19/10	71/0±17/7b	$11/14 \pm 1/0$

میانگینهای دارای حروف غیرمشابه در هر ستون، دارای اختلاف معنی داری در سطح احتمال ۱ درصد می باشند.

سنهای شکارگر (Hemiptera): بیست و یک گونه س_ن ش_كارگر از هف_ت ج_نس Anthocoris (Anthocoridae: Anthocorinae) (Miridae:Phylinae) Comphylomma Deraeocorinae) Deraeocoris (Miridae: Miris (Lygaeidae: Geocorinae) Geocoris Nabidae:) *Nabis* (Miridae: Mirinae) Anthocoridae:) Orius , (Nabinae Anthocorinae) به عنوان دشمنان طبیعی سفید بالک ها جمع آوری و شناسایی گردیدند. از میان سنهای شکارگر A. A. confusus شناسایی شده، چهار گونه G. marduk flavipes و G. ningal برای اولین بار از ایران گزارش می گردند.

مطالعات انجام شده روی سنهای شکارگر نشان داد که در بین ۲۱ گونه مورد بررسی، گونه گونه دارای قدرت شکارگری بیشتری در مقایسه با سایر گونهها در جهت تغذیه از پورههای سنین اول و دوم برخوردار است (۱۳/۷±۱۳/۸ عدد) (جدول ۲). در رابطه با میانگین

قدرت تغذیهای سنهای شکارگر از تمام مراحل نابالغ زیستی سفید بالکها به جز تخم، بررسی ها نشان داد که .G. megacephalus N. palifer سـن هـاى D. punctulatus و C. diversicornis بهترتیب از کارآیی شکارگری بیشتری در مقایسه با سایر سنها برخوردارند (جدول ۲). با توجه به این که از جنبه کنترل بیولوژیک، عواملی که مراحل زیستی اولیه آفات (تخم یا سنین لاروی یا یورگی اول) را از بین می برند، نقش مؤثرتر و کارآمدتری در کاهش خسارت ایجاد شده توسط آفات ایفاء مینمایند (دیباخ و رزن، ۱۹۹۱)، در نتیجه بـر اساس جدول ۲، سن O. albidipennis برخلاف گونه سن مذکور، به دلیل فعالیت تغذیهای بسیار مطلوب از پورههای سنین اول و دوم سفید بالکها می تواند به عنوان عامل كارامد در كنترل سفيد بالكها و نيز كهش خسارت آنها محسوب گردد که انجام تحقیقات جامع در رابطه با امکان پرورش انبوه این شکارگر جهت رهاسازی اشباعی یا تلقیحی در گلخانهها، کشتهای زیر یوشش و نیز مزارع پیشنهاد می گردد.

جدول ۲- میانگین تغذیهای پنج عدد حشره کامل سنهای شکارگر از سفیدبالک پنبه در مدت ۷۲ ساعت (n=۲۵).

خطای معیار \pm میانگین تعداد طعمه خورده شده		
نخم	سن شکارگر تخ تخ	
•	· A. confusus Reuter	
•	• A. flavipes Reuter	
•	· A. minki Dohrn	
	· A. Nemoralis (Fabr)	
	· A. Nemorum L.	
•	· C. diversicornis Reuter	
	· C. verbasci Meyer Dur	
	· D. punctulatus (Fallen)	
•	· D. pallens Schill	
	• G. lurdicus Fieb.	
	• G. marduk Linnavuori	
•	· G. megacephalus Sicul.	
	· G. ningal Linnavuori	
	• G. pallidipennis Costa	
•	· G. quercicola Linnav.	
•	• M. persicus Jak.	
•	N. capsiformis Germ.	
•	N. palifer Seidenstucker	r
•	· O. albidipennis (Reuter)	
•	· O. minutus L.	
•	• O. pallidicornis Reuter	

میانگینهای دارای حروف غیرمشابه در هر ستون، دارای اختلاف معنی داری در سطح احتمال ۱ درصد می باشند.

تریپس های شکارگر (Thysanoptera): چهار گونه ت_ريبس ش_كارى از س_ه ج_نس Aelothrips **Haplothrips** (Aelothripidae) (Thripidae) Scolothrips (Phlaeothripidae) به عنوان شكار گران فعال سفيدبالك ها جمع آوري و شناسایی گردیدند. بررسی قدرت شکارگری یا تغذیهای تریپسهای گزارش شده در پژوهش حاضر نشان داد که تمام گونهها، از سنین پورگی اولیه سفید بالکها بیشتر از پورههای مسنتر یا درشتتر و یا شفیرهها تغذیه مىنمايند، بهطورى كه ترجيح تغذيهاى شكارگران فوق توأم با افزایش سن پورگی میزبان، بهطور معنی داری کاهش می یابد. در بین چهارگونه ترییس گزارش شده، گونههای S. longicornis و S. latipennis بهترتیب دارای بیشترین قدرت تغذیهای می باشند، به طوری که میانگین تعداد پورهها و شفیرههای مورد تغذیه قرار گرفته توسط آنها به ترتیب ۵۲/۲±۵۲/۷ و ۲۱/۱±۳۳/۰ عدد تعیین گردید که اختلاف معنی داری بین آنها با سایر $P=\cdot/\cdot\cdot 1$ تیمارها در سطح احتمال ۱ درصد وجود دارد ۳=۲۳/٤٦، df=۳ (جدول ۳).

بالتورىها (Neuroptera: Chrysopidae): سه گونه بالتوري از جنس هاي Mallada ،Chrysoperla و Suarius به عنوان دشمنان طبيعي سفيد بالكها جمع آوری و شناسایی گردیدند. بررسی قــدرت تغذیــهای بالتورىهاي مزبور نشان ميدهد كه أنها برخلاف ترییسها، مراحل زیستی مسنتر سفید بالکها را جهت تغذیه ترجیح می دهند. در بین سه گونه بالتوری گزارش شده در تحقیق حاضر، گونه C. carnea دارای بیشترین قدرت تغذیهای بوده و اختلاف میانگین تعداد طعمههای شکار شده توسط آن در مقایسه با سایر گونهها در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار است (۱۳۰۸-۳۳۲ احتمال ۱ درصد التورى از (جدول ٤). اگرچه ترجیح تغذیهای بالتوری از (۴=۳۷/۵۱ مراحل زیستی انتهای آفت و نیز وجود پدیده همخواری در آنها، یک نقطه ضعف از دیدگاه کنترل بیولوژیک محسوب مى گردد، اما قدرت تغذيهاي بالاي اين شكارگران به خوبی این نقطه ضعف را پوشش داده و رهاسازی صحیح آن در شرایط گلخانه طی چند نسل باعث كنترل جمعيت آفت مورد نظر مي گردد.

جدول ۳- میانگین تغذیهای پنج عدد حشره کامل تریپسهای شکارگر از سفید بالک پنبه در ۷۲ ساعت (n =۲۵).

خطای معیار \pm میانگین تعداد طعمه خورده شده			ترييس شكار گر	
شفيره	پورههای سنین ۳–٤	پورههای سنین ۱–۲	تخم	تریپس شمار در
٤/٢±٣/٢b	0/£±7/1C	۸/٩±٣/٥c	•	A. collaris Priesner
$r/2\pm r/4b$	ε/λ±٣/۲c	$V/\Upsilon\pm\delta/4c$	•	A. kurdjomovi Karny
$V/o\pm \xi/Va$	$4/r\pm 1/hb$	17/7±9/7b	•	S. latipennis Priesner
$\Lambda/\Lambda\pm T/\Upsilon a$	$17/V\pm\Lambda/3a$	19/A±1·/£a	•	S. longicornis Priesner

میانگین های دارای حروف غیرمشابه در هر ستون، دارای اختلاف معنی داری در سطح احتمال ۱ درصد می باشند.

جدول ٤- ميانگين تغذيهای پنج عدد لارو سن سوم بالتوری شکارگر از سفيد بالک پنبه در ٧٢ ساعت (n=٢٥).

	تعداد طعمه خورده شده			
شفيره	پورههای سنین ۳-۶	پورههای سنین ۱-۲	تخم	 بىنورى
٣1/1±10/Va	Υ٣/٤±١١/0a	1V/7生1・/でa	•	C. carnea (Stephens)
$\Upsilon \Upsilon / \Lambda \pm \Lambda / \P b$	$1 \text{V/Y} \pm 1 \cdot \text{/A}b$	V/9±Y/VC	•	M. flavifrons (Brauer)
70/7±11/Vb	10/9±9/Eb	$17/\text{m} \pm \text{A/V} b$	•	S. fedtschenkoi McLach.

میانگینهای دارای حروف غیرمشابه در هر ستون، دارای اختلاف معنیداری در سطح احتمال ۱ درصد میباشند.

مگسهای شکار گر (Diptera): پنج گونه مگس شکار گر (Drosophilidae) Acletoxenus از جسسهای Diplosis Dicrodiplosis Aphidoletes

مگسهای (Cecidomyiidae) و (Cecidomyiidae) به عنوان (Chamaemyiidae=Ochthiphilidae) به عنوان طبیعی سفید بالکها جمع آوری و شناسایی گردیدند. از میان دو بالان شناسایی شده، گونه D. گردیدند. از میان دو بالان شناسایی شده، گونه D. همچنین رابطهی شکار گر طعمه بین مگس شکار گر میادرش می شکار گر طعمه بین مگس شکار گر D. همچنین رابطهی شکار گر طعمه بین مگس شکار گر می گردد.

A. مجموع میانگینهای تغذیهای مگسهای شکارگر مجموع میانگینهای تغذیهای مگسهای شکارگر مجموع میانگینهای مگسهای A. D. manihoti A. aphidimyza formosus D. puncticornis D aphidisuga D (مراحل مختلف میل D از مراحل مختلف میل D از مراحل مختلف میل D و کرم و کرم D و کرم و ک

مقایسه کارآیی شکارگران مختلف بر اساس جدولهای ۱ تا ۵، نشان میدهد که در بین تمام شکارگران جمع آوری شده در پژوهش حاضر، بالتوری سبز C. carnea دارای بیشترین قدرت شکارگری میباشد، به طوری که لاروهای این شکارگر در طول مدت آزمایش، ۷۲/۱±۲۷/۵ عدد از پورههای سفید بالک پنبه را مورد تغذیه قرار دادند.

با توجه به وجود فون بسیار غنی و کارآمد از انواع دشمنان طبيعي بـهخصـوص كفشـدوزكهـا و سـنهـاي شکارگر در استانهای مازندران و گلستان، در صورتی که از کاربرد بی رویه ترکیبات شیمیایی در مناطق مزبور اجتناب گردد، این طیف وسیع و کارآمد از دشمنان طبیعی بهطور قطع توانایی کنترل جمعیت سفید بالکها و بسیاری دیگر از آفات را در مناطق مزبور دارا می باشند. اگرچه پرورش انبوه دشمنان طبیعی و رهاسازی آنها در شرایط گلخانه و مزرعه مستلزم صرف هزینه های نسبتاً بالایی می باشد، اما با حمایت و حفاظت می توان گامهای مؤثری در جهت فزایش راندمان شکارگران برداشت (حافظ و همكاران، ١٩٧٨). يژوهش حاضر كه اساساً به معرفي شکارگران سفید بالکها در استانهای مذکور پرداخته است، گامی نخست در جهت شناسایی، معرفی و حمایت از شکارگرهای موجود در مناطق مزبور محسوب گردیده و انجام مطالعات جامع در جهت تعیین کارآیی هر یک از شکارگرها در شرایط طبیعی، تعیین کانونهای زمستان گذرانی و دینامیسم جمعیت آنها در فصول مختلف سال و شناسایی دشمنان طبیعی آنها ضروری میباشد. بـر اسـاس نتایج پژوهش حاضر و نیز گزارشهای گرلینگ (۱۹۹۰)، برین و همکاران (۱۹۹۶) و ابریکی و کرینگ (۱۹۹۸)، بالتوری سبز، کفشدوزکها و سنهای شکارگر به دلیل دارا بودن فون بسیار غنی و تراکم بالا در اغلب مناطق دنیا و نیز قدرت شکارگری بالا، نقش مؤثرتری در کنترل سفید بالکها دارند، بهطوریکه امروزه در برخی مناطق دنیا، تعدادی از گونههای کارآمد کفشدوزکها و سنها و نیز بالتوری سبز را بهصورت انبوه پرورش داده و در مزارع و گلخانهها رهاسازی مینمایند (سیندر و وایز، ۱۹۹۹؛ استيونس و همكاران، ٢٠٠٠). به اين ترتيب مي توان با حمایت از شکارگران مزبور و نیز سایر شکارگران مانند کنهها، دو بالان و تریپسهای شکارگر گامهای مؤثر و بی خطری در راستای کنترل سفید بالکها و نیز سایر آفات بر داشت.

جدول ۵- میانگین تغذیهای پنج عدد لارو سن آخر مگسهای شکارگر از مراحل مختلف زیستی سفید بالک پنبه در مدت ۷۲ ساعت (n=۲۵).

خطای معیار \pm میانگین تعداد طعمه خورده شده				مگس شکار گر ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شفيره	پورههای سنین ۳-۶	پورههای سنین ۱–۲	تخم	محس سکار در
Yo/V±V/Ja	19/V±1•/٣a	\٣/٣±٧/٦a	٣/A±٢/£b	A. formosus Loew
11/r±7/8b	1 E/9±1/7b	$\Lambda/1\pm o/9b$	•	A. aphidimyza
17/7±11/4c	Y • / Y ± 1 Y / Ja	11/9±7/Aa	$9/9\pm0/Aa$	D. manihoti Harr.
T•/7±9/1b	$10/0\pm 9/Vb$	\sqrt{b}	•	D. aphidisuga
٤/٩±٤/٤d	V/\#±\\7c	٣/V±٢/٤c	•	L. puncticornis Meig.

میانگین های دارای حروف غیرمشابه در هر ستون، دارای اختلاف معنی داری در سطح احتمال ۱ درصد می باشند.

يژوهش حاضر از اعتبارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نگارنـدگان از مساعدتهای ارزشـمند شـادروان دکتـر علوم و تحقیقات تهران تأمین و پرداخت گردیده است.

سپاسگزاری

هوشنگ بیات اسدی کمال امتنان را دارند. هزینه انجام

منابع

- 1.Breene, R.G., Dean, D.A. and Quarlea, W. 1994. Predators of sweetpotato whitefly, *Bemisia tabaci*. IPM-Practitioner 16(8): 1-9.
- 2.Byrne, D.N., and Bellows, T.S. 1991. Whitefly biology. Annu. Rev. Entomol. 36: 431-57.
- 3.Gerling, D. 1990. Whiteflies; their bionomics, pest status and management. Wimborne, U.K. Intercept, 348 p.
- 4.Gordon, R.D., and Vandenberg, N. 1995. Larval systematics of North American Coccinella L. (Coleoptera: Coccinellidae). Entomological Scandinavica 26 (1): 67-86.
- 5. Hafez, M., Tawfik, M.F.S., Awadallah, K.T., and Sarhan, A.A. 1978. Natural enemies of the cotton whitefly, Bemisia tabaci (Genn.); in the world and in Egypt. Bull. Soc. Entomol. Egypt 62: 9-13.
- 6.Hoddle, M.S., Van Driesche, R.G. and Sanderson, J.P. 1998. Biology and use of the whitefly parasitoid Encarsia formosa. Annu. Rev. Entomol. 43:645-69.
- 7. Linnavuori, R.E. 1984. New species of Hemiptera Heteroptera from Iraq and the adjacent countries. Acta Entomologica Fennica 44:1-58.
- 8. Majerus, M.E.N. 1994. Ladybirds. London: Harper Collins. 367 p.
- 9. Obrycki, J.J., and Kring, T.J. 1998. Predaceous Coccinellidae in biological control. Annu. Rev. Entomol. 43: 295-321.
- 10.Phoofolo, M.W., and Obrycki, J.J. 1997. Comparative prey suitability of Ostrinia nubilalis eggs and Acyrthosiphon pisum for Coleomegilla maculata. Biol. Control. 9: 167-172.
- 11.Plant, C.W. 1994. Provisional atlas of the lacewings and allied insects (Neuroptera, Megaloptera, Raphioptera and Mecoptera) of Britain and Ireland. Huntingdon.
- 12.SAS Institute, 1994. SAS users guide statistics, SAS Institute Carey, N.C.
- 13. Stevens, T.J., Kilmer, R.L., and Glenn, S.J. 2000. An economic comparison of biological and conventional control strategies for whiteflies (Homoptera: Aleyrodidae) in greenhouse poinsettias. J. Econ. Entomol. 93 (3): 623-629.
- 14. Synder, W.E., and Wise, D.H. 1999. Predator interfrence and the establishment of generalist predator populations for biocontrol. Biological Control 15:283-92.
- 15.Vet, L.E.M., and Dicke, M. 1992. Ecology of infochemical use by natural enemies in a tritrophic context, Annu. Rev. Entomol. 37: 141-172.

J. Agric. Sci. Natur. Resour., Vol. 12(6), Feb - Mar 2006 www.magiran.com/jasnr

Predator arthropods, fauna of whiteflies (Homoptera: Aleyrodidae) in Mazandaran and Golestan provinces and their feeding efficiency

H. Mahghari and H. Ostovan

Ph.D. Student and Assis. Prof., Dept. of Entomology, Research and Science center, Azad Univ., Tehran, Iran

Abstract

In a faunal study of whiteflies predators in 1999-2003 at different areas of Mazandaran and Golestan provinces, 64 species of Hexapoda and Acarina were collected and identified. The species were confirmed by the authorized specialists. All mites belonged to Phytoseiidae of Mesostigmata, and the predatory insects Coleoptera, Hemiptera, Neuroptera, Diptera, and Thysanoptera. The predator beetles that belonged to Coccinellidae, contain 25 species, and for Hemiptera, Neuroptera, Diptera, and Thysanoptera were 21, 3, 5 and 4 species, respectively. Among the identified predators, 4 species of Hemiptera including: *Anthocoris confusus* Reuter, *Anthocoris flavipes* Reuter (Anthocoridae), *Geocoris marduk* Linnavuori, and *Geocoris ningal* Linnavuori(Lygaeidae), and also *Diplosis aphidisuga* (Diptera: Cecidomyiidae) are new record from Iran. In this study, feeding efficiency of predators was also determined on the different life stage of *Bemisia tabaci* Gennadius in laboratory conditions. The results of feeding tests indicated that among the different predators, *Chrysoperla carnea*(Stephens), *Coccinella septempunctata* (L.), *Acletoxenus formosus* Loew, and *Nabis palifer* Seidenstucker with 72.1±37.5, 68.2±55.4 and 56.1±46.9 fed preys had the most feeding efficiency, respectively.

Keywords: Natural enemies; Predator; Whitefly; Mazandaran; Golestan