

## مطالعه اثرات طولانی مدت تغذیه بر فعالیت فولیکولی تخدمان در قبل و بعد از بلوغ جنسی در تلیسه‌های برهمن

\*فیروز صمدی

استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تاریخ دریافت: ۸۷/۶/۲۷؛ تاریخ پذیرش: ۸۹/۵/۱۷

### چکیده

هدف از این مطالعه، تعیین اثرات طولانی مدت تغذیه بر فعالیت فولیکولی تخدمان در قبل و بعد از بلوغ جنسی در تلیسه‌های برهمن بود. تعداد ۲۲ راس گوساله برهمن در حال رشد، به طور تصادفی و براساس سن و وزن اولیه به ۲ گروه مساوی تقسیم شدند. گروه ۱، تلیسه‌هایی که از چراگاه خوب تغذیه و گروه ۲، تلیسه‌هایی که از چراگاه فقیر تغذیه کردند. فعالیت فولیکولی تخدمان در هر دو گروه با استفاده از دستگاه فرا صوت<sup>۱</sup> به صورت هفت‌هفته در میان ثبت شد. متوسط تعداد فولیکول‌های ذخیره‌ای (۲-۰ میلی‌متر) در تلیسه‌های گروه ۱ به طور قابل ملاحظه‌ای بیش از گروه ۲ بوده است ( $P < 0.05$ ). میانگین تعداد فولیکول‌های کوچک (۳-۵ میلی‌متر) در طول آزمایش در نوسان بوده و با این وجود، متوسط تعداد فولیکول‌های بالا در گروه ۱ به طور معنی‌داری بیشتر بود ( $P < 0.05$ ). الگوی رشد فولیکول‌های متوسط (۶-۹ میلی‌متر) برای هر دو گروه در طول آزمایش مشابه بوده است ( $P > 0.05$ ). اندازه بزرگ‌ترین فولیکول در طول دو ماهه اول آزمایش افزایش یافت ( $P < 0.05$ ، اما پس از آن ثابت ماند). میانگین تعداد فولیکول‌های بزرگ (حداقل ۱۰ میلی‌متر) در بین گروه‌های آزمایشی تفاوت معنی‌داری نداشت ( $P > 0.05$ ). اگرچه درصد فولیکول‌های کوچک، متوسط و بزرگ در بین گروه‌های آزمایشی یکسان بوده، اما درصد فولیکول‌های ذخیره‌ای در تلیسه‌های تغذیه شده از چراگاه خوب بیشتر بوده است ( $P < 0.05$ ). اندازه بزرگ‌ترین فولیکول آماده برای تخمکریزی در تلیسه‌های گروه ۱ بیش از گروه ۲ بود ( $P < 0.05$ ). درصد تخمکریزی برای تیمارهای ۱ و ۲ به ترتیب ۱۰۰ و ۱۰ می‌باشد ( $P < 0.05$ ). این نتایج نشان می‌دهند که تغذیه ممکن است با تحریک فولیکول‌های ذخیره‌ای و نیز با افزایش اندازه فولیکول‌های بالغ سبب افزایش میزان تخمکریزی شود.

واژه‌های کلیدی: فعالیت فولیکولی تخدمان، تغذیه، تلیسه‌های برهمن

فعالیت فولیکول‌ها از دوران جنینی شروع شده و در طول حیات حیوان، فولیکول‌ها به طور مرتب در حال رشد و پس‌روی می‌باشند (فورچون و همکاران، ۲۰۰۰؛ وب و همکاران، ۲۰۰۴). اگرچه مکانیسم‌های مؤثر بر شروع و ادامه فعالیت فولیکول‌های تخدمان به درستی شناخته نشده‌اند، اما به نظر می‌رسد فعالیت فولیکولی تخدمان

### مقدمه

فعالیت‌های فولیکولی تخدمان نقش اساسی در کترسل چرخه تولیدمثلی، تعیین رفتارهای فحلی، تخمکریزی و آبستنی بر عهده دارند (دیسکین و همکاران، ۲۰۰۳).

\* مسئول مکاتبه: samadi542@yahoo.com

نیز تأثیر مثبت تغذیه بر رشد فولیکول های نژاد گوشته شده با جیره های غذایی مطلوب، تعداد فولیکول های آماده تخمکریزی و نیز نسبت تخمکریزی به طور قابل ملاحظه ای بیشتر بود. کیندر و همکاران (۱۹۹۵) بیان کردند که تغذیه ناکافی در تلیسه های نژاد گوشته سبب تأخیر در رشد فولیکول ها و نیز تأخیر در بلوغ جنسی می شود. چلیکانی و همکاران (۲۰۰۳) گزارش کردند که تلیسه های شیری تغذیه شده با جیره های پرانرژی و پروتئین، سریع تر به سن بلوغ جنسی می رسند. همچنین میانگین قطر فولیکول های بالغ در تلیسه های تغذیه شده با جیره های فقیر، کمتر از تلیسه های تغذیه شده با جیره های مقوی بود. دیسکین و همکاران (۲۰۰۳) بیان کردند که محدودیت های تغذیه ای ملایم و شدید (تغذیه به اندازه ۴۰ درصد احتیاجات تغذیه ای) بسته به شدت محدودیت، با کاهش رشد فولیکول های غالب به ترتیب سبب آنستروس<sup>۱</sup> تدریجی و آنی می شوند. همچنین این محققان گزارش کردند در صورتی که گوساله های در معرض محدودیت تغذیه ای با جیره های مناسب تغذیه شوند نسبت رشد و اندازه فولیکول های بالغ به طور معنی داری افزایش می یابد.

با توجه به این که در ارتباط با تأثیر تغذیه بر فعالیت فولیکولی تخدمان، بیشتر اثرات کوتاه مدت تغذیه بررسی شده است و نیز با توجه به این که فرم رشد و نمو فولیکول های با اندازه های مختلف در نژاد های گوشته در یک دوره زمانی طولانی مدت کمتر مطالعه شده است، بنابراین این پژوهش جهت مطالعه تأثیر طولانی مدت تغذیه بر فعالیت فولیکول های مختلف تخدمان در قبل و بعد از بلوغ جنسی در تلیسه های نژاد گوشته بر همن منجام شد.

## مواد و روش ها

این پژوهش در دانشگاه کوئینزلند استرالیا در سال های ۲۰۰۶-۲۰۰۴ میلادی انجام شد. در این پژوهش به منظور تعیین تأثیر طولانی مدت تغذیه بر فعالیت فولیکولی تخدمان

تحت تأثیر سازو کارهای متعدد درونی و بیرونی باشد (وب و همکاران، ۲۰۰۴). برای مثال، حساسیت هیپوتalamوس به هورمون استرادیول تخدمان از جمله سازو کارهای مهم و مؤثر بر فعالیت فولیکول های تخدمان می باشد. زمانی که هیپوتalamوس تحت تأثیر فیدبک منفی استرادیول تخدمان است نبود ترشح کافی LH از بخش پیشین غده هیپوفیز منجر به رشد نکردن کافی فولیکول ها و در نهایت نبود تخمکریزی می شود (پاتریک و لیون، ۲۰۰۱). علاوه بر FSH و LH (درینکورت، ۲۰۰۰) فاکتورهای رشد (وب و همکاران، ۲۰۰۴) و تعدادی از فاکتورهای محیطی به خصوص تغذیه نیز بر رشد و فعالیت فولیکول های تخدمان مؤثرند (وب و همکاران، ۲۰۰۳؛ باتلر، ۲۰۰۰). تغذیه با تأثیر بر محور هیپوتalamوس - هیپوفیز - تخدمان، فعالیت فولیکولی تخدمان را کنترل می کند (دیسکین و همکاران، ۲۰۰۳). تغذیه ممکن است از طریق متابولیت های تغذیه ای مانند انسولین بر فعالیت فولیکولی تخدمان مؤثر باشد (سیمپسون و همکاران، ۱۹۹۴؛ گانگ و همکاران، ۲۰۰۲b). کمبود انرژی مصرفی و یا تعادل منفی انرژی سبب تأخیر در بلوغ جنسی تلیسه ها (کیندر و همکاران، ۱۹۹۵) و نیز تأخیر در شروع مجدد فعالیت های فولیکولی تخدمان در پس از زایش می شود (سینکلر و همکاران، ۲۰۰۲). محدودیت تغذیه ای در تلیسه ها، علاوه بر تأثیر منفی بر رشد فولیکول ها از فعالیت استروئیدسازی فولیکول های بالغ نیز جلوگیری می کند (رودز و همکاران، ۱۹۹۶؛ بیم و باتلر، ۱۹۹۹)، اما فلاشینگ یا شوک تغذیه ای با تحریک رشد فولیکول ها از میزان فولیکول های تحیلی رونده یا آترتیک<sup>۲</sup> می کاهد (موراز و همکاران، ۱۹۸۵). گوتیرز و همکاران (۱۹۹۷) گزارش کردند که در تلیسه های تغذیه شده تا ۲۰۰ درصد سطح نگهداری، تعداد فولیکول های کوچک به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. همچنین بوسیس و همکاران (۲۰۰۰) نیز نتایج مشابهی گزارش کردند. آرمسترورنگ و همکاران (۲۰۰۲) نیز تأثیر مثبت تغذیه بر رشد فولیکول های ذخیره ای را

(۳) فولیکول‌های گروه ۳ یا متوسط، فولیکول‌هایی که اندازه‌شان ۶-۹ میلی‌متر است و (۴) فولیکول‌های گروه ۴ یا بالغ، فولیکول‌هایی که اندازه‌شان حداقل ۱۰ میلی‌متر است. همچنین نسبت تخمکریزی با رویت جسم زرد ببروی تحمدان‌های چپ و راست ثبت شد. سن بلوغ جنسی با رویت اولین جسم زرد ببروی تحمدان تعیین شد. داده‌های حاصل با استفاده از نرم‌افزار آماری SAS (۲۰۰۱) تجزیه و تحلیل گردید. ابتدا داده‌هایی که توزیع نرمال نداشتند به‌فرم لگاریتمی تبدیل شدند. با توجه به این‌که داده از نوع داده‌های تکراری بودند بنابراین برای تجزیه و تحلیل از رویه Mixed استفاده شد. نسبت تخمکریزی گوساله‌ها به کمک تست فیشر<sup>۳</sup> و رویه Proc freq تجزیه تحلیل شدند. مقایسه میانگین‌ها نیز با استفاده از آزمون چندامنه‌ای دانکن<sup>۴</sup> انجام شد.

## نتایج و بحث

الگوی کلی رشد فولیکول‌های با اندازه‌های مختلف در دو شرایط متفاوت تغذیه‌ای تقریباً یکسان بود و تغییرات خاصی در این خصوص در بین تیمارها مشاهده نشد (شکل ۱)، اما روند رشد فولیکول‌های با قطر حداقل ۲ میلی‌متر بیانگر یک افزایش نسبی در طول دوره آزمایش، به خصوص برای تیله‌های با شرایط تغذیه‌ای خوب می‌باشد. به‌طوری‌که میانگین ( $\pm$  انحراف معیار) تعداد فولیکول‌های ۰-۲ میلی‌متر در طول دوره آزمایش برای تیله‌های با شرایط تغذیه‌ای خوب به‌طور معنی‌داری تیله‌های گروه مقابله می‌باشد که این با نتایج دیگران هم‌خوانی دارد (گوتیرز و همکاران، ۱۹۹۷؛ آرمسترونگ و همکاران، ۲۰۰۲). به‌نظر می‌رسد دسترسی به مواد مغذی تأثیر مثبتی بر شروع فعالیت فولیکول‌های ذخیره‌ای تحمدان دارد (وب و همکاران، ۲۰۰۴). در یک مطالعه مشخص شد که تغذیه تا ۲۰۰ درصد نیاز نگهداری، سبب

در قبیل و بعد از بلوغ جنسی، تعداد ۲۲ راس گوساله در حال رشد از نژاد گوشتشی برهمن (وزن اولیه بدن  $\pm$  انحراف معیار:  $200 \pm 3$  کیلوگرم؛ سن اولیه  $\pm$  انحراف معیار:  $11/5 \pm 11/5$  ماه) در قالب طرح کاملاً تصادفی مورد استفاده قرار گرفتند. تلیسه‌ها براساس سن و وزن اولیه به ۲ گروه مشابه ۱۱ تایی تقسیم گردیدند. گروه اول از چراگاه با شرایط تغذیه‌ای خوب و گروه دوم از چراگاه با شرایط تغذیه‌ای فقیر به مدت ۱۳ ماه (از سن ۱۱ تا ۲۴ ماهگی) تغذیه شدند. گیاهان غالب در هر دو چراگاه شامل *Panicum Maximum Chloriss Gayana* و *Cynodon Dactylon* بودند، اما میزان در دسترس بودن غذا در دو چراگاه متفاوت بود. به‌طوری‌که در چراگاه خوب، غذا به اندازه کافی در دسترس بوده در حالی‌که در چراگاه فقیر به‌دلیل محدودیت ایجاد شده غذا به اندازه کافی در دسترس نبوده و در نتیجه درجه وضعیت بدنی آنها نیز کمتر از گروه قبلی بود. با توجه به این‌که هدف این طرح بررسی فعالیت فولیکولی تحمدان در دو شرایط متفاوت تغذیه‌ای بوده بنابراین در طول آزمایش، جهت ایجاد تفاوت در درجه وضعیت بدنی بین دو گروه، برای گروه‌های آزمایشی اول و دوم به ترتیب  $1/5$  و ۱ کیلوگرم کنسانتره جو به‌ازای هر راس گوساله در هر روز نیز استفاده شد. در طول آزمایش، جهت بررسی فعالیت فولیکولی، تحمدان گوساله‌ها به صورت هفت‌هفته در میان به کمک دستگاه التراسوند<sup>۵</sup> مورد بازررسی قرار گرفت. تغییرات فولیکولی تحمدان‌ها از نظر اندازه قطر فولیکول‌ها و موقعیت فولیکول‌ها برروی تحمدان چپ یا راست (آنگوس و همکاران، ۲۰۰۱) ثبت شد. جهت مطالعه بهتر تغییرات فولیکولی تحمدان، تعداد فولیکول‌های تحمدان براساس اندازه و بر مبنای گروه‌بندی لوسی و همکاران (۱۹۹۲) به‌شرح ذیل ثبت شدند: ۱) فولیکول‌های گروه ۱ یا فولیکول‌های ذخیره، فولیکول‌هایی که اندازه‌شان حداقل ۲ میلی‌متر است؛ ۲) فولیکول‌های گروه ۲ یا کوچک، فولیکول‌هایی که اندازه‌شان بین ۳-۵ میلی‌متر می‌باشد

3- Fisher's Exact Test

4- Duncan


1- Body Condition Score

2- Aloka SSD-500, 7.5-MHz, Tokyo, Japan


است با تحریک فعالیت استروئیدسازی سلول‌های لایه‌  
تیکا سبب سنتز بیشتر استروژن شوند.

تغییرات رشد فولیکول‌های با قطر ۲-۰ میلی‌متر در دو  
شرایط متفاوت تغذیه‌ای در شکل ۲ نشان داده شده است.  
اگرچه تغییرات رشد فولیکول‌های با قطر حداقل ۲  
میلی‌متر یک روند افزایشی را در طول دوره آزمایش نشان  
می‌دهد اما از نظر آماری معنی‌دار نبود. با اعمال تیمارهای  
آزمایشی، تعداد فولیکول‌های فوق برای تلیسه‌های گروه ۱  
که از چراگاه خوب تغذیه کردند، از حدود ۲۷ فولیکول  
به ۳۱ فولیکول و برای تلیسه‌های گروه ۲ که از چراگاه  
فقیر تغذیه کردند، از حدود ۲۳ فولیکول به ۲۹ فولیکول  
در پایان دوره افزایش یافت. نسبت توزیع فولیکول‌های  
بالا بین تحمدان‌های راست و چپ به ترتیب  $56/4$  به  
 $43/60$  درصد تعیین شد ( $P<0.05$ ) که بیانگر فعل بودن  
تمدان راست در مقایسه با تحمدان چپ می‌باشد  
(آنگوس و همکاران، ۲۰۰۱).

تحریک رشد تعداد زیادی از فولیکول‌های ذخیره‌ای  
تخمدان (۴-۱ میلی‌متری) شده است (گانگ و همکاران،  
۲۰۰۲a). وب و همکاران (۲۰۰۴) نیز گزارش کردند که  
تغذیه احتمالاً از طریق فاکتورهای متاویکی مانند انسولین،  
گلوكز، هورمون‌های تیروئیدی، اسیدهای چرب، هورمون  
رشد و لپتین بر فعالیت فولیکولی تخمدان اثر می‌کند. اما  
درباره سازوکار دقیق تأثیر این متابولیت‌ها تناظری‌های  
زیادی وجود دارد (فلورس و همکاران، ۲۰۰۸). برای  
مثال، در یک بررسی مشخص شده که القاء پرکاری غده  
تیروئید با افزایش تراوش هورمون T3 منجر به آنستروس  
می‌شود (دموراس و همکاران، ۱۹۹۸). به نظر می‌رسد T3  
با مصرف انرژی ذخیره‌ای بدن و در واقع کاهش وزن و  
درجه وضعیت بدن سبب آنستروس می‌شود. اما اسپاپیسر  
و همکاران (۲۰۰۱) همبستگی مثبتی را بین غلظت T3 با  
قطر بزرگ‌ترین فولیکول گزارش کردند. به علاوه این  
محققان گزارش کردند که هورمون‌های تیروئیدی ممکن




شکل ۱- متوسط تعداد فولیکول‌ها در گروه‌های مختلف فولیکولی در دو شرایط تغذیه‌ای خوب (الف) و فقیر (ب)، ● فولیکول‌های با قطر ۵-۶ میلی‌متر، ○ فولیکول‌های با قطر ۶-۷ میلی‌متر، ■ فولیکول‌های با قطر ۷-۸ میلی‌متر؛ n=۱۱



شکل ۲- مقایسه رشد فولیکول‌های با قطر ۲۰ میلی‌متر در دو شرایط متفاوت تغذیه‌ای (■ چراگاه خوب، □ چراگاه فقیر  $n=11$ ).

آرمسترونگ و همکاران (۲۰۰۱) مبنی بر تأثیر مثبت تغذیه بر سرعت رشد و اندازه فولیکول‌های کوچک مطابقت دارد. روند رشد فولیکول‌های با اندازه متوسط (۶-۹ میلی‌متر) در طول دوره آزمایش برای هر دو نوع شرایط تغذیه‌ای یکسان بود. به علاوه، میانگین ( $\pm$  انحراف معیار) تعداد فولیکول‌های بالا نیز در طول آزمایش تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشت ( $1/41 \pm 0/05$  در مقابل  $1/32 \pm 0/04$ ,  $P > 0/05$ ).

منحنی رشد فولیکول‌های با اندازه‌های ۳-۵ و بزرگ‌تر از ۱۰ میلی‌متر در دو شرایط متفاوت تغذیه‌ای در شکل ۳ نشان داده شده است. تغییرات اندازه فولیکول‌های کوچک (۳-۵ میلی‌متر) در طول آزمایش در نوسان بود. میانگین ( $\pm$  انحراف معیار) تعداد فولیکول‌های کوچک در طول آزمایش برای تیسیه‌های تغذیه شده از چراگاه خوب  $4/5 \pm 0/18$  و برای گروه مقابل  $4/0 \pm 0/15$  فولیکول تعیین شد ( $P < 0/05$ ). نتایج به دست آمده از این پژوهش با گزارش بوسیس و همکاران (۲۰۰۰) و



شکل ۳- مقایسه رشد فولیکولهای تخدمان با اندازه‌های کوچک (۳-۵ میلی‌متر، الف)، متوسط (۶-۹ میلی‌متر، ب) و بزرگ (بزرگ‌تر مساوی ۱۰ میلی‌متر، ج) در دو شرایط متفاوت تغذیه‌ای (■ چراگاه خوب، □ چراگاه فقیر؛  $n=11$ ).

فولیکولهای با اندازه‌های مختلف به جز فولیکولهای ذخیره‌ای (۰-۲ میلی‌متر) در بین تیمارهای یکسان بود ( $P>0.05$ ). درصد فولیکولهای ذخیره‌ای تخدمان در تلیسه‌های تغذیه شده از چراگاه خوب به طور معنی‌داری بیش از تلیسه‌های گروه مقابله بوده است ( $65/3$  در مقابل  $61/1$  درصد،  $P<0.05$ ). اگرچه درصد فولیکولهای بالغ (با قطر حداقل ۱۰ میلی‌متر) در بین گروههای آزمایشی از نظر آماری یکسان بود اما قطر فولیکولهای آماده برای تخمکریزی در تلیسه‌های گروه ۱، به طور معنی‌داری بیش از تلیسه‌های گروه مقابله بوده است ( $12/5$  در مقابل  $10$  میلی‌متر،  $P<0.05$ ).

اندازه فولیکولهای بزرگ (میلی‌متر  $\geq 10$ ) در طول دو ماه اول آزمایش افزایش معنی‌داری داشت ( $P<0.01$ ، اما پس از آن تا پایان آزمایش اندازه فولیکولهای بالا بدون تغییر بود ( $P>0.05$ ). به نظر می‌رسد اندازه فولیکولهای بالغ، تنها فاکتور لازم برای تخمکریزی نباشد. همچنین میانگین ( $\pm$  انحراف معیار) تعداد فولیکولهای بالغ (میلی‌متر  $\geq 10$ ) برای گوساله‌های تغذیه شده از چراگاه خوب  $0.90\pm0.03$  و برای گوساله‌های تغذیه شده از چراگاه فقیر  $0.88\pm0.03$  فولیکول بود که از نظر آماری معنی‌دار نبود. نسبت فولیکولهای مختلف و نیز درصد تخمکریزی در جدول ۱ نشان داده شده است. درصد

جدول ۱- نسبت و مشخصات فولیکول‌های تخدمان در تلیسه‌های تغذیه شده از دو چراغاه متفاوت.

تیمار	درصد فولیکول‌ها					تیمار
	۰-۲ (میلی‌متر)	۳-۵ (میلی‌متر)	۵-۶ (میلی‌متر)	۶-۹ (میلی‌متر)	۱۰ (میلی‌متر) ≥	
چراغاه خوب	۶۵/۳ <sup>a</sup>	۲۲/۸ <sup>a</sup>	۷/۳ <sup>a</sup>	۴/۶ <sup>a</sup>	۱۲/۵ <sup>a</sup>	۱۰۰ <sup>a</sup>
چراغاه فقیر	۶۱/۱ <sup>b</sup>	۲۵/۱ <sup>a</sup>	۸/۵ <sup>a</sup>	۵/۳ <sup>a</sup>	۱۰ <sup>b</sup>	۱۰ <sup>b</sup>

حروف مشابه در یک ستون بیانگر عدم اختلاف معنی دار ( $P > 0.05$ ) بین تیمارهاست.

آبستنی بالاست. با توجه به این که درصد فولیکول‌های بالغ در بین گروه‌های آزمایشی یکسان بوده اما قطر فولیکول‌های آماده تخمکریزی و نیز نسبت تخمکریزی در بین گروه‌های آزمایشی تفاوت فاحشی ( $P < 0.05$ ) داشته است. بنابراین این نتایج بیانگر این موضوع می‌باشند که تلیسه‌های یادشده قبل از سن بلوغ جنسی توانایی تولید فولیکول بالغ (گراف) را دارند اما بنا به دلایل نامعلومی قادر به تخمکریزی نیستند. توانایی نداشتن در تخمکریزی ممکن است چنین تفسیر شود که ترشح گنادوترپین‌ها جهت تحریک رشد فولیکول‌ها و رسیدن به مرحله فولیکول گراف به خوبی انجام شده و همان‌طور که نتایج این مطالعه نیز نشان می‌دهد، اما عامل یا عوامل دیگری مانع از انجام تخمکریزی می‌شوند. در این رابطه، ممکن است توانایی نداشتن فولیکول گراف در ترشح هورمون استرادیول کافی جهت تحریک سرژ LH در قبل از تخمکریزی مؤثر باشد. علاوه بر آن آمادگی نداشتن سلول‌های عصبی ترشح‌کننده GnRH نیز ممکن است سبب نبود تخمکریزی شوند (پاتریک و لیون، ۲۰۰۰).

تفاوت معنی‌داری در مقایسه نسبت تخمکریزی در بین تلیسه‌های تغذیه شده از دو چراغاه با شرایط تغذیه‌ای متفاوت مشاهده شد ( $P < 0.05$ ), به طوری که در تمام تلیسه‌های تغذیه شده از چراغاه خوب تا پایان دوره آزمایش، تخمکریزی رویت، اما تنها یکی از تلیسه‌های گروه مقابله در این مدت موفق به تخمکریزی شد. در این مطالعه با توجه به این که تعداد فولیکول‌های بالغ برای هر دو تیمار از نظر آماری یکسان بود اما اندازه بزرگ‌ترین فولیکول (فولیکول آماده برای تخمکریزی) و نیز نسبت تخمکریزی در بین گروه‌های آزمایشی متفاوت بوده است، بنابراین به نظر می‌رسد که تغذیه با تحریک رشد نهایی فولیکول‌ها تأثیر مثبتی بر نسبت تخمکریزی داشته باشد (بوسیس و همکاران، ۲۰۰۰؛ آرمسترونگ و همکاران، ۲۰۰۱). همچنین، نتایج این پژوهش با نتایج گانگ و همکاران (۲۰۰۲a) مبنی بر اینکه تغذیه تاثیر مثبتی بر رشد فولیکول‌های بالغ و تخمکریزی داشته مطابقت دارد. در این رابطه، گانگ و همکاران (۲۰۰۲b) نیز گزارش کردند که در گاوهای با تغذیه خوب نرخ

## منابع

- Angus, J.M.T., Rafet Gazvani, M., Wood, S.J., Stephanie, C.M., Iwan, D.L.J., and Charles, R.K. 2001. Comparison of ovarian response in right and left ovaries in IVF Patients. *Hum. Reprod.* 16: 1694-1697.
- Armstrong, D.G., McEvoy, T.G., Baxter, G., Robinson, J.J., Hogg, C.O., Woad, K.J., and Webb, R. 2001. Effect of dietary energy and protein on bovine follicular dynamics and embryo production in vitro: associations with the ovarian insulin-like growth factor system. *Biol. Reprod.* 64: 1624-1632.
- Armstrong, D.G., Gong, J.G., Gardner, J.O., Baxter, G., Hogg, C.O., and Webb, R. 2002. Steroidogenesis in bovine granulosa cells: the effect of short-term changes in dietary intake. *Reproduction*, 123: 371-378.
- Beam, S.W., and Butler, W.R. 1999. Energy balance effects on follicular development and first ovulation in postpartum cows. *J. Reprod. Fertil. Suppl.* 54: 411-24.

- 5.Bossis, I., Wettemann, R.P., Welty, S.D., Vizcarra, J., and Spicer, L.J. 2000. Nutritionally induced anovulation in beef heifers: ovarian and endocrine function during realimentation and resumptions of ovulation. *Biol. Reprod.* 62: 1436-1444.
- 6.Buttler, W.R. 2000. Nutritional interactions with reproductive performance in dairy cattle. *Anim. Reprod. Sci.* 60-61: 449-457.
- 7.Cheikani, P.K., Ambrose, J.D., and Kennelly, J.J. 2003. Effect of dietary energy and protein density on body composition, attainment of puberty, and ovarian follicular dynamics in dairy heifers. *Theriogenology*, 60: 707-725.
- 8.De Moraes, G.V., Vera-Avila, H.R., Lewis, A.W., Koch, J.W., Neuendorff, D.A., Hallford, D.M., Reeves, J.J., and Randel, R.D. 1998. Influence of hypo-or hyperthyroidism on ovarian function in Brahman cows. *J. Anim. Sci.* 76: 871-879.
- 9.Diskin, M.J., Mackey, D.R., Roche, J.F., and Sreenan, J.M. 2003. Effects of nutrition and metabolic status on circulating hormones and ovarian follicle development in cattle. *Anim. Reprod. Sci.* 78: 345-370.
- 10.Driancourt, M.A. 2001. Regulation of ovarian follicular dynamics in farm animals: implications for manipulation of reproduction. *Theriogenology*, 55: 1211-1239.
- 11.Flores, R., Looper, M.L., Rorie, R.W., Hallford, D.M., and Rosenkrans Jr, C.F. 2008. Endocrine factors and ovarian follicles are influenced by body condition and somatotropin in postpartum beef cows. *J. Anim. Sci.* 86: 1335-1344.
- 12.Fortune, J.E., Cushman, R.A., Wahl, C.M., and Kito, S. 2000. The primordial to primary follicle transition. *Molecular and Cellular Endocrinology*, 163: 53-60.
- 13.Gong, J.G., Armstrong, D.G., Baxter, G., Hogg, C.O., Garnsworthy, P.C., and Webb, R. 2002a. The effect of increased dietary intake on superovulatory response to FSH in heifers. *Theriogenology*, 57: 1591-1602.
- 14.Gong, J.G., Lee, W.J., Garnsworthy, P.C., and Webb, R. 2002b. Effect of dietary-induced increases in circulating insulin concentrations during the early postpartum period on reproductive function in dairy cows. *Reproduction*, 123: 419-427.
- 15.Gutierrez, C.G., Oldham, J., Bramley, T.A., Gong, J.G., Campbell, B.K., and Webb, R. 1997. The recruitment of ovarian follicles is enhanced by increased dietary intake in heifers. *J. Anim. Sci.* 75: 1876-1884.
- 16.Kinder, J.E., Bergfeld, E.G., Wehrman, M.E., Peters, K.E., and Kojima, F.N. 1995. Endocrine basis for puberty in heifers and ewes. *J. Reprod. Fertil. Suppl.* 49: 393-407.
- 17.Lucy, M.C., Savio, J.D., Badinga, L., De La Sota, R.L., and Thatcher, W.W. 1992. Factors that affect ovarian follicular dynamics in cattle. *J. Anim. Sci.* 70: 3615-3626.
- 18.Maurasse, C., Marton, P., and Dufour, J.J. 1985. Ovarian follicular populations at two stages of an oestrus cycle in heifers given high energy diets. *J. Anim. Sci.* 61: 1194-200.
- 19.Patrick, E.C., and Levine, J.E. 2000. Stimulation of gonadotropin-releasing hormones surges by estrogen. I. Role of the hypothalamic progesterone receptors. *Endocrinology*, 141: 1477-1485.
- 20.Rhodes, F.M., Entwistle, K.W., and Kinder, J.E. 1996. Changes in ovarian function and gonadotropin secretion preceding the onset of nutritionally induced anestrus in *Bos indicus* heifers. *Biol. Reprod.* 55: 1437-43.
- 21.Statistical Analysis System. 2001. SAS/STAT, User's Guide, Version 8.2. Cary, NC, USA.
- 22.Simpson, R.B., Chase, C.C., Spicer, L.J., Vernan, R.K., Hammond, A.L., and Rae, D.O. 1994. Effects of exogenous insulin on plasma and follicular insulin like growth factor I, insulin like growth factor binding activity, follicular oestradiol and progesterone and follicular growth in superovulated Angus and Brahman cows. *J. Reprod. Fertil.* 102: 483-492.
- 23.Sinclair, K.D., Revilla, R., Roche, J.F., Quintans, G., Sanz, A., Mackey, D.R., and Diskin, M.G. 2002. Ovulation of the first dominant follicle arising after day 21 postpartum in suckling beef cows. *J. Anim. Sci.* 75: 115-126.
- 24.Spicer, L.J., Alonso, J., and Chamberlain, C.S. 2001. Effects of thyroid hormones on bovine granulosa and thecal cell function in vitro: Dependence on insulin and gonadotropins. *J. Dairy Sci.* 84: 1069-1076.
- 25.Webb, R., Nicholas, B., Gong, J.G., Campbell, B.K., Gutierrez, C.G., Garverick, H.A., and Armstrong, D.G. 2003. Mechanism regulating follicular development and selection of the dominant follicle. *Reproduction in Domestic Ruminants V. Reproduction Suppl.* 61: 71-90.
- 26.Webb, R., Garnsworthy, P.C., Gong, J.G., and Armstrong, D.G. 2004. Control of follicular growth: Local interactions and nutritional influences. *J. Anim. Sci.* 82: 63-74.

---

## **Study of long-term nutritional effects on ovarian follicular function in pre- and postpubertal period in Brahman heifers**

**\*F. Samadi**

Assistant Prof., Dept. of Animal Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

---

### **Abstract**

The objective of this study was to determine the long-term nutritional effects on ovarian follicular function during the pre- and postpubertal period in Brahman heifers. Twenty-two growing heifers were randomly assigned into two equal groups based on their age and initial body weight. Group 1, heifers that fed on pasture with good condition and group 2, heifers that fed on pasture with bad condition. Ovarian follicular function for both groups was observed bi-weekly using ultrasound. The mean number of follicles with 0-2 mm was greater in heifers of group 1 compared to heifers of group 2 ( $P<0.05$ ). The mean number of small-sized follicles (3-5 mm) fluctuated during the experiment. However, the mean number of small-sized follicles in heifers of group 1 was significantly greater ( $P<0.05$ ). Growth pattern of medium-sized follicles (6-9 mm) was similar for both groups during the experimental period ( $P>0.05$ ). The size of large-sized follicles increased during the two first months of experiment ( $P<0.05$ ), thereafter it was constant. The mean number of large follicles did not differ between experimental groups ( $P>0.05$ ). Although the percentage of small-, medium- and large-sized follicles did not differ between experimental groups, the percentage of primordial follicle was significantly greater for heifers fed on good pasture ( $P<0.05$ ). The size of the pre-ovulatory follicle was greater for heifers in group 1 than heifers in group 2 ( $P<0.05$ ). The percentage of ovulation for treatments 1 and 2 was 100 and 10, respectively ( $P<0.05$ ). These results show that nutrition may through stimulating of smaller-sized follicles (0-2 mm) and also increasing of the size of ovulatory follicle increase the proportion of ovulation.

**Keywords:** Ovarian follicular function; Nutrition; Brahman heifers

---

\* Corresponding Author; Email: samadi542@yahoo.com