

شیوع سوء تغذیه پروتئین - انرژی و عوامل موثر بر آن در کودکان زیر ۵ سال

شهرستان ساوجبلاغ سال ۸۱

چکیده

زمینه و هدف: سوء تغذیه پروتئین - انرژی یکی از مشکلات جوامع به ویژه در کودکان زیر ۵ سال می‌باشد. با توجه به عوارض شناخته شده و گزارش‌های متفاوت و متناقض از شیوع اختلال به ویژه عوامل موثر بر بروز آن، این بررسی انجام گرفته است. هدف از این مطالعه تعیین شیوع و عوامل موثر بر سوء تغذیه پروتئین - انرژی در کودکان کمتر از ۵ سال است. روش بررسی: مطالعه به روش توصیفی - مقطعی از مهرماه تا اسفندماه ۱۳۸۱ در شهرستان ساوجبلاغ انجام گرفته است. نمونه‌ها براساس ۲۰٪ شیوع سوء تغذیه و حدود اطمینان ۹۵٪ و با محاسبه اثر طرح ۱/۸ و درصد خطای ۰/۰۲ تعیین شدند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوش‌های ۱۲۴۳ کودک انتخاب شدند. ۶۳۲ نمونه روستایی و ۶۰۳ نمونه شهری. داده‌ها توسط پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده جمع‌آوری شدند.

یافته‌ها: مهم‌ترین یافته‌ها در این مطالعه عبارت بودند از: شیوع از رشد بازماندگی در دختران بیش از پسران بود به ترتیب (۱/۱٪، ۷/۸٪)، شیوع کم وزنی در بین دختران (۷/۴٪) و در پسران (۷/۴٪) بود، سن (۰/۰۴۳) (p<0/0/۰۱)، وزن (۰/۰۰۱) (p<0/0/۰۱) کودکان با سوء تغذیه رابطه معنی‌داری داشت. بین سوء تغذیه و کالری رژیم غذایی رابطه معنی‌داری وجود داشت (۰/۰۳۸) (در گروه سنی ۳-۴ سال). هم چنین در این مطالعه رابطه معنی‌داری بین وزن برای قد، برای سن و پروتئین کم در رژیم غذایی نشان داده شد (۰/۰۰۱) (در گروه‌های سنی ۱-۲ سال و ۲-۳ سال).

نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های این مطالعه کودکان مبتلا به سوء تغذیه خفیف بودند. از عوامل تعیین کننده موثر شناخته شده در سوء تغذیه کودکان زیر ۵ سال شهرستان ساوجبلاغ در این بررسی می‌توان از عدم استفاده از غذای کمکی (۰/۰۴۵) (p<0/0/۰۴۵)، عدم آگاهی مادر از زمان مناسب شروع تغذیه تكمیلی (۰/۰۲۲) (p<0/0/۰۲۲) و صرف نصف درآمد خانوار برای خرید مواد غذایی (۰/۰۳۹) (p<0/0/۰۳۹) نام برد.

کلیدواژه‌ها: ۱- شیوع ۲- عوامل موثر ۳- سوء تغذیه پروتئین - انرژی
۴- کودکان زیر ۵ سال

دکتر شهناز ریماز I

*اعظم مقدری II

دکتر فرزاد شیدفر III

دکتر فرشاد پورملک IV

تاریخ دریافت: ۵/۶/۸۳، تاریخ پذیرش: ۸/۱۲/۸

(I) استادیار و Ph.D اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران، تهران.

(II) مربي و کارشناس ارشد بهداشت جامعه، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتی - درمانی ایران، تهران. (*مؤلف مسؤول)

(III) استادیار و Ph.D علوم تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران، تهران.

(IV) دستیار اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران، تهران.

مقدمه

داشته‌اند و وزن تولد آن‌ها کم بوده است. تمایل به مصرف کمتر مواد غذایی، دسترسی کمتر به شیر مادر و حمایت کمتر از هر دو والد دیده شد. وزن تولد کم و بی سوادی مادر از عوامل خطر مهم برای شیوع کم وزنی و سوء تغذیه شدید شناخته شدند.^(۱) به هر حال در کشورهای در حال توسعه میزان وزن کم برای سن با شیوع متفاوت دیده می‌شود. به عنوان مثال: وزن کم برای سن در کودکان ۲ ساله و کمتر از ۱۳ درصد در بولیوی تا ۶۸ درصد در نیپال متفاوت است.^(۲) در مطالعه‌ای که به منظور نشان دادن ارتباط سوء تغذیه با اسهال در تایلند، طی سال‌های ۱۹۷۹-۸۰ انجام گرفت، در کل شیوع تغذیه پروتئین - انرژی در مناطق فقیرنشین شهری از ۷۱-۷۹ درصد در نوسان است. کاهش شیردادن مادر، حمل نامناسب و آماده کردن تغذیه مصنوعی به صورت غیربهداشتی از عوامل عمدہ کمک کننده به سوء تغذیه پروتئین - انرژی توان با اسهال در اثنای دوران اولیه شیرخوارگی شناخته شده است. تمام کودکان مبتلا به اسهال غیرقابل درمان دچار سوء تغذیه بودند.^(۳)

شیوع سوء تغذیه پروتئین - انرژی و هم‌چنین عوامل موثر در مناطق مختلف جغرافیائی در شرایط اجتماعی و فرهنگی مختلف، متفاوت است. بنابراین مشخص شدن میزان شیوع سوء تغذیه پروتئین و درصد هر یک از عوامل مهم و موثر در جمعیت‌های مختلف، با توجه به این که الگوی دریافت مواد غذایی، عقاید فرهنگی و امکان دسترسی و استفاده از مراقبت‌های بهداشتی در جوامع مختلف نیز دارای تفاوت است، پیشنهاد می‌گردد.

عوامل موثر بر بروز سوء تغذیه پروتئین - انرژی مورد بررسی در این تحقیق شامل: ویژگی‌های کودک از قبیل سن، جنس و ... الگوی تغذیه‌ای کودک(نوع شیر مصرفی و ...)، ویژگی‌های مادر(سن اولین زایمان و ...) ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی خانوار(سمت در شغل سرپرست خانوار و ...)، ویژگی‌های بهداشتی خانوار(منبع عده تامین آب آشامیدنی و ...) ویژگی‌های مربوط به نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه(ترتیب مراجعه کودک به مراکز بهداشتی، وضعیت واکسیناسیون و ...) است.

امروزه سوء تغذیه پروتئین - انرژی کودکان یکی از مهم‌ترین مشکلات تغذیه‌ای در بسیاری از کشورهای در حال توسعه است.^(۴) تخمین زده شده که بیش از ۵۰۰ میلیون نفر از مردم دچار کم غذایی هستند که اکثر آن‌ها در کشورهای در حال توسعه آسیایی، آفریقائی و آمریکای لاتین هستند.^(۵) حدود ۳۴ درصد(۲۳۰ میلیون نفر) کودکان کمتر از ۵ سال دچار بازماندگی از رشد هستند و حدود ۹ درصد دچار کم وزنی می‌باشند.^(۶)

مطالعاتی که در ایران در زمینه وضعیت تغذیه کودکان انجام گرفته نشان دهنده آن است که براساس طبقه‌بندی گومز ۲۵-۵۰ درصد کودکان کشور به درجات مختلف سوء تغذیه پروتئین - انرژی و کم وزنی دچار هستند.^(۷) سوء تغذیه پروتئین - انرژی عمدتاً در کودکان زیر ۵ سال دیده می‌شود و حداقل شیوع آن در سن ۱۸ ماهگی است. به طور متوسط از هر ۳ کودک زیر ۵ سال در ایران یک نفر در معرض ابتلاء به سوء تغذیه پروتئین - انرژی متوسط و شدید است.^(۸)

در یک بررسی انجام گرفته در سال ۱۳۷۰ در شیراز به منظور بررسی علل سوء تغذیه، افزایش تعداد افراد خانوار(۷۱/۹٪)، سن پایین مادران(۴۲/۴٪)، بی‌سوادی والدین(۲/۷۱٪) مادران و ۴۴/۶٪ پدران)، مشاغل کم درآمد(۶/۶٪) یا فاقد درآمد مادران(۵/۸۸٪)، اطلاعات ناکافی بهداشتی - تغذیه‌ای(۳/۷۱٪)، مسکن، بهداشت نامناسب و محرومیت از شیر مادر(۵۱٪) کاهش مصرف مواد غذایی و کالری کم(۷/۷۹٪) همگی از عوامل مهم در سوء تغذیه کودکان بودند. با توجه به تاثیر همه عوامل اجتماعی - اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی در بروز سوء تغذیه عامل اقتصادی - اجتماعی(۵۶٪) تاثیر بیشتری را نشان داده است.^(۹)

در یک مطالعه وضعیت اقتصادی و اجتماعی پایین، عدم استفاده از شیر مادر و وجود بیماری‌های قلبی و خصوصاً گاستروآنتریت از عوامل موثر در سوء تغذیه شناخته شدند.^(۱۰) در یک مطالعه دیده شده است که کودکان با سوء تغذیه شدید بیشتر احتمال داشتن مادران جوان را

تقسیم نمونه به روستاهای نسبت در مراکز در نظر گرفته شد. برای مشخص نمودن هر خوش نشانه محله های روستایی مشخص و به صورت تصادفی خوش انتخاب گردید و برای تعیین سر خوش از شماره پرونده خانوار استفاده شد. داده ها به صورت مراجعت خانه به خانه و از طریق مصاحبه، پرسش نامه و اندازه گیری قد و وزن توسط پرسش گران جمع آوری گردید.

پرسش نامه حاوی ۵۲ سوال بود (سوال شماره ۵۲ در مورد بسامد خوراکی بود). در قسمت ابتدایی پرسش نامه اطلاعات مربوط به تعداد افراد خانوار، تعداد کودک زیر ۵ سال، جنس و سن کودک و وزن و قد کودک و وزن و قد مادر قرار داشت. سپس ویژگی های عمومی و تغذیه ای کودک، ویژگی های مربوط به نظام مراقبت های بهداشتی، ویژگی های مادر، وضعیت اقتصادی - اجتماعی خانوار، ویژگی های بهداشتی خانوار و در انتها جدول بسامد خوراکی آورده شده بود.

در ابتدا با مراجعت خانه به خانه سوال های پرسش نامه به روش مصاحبه جمع آوری می شد، سپس کودکان زیر یک سال توسط ترازوی کفه ای و حداقل لباس ممکن وزن شدند. برای کودکان بالای یک سال و آن هایی که قادر به ایستادن بودند از ترازوی تعادلی استفاده می شد و قد آن ها در حالت ایستاده اندازه گیری و ثبت می گردید. آموزش لازم جهت تکمیل پرسش نامه به پرسش گران داده شد (در ضمن همراه با پرسش نامه، راهنمایی در مورد نحوه تکمیل پرسش نامه تهیه و در اختیار پرسش گران قرار داده شده بود). سن کودک بر حسب ماه، وزن بر حسب کیلوگرم و قد بر حسب سانتی متر محاسبه شد.

Z-score برای محاسبه کم وزنی، کوتاهی قد و لاغری از وزن به سن و جنس، قد به سن و جنس و وزن برای قد و جنس استفاده شد. به این ترتیب کم وزنی، کوتاهی قد و لاغری متوسط و شدید مواردی بودند که بیش از دو انحراف معیار از میانگین قد و وزن همان گروه فاصله داشتند. داده ها توسط نرم افزارهای آخرین ویرایش SPSS 5 (V.II)، آخرین ویرایش Epiinfo 1 (Revision 2002) توصیف و تجزیه

در این مطالعه با توجه به اهمیت سوء تغذیه پروتئین - انرژی و اثر آن در رشد و تکامل کودکان و عوامل خطرزای مهم در بروز آن در کودکان زیر ۵ سال شهرستان ساوجبلاغ مورد بررسی قرار گرفت و میزان شیوع عوامل موثر بر بروز آن تعیین گردید.

روش بررسی

در یک مطالعه مقطعی ۱۲۴۳ کودک زیر ۵ سال شهرستان ساوجبلاغ مورد بررسی قرار گرفتند. جامعه پژوهش تمام کودکان زیر ۵ سال جمعیت شهری و روستایی شهرستان ساوجبلاغ است که از بین آن ها ۱۲۴۳ کودک به روش نمونه گیری خوش ای تصادفی انتخاب شدند.

حجم نمونه مورد نظر با $d=0.03$ درصد احتمال شیوع سوء تغذیه پروتئین - انرژی ($P=0.20$) و حدود اطمینان ۹۵ درصد و درصد خطای $\alpha=0.05$ و اثر طرح مساوی $1243/1/8$ نفر محاسبه شد. از آن جا که جمعیت روستایی شهرستان ساوجبلاغ بیش از جمعیت شهری است، از جمعیت روستایی تعداد ۶۳۵ نفر نمونه روستایی و تعداد ۲۰ نفر نمونه تیم سیار و ۵۸۸ نمونه شهری انتخاب شدند. برای نمونه گیری شهری ابتدا لیست مراکز بهداشتی شهری تهیه گردید، پس از مشخص شدن مراکز بهداشتی از بین ۱۰ مرکز، ۵ مرکز به صورت تصادفی انتخاب شد. از ۳ مرکز بهداشتی انتخاب شده تحت پوشش نظر آباد تعداد ۳۵۹ نمونه و از ۲ مرکز بهداشتی شهری انتخاب هشتگرد تعداد ۲۲۹ نمونه انتخاب گردید، برای تقسیم نمونه ها بین مراکز نامبرده، نسبت جمعیت زیر ۵ سال در نظر گرفته شد.

با توجه به بلوک بندی انجام گرفته در مراکز بهداشتی، بلوک ها به صورت تصادفی انتخاب و سرشاخه هر بلوک با استفاده از پرونده خانوار به صورت تصادفی انتخاب و تعداد نمونه ها در هر بلوک با در نظر گرفتن نسبت جمعیت آن مشخص گردید. در مورد انتخاب نمونه های روستایی از مراکز بهداشتی روستایی، ۶ مرکز بهداشتی و از تیمهای سیار، یک تیم به صورت تصادفی انتخاب شدند. با توجه به متفاوت بودن جمعیت در روستاهای انتخاب شده برای

جدول شماره ۱- توزیع فراوانی کم وزنی، کوتاهی قد و لاغری در

پسر	دختر	جنس	نوع سوء تغذیه
درصد	درصد	تعداد	
۴/۴	۲۶	۴/۴	۲۵ (under weight) کم وزنی
۸/۱	۴/۸	۱۲/۱	۶۹ (stunting) کوتاهی قد
۲/۷	۲۲	۴/۷	۲۷ (wasting) لاغری

بیماری‌های حاد اسهالی بوده‌اند از آنالیز کنار گذاشته شدن. هیچ یک از متغیرهای کمی مطالعه با پیامد اصلی تعیین کمی وزن برای قد و جنس بر طبق نمره استاندارد ($Z = -2SD$) در سطح $\alpha = 0.05$ طبق آزمون t مستقل معنی دار نبودند. طبق آزمون Chi-Square رابطه متغیر درصد درآمد خانوار که صرف تغذیه می‌شود با بروز سوء تغذیه معنی دار بود ($p = 0.39$). درصد درآمد خانوار که صرف تغذیه می‌شود به صورت کمی در این مطالعه اندازه‌گیری شده است (حدول شماره ۲).

جدول شماره ۲- توزیع فراوانی کمی وزن برای قد و جنس بر حسب

درآمد خانوار که صرف تغذیه می‌شود طبق نمره استاندارد ($Z < -2$)

		پیامد کمی وزن برای قد و جنس		درصد درآمد خانوار که صرف تغذیه فی شود	
بلی	خیر	جمع			
۲۷۳	۲۵۷	۱۶	تعداد		۱
۱۰۰	۹۴/۱	۵/۹	درصد		۲
۱۰۰	۱۰۰	۰	تعداد		۱
۱۰۰	۹۵/۳	۴/۷	درصد		۱/۴
۳۷۸	۳۵۷	۲۱	تعداد		جمع
۱۰۰	۹۴/۶	۰/۶	درصد		

رابطه استفاده از غذای کمکی در کودکان با پیامد اصلی کمی وزن برای قد و جنس معنی‌دار بود ($P=0.045$). رابطه بین کمی وزن برای قد و جنس و آگاهی مادر از زمان مناسب شروع تغذیه در کودکان بر طبق نمره استاندارد ($Z<-2 SD$) معنی‌دار بود ($P=0.022$). در جدول شماره ۳ توزیع فراوانی سوء تغذیه بر حسب کمی وزن برای سن و جنس آورده شده است. بعد از آنالیز توصیفی، برای تعیین ارتباط کلیه متغیرها

و تحلیل شد. آزمون های آماری مورد استفاده؛ T مستقل، آنالیز واریانس غیرپارامتری کروسکال والیس، کای دو و محاسبه OR و حدود اطمینان آن، رگرسیون لستیک برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. برای تعیین پیامد از WHO با استفاده از شاخص های رفرانس Epinutr 2002، CDC ۱۹۷۸ استفاده شد. تجزیه و تحلیل جدول بسامد خوراکی (غذائی) با استفاده از نرم افزار Nutri Cale Diet crunch انجام شد.

از T مستقل برای رابطه بین متغیرهای کمی مطالعه (مانند قد، وزن، سن و ...) با پیامد اصلی (یعنی وزن کم برای قد و جنس طبق نمره استاندارد ($Z = 2SD$)) استفاده شده آنالیز واریانس غیرپارامتری کروسکال والیس برای رابطه بین پیامد اصلی مطالعه (یعنی وزن برای قد و جنس طبق نمره استاندارد ($Z = 2SD$)) و متغیرهای رتبه‌ای (مانند سمت در شغل سرپرست خانوار، وضعیت اشتغال مادر، آگاهی تغذیه‌ای مادر و ...). مورد استفاده قرار گرفته است.

بافتہ‌ها

در این مطالعه ۱۲۴۳ کودک زیر ۵ سال ساکن در شهرستان ساوجبلاغ مورد بررسی قرار گرفتند. ۴۸/۹ درصد نمونه‌ها متعلق به شهر و ۵۱/۱ درصد مربوط به روستا بودند. میانگین و انحراف معیار سن کودکان به ماه $15/64 \pm 78/75$ ، میانگین و انحراف معیار سن مادر به سال $45/45 \pm 38/27$ ، میانگین و انحراف معیار سن مادر به سال در اولين تولد زنده $60/58 \pm 3/05$ ، میانگین و انحراف معیار سن مادر به سال هنگام تولد کودک مورد مطالعه $25/25 \pm 23/25$ ، میانگین و انحراف معیار وزن به کیلوگرم و قد مادر به سانتی‌متر به ترتیب $64/70 \pm 13/67$ و $15/07 \pm 15/66$ ، میانگین و انحراف معیار بعد خانوار $4/23 \pm 1/43$ ، میانگین و انحراف معیار سن شروع شیر مادر به روز $34/0 \pm 20/10$ و میانگین و انحراف معیار مدت تغذیه با شیر مادر به روز $51/05 \pm 22/07$ و ... جدول شماره ۱ نوع سوء تغذیه بر حسب جنس را نشان می‌دهد. کودکانی که در دو هفته قبل از ثبت اطلاعات، مبتلا به

کودکانی که پروتئین رژیم غذایی آن‌ها کم است به ترتیب در گروه‌های سنی ۱-۲، ۲-۳، ۳-۴، ۴-۵ سال ۱۸/۹ درصد، ۱۶/۶ درصد، ۱۴/۷ درصد و ۶/۲ درصد است. فراوانی نسبی کالری رژیم غذایی که از مقدار توصیه شده ۷۵ درصد کمتر است. به ترتیب در گروه‌های سنی ۱-۲، ۲-۳، ۳-۴ و ۴-۵ سال عبارتند از ۱۶/۶ درصد و صفر، ۲۴ درصد و ۶/۲ درصد، ۱۵/۴ درصد و ۴۱/۵ درصد و ۱/۱ درصد. در گروه سنی ۱-۲ سال سوء تغذیه برحسب کمی وزن برای سن و جنس (SD <-2) با مناسبت میزان پروتئین در سطح معنی‌دار نبود، در گروه‌های مختلف سنی رابطه سوء تغذیه با مقدار کالری رژیم غذایی فقط در گروه سنی ۳-۴ = ۰/۰۵ معنی‌دار بود، در گروه‌های مختلف سنی رابطه سوء سال معنی‌دار بود = ۰/۰۲۸ (جدول شماره ۵). جنس کودک، کامل نبودن تعداد مراقبت پایش رشد، واکسیناسیون و کامل بودن مراقبت‌های بارداری با مناسبت پروتئین رژیم غذایی در سطح = ۰/۰۵ رابطه معنی‌داری نداشت. بین تحصیلات پاییز پدر و کم بودن پروتئین رژیم غذایی رابطه ضعیفی وجود داشت ($p < 0/049$). کم بودن وزن برای قد در گروه سنی ۱-۲ = ۰/۰۴۹، ابطه معنی‌دار داشت ($p < 0/049$).

با پیامد اصلی کمی وزن برای قد و جنس (سوء تغذیه) از مدل آماری رگرسیون لژستیک استفاده شد. در مدل سازی آماری رگرسیون لژستیک، سن کودک ($P < 0.043$)، وزن کودک ($P < 0.001$) و قد کودک ($P < 0.001$) نیز با سوء تغذیه دارای رابطه معنی دار بود. ابتدا رابطه کلیه متغیرهای مستقل که در تحلیل تک متغیره با پیامد اصلی بررسی شده بودند، با Backward، Forward، Enter مورد بررسی قرار گرفته و براساس متغیرهای غربال شده، متغیرهای آگاهی مادر از زمان مناسب شروع تغذیه تکمیلی، زمان استفاده از تغذیه تکمیلی، درصد درآمد خانوار که صرف تغذیه می‌گردد، سن و وزن و قد در مدل نهایی وارد شدند و با روش‌های BW Cond، BW Wald، BW LR FW Likelihood Ratio مطالعه شدند، ضرایب رگرسیون، خطای Conditional استاندارد آن‌ها، آمار واحد و مقدار خطای نوع آلفا و لوزیت متغیرهای نهایی باقی مانده در جدول شماره ۴ آورده شده است. بعد از تبدیل داده‌های مقادیر بسامد خوراکی به مواد مغذی، موحود در داشتیم غذاهای کوکا، ملعون گردید، در صد

حدول شیماه ۳-۳- توزیع فراوان، سوء تغذیه بر حسب کم، و زن برای سین و حسنه(WAS<-2 SD) در هر گروه سین، به تفکیک حسنه

جدول شماره ۴ - مدل نهایی رگرسیون لستیک برای سبیت شاشن تطبیق شده رابطه متغیرهای مستقل با پیامد کمی وزن برای قد و چشم طبق نمره استاندارد شده

نام متغیر	β	Sec(B)	Wald	P	EXP(B)
آگاهی مادر از مناسبترین زمان شروع تغذیه تکمیلی	۱/۰۱۲	۱/۳۱۵	۰/۰۹۲	۰/۴۴۱	۲/۷۵۱
سن کودک	-۰/۱۰۳	۰/۰۵۱	۴/۱۰۷	۰/۰۴۳	۰/۹۰۲
وزن کودک	-۸/۳۹۶	۱/۶۷۳	۲۵/۱۷۸	<۰/۰۰۱	۰/۰۰۰۲
کاربرد تغذیه تکمیلی	۰/۶۲۳	۰/۷۴۴	۰/۷۰۲	۰/۴۰۲	۱/۸۶۵
قد کودک	۱/۸۹۳	۰/۳۷۳	۲۵/۸۱۱	<۰/۰۰۱	۶/۶۴۲
عرض از مبدأ	-۷۶/۰۰۳	۱۴/۹۳۲	۲۵/۹۴۳	<۰/۰۰۱	۹/۳۴۷

جدول شماره ۵- رابطه سوء تغذیه با مقدار کالری رژیم غذایی(تفاوت ۷۵٪ مقدار لازم) در گروه سنی ۴-۳ سال

						کمی وزن برای سن و جنس Z<-2SD	مقدار کالری رژیم غذایی
جمع	فرافوایانی	درصد	پسر	فرافوایانی	درصد	دختر	
۱۰۰	۴۹	۹۱/۸	۴۵	۸/۲	۴		کمتر از ۷۵درصد مقدار لازم
۱۰۰	۱۱۵	۹۹/۱	۱۱۴	۹	۱		بیشتر از ۷۵درصد مقدار لازم
۱۰۰	۱۶۳	۹۷/۵	۱۵۹	۳	۵		جمع

بحث

مطلوبتری برخوردار است. در مطالعه انجام گرفته در سال ۱۹۹۵ نیجریه ۴۱/۶درصد از کودکان به سوء تغذیه مبتلا بودند که ۰/۸۴درصد از آن‌ها دچار کمی وزن برای قد کمتر از دو انحراف زیر میانه استاندارد می‌باشند.^(۲) در مطالعه‌ای که در کشور اتیوپی در سال ۱۹۹۵ میلادی انجام گرفت دیده شد که شیوع کم وزنی، وزن از دستدهی و از رشد بازماندگی به ترتیب ۳۶درصد، ۹درصد و ۳۶درصد بودند.^(۱۲) مطالعه حاضر در مقایسه با مطالعات انجام گرفته در کشورهای نیجریه و اتیوپی از وضعیت بهتری برخوردار است.

از عوامل موثر شناخته شده در این مطالعه بر بروز سوء تغذیه پروتئین - انرژی عدم استفاده از غذای کمکی($P=0.45$)، عدم آگاهی مادر از زمان مناسب شروع تغذیه تكمیلی و در مقابل آگاهی($P=0.22$)، صرف سهم بیشتری از درآمد خانوار برای تغذیه($P=0.39$) است. متغیرهای دیگر مانند جنس، سن، بعد خانوار، رتبه تولد، تحصیلات پدر و مادر و شغل آن‌ها و ... گرچه در دو گروه دارای سوء تغذیه و بدون سوء تغذیه دارای تفاوت بودند، ولی تفاوت در سطح اطمینان ۰/۰۵ معنی‌دار نبوده است. در مدل‌سازی آماری رگرسیون لژستیک سن کودک($P=0.43$) وزن کودک($P<0.001$) و قد کودک($P<0.001$) نیز با سوء تغذیه دارای رابطه معنی‌دار می‌باشند.

در مطالعه‌ای که در سال ۱۹۹۶ در هندوستان انجام شد مشاهده شد که سوء تغذیه با افزایش بعد خانوار از ۱۰ نفر به بالا، تحصیلات پدر و مادر و شغل والدین رابطه معنی‌داری دارد.^(۱۲، ۱۳) در مطالعه حاضر متغیرهای فوق در

به طور کلی هدف این بررسی تعیین شیوع سوء تغذیه پروتئین - انرژی و عوامل موثر بر بروز آن در کودکان زیر ۵ سال بود. دیده شد ۳/۴درصد از ۱۱۰ کودک زیر ۵ سال(که در دو هفته قبل از جمع‌آوری داده‌های مطالعه اسهال حاد نداشته‌اند که روی وزن آن‌ها اثر فوری بگذارد) دچار کمی وزن برای قد و جنس کمتر از دو انحراف معیار زیر منحني میانه منحني استاندارد می‌باشند.

فرافوایانی در پسران ۷/۳درصد و در دختران ۷/۴درصد است که تفاوت معنی‌داری ندارد. کمی شدید وزن برای قد در ۶/۰درصد، در پسران ۳/۰درصد و در دختران ۷/۰درصد با تعریف وزن برای قد و جنس($Z<3SD$) است. در مطالعه‌ای که در طی سالهای ۱۳۸۰-۸۱ در کرج انجام گرفت، دیده شد که به ترتیب ۹/۲درصد، ۳/۰درصد و ۹/۶درصد از کودکان مورد بررسی دچار کم وزنی، کوتاهی قد و لاغری متوسط و شدید هستند.^(۱۰)

در مطالعه دیگری که در مناطق مختلف غرب شهر تهران انجام شد درجات شدید و متوسط کمبود وزن برای سن در کودکان پسر و دختر به ترتیب ۱۳ و ۱۱/۱ درصد مشاهده گردید و درجات شدید و متوسط شاخص کمبود قد برای سن در کودکان پسر و دختر به ترتیب ۱۷/۶ و ۹/۸درصد مشاهده شد. میزان سوء تغذیه مزمن(کوتاهی قد) متوسط و شدید بین ۱۰ تا ۱۷ درصد و میزان لاغری متوسط و شدید بین ۱۱ تا ۱۲ درصد گزارش شد.^(۱۱)

در مطالعه حاضر بیشترین میزان مربوط به کمی وزن برای قد و جنس است و میزان‌های مطالعه در مقایسه با بررسی‌های انجام گرفته در کرج و تهران از وضعیت

$\alpha=0/05$ نداشت. تنها متغیری که می‌توانست توجیه کننده کم بودن پروتئین رژیم غذایی باشد، تحصیلات پایین پدر بود که رابطه معنی‌دار ضعیفی داشت ($p=0/049$). کمی پروتئین و رژیم غذایی با کم بودن برای قد در گروه سنی ۱-۲ سال و ۲-۳ سال رابطه معنی‌دار داشت ($p=0/01$). در مطالعه سال ۱۳۷۰ شیراز یکی از علل سوء تغذیه کاهش مصرف مواد غذایی و کالری کم از عوامل مهم تشخیص داده شد.^(۱)

در مطالعه حاضر نیز در گروه سنی ۳-۴ سال رابطه سوء تغذیه با مقدار کالری ارتباط معنی‌داری داشت ($p=0/028$). براساس یافته‌های این مطالعه کودکان مبتلا به سوء تغذیه خفیف بودند. از عوامل تعیین کننده موثر شناخته شده در سوء تغذیه کودکان زیر ۵ سال شهرستان ساوجبلاغ در این بررسی می‌توان از عدم استفاده از غذای کمکی ($P<0/045$), عدم آگاهی مادر از زمان مناسب شروع تغذیه تکمیلی ($P<0/022$) و صرف نصف درآمد خانوار برای خرید مواد غذایی ($P<0/029$) نام برد.

نتیجه‌گیری

براساس یافته‌های این مطالعه کودکان مبتلا به سوء تغذیه خفیف بودند و عوامل مؤثر شناخته شده در سوء تغذیه آن‌ها شامل عدم استفاده از غذای کمکی و عدم آگاهی مادران از زمان مناسب شروع تغذیه تکمیلی و صرف نصف درآمد خانوار برای خرید مواد غذایی، می‌باشد.

تقدیر و تشکر

این مطالعه تحت حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شده است و به این وسیله نویسندها از همکاری مسؤولین محترم دانشگاه تشکر و قدردانی می‌نمایند.

منابع

- ۱- عزیزی - فریدون، حاتمی - حسین، جانقیانی - محسن. ایدمیولوژی و کنترل بیماری‌های شایع در ایران، ویراست دوم، تهران، نشر اشتیاق، ۱۳۸۰، صفحه ۲۹۶-۲۸۰.

دو گروه دارای سوء تغذیه و بدون سوء تغذیه در سطح $\alpha=0/05$ دارای تفاوت معنی‌دار نبودند. در نتیجه در این مطالعه عوامل مذکور جزو عوامل اصلی تاثیرگذار بر روی سوء تغذیه نمی‌باشد. در مطالعه‌ای که در سال ۱۹۹۸ در غنا انجام گرفت، دیده شد که سطح سواد والدین و شغل آن‌ها تفاوت چشمگیری در متغیرهای موجود در گروه کم وزن وجود نداشت.^(۱۴، ۱۵)

همان طور که مشاهده می‌گردد نتایج به دست آمده در مطالعه حاضر با بررسی انجام گرفته در غنا تقریباً مطابقت دارد. بعد از تبدیل داده‌های مقادیر بسامد خوراکی به مواد مغذی موجود در رژیم غذایی معلوم شد که درصد کودکانی که پروتئین رژیم غذایی آن‌ها کم است، عبارتند از ۱۸/۹ درصد در گروه سنی ۱-۲ سال، ۱۶/۶ درصد در گروه سنی ۲-۳ سال، ۱۴/۷ درصد در گروه سنی ۳-۴ سال و ۱۲/۶ درصد در گروه سنی کودکان ۵-۶ سال. فراوانی نسبی کودکانی که کالری رژیم غذایی آن‌ها از ۷۵ درصد و از ۱۰ درصد مقدار توصیه شده کمتر است، به ترتیب عبارتند از: ۱۶/۶ و صفر درصد در گروه سنی ۱-۲ سال، ۲۴ درصد و ۲/۶ درصد در گروه سنی ۲-۳ سال، ۳۲/۶ درصد و ۱/۱ درصد در گروه سنی ۳-۴ سال و ۱/۵ درصد و ۱۵/۴ درصد در گروه سنی ۴-۵ سال.

در گروه سنی ۱-۲ سال سوء تغذیه بر حسب کمی وزن برای سن و جنس ($Z=-2SD$) با مناسبت میزان پروتئین - رژیم غذایی دارای رابطه معنی‌دار در سطح ($\alpha=0/05$) نبوده است. هم چنین سوء تغذیه بر حسب کمی وزن برای سن و جنس با معیار فوق در گروه سنی ۲-۳، ۳-۴ و ۴-۵ سال نیز دارای رابطه معنی‌دار با ناکافی بودن پروتئین رژیم غذایی نمی‌باشد.

در گروه‌های سنی مختلف رابطه سوء تغذیه با مقدار کالری رژیم غذایی فقط در گروه سنی ۳-۴ سال دارای رابطه معنی‌دار بود ($p=0/028$). سایر متغیرها مانند جنس کوک، کامل بودن تعداد مراقبت پاییش رشد، تعداد واکسیناسیون و ... با مناسبت پروتئین رژیم غذایی با وزن برای سن و جنس و قد برای سن و جنس رابطه معنی‌دار در سطح

referral hospital in Addis Ababa, Ethiopmed J; 1997 July. 35(3): 161-8.

13- Nanda S. The immpae of family milieu on the prevalence of protein-Energy Malnutrition in infants, Indian J, Matern child Health; 1996 Jan Mar. 7(1): 20-3.

14- Rikimaru T, Et Al. Risk factors for the prevalence of Malnutrition among children in Chana, J Nutrsci vitaminol(tokyo); 1998 juni. 44(30): 391-407.

15- Islam MA, Rahman MA, Mahalanabis D. Maternal and socio-economic factors and risk of severe malnutrition in a child A case-control study Eur J of clin Nutr; 1994 Jan. 48(6): 416-24.

2- Abidoye RO, Sikabofori. A study prevalence of protein-Energy malmitrition among 0-5 years in Rural, Benue state, Nigeria, Nutrition and Health; 2000. 13: 235-247.

3- Smolin LA, Grosvenor MB. Nutrition science and application. 3 nd ed. Philadelphia: Saunders college publishing; 2000. p: 445.

۴- ملکزاده - ج، کیمیاگر - م. بررسی میزان شیوع و عوامل موثر بر سوء تغذیه پروتئین - انرژی در کودکان زیر ۵ سال کهکیلیه و بویراحمد، پایان نامه. انتستیتو تغذیه و صنایع غذایی ایران، ۱۳۷۷.

۵- کیمیاگر - م، جزایری - الف. نگاهی به وضعیت تغذیه‌ای کشور و ضرورت تدوین برنامه اجرایی تغذیه، شماره ۵، تهران، انتشارات انتستیتو تغذیه و صنایع غذایی ایران. مقالات تغذیه‌ای کشور، ۱۳۷۰-۷۱، صفحه .۳۲

۶- کریم - م، امیرحکیمی، کرمی‌زاده. بررسی علل سوء تغذیه در کودکان استان فارس، پایان نامه دکترا، شماره ۲۲۶۶، سال .۱۳۷۷

۷- حکیمی - پ، اجتماعی - ر. بررسی موارد سوء تغذیه در مطالعه سه ساله بیمارستان هفده شهریور رشت، پایان نامه دکترا، شماره ۱۸۰، سال .۱۳۷۷

8- Bern C, Zueker JR, Perkins BA. Assessment of potentiol indicators for protein-Energy Malnutrition in Algoritm for integrated management of child illness, Bull, word Health org; 1997. 75 suppl. 1: 87-96.

9- Tontisirin K, Valyaseri A. Protein-Energy malnutrition related to diarrhea in Thai children J nutr sei vitamol (Tokyo); 1981. 27(6): 513-20.

۱۰- نجمی - مرضیه، کفاشی - احمد، نجم‌آبادی - شهاندخت. بررسی فراوانی عوامل خطر سوء تغذیه در کودکان زیر ۵ سال شهرستان کرج در سال ۱۳۸۰-۸۱، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، سال دهم، شماره ۳۳، بهار ۱۳۸۲، صفحات ۱۲۲-۱۲۲.

۱۱- نجم‌آبادی - شهاندخت. ارزیابی شاخص‌های آنتروپومتریک کودکان کمتر از ۶ سال در مناطق مختلف غرب تهران، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، سال پنجم، تک شماره، پائیز ۱۳۷۷، صفحات ۶۹-۶۳.

12- Ketema L, Lulsegeds. Persistant diarrhea, socio-demographic and clinical profile of 264 children seen at a

Prevalence and Determinants of Protein-Energy Malnutrition among Children Under the age of 5 in Savojbolagh(2002-2003)

Abstract

Background & Aim: Protein-Energy malnutrition is one of the most important world's health problems, especially among the children under the age of 5. Thus, this study was conducted with regard to the known complications and different reports of the prevalence and the determinants of this disorder. The goal of the present study was to determine the prevalence and determinants of protein-energy malnutrition among children under the age of 5.

Patients & Methods: A descriptive cross-sectional study was conducted between Oct.2002 to Feb. 2003 in Savojbolagh. Sampling was based on 20% prevalence of malnutrition, 95% CI, design effect of 1.8, and d=0.03. By employing random cluster sampling technique, 1243 samples were chosen (632 rural samples and 603 urban samples). Data was collected by means of questionnaire, interview and observation.

Results: The most important findings in this study were as follows. The prevalence of stunting among the girls was more than the boys (12.1%, 8.7% respectively). Prevalence of wasting was 4.7% in girls and 3.7% in boys. Age($P<0.043$), weight($P<0.001$) and height ($P<0.001$) of the children had significant correlation with malnutrition. There was a significant correlation between malnutrition and calorie of diet($P<0.038$) in 3-4 age group. This study also showed a significant correlation between low weight for height for age and low protein in children's diet ($P<0.01$)(1-2 and 2-3 age groups).

Conclusion: According to the findings of this study, children were suffering from the mild malnutrition. The determinants affecting the children in this study were: mother's lack of knowledge of appropriate time for beginning complementary food ($P < 0.022$), use of no complementary food ($P < 0.045$), and spending half of the household income on food ($P < 0.039$).

Assistant Professor of Epidemiology, Iran University of Medical Sciences and Health Services, Tehran, Iran.

11) Assistant Professor of Epidemiology, Iran University of Medical Sciences and Health Services, Tehran, Iran.

Assistant Professor of Nutrition Sciences, Iran University of Medical Sciences and Health Services, Tehran, Iran.

Epidemiology Resident, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences and Health Services, Tehran, Iran.