

# گزارش یک مورد آنژیوسارکوم اولیه پریکارد

## چکیده

مقدمه: میزان بروز تومورهای بدخیم پریکارد، بسیار نادر میباشد و آنژیوسارکوم اولیه پریکارد در این بین، به عنوان نادرترین‌ها شناخته می‌شود.

معرفی بیمار: بیمار خانم ۵۱ ساله‌ای بود که به دلیل تنگی نفس کوششی و ادم اندام‌های تحتانی مراجعه کرده بود. در اکوکاردیوگرافی، افیوژن پریکارد مشاهده شد. بیمار تحت آسپیراسیون مایع پریکارد و بیوپسی پریکارد قرار گرفت که التهاب مزمن پریکارد گزارش شد. در طی سومین بار بسترسی، دچار افزایش تنگی نفس، ارتوپنه و برجنستگی ورید ژوگولر گردید که در اکوکاردیوگرافی علی‌رغم کاهش مایع پریکارد، نمای رستریکتیو مشاهده شد. کاتتریزاسیون راست و چپ قلب، پریکارڈیت کاستریکتیو را تایید نمود. بیمار تحت پریکارڈیوتومی توتال تسکینی قرار گرفت که گزارش هیستولوژی و ایمونوھیستوکمیکال پریکارد، آنژیوسارکوم بود.

بحث: با توجه به عدم وجود هیچ نشانه‌ای از منشا تومور در بررسی‌های پستان، ریه، دستگاه گوارش، دستگاه ادراری و سیستم لنفاوی برای بیمار تشخیص نهایی آنژیوسارکوم اولیه پریکارد مطرح گردید. بیمار چند روز پس از آغاز شیمی‌درمانی، به دنبال ایست قلبی - تنفسی فوت نمود.

کلیدواژه‌ها: ۱ - پریکارد ۲ - تومور ۳ - آنژیوسارکوم اولیه پریکارد

دکتر بهرام پیشگو I

\*دکتر شروین آثاری II

تاریخ دریافت: ۸۴/۵/۲۲، تاریخ پذیرش: ۸۴/۹/۱۵

## مقدمه

اگر چه پیش از این، لنفوم، مزوتلیوما، سارکوم تمايز نیافته، سارکوم سینوفیال، فیبروسارکوم و هیستوسیتوم فیبروز پلی‌مورف (Malignant pleomorphic fibrous histocytoma) گزارش شده‌اند<sup>(۲-۷)</sup>، اما آنژیوسارکوم اولیه پریکارد بسیار نادر بوده است. مطالعه حاضر به گزارش یک مورد آنژیوسارکوم اولیه پریکارد اختصاص دارد.

تومورهای قلب، ندرتاً بروز می‌کنند و کمتر از ۱٪ کل تومورها را تشکیل می‌دهند. این تومورها ممکن است خوش‌خیم یا بدخیم باشند. تومورهای اولیه پریکارد معمولاً خوش‌خیم هستند. تومورهای بدخیم پریکارد به ترتیب شیوع شامل لنفوم، مزوتلیوم و سارکوم می‌باشند. شیوع این تومورها در مردان ۲ برابر زنان است و حداقل سن بیماران در هنگام تشخیص، ۴۰-۳۰ سالگی است.<sup>(۱)</sup>

(I) استادیار و متخصص بیماری‌های قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ایران، تهران، ایران.

(II) پژوهش عمومی، موسسه پژوهشگران طب و توانse بهداشت، کامرانیه جنوبی، خیابان دژم‌جو، بنی‌ست راز، تهران، ایران (\*مؤلف مسؤول).

## معرفی بیمار

بیمار ۳۰ روز پس از ترخیص از دومین بسته، مجدداً به دلیل تشدید عالیم تنگی نفس و ادم اندامها در بخش قلب بسته گردید.

در هنگام مراجعه، عالیم حیاتی بیمار به قرار زیر بوده است:

فشار خون: ۱۱۰/۷۰ میلیمتر جیوه

تعداد نبض: ۷۲ ضربه در دقیقه(نامنظم)

تعداد تنفس: ۲۰ بار در دقیقه

دما: ۳۷/۳ درجه سانتی گراد

در معاینه فیزیکی، ملتحمه رنگ پریده بود و در سمع قلب، S1 و S2 به همراه سوافل سیستولیک II/VI در کانون میترال وجود داشت؛ فریکشن راب سمع نشد. صداهای تنفسی قواعد ریه کاهش داشت. ادم +۱ اندام تحتانی مشهود بود. لنفاونوپاتی، علامت کوسمال، پالس متناوب و کراکل وجود نداشت.

هموگلوبین و شمارش سلولهای خون، طبیعی بود. سرعت رسوب گلbul قرمز (Erythrocyte sediment rate=ESR) برابر ۱۰ بود. در گرافی قفسه صدری، قلب بزرگ (Cardiac thoracic ratio ratio=CTR) برابر ۶۵٪ گزارش شد. در الکتروکاردیوگرام، تغییرات غیراختصاصی موج T و همچنین موج T معکوس در لیدهای I, AVL, و V3 تا V6 مشاهده شد.

در اکوکاردیوگرافی، عملکرد مناسب بطن چپ، اندازه طبیعی بطن راست، رگورژیتاسیون خفیف دریچه میترال (+1) و رگورژیتاسیون خفیف دریچه تریکوسپید (+1) به همراه افزایش ضخامت پریکارد (حدود ۹ میلیمتر) مشاهده شد (شکل شماره ۱ و ۲).


در سی تی اسکن قفسه صدری نیز، پریکارد ضخیم و ندولر گزارش شد. علی‌رغم درمان بیمار با دیورتیک، تنگس نفس بیمار در عرض چند روز تشدید گردید و ارتوپنه واضح و افزایش فشار ورید ژوگولر به تابلوی بیمار افزوده گردید. به دنبال آن، بیمار مکرراً دچار آریتمی‌های فوق بطنی [فیبریلاسیون دهیزی] و تاکیکاردی فوق بطنی

بیمار، خانم ۵۱ ساله دارای شغل آرایشگری بود که به دنبال تب، گلودرد و درد عضلانی - اسکلتی، دچار درد سینه، تنگی نفس فعالیتی و ادم اندام تحتانی شده بود و به دنبال آن در یک بیمارستان فوق‌تخصصی قلب بسته گردیده بود.


در گرافی قفسه صدری بیمار، قلب بزرگ و افیوژن دو طرفه پلور قابل مشاهده بود. در اکوکاردیوگرافی بعمل آمده، افیوژن پریکارد (MITS) تا شدید و رگورژیتاسیون خفیف میترال (+1) بدون عالیم تامپوناد مشاهده شد. آسپیراسیون مایع و نمونه برداری پریکارد، از طریق شکاف زیر گزیفویید و ایجاد پنجره پریکارد (Pericardial window) انجام شد. در سیتولوژی مایع پریکارد، گلبول قرمز و گلبول سفید چند هسته‌ای (فأقد باکتری) گزارش شد. رنگ آمیزی اسید فاست و کشت باکتریال و سل مایع پریکارد، منفی بود.

بیوپسی پریکارد، التهاب مزمун پریکارد را گزارش داد. بیمار پس از کاهش عالیم، از بیمارستان ترخیص شد. بیمار ۲۰ روز پس از اولین بسته مجدداً دچار افزایش تنگی نفس و ادم اندام شد. وی به کلینیک فوق‌تخصصی ریه مراجعه نمود و در بخش ریه بسته گردید.

بیمار با شک به آمبولی ریه، تحت اسکن پروفیوژن ریه قرار گرفت که طبیعی گزارش شد. همچنین در بررسی بعمل آمده، ندول تیرویید کشف شد. آزمایشات عملکرد تیرویید، FNA طبیعی بودند. در اسکن ایزوتوپ ندول سرد و (Fine needle aspiration)، کولویید گزارش شد. با شک بیماری‌های کلاژن و اسکولار، برای وی آنتی‌بادی ضد آنتی‌بادی (Anti ds DNA Antibody)، (Anti neutrophil cytoplasmic Antibody) ANCA، Purified protein derivative (PPD) و (Widal)، تست‌های کبدی و (derivative) درخواست گردید. به دنبال کاهش عالیم، بیمار با حال عمومی نسبتاً مناسب مرخص گردید. همگی آزمایشات درخواست شده فوق، نرمال بودند.




شکل شماره ۳- اکوکاردیوگرافی، نارسایی + میترال و فلوی دریچه میترال به صورت سودونزرمالیزاسیون را نشان داد.




شکل شماره ۴- اکوکاردیوگرافی، نارسایی + تریکوسپید، فشار بطن راست برابر ۴۶ میلیمتر جیوه و فلوی تریکوسپید برابر ۲/۹۶ متر بر ثانیه را نشان داد.

وی به منظور تایید پریکاردیت کانستیریکتیو، تحت کاتتریزاسیون راست و چپ قلب و همچنین آنژیوگرافی عروق کرونر قرار گرفت. در کاتتریزاسیون، بروند ده قلب ۶۰٪ به همراه الگوی Square root pattern مشاهده شد و فشارهای دیاستول برابر بودند(جدول شماره ۱).

[(Paroxysmal supraventricular tachycardia=PSVT) گردید که به داروهای آنتی آریتمی، مقاوم بود. در اکوکاردیوگرافی سریال، علی‌رغم کاهش مایع پریکارد، الگوی رستیریکشن بطن راست و چپ مشاهده شد که پریکاردیت کانستیریکتیو را مطرح نمود(شکل شماره ۳ و ۴).



شکل شماره ۱- اکوکاردیوگرافی بیمار نشان‌دهنده افیوڈن و افزایش ضخامت پریکارد (Ejection fraction) EF=٪۵۷ است



شکل شماره ۲- نمای چهار حفره‌ای اکوکاردیوگرافی بیمار

تنگی نفس، درد سینه و ادم اندام تظاهر کرده بود. عنوان شده است که بیماران مبتلا به تومورهای پریکارد، غالباً بی علامت هستند، اما در صورت علامت دار بودن، معمولاً عالیم شامل تنگی نفس، سرفه، ارتوپنه، ادم اندام، درد سینه، لاترژی، تب و تعریق شبانه می باشد. به طور کلی، باید عنوان کرد که تظاهر بالینی تومورهای پریکارد به کلی متفاوت است. با توجه به احتمال ایجاد نارسایی قلب، بر جستگی و رید ژوگولر محتمل است.<sup>(۲)</sup>

در بیمار اخیر نیز با گذشت زمان، سیر بیماری به سمت ایجاد تابلوی پریکارдیت کانستربیکتیو پیشرفت نمود که با عالیم نارسایی قلب و بر جستگی و رید ژوگولر همراه بود. در برخی از بیماران، شواهدی از متاستاز دور دست نیز مشاهده شده است.<sup>(۳)</sup> با این وجود در این بیمار، هیچ شواهدی از متاستاز دور دست وجود نداشت.

یافته های تصویربرداری و یافته های تشخیصی بیمار شامل افزایش ضخامت پریکارد همراه با ندولاریت در CT scan و افزایش جذب(uptake) در سنتی گرام با گالیوم Gallium scintigram) بود. استفاده از مارکرهای درگیری (Embryonic membrane antigen)EMA مثبت و CD31، CD34، HMB45، PR منفی (Progesterone receptor)، ER، Cytokeratin، وینتین (vimentin)، و فاکتور ویلبراند (Von willebrand factor) مثبت و منفی (Negtive)، اما بیوپسی باز پاتولوژیک این بیماری نمی باشد<sup>(۴)</sup>، اما بیوپسی باز پریکارد در بیش از ۹۰٪ موارد به تشخیص منجر خواهد شد.<sup>(۱)</sup>

نکته قابل توجه این است که در مورد این بیمار نتیجه دو نوبت آسپیراسیون و بیوپسی پریکارد (یک بار در بستری نخست و بار دیگر در بستری سوم)، منفی کاذب بود که به تأخیر در تشخیص منجر شد. احتمال منفی کاذب در پریکاردیوستنتز در منابع نیز ذکر شده است.<sup>(۵)</sup> عنوان می شود که در برخی از بیماران، تشخیص به اشتباه<sup>(۶)</sup> و یا اتفاقی حاصل می شود.<sup>(۷)</sup>

در مورد اخیر، عالیم محدود کننده پریکارد در معاینه و اکوی سریال، پریکاردیت کانستربیکتیو را مطرح کرد که به تصمیم گیری برای انجام کاتریزاسیون قلب در بیمار منجر

جدول شماره ۱- نتایج کاتریزاسیون راست و چپ قلب

فضا	فشار(میلیمتر جیوه)
دهلیز راست	۰-۱۸
بطن راست	۴۰/۰-۱۸
شریان ریوی	۴۰/۰-۱۸
متوسط فشار Wedge شریان ریوی	۲۰
آئورت	۱۱۰/۰-۱۸
بطن چپ	۱۱۰/۰-۱۵
	۱۱۰/۰-۱۵

در آنژیوگرافی عروق کرونر، حرکت کرونرها بسیار محدود اما قادر هر گونه ضایعه انسدادی بود. به هدف تسکین بیمار، بیمار تحت پریکاردکتونی توatal قرار گرفت. در گزارش پاتولوژی پریکارد، بافت نئوپلاستیک انفیلتراتیو، متشکل از صفحات سلولهای دوکی پلئومورف با هسته بزرگ وزیکوله و اوزینوفیلیک مشاهده شد که مطرح کننده آنژیووسارکوم بود.

بررسی ایمونوھیستوکمیکال، (ویمنتین vimentin) و (Von willebrand factor) VWF مثبت و (CD31) منفی (Negtive)، (EMA) Embryonic membrane antigen، (PR) Estrogen receptor، (ER) Cytokeratin منفی (Negtive)، (Progesterone receptor) تشخیص آنژیووسارکوم را قطعی نمود. از آن جهت که در بررسی های دستگاه های مختلف بدن، هیچ شواهدی از وجود تومور در پستان، ریه ها، دستگاه گوارش (کبد، پانکراس و مری)، طحال، تیموس و کلیه ها بدست نیامد، تومور پریکارد، آنژیووسارکوم اولیه در نظر گرفته شد.

بیمار به بخش انکولوژی منتقل گردید و تحت کموترایپی قرار گرفت. وی پس از آن دچار افزایش تنگی نفس و ریتم های تاکی کاردی فوق بطنی (PSVT) و فیبریلاسیون دهلیزی (Atrial fibrillation=AF) گردید. چند روز بعد، وی به دنبال ایست قلبی - تنفسی فوت نمود.

#### بحث

بیمار معرفی شده، مبتلا به تومور اولیه پریکارد بود که با

5- Kobayashi Y, Murakami R, Ogura J, Yamamoto K, Ichikawa T, Nagasawa K, et al. Primary pericardial mesothelioma: A case report. Eur Radiol 2001; 11: 2258-61.

6- Matsakas EP, Lazaros GA, Panou FK, Karavidas AI, Papalimberi EP, Scotis ID, et al. Primary pericardial fibrosarcoma presenting as “near” cardiac tamponade. Clin Cardiol 2002; 25: 83-5.

7- Saotome M, Yoshitomi Y, Kojima S, Kuramochi M. Primary cardiac lymphoma: A case report. Angiology 2002; 53: 239-41.

8- Sevinc A, Cameci C, Turk HM, Buyukberber S. How to interpret serum CA125 levels in patients with serosal involvement? A clinical dilemma. Oncology 2003; 65(1): 1-6.

9- Eren NT, Akar AR. Primary pericardial mesothelioma. Current treatment options in oncology 2002; 3: 369-73.

10- Grebenc ML, Rosado de Christenson ML, Burke AP, Green CE, Galvin JR. Primary cardiac and pericardial neoplasms: radiologic-pathologic correlation. Radiographics 2000 Jul-Aug; 20(4): 1073-103.

شد. سیر مشابه تغییرات یافته‌های اکوکاردیوگرافی پیش از این نیز در بیماران مشابه گزارش شده است.<sup>(۱)</sup> بیمار با فاصله زمانی کمی از زمان تشخیص، فوت نمود. در منابع نیز به پیش‌آگهی بسیار بد این بیماری به دلیل تظاهر بسیار دیررس و عدم امکان خارج کردن کامل تومور توسط جراحی، اشاره شده است.<sup>(۱۰)</sup>

مطابق اطلاع نویسنده‌گان این مقاله، پیش از این هیچ گزارشی از آنژیوپریکارد در ایران منتشر نشده بود. در پایان، به نظر می‌رسد که در نظر داشتن تومورهای پریکارد در لیست تشخیص‌های احتمالی، ممکن است بتواند پزشکان را زودتر به تشخیص راهنمایی نماید.

### تقدیر و تشکر

بدین وسیله نویسنده‌گان این مقاله از دیگر اعضای محترم کادر پزشکی بیمار، جناب آقای دکتر سعادت، دکتر سعیدی، دکتر محبی، دکتر صالحی و دکتر اصلانی که در طول مدت بستری بیمار، جهت بدست آوردن تشخیص قطعی، زحماتی را متحمل شدند، مراتب تقدیر و تشکر را ابراز می‌دارند و همچنین از سرکار خانم دکتر بهرامی نژاد که با بررسی‌های هیستوپاتولوژی، تشخیص قطعی را مطرح نمودند، سپاسگزاری می‌نمایند.

### فهرست منابع

1- Kim NH, Kweon KH, Oh SK, Park MR, Yun KJ, Juhng SK, et al. A case of primary pericardial undifferentiated sarcoma. J Korean Med Sci 2003 Oct; 18(5): 742-5.

2- Spodick DH. Pericardial diseases. In: Braunwald E, editors. Heart disease. 6 th ed. Philadelphia: WB Saunders Co; 2001. p. 1858-9.

3- Basso C, Valente M, Poletti A, Casarotto D, Thiene G. Surgical pathology of primary cardiac and pericardial tumors. Eur J Cardiothorac Surg 1997; 12: 730-8.

4- Yoshida A, kanda T, Sakamoto H, Masuda H, Iwasaki T, Nakajima T, et al. Sudden death with malignant hemangioendothelioma originating in the pericardium: A case report. Angiology 1999; 50: 607-11.

## *Primary Pericardial Angiosarcoma: A Case Report and Literature Review*

/  
B. Pishgoo, MD      \*Sh. Assari, MD      //

### *Abstract*

**Introduction:** Among malignant pericardial tumors, which appear to be scarcely seen, primary pericardial angiosarcoma is considered as one of the rarest ones.

**Case Report:** A 51-year-old female presented with dyspnea on exertion and edema of lower limbs. Echocardiography showed pericardial effusion. Aspiration and biopsy of pericardium were reported as chronic pericarditis as well. In her third admission, dyspnea and orthopnea were on the increase. In serial echocardiography, restrictive pattern was seen despite small pericardial effusion, which suggests constrictive pericarditis(CP). Cardiac catheterization also confirmed CP. A palliative total pericardectomy was performed and angiosarcoma was diagnosed based on histopathological and immunohistochemical reports.

**Conclusion:** While there was no tumor source in breast, lungs, gastrointestinal, genitourinary, and reticuloendothelial system, the tumor was recognized as primary pericardial angiosarcoma. However, she died a few days after the initiation of chemotherapy due to cardiopulmonary arrest.

**Key Words:** 1) Pericardium 2) Tumor 3) Primary Pericardial Angiosarcoma

I) Assistant Professor of Cardiology. Baqiyatallah University of Medical Sciences. Tehran, Iran.

II) General practitioner. Research Institute of Medicine and Health Promotion. Dezhmjo St., South Kamranieh Ave., Tehran, Iran. (\*Corresponding Author)