

بررسی شنوایی شیرخواران و کودکان مبتلا به بیماری منژیت به وسیله آزمون‌های

(ABR) Auditory brain-stem response

(EOAE) Evoked otoacoustic emission و آزمون‌های رفتاری شنوایی

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت حس شنوایی در رشد و تکامل مهارت‌های کلامی و زبانی و ماهیت آسیب شنوایی در بیماری منژیت به عنوان یک نوع از آسیب شنوایی اکتسابی، این مطالعه بر ارزیابی شنوایی و تشخیص زودهنگام کم شنوایی در بیماری منژیت متمرکز شده است. هدف از این مطالعه ارزیابی ادیولوژیک شیرخواران و کودکان مبتلا به بیماری منژیت در مرحله حاد و در هنگام بهبودی از بیماری منژیت، به کمک آزمون‌های (ABR) Auditory brain-stem response و آزمون‌های رفتاری شنوایی (EOAE) Evoked otoacoustic emission.

روش بررسی: این مطالعه از نوع مقطعی بود. روش گردآوری اطلاعات، معاینه و آزمایش بود. تعداد نمونه‌های مورد مطالعه در این پژوهش، شامل ۴۰ نوزاد و کودک در محدوده سنی بدو تولد ۱۲ سال بود. تمامی بیماران فوق در طی مدت ۲۴-۷۲ ساعت پس از تشخیص قطعی ابتلاء به بیماری منژیت، از نظر وضعیت شنوایی به کمک آزمون ABR (با هدف ارزیابی آستانه شنوایی)، مورد بررسی قرار گرفتند که در ۲۴ ساعت قبل از ترخیص از بیمارستان نیز مجدداً تکرار می‌شد. همچنین در طی ۷-۱۴ روز پس از بهبودی، تمام ۴۰ بیمار مورد مطالعه، تحت آزمون‌های رفتاری شنوایی و آزمون EOAE قرار گرفتند تا علاوه بر تایید نتایج آزمون ABR، عملکرد حلزون شنوایی نیز مورد بررسی قرار گیرد. لازم به ذکر است جهت تحلیل یافته‌ها، نرم‌افزار آماری SPSS [آزمون دقیق فیشر (Fisher exact test) و آزمون T] و جهت ترسیم نمودارها، نرم‌افزار EXCEL پکار برده شد.

یافته‌ها: براساس نتایج آزمایش ABR در ابتدای مرحله حاد بیماری، از ۴۰ بیمار مورد مطالعه، ۴ بیمار (۱۰٪) مبتلا به آسیب شنوایی حسی - عصبی (SNHL) Sensorineural hearing loss شدید تا عمیق دوطرفه و یک بیمار (۲/۵٪) مبتلا به SNHL شدید تا عمیق یکطرفه شده بودند. در ۳۵ بیمار دیگر (۸/۷٪)، عملکرد شنیداری کاملاً منجذب ملاحظه شد. نتایج فوق در آزمایش ABR در مرحله دوم و همچنین در آزمون‌های رفتاری شنوایی که در طی ۷-۱۴ روز پس از ترخیص از بیمارستان انجام می‌شد، مجدداً ملاحظه شد (اصل کراس - چک). در خصوص آزمون EOAE در ۲۵ بیمار با شنوایی هنجار براساس آزمون ABR، عملکرد حلزون شنوایی نیز هنجار بود. از ۵ بیمار مبتلا به SNHL، در ۲ بیمار، عملکرد ناهنجار حلزون شنوایی و در ۲ بیمار، عملکرد هنجار حلزون شنوایی ملاحظه شد.

نتیجه‌گیری: آسیب شنوایی ناشی از ابتلاء به بیماری منژیت، در صورت رخداد، در مرحله حاد بیماری قابل نمایان است که در مطالعه حاضر ۱۲/۵٪ از جمعیت مطالعه را متأثر نموده بود. همچنین می‌توان عنوان نمود که در بیماری منژیت علاوه بر احتمال آسیب به عصب شنوایی و احتمالاً مسیر ساقه مغزی شنوایی، آسیب به حلزون شنوایی نیز (در حضور و یا عدم حضور آسیب به مراکز عصبی شنوایی) محتمل است.

- کلیدواژه‌ها: ۱- آسیب شنوایی حسی - عصبی (SNHL) ۲- پاسخ‌های شنیداری ساقه مغزی (ABR)
۳- پرتوهای صوتی برانگیخته گوش (EOAE) ۴- آزمون‌های رفتاری شنوایی ۵- منژیت

تاریخ دریافت: ۸۴/۱/۳۱، تاریخ پذیرش: ۸۴/۸/۱۰

I) عضو کادر آموزشی و کارشناس ارشد ادیولوژی، دانشکده علوم توانبخشی، میدان محسنی، خیابان شهید شاهنشهری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران (مؤلف مسئول).

II) عضو هیأت علمی و کارشناس ارشد ادیولوژی، دانشکده علوم توانبخشی، میدان محسنی، خیابان شاهنشهری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران.

III) دانشیار و متخصص بیماری‌های گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن، دانشکده علوم توانبخشی، میدان محسنی، خیابان شاهنشهری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران.

IV) دستیار تخصصی بیماری‌های کودکان و نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران.

مقدمه

رفتاری شنوایی می‌شود، جهت بررسی وضعیت شنوایی در مرحله حاد بیماری، استفاده از آزمون‌های الکتروفیزیولوژیک (که نیاز به همکاری بیمار ندارند)، توصیه شده است.^(۳)

با توجه به احتمال درگیری سیستم حذرون شنوایی، عصب شنوایی و یا هر دو (در اثر ابتلا به بیماری منژیت)، انجام آزمون‌هایی از قبیل ABR و EOAE در امر تشخیص افتراقی، بسیار حائز اهمیت است.

به لحاظ اهمیت بسزای تشخیص سریع آسیب شنوایی در جهت پیشرفت مناسب و مطلوب در برنامه‌های توانبخشی شنیداری در نوزادان و کودکان مبتلا به SNHL، در این مقاله، نتایج یک مطالعه در خصوص وضعیت شنوایی، پس از ابتلا به بیماری منژیت ارایه می‌شود که به کمک آزمون‌های ABR (در ابتدای مرحله حاد بیماری و پس از بهبودی)، EOAE و آزمون‌های رفتاری شنوایی (در طی ۷-۱۴ روز پس از بهبودی) انجام شده است. لازم به ذکر است که هدف کلی در این بررسی، ارزیابی وضعیت شنوایی در شیرخواران و کودکان مبتلا به بیماری منژیت به کمک آزمون‌های ABR، EOAE و آزمون‌های رفتاری بود.

روش بررسی

در این مطالعه، ۴۰ شیرخوار و کودک مبتلا به بیماری منژیت و بسترهای در بیمارستان کودکان مفید تهران و در محدوده سنی بدو تولد تا ۱۲ سال، جهت ارزیابی وضعیت شنوایی انتخاب شدند.

از تمام بیماران پس از انجام معاینات بالینی، آزمایش کشیدن مایع مغزی - نخاعی (Lumbar puncture=LP) و (Cerebrospinal fluid=CSF) (در جهت تأیید قطعی ابتلا به منژیت)، شرح حال دقیق گرفته می‌شد.

در روند شرح حال گیری بیماران، در صورت مواجهه قبلی بیمار با عوامل خطرزا برای شنوایی و یا هر گونه سابقه آسیب شنوایی در گذشته، نمونه‌ها از مطالعه خارج می‌شدند. در صورت عدم مواجهه با عوامل خطرزا برای شنوایی و یا هر گونه سابقه کاهش شنوایی در گذشته، بیماران تحت

کم‌شنوایی و ناشنوایی، از جمله رایج‌ترین و مهم‌ترین پیامدهای ابتلا به بیماری منژیت می‌باشند. عاقب و پیامدهای ابتلا به بیماری منژیت (شامل پیامدهای نورولوژیک و ادیولوژیک)، در ۵۰٪ از مبتلایان بروز پیدا می‌کند.^(۴) آسیب شنوایی حسی - عصبی در ۳۵٪ از شیرخواران و کودکان مبتلا به بیماری منژیت ملاحظه شده است.^(۵) عنوان شده است که در حدود ۲۰٪ از موارد آسیب شنوایی حسی - عصبی شدید تا عمیق، به دلایل اکتسابی، به فرد عارض می‌شوند که در حدود ۹۰٪ آنها، به دلیل ابتلا به بیماری منژیت، دچار آسیب شنوایی حسی - عصبی شده‌اند. این عارضه عمده‌تاً در گروه شیرخواران و کودکان مبتلا به منژیت باکتریایی و منژیت قارچی متظاهر می‌شود.^(۶)

کاهش شنوایی در اثر ابتلا به بیماری منژیت از طریق چندین مکانیسم بروز می‌نماید که می‌توان موارد زیر را عنوان نمود.^(۷)

۱- انتشار عفونت از فضای ساب آراکنویید به اکوداکت حذرونی که در صورت مقاومت ضعیف می‌تواند منجر به لاپیرنتیت بشود.

۲- لاپیرنتیت سروز (علت آسیب شنوایی گذرا).

۳- آسیب مستقیم به الیاف عصب شنوایی (هشتمن عصب جمجمه‌ای) که به دلیل ischemia و تجمع کانون عفونی متظاهر می‌شود.

۴- آسیب مستقیم میکروارگانیسم مهاجم به هسته‌ها و مسیرهای شنوایی ساقه مغزی.

با توجه به اهمیت تشخیص سریع کاهش شنوایی، کلیه کودکان مبتلا به بیماری منژیت باید قبل از ترخیص از بیمارستان (ترجیحاً تحت ارزیابی‌های ادیولوژیک قرار بگیرند و حتی برخی از متون عنوان می‌نمایند که ارزیابی وضعیت شنوایی نوزاد یا کودک مبتلا به بیماری منژیت باید تا ۶-۷ هفته پس از بهبودی نیز ادامه یابد.^(۸)

به دلیل وضعیت نامناسب بیماران مبتلا به منژیت (سفتی گردن و ...) که منجر به همکاری ضعیف آنها در آزمون‌های

(Transient-otoacoustic emission)TE-OAE [شامل EOAE و (Distortion product-otoacoustic emission)DP-OAE] قرار گرفتند. در بررسی‌های ایمیتانس صوتی، نوع تیمپانوگرامها و وضعیت رفلکس‌های همان سویی و دیگر سویی (در گروه بیماران بالای ۶ ماه) مورد ارزیابی قرار می‌گرفت.

در آزمون‌های رفتاری نیز از آزمون puretone (PTA)، BOA (Sound field audiometry)، S.F. (audiotometry)، (Behavioral observation audiometry) (برحسب سن) استفاده می‌شد.

در خصوص آزمون TE-OAE، از برنامه Quik-Screen در آزمون TE-OAE، ۸۰ میکروثانیه و به صورت و محرك click (default)، ۸۰ میکروثانیه و به صورت غیرخطی استفاده می‌شد و معیار قبول پاسخ، شامل وجود دامنه پاسخ مطابق با سن و قابلیت تکرار پذیری بالای ۶۵٪ بود (این در حالی بود که معیارهای قبول پاسخ شامل ثبات پاسخها، آستانه پس زدن و ...، در حد قابل قبول و استاندارد باشد).

در آزمون DP-OAE نسبت به F_1 به F_2 معادل ۱/۲۲ بوده و سطوح شدتی L_1 و L_2 ، ۷۰ دسی‌بل بود و در شرایط $2F_1-F_2$ ، دامنه مناسب پاسخ‌های اعوجاجی (Distortion) در فرکانس‌های (F_2) ۱۰۰۱، ۱۲۵۷، ۱۵۸۷، ۲۰۱۵، ۲۰۰۲، ۳۱۷۴، ۴۰۰۴، ۴۰۰۴ و ۵۰۴۲ هرتز، اندازه‌گیری می‌شد، در این خصوص نیز معیار قبول پاسخ شامل ظهر منحنی رزوئانس کانال مناسب و دامنه‌های اعوجاجی متناسب با سن بود. در صورت نیاز به آرام‌بخشی بیمار، از داروی فنوباربیتال به میزان ۱ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن (زیر نظر پزشک) استفاده می‌شد.

لازم به ذکر است در خصوص آزمون ABR از دستگاه Biomedical phasis استگاه Intraacoustic مدل AZ-۷، در آزمون ایمیتانس صوتی از شنوایی از دستگاه Madsen مدل OB^{۸۲۲} و در آزمون‌های TE-OAE و DP-OAE از دستگاه HORTMAMN مدل ILO^۵ استفاده می‌شد. این مطالعه از نوع مقطعی بوده و روش گدآوری اطلاعات، معاینه و آزمایش بود. همچنین جهت تحلیل یافته‌ها، از نرم‌افزار آماری

آزمایش ABR قرار می‌گرفتند. اولین آزمایش ABR در طی مدت ۷۲-۲۴ ساعت پس از تشخیص قطعی ابتلا به منژیت، صورت می‌پذیرفت. Set-up دستگاه در این خصوص به صورت زیر بود:

نوع محرك: half click

دفعات تکران: ۲۱/۱ بار در ثانیه

قطبیت: انبساطی (Rarefaction) (در مورد نوزادان از قطبیت تراکمی (Condensation) استفاده می‌شد)

تعداد محركات: ۱۵۰۰ تحریک

دریچه زمانی: ۱۵ میلی‌ثانیه

مبدل: گوشی TDH-۳۹ (و ارایه نویز سفید به گوش غیرآزمایشی).

سطح شدت برای شروع آزمون، ۱۰۰ دسی‌بل pe-SPL بود که در صورت عدم مشاهده پاسخ به ۱۱۰ و ۱۲۰ دسی‌بل pe-SPL، افزایش می‌یافت. در صورت ظهر امواج در سطح شدت ۱۰۰ دسی‌بل pe-SPL، شدت محرك در فوائل ۲۰ دسی‌بل کاهش می‌یافت. در صورت مشاهده پاسخ (موج V)

در سطح شدت ۴۰ دسی‌بل pe-SPL (معادل با ۱۰ دسی‌بل nHL)، شنوایی بیماران هنجار تلقی می‌شد و در صورتی که آخرین سطح شدتی که موج V قابل ردهیابی باشد، بالاتر از ۴۰ دسی‌بل pe-SPL بود، شنوایی بیماران ناهنجار تلقی می‌شد (برحسب مورد کم شنوایی خفیف، ملایم و ...).

آزمایش ABR با همان Set-up و پروتکل کاری در ۲۴ ساعت قبل از ترخیص بیماران از بیمارستان نیز تکرار می‌شد. لازم به ذکر است که در هر دو مرحله، از آرایش سه الکترودی استفاده می‌شد (الکترود non-Inverting متصل به ناحیه F_z ، الکترود Inverting متصل به مستویید گوش آزمایشی و الکترود Ground متصل به مستویید گوش غیرآزمایشی). در صورت نیاز به آرام‌بخشی بیمار، از داروی کلرال هیدرات به میزان ۰.۰ mg/kg (زیر نظر پزشک) استفاده می‌شد.

حدود ۷-۱۴ روز پس از ترخیص بیماران از بیمارستان، کلیه شیرخواران و کودکان مورد مطالعه، تحت آزمون‌های ایمیتانس صوتی، آزمون‌های رفتاری شنوایی و آزمون‌های

بیماری در گروه شیرخواران ۴-۰ ماه، در یک بیمار، شنوایی هنجر و در یک بیمار دیگر، SNHL شدید تا عمیق دو طرفه ملاحظه شد(یک نوزاد دختر).

در گروه شیرخواران ۵-۲۲ ماه (براساس نتایج آزمون ABR) در ۳ بیمار(۲ دختر و یک پسر)، SNHL شدید تا عمیق دو طرفه و در یک بیمار(یک دختر)، SNHL شدید تا عمیق یکطرفه ملاحظه شد و در ۷ بیمار دیگر، آزمایش ABR نمایانگر شنوایی کاملاً هنجر بود.

در گروه کودکان ۱۳۲-۲۴ ماه، آزمایش ABR در تمام ۲۷ بیمار مؤید شنوایی هنجر بود.

در آزمایش ABR در مرحله بهبودی(در ۲۴ ساعت قبل از ترخیص از بیمارستان)، نتایج مرحله اول مجدداً ملاحظه شد و آزمون T بین نتایج آزمایش ABR در دو مرحله، اختلاف معنی داری را نشان نداد.(Pvalue>۰/۰۵).

در گروه بیماران مبتلا به SNHL شدید تا عمیق، موج ۷ در سطح شدت ۱۲۰ دسی بل pe-SPL نیز قابل ردیابی نبود. در کلیه بیماران با شنوایی هنجر براساس نتایج آزمایش ABR، نهفته مطلق امواج و فواصل بین

(آزمون دقیق فیشر و آزمون T) و جهت ترسیم نمودارها، از برنامه Excel استفاده شد.

یافته ها

در این مطالعه ۲۷ پسر(۵/۶۷٪) و ۱۳ دختر(۵/۳۲٪) در محدوده سنی ۱ ماه تا ۱۲ سال(با میانگین سنی ۶۵/۵ ماه) وجود داشت. بیماران از لحاظ سنی در سه گروه ۰-۴ ماه (۲ نفر=n)، ۵-۲۲ ماه (۱۱ نفر=n) و ۲۴-۱۳۲ ماه (۲۷ نفر=n) قرار داشتند.

براساس نتایج آزمایش LP و تجزیه مایع مغزی - نخاعی و بررسی مقادیر RBC(Red Blood Cell) و WBC(White Blood Cell) در مایع مغزی - نخاعی، ۲۰ بیمار، مبتلا به منژیت باکتریایی و ۱۹ بیمار، مبتلا به منژیت ویروسی و یک بیمار، مبتلا به منژیت قارچی بودند. از ۲۱ بیمار مبتلا به منژیت چرکی(یک بیمار مبتلا به منژیت قارچی و ۲۰ بیمار مبتلا به منژیت باکتریایی)، میکروارگانیسم ایجاد کننده منژیت، در ۱۳ بیمار در محیط کشت رشد کرد(جدول شماره ۱).

جدول شماره ۱- توزیع میکروارگانیسم های ایجاد کننده بیماری منژیت در ۱۳ نفر از شیرخواران و کودکان ۱ ماه تا ۱۲ سال مبتلا به منژیت با کشت مثبت و بستره در بیمارستان کودکان مفید تهران، سال ۱۳۸۰-۸۱

نام میکروارگانیسم	هموفیلوس	پنوموکوک	استافیلوکوک	منگوکوک	استرپتوکوک	قوبریکلوزیس	کاندیدا آلبیکنکس	E-coli	تعادل(نفر)	وضعیت شنوایی
۱	۲	۲	۲	۱	۱	۱	۱	۱	۱	نهنجار
نهنجار	نهنجار	نهنجار	نهنجار	نهنجار	نهنجار	نهنجار	نهنجار	نهنجار	نهنجار	نهنجار
دختر	دختر	دختر	دختر	دختر	دختر	دختر	دختر	پسر	پسر	جنسیت
				۱	۱	۲	۲	۲	۱	وضعیت شنوایی

قله ای امواج در محدوده کاملاً هنجر و مطابق با سن قرار داشت.

در این پژوهش در طی ۷-۱۴ روز پس از ترخیص بیماران از بیمارستان، تمام ۴ بیمار مورد بررسی، تحت آزمایش های ایمیتانس صوتی، آزمون های رفتاری

لازم به ذکر است که آزمون T اختلاف میانگین سطح قند و پروتئین مایع مغزی - نخاعی را در گروه با شنوایی هنجر و گروه با شنوایی ناهنجار، معنی دار نشان داد (Pvalue=۰/۰۲).

براساس نتایج آزمایش ABR در ابتدای مرحله حاد

SNHL شدید تا عمیق) و تحت تأثیر بیماری قرار نگرفته بود و در ۳ بیمار دیگر، عملکرد کاملاً ناهنجار حزون شنوایی ملاحظه شد(یعنی حزون شنوایی متأثر از بیماری شده بود).

لازم به ذکر است معیار قبول پاسخ در آزمون TE-OAE، قابلیت تکرارپذیری بالای ۶۵٪ و دامنه پاسخ متناسب با سن (در نوزادان و شیرخواران، حدود ۱۶-۲۰ دسیبل و در کودکان، در حدود ۱۴-۱۲ دسیبل) و در آزمون DP-OAE رویت منحنی رزوئننس مناسب کانال و دامنه اعوجاجی متناسب با سن(در نوزادان و شیرخواران، ۱۴-۲۰ دسیبل و در کودکان، ۱۲-۹ دسیبل) بود.^(۸)

بحث

SNHL شدید تا عمیق دو طرفه و گاهآی یکطرفه از جمله مهمترین پیامدهای ابتلا به بیماری منژیت میباشد و به همین دلیل نیز ارزیابی وضعیت شنوایی در کودکان مبتلا به بیماری منژیت، بارها توصیه و تأکید شده است.^{(۶) و (۷)}


شیوع آسیب شنوایی حسی - عصبی در اثر ابتلا به بیماری منژیت در مطالعات مختلف، رقم قابل توجهی عنوان شده است؛ رقم فوق در اکثر این مطالعات، ۱۰-۱۲٪ بیان شده است.^(۹-۱۱)

در این مطالعه، نتایج حاصل از انجام آزمایش ABR، مؤید بروز SNHL شدید تا عمیق دو طرفه در ۱۰/۵٪ و SNHL شدید تا عمیق یکطرفه در ۲/۵٪ از نمونه‌های مورد بررسی بود. در مطالعه حاضر، موردی از بهبودی در SNHL حاصله و یا آسیب شنوایی ثانویه ملاحظه نشد و به این ترتیب میتوان عنوان نمود که(همان طوری که در بسیاری از مقالات و متون بیان شده است) SNHL حاصل از بیماری منژیت، در صورت رخداد، در مرحله حاد بیماری قابل نمایان است و وجود تغییرات بویژه از لحاظ بهبودی پس از آن، محتمل نمیباشد.^(۱۰) این یافته با مطالعه Jing و همکاران(۱۹۹۹)، Francosis M (۱۹۹۷) و ZE Gelfand (۱۹۹۷) و S Stanley (۲۰۰۲) مطابقت دارد.

کلیه بیمارانی که در این بررسی به دنبال ابتلا به بیماری

شنوایی و آزمایش TE-OAE و DP-OAE قرار گرفتند.

در آزمون ایمیتанс صوتی در ۲/۵٪ بیماران(۱ نفر)، تیپانوگرام نوع C و در ۵/۹٪(۳۹ نفر)، تیپانوگرام نوع A ملاحظه شد (نمودار شماره ۱).



نمودار شماره ۱- درصد توزیع فراوانی نوع تیپانوگرامها در ۵۰ نفر از شیرخواران و کودکان(بدو تولد تا ۲ سال) مبتلا به بیماری منژیت و مراجعه کننده به بیمارستان کودکان مفید تهران؛ سال ۱۳۸۰-۸۱

نتایج آزمایش بررسی عملکرد رفلکس صوتی عضله رکابی(همان سویی و دیگر سویی) در گروه بیماران بالای ۶ ماه که دارای شنوایی هنجار بودند، کاملاً هنجار بود(در بیماران زیر سن ۶ ماه این ازمون فاقد اعتبار است). در خصوص آزمون‌های رفتاری شنوایی، ۲۱ بیمار، تحت آزمایش PTA؛ ۸ بیمار، تحت آزمایش S.F و ۱۱ بیمار، تحت آزمایش BOA قرار گرفتند.

یافته‌های آزمون ایمیتанс صوتی و آزمون‌های رفتاری شنوایی، هماهنگ با یافته‌های آزمایش ABR بود(اصل کراس - چک)؛ یعنی در ۴ بیمار، SNHL شدید تا عمیق(عمدتاً عمیق) دو طرفه و در یک بیمار، SNHL شدید تا عمیق یکطرفه، ملاحظه شد و در ۳۵ بیمار دیگر، شنوایی هنجار آشکار شد. در خصوص آزمون EOA(OAE و TE-OAE) در ۳۵ بیمار با شنوایی هنجار، عملکرد حزون شنوایی نیز کاملاً هنجار بود. از ۵ بیمار مبتلا به SNHL شدید تا عمیق، در ۲ بیمار، عملکرد حزون شنوایی کاملاً هنجار بود(علی‌رغم

شنوایی ملاحظه شد (جدول شماره ۲).
شناختی (DP-OAE و TE-OAE) عملکرد کاملاً هنجار حلقه از آزمون EOAE، از ۵ بیمار مبتلا به SNHL، علی‌رغم بروز آسیب شنوایی حسی - عصبی شدید تا عمیق، در ۲ بیمار عملکرد هنجار حلقه از بیماری نشده بود و در ۳ بیمار دیگر عملکرد کاملاً ناهنجار حلقه از شنوایی ملاحظه شد (یعنی Robinet MS).
حلقه از بیماری نشده بود (Jiang ZE، Northon JL، ۱۹۹۷) و همکاران (Northon JL، Jiang ZE، ۱۹۹۹) نیز نتایج مشابه را گزارش نموده‌اند.

Dowwns P در واقع می‌توان عنوان نمود که در بیماری منژیت علاوه بر احتمال آسیب به عصب شنوایی (و احتمالاً مسیر ساقه مغزی شنوایی)، آسیب به حلقه از بیماری نیز (در حضور و یا عدم حضور آسیب به مراکز عصبی شنوایی) محتمل است. (۱۴، ۱۵، ۱۶)

در نهایت باید گفت که SNHL حاصل از ابتلا به بیماری منژیت (همان طوری که در بسیاری از مقالات و متون بیان شده است) در صورت رخداد در مرحله حاد بیماری، قابل ردیابی است که باید توسط ارزیابی‌های دقیق ادیولوژی سریعاً تشخیص داده شود تا بتوان حداقل بهره را از خدمات توابنخشی شنیداری برد. (۱۶، ۱۷)

با توجه به اهمیت حس شنوایی در رشد و تکامل توانایی‌های ارتباطی و اجتماعی و اهمیت دوره‌های بحرانی برای رشد گفتار و زبان که بدون حس شنوایی شاید بتوان گفت میسر نمی‌باشد و همچنین تشخیص بموقع آسیب شنوایی در جهت شروع زود هنگام خدمات توابنخشی برای چنین کودکان، باید ارزیابی وضعیت شنوایی در این بیماران قبل از ترخیص از بیمارستان مورد توجه قرار گیرد، چرا که

منژیت دچار آسیب شنوایی حسی - عصبی شدید تا عمیق شده بودند، اطفال زیر ۲ سال بودند. در استدلال این مسئله، شاید بتوان متكامل‌تر شدن سیستم دفاعی میزبان در سنین بالای ۲ سال را عنوان نمود. (۱۰، ۱۲)

لازم به ذکر است که در این مطالعه، ۵ بیمار مبتلا به SNHL، همگی کشت‌های مایع مغزی - نخاعی مثبت داشتند. همان طوری که در جدول شماره ۱ نشان داده شده است، میکروارگانیسم‌های ایجاد کننده منژیت در این ۵ بیمار، همگی از لحاظ احتمال آسیب به دستگاه شنوایی در اثر ابتلا به بیماری منژیت، شناخته شده می‌باشند. (۱۲) همچنین در گروه بیماران مبتلا به SNHL، میانگین سطح قند مایع مغزی - نخاعی، پایین‌تر و میانگین سطح پروتئین آن، بالاتر از حد هنجار بود که در ایجاد SNHL، به عنوان یک پیش‌آگهی منفی محسوب می‌شود. (۱۴، ۱۵، ۱۶) چرا که با افزایش تعداد میکروارگانیسم‌های ایجاد کننده منژیت در مایع مغزی - نخاعی، سطح مواد توکسیک در CSF (پروتئین)، بالاتر رفته و میزان گلوکز آن کاهش می‌یابد (به علت مصرف توسط میکروارگانیسم). در بررسی Kulahli و همکاران (Kulahli و همکاران، ۱۹۹۷) نیز چنین مطلبی گزارش شده است.

در راستای رعایت اصل کراس - چک، در طی ۷-۱۴ روز پس از ترخیص بیماران از بیمارستان، کلیه ۴۰ بیمار مورد پژوهش، تحت ارزیابی‌های رفتاری شنوایی قرار گرفتند که در این مرحله از بررسی نیز، نتایج حاصل از آزمایش ABR مجددأ تکرار شد.

در خصوص بررسی فعالیت عملکرد حلقه از بیماری شناختی (DP-OAE و TE-OAE) استفاده شد. در ۳۵ بیمار با شنوایی هنجار براساس نتایج آزمون شنوایی رفتاری و ABR، در آزمون E-OAE شامل

جدول شماره ۲ - توزیع فراوانی و درصد فراوانی نتایج آزمون ABR بر حسب نتایج آزمون OAE در شیرخواران و کودکان ۱۲ سال تا ۱۲ سال مبتلا

به بیماری منژیت و مراجعه کننده به بیمارستان کودکان مغید تهران؛ ۸۱-۸۰۱۲

	نتایج ABR	نتایج ABR مطابق با شنوایی هنجار	نتایج OAE	نتایج OAE مطابق با عملکرد ناهنجار حلقه از بیماری شناختی	مجموع
۲۵٪ (%) نفر	۲۵٪ (%) نفر	۲۵٪ (%) نفر	-	-	۲۵٪ (%) نفر
۵٪ (%) نفر	۲٪ (%) نفر	۳٪ (%) نفر	۳٪ (%) نفر	۳٪ (%) نفر	۵٪ (%) نفر
۴۰٪ (%) نفر	۳۷٪ (%) نفر	۳۷٪ (%) نفر	۳۷٪ (%) نفر	۳۷٪ (%) نفر	۴۰٪ (%) نفر

of brain and auditory function of children recovered from meningitis. Developmental medicine and child neurology. 1999; 32: 473-80.

6- Richardson MP, Reid A, Williamson TJ, Chair MB, Tarlow MG. Otoacoustic emission as a screening test for hearing impairment in children recovering from acute bacterial meningitis. Pediatrics 1998; 102: 1364-8.

7- Kotagal S, Rosenberg C. Auditory evoked potential in bacterial meningitis. Archives of neurology 1981; 38: 693-5.

8- Robinett MS, Glattka TJ. Otoacoustic emissions: Clinical applications. 1st ed. New York: New York Thieme; 1997. p. 182-6.

9- Berlow MA, Galdarelli DD, Matz GJ, Meyer DH, Harshoh GG. Bacterial meningitis and sensorineural hearing loss: A prospective investigation. Laryngoscope 1980; 90: 1445-52.

10- Ozdamar O, Kraus N, Stein L. Auditory brain-stem response in infant recovering from bacterial meningitis. Acta otolaryngology 1983;109: 13-18.

11- Francosis M, Laccourreye L, Narcy P. Hearing impairment in infant after meningitis: detection by transient evoked otoacoustic emission. Pediatrics 1997; 130: 712-7.

12- Ralph D, Cherry JD, Shield DW. Text book of pediatric infectious disease. 2nd ed. London: WB Saunders Company; 1993. p. 401-18.

13- Bhatt S, Kate J, Nelson JD, Peltola H. Hearing loss and pneumococcal meningitis: An animal model laryngoscope 1991; 101: 1285-91.

14- Vienny H, Despland PA, Lutschg J, Deonna ML, Gander C. Early diagnosis and evaluation of deafness in childhood bacterial meningitis: A study using brain-stem auditory evoked potential. Pediatrics 1984; 73: 579-85.

15- Dodge PR. Prospective evaluation of hearing impairment as a sequale of bacterial meningitis. New England Journal Medicine 1984; 311: 869-74.

16- Gelfans S, Stanley A. Essential of audiology. 2nd ed. New York: Thieme medical pub; 2002. p. 384-7.

17- Northon JL, Dowwns P. Hearing in children. 5th ed. Baltimore: Lipincott Wiliams & Wilkins; 2002. p. 102-4.

یکی از علل مهم آسیب‌شنوایی اکتسابی در اطفال (و در مواردی بزرگسالان)، ابتلا به بیماری منژیت عنوان شده است.^(۱۶ و ۱۷)

البته در بررسی فوق، محدودیت‌هایی نیز وجود داشت. از جمله اینکه در تعدادی از بیماران به دلیل و خامت وضعیت بیمار، آزمایش ناتمام می‌ماند و بیماران از مطالعه خارج می‌شوند. در مواردی نیز بیماران ۳-۴ روز بعد از ابتلا به بیماری منژیت، جهت ارزیابی شنوایی ارجاع می‌شوند که خارج از روند برنامه بوده و این تعداد نیز از مطالعه خارج می‌شوند. محدودیت دیگر این بررسی، احتمال سرایت بیماری از بیمار به محقق، در طول فاز حاد بیماری بود که با رعایت اصول بهداشتی و پروفیلاکسی این امکان سرایت به حداقل رسید.

نتیجه‌گیری

در نهایت به عنوان یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان عنوان نمود که با توجه به اهمیت تشخیص زودرس کم شنوایی اکتسابی ناشی از بیماری منژیت و با در نظر گرفتن و خامت حال بیمار، آزمون‌های ABR و EOAE و در جهت تأیید نتایج، آزمون‌های رفتاری شنوایی، سریع‌ترین راه جهت ارزیابی شنوایی می‌باشد.

فهرست منابع

- 1- Kaplan S, Catlin FL, Feigin RD. Onset of hearing loss in children with bacterial meningitis. Pediatrics 1983; 73: 574-8.
- 2- Fortnum HM. Hearing impairment after bacterial meningitis. Archives disease of childhood 1993; 67: 1128-33.
- 3- Kulahli I, Ozturk M, Bilen C, Cureoglu S, Merhammetziz A. Evaluation of hearing loss with auditory brain-stem response test in the early and late periods of bacterial meningitis in children . The journal of laryngology and otology 1997; 111: 223-7.
- 4- Harada T, Semba T, Suzuki M, Murofoshi T. Audiological characteristics of hearing loss following meningitis. Acta otolaryngology(Stockh) 1988; 456: 61-7.
- 5- Jiang ZE, Gallis HA, Joseph B. Long term impairments

Hearing Assessment in Infants and Neonates Suffering from Meningitis by Using EOAE(Evoked Otoacoustic Emission) & ABR(Auditory Brainstem Response) Tests plus Behavioral Hearing Tests

/
*L. Faraji, MS M. Akbari, MS A. Moosavi, MD O. Khojasteh, MD /IV

Abstract

Background & Aim: Attending to the importance of hearing in development of language skills and the essence of hearing loss in meningitis as an acquired hearing loss, this study focuses on hearing assessment and early diagnosis of hearing loss. The purpose of the present study is to apply EOAE, ABR and behavioral hearing tests to evaluate audiologic condition of infants and neonates suffering from meningitis at the acute and recovery stages.

Patients & Method: This cross-sectional study included 40 infants and neonates whose ages ranged from birth to 12 years. These patients, 24-72 hours after diagnosis or starting the treatment, were evaluated using ABR test. This test was also repeated 24 hours before discharge or recovery. 7-14 days after discharge or recovery, all the 40 patients were assessed using EOAE and behavioral tests, which could evaluate cochlear function besides confirming the results of ABR test. To analyse the data and draw the charts and diagrams, we profited from SPSS, t-test, Fisher test, and EXCEL.

Results: According to the results of ABR test, 24-72 hours after diagnosis, 4 patients(10%) showed bilateral severe to profound SNHL(sensorineural hearing loss) and 1 patient(2.5%) showed unilateral severe to profound SNHL. The same results were observed in re-evaluation 24 hours before discharge using ABR test and also in behavioral test 7-14 days after discharge from the hospital. However, ABR test recognized the rest of the cases(35 patients) as normal regarding their hearing abilities. These 35 patients were diagnosed to have normal hearing sense by EOAE test, which was carried out 7-14 days after discharge from the hospital, as well. EOAE, however, indicated that three of the five patients suffering from SNHL presented with abnormal cochlear function but the two of them remained normal in this respect.

Conclusion: SNHL caused by meningitis, which involved 12.5% of our subjects, is detectable at the acute stage of the disease. Moreover, it can be concluded that meningitis can cause damage not only to cochlear nerve but probably to cochlear function, too. The damage to cochlear function may occur in the presence of the damage to cochlear nerve or by itself.

Key Words: 1) Sensorineural Hearing Loss(SNHL) 2) Auditory Brainstem Response(ABR)

3) Evoked Otoacoustic Emission(EOAE) 4) Behavioral Hearing Tests 5) Meningitis

I) MS in Audiology. Instructor. Faculty of Rehabilitation Sciences. Iran University of Medical Sciences and Health Services. Tehran, Iran.
(*Corresponding Author)

II) MS in Audiology. Instructor. Faculty of Rehabilitation Sciences. Iran University of Medical Sciences and Health Services. Tehran, Iran.

III) Associate Professor of ENT. Faculty of Rehabilitation Sciences. Iran University of Medical Sciences and Health Services. Tehran, Iran.

IV) Resident of Pediatrics. Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services. Tehran, Iran.