

# تهیه و خالص‌سازی آنتی‌ژن‌های کرم بالغ فاسیولاهپاتیکا جهت تشخیص فاسیولیازیس

## چکیده

زمینه و هدف: فاسیولیازیس، یکی از بیماری‌های مهم انگلی انسان و دام است که توسط گونه‌های فاسیولا در میزبان ایجاد می‌شود. تقریباً ۲/۴ میلیون نفر در جهان به این انگل مبتلا هستند و ۱۸۰ میلیون نفر، در معرض خطر ابتلا هستند. تشخیص موقع و درمان سریع آن، از بروز عوارض بیماری در مبتلایان بطور چشمگیری جلوگیری می‌نماید. به همین جهت در مطالعه حاضر نسبت به جداسازی، خالص‌سازی و ارزیابی آنتی‌ژن مناسب و بکارگیری آن در روش‌های سرولوژیک حساس و اختصاصی اقدام شد.

روش بررسی: در این مطالعه، ابتدا کرم‌های سالم جمع‌آوری شدند، سپس کوتیکول و سایر ارگان‌های آنها تفکیک شده، آنگاه به صورت جدگانه، هموژنیزه و سوینکه شدند. میزان پروتئین آنها به روش برادفورد اندازه‌گیری شده و کلیه نمونه‌ها، تخلیط شدند و بر روی ستون ژل کروماتوگرافی (سفادکس G<sub>200</sub>) برده شدند. برای هر قسمت، ۴ جزء آنتی‌ژنیک دریافت شد. آنگاه با اولترافیلتراسیون پروتئین، نمونه‌ها به میزان مناسب رسانده شدند. با آنتی‌ژن بدست آمده، ۳۶ راس خرگوش مخصوص شدند، آنتی سرم بدست آمده از خرگوش‌ها به همراه ۳۰ نمونه سرم انسان مشکوک به ابتلاء به فاسیولیازیس، به روش CIEP (Counterimmuno-electrophoresis) آزمایش شدند. در این مطالعه، آنتی‌ژن جزء ۲ (Fraction 2) کوتیکول با روش فاسیولا هپاتیکا، حساسیت ۹۴/۴٪ و اختصاصیت ۹۰/۹٪ را در تست CIEP نشان داد. آنگاه آنتی‌ژن مذکور با روش SDS-PAGE (sodium dodecyl sulphate-polyacryl amide) شناسایی شد که تنها یک باند مشخص ۶۰ کیلو Daltonی داشت؛ در طول ژل، باند دیگری مشخص نگردید؛ این آنتی‌ژن، با روش الایزا مورد آزمایش قرار گرفت. در این روش، آنتی‌بادی در نمونه سرم ۲۶ نفر از ۳۶ انسان و همه ۳۶ راس خرگوش، قابل تشخیص و اندازه‌گیری بود. نوع مطالعه، راه اندازی یک روش یا سیستم علمی بود که تجزیه و تحلیل اطلاعات آن با استفاده از آزمون همبستگی به روش SPSS انجام شد.

یافته‌ها: در مجموع با روش CIEP، از مجموع ۶۶ نمونه سرم (۳۰ نمونه سرم انسان و ۳۶ نمونه سرم خرگوش)، در ۶۰ مورد (آنچه‌که حاصل از کوتیکول فاسیولا هپاتیکا) واکنش رسوبی مثبت مشاهده گردید، در حالی که با روش الایزا، ۶۲ نمونه سرم از ۶۶ نمونه، جواب مثبت داشته است.

نتیجه‌گیری: بنا بر این استفاده از آنتی‌ژن ۶۰ کیلو Daltonی کوتیکول کرم فاسیولا به عنوان آنتی‌ژن خالص، در تست‌های سرولوژیک CIEP و الایزا توصیه می‌شود. نتایج حاصل، بیانگر حساسیت بالای روش الایزا نسبت به روش CIEP می‌باشد.

کلیدواژه‌ها: ۱- خالص‌سازی ۲- آنتی‌ژن ۳- فاسیولا هپاتیکا ۴- فاسیولیازیس

تاریخ دریافت: ۸۵/۱/۳۰، تاریخ پذیرش: ۸۵/۵/۲۱

## مقدمه

فاسیولیازیس، یکی از بیماری‌های مهم انگلی انسان و دام تقریباً ۲/۴ میلیون نفر در جهان به این انگل مبتلا هستند و ۱۸۰ میلیون نفر در معرض خطر ابتلا هستند.<sup>(۱)</sup>

(۱) دانشیار انگل‌شناسی، دانشکده پیراپزشکی، تقاطع بزرگراه شهید همت و چمران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران، تهران، ایران (\*مؤلف مسئول).

(۲) مربي انگل‌شناسی، دانشکده پیراپزشکی، تقاطع بزرگراه شهید همت و چمران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران، تهران، ایران.

روشهای ایمونولوژیکی کانترایمونوالکتروفورز و الایزا، می‌تواند به درمان سریع آن کمک نماید.

### روش بررسی

در این مطالعه، کبدهای آلوده به کرم بالغ فاسیولا هپاتیکای جمع‌آوری شده از کشتارگاهها و سرم انسان و حیوان آلوده و سالم، جهت بررسی مراحل مختلف کار مورد استفاده قرار گرفتند.

در آزمایشگاه، کلیه کرم‌های سالم از مجاری صفرایی، خارج و به داخل سرم فیزیولوژی منتقل شده و چندین بار با سرم فیزیولوژی شستشو داده شدند. سپس کرم‌ها با PBS ۰/۰۱ مولار (phosphate buffered saline) با  $\text{PH}=8/2$  چندین بار شستشو داده شدند. بعد از خشک کردن کرم‌ها توسط کاغذ خشککن، به فریزر -۲۰ درجه سانتی‌گراد منتقل می‌شدند. کرم‌های فریز شده برای جداسازی قسمتهای مختلف بدن، از فریزر خارج شدند، ابتدا با تیغ پیستوری، کوتیکول آنها، جدا و در بشر حاوی PBS جمع‌آوری شد، سپس سایر اندام‌ها نیز در بشر دیگری که حاوی PBS بود، نگهداری شدند.

نمونه‌ها به وسیله هموژنیزاتور، هموژنیزه شدند و با استفاده از سونیکاتور، سه مرتبه و هر بار به مدت ۱۰-۱۵ دقیقه و با شدت ۵۰ کیلو هرتز، عمل سونیکاسیون روی نمونه‌ها انجام گرفت، بطوری که کلیه سلولها، متلاشی شده و ماکرومولکول‌ها، آزاد گردیدند.<sup>(۶)</sup> آنگاه برای خارج کردن چربی، آنها را در دکانتور با ۳ برابر حجم نمونه، اتر قرار داده درب دکانتور بسته و چندین بار آن را محکم به هم زده و برای خارج شدن گاز از دکانتور شیر آن را چند بار باز و بسته نموده سپس آن را به مدت نیم ساعت در یخچال قرار داده تا دو فاز تشکیل گردد. فاز پایینی که نمونه بود، از آن خارج شد. آنگاه نمونه در ارلن مایر مجهز به ۲ لوله تخلیه، وارد و به پمپ خلاء وصل شد تا اتر کلیه نمونه‌ها خارج گردد.<sup>(۷)</sup>

از روش برادفورد که روشی ساده، دقیق، سریع و حساس بوده، جهت تعیین میزان پروتئین نمونه‌ها استفاده شد. آنگاه

در ایران اکثراً به صورت آندمیک در استان گیلان بویژه بندرانزلی و لاھیجان دیده می‌شود و گاهی به صورت اپیدمی گزارش شده است که آخرین اپیدمی گزارش شده در این منطقه، در حدود سالهای ۱۳۷۷-۷۸ بوده است.<sup>(۱)</sup>

در کشورهای فرانسه، مصر و بربادی هم اپیدمی با این انگل گزارش شده است<sup>(۲)</sup> از نظر دامپزشکی هم بسیاری از دامهای اهلی علفخوار، به دلیل آلودهشدن به این انگل، خسارت جبران‌ناپذیر اقتصادی به بار می‌آورند، زیرا دامها پس از آلوگی، شدیداً دچار اختلالات متابولیسمی و کبدی می‌شوند و بازدهی اقتصادی نخواهد داشت.<sup>(۳)</sup>

آلوگی دامهای کشورمان هم به این انگل بسیار زیاد است. نظر به اینکه این بیماری به عنوان یک بیماری مشترک بین دام و انسان از طریق علوفه و سیزیجات به میزان زیاد منتقل می‌شود و در انسان خطرات جدی ایجاد می‌نماید، به عنوان یک معضل بهداشتی جوامع بشری مطرح است.<sup>(۴)</sup> از طرفی دستیابی به تخم انگل در مدفوع افراد مشکوک، چنان آسان نیست و در صورت تشخیص بیماری، در این مرحله نیز مشکلات فراوانی در درمان بیماران بروز خواهد کرد، بنابراین با توجه به لزوم تشخیص سریع و زود هنگام این بیماری، امروزه از تکنیک‌های پیشرفته‌تری علاوه بر روش‌های پارازیتولوژیکی استفاده می‌شود؛ این روش‌ها آلوگی را در کمتر از یک هفته پس از ورود عامل بیماری تشخیص می‌دهند، تا با درمان بموقع، از عوارض خطرناک آن جلوگیری شود.<sup>(۵)</sup>

از آنجایی که فاسیولیازیس هرساله ضایعات جبران‌ناپذیری را ایجاد می‌کند، هدف از این مطالعه، تهیه آنتی‌ژن‌های خالص فاسیولا و استاندارد نمودن آن می‌باشد. این بیماری در برخی نواحی ایران، آندمیک می‌باشد و کترول و درمان آن با مشکل همراه است. تشخیص بیماری با تهیه و خالص‌سازی آنتی‌ژنهای کرم بالغ توسط روش‌های بیوشیمیایی اولترافیلتراسیون، ژل کروماتوگرافی و الکتروفورز بر روی ژل پلی‌اکریل‌آمید و

بررسی آنتیژن ها با روش های کانترا یمونو الکترو فورز انجام شد.<sup>(۱۰)</sup> تعیین وزن مولکولی پروتئین ها به روش دودسیل سولفات پلی آکریل آمید ۷۷ الکترو فورز انجام شد.<sup>(۱۱)</sup> از تست ELISA (Enzyme linked Immuno sorbent assay) برای تشخیص و تیتراسیون آنتیژن های کوتیکول و سایر ارگان های فاسیولولا هپاتیکا استفاده شد.<sup>(۱۲)</sup> آنگاه برای ارزیابی آنتیژن های تهیه شده، اقدام به تهیه سرمه های انسانی و حیوانی شد. در ۴ نوبت از خرگوش ها خونگیری بعمل آمد و سرم آنها جهت مراحل آزمایش نگهداری شد. ۳۰ نمونه سرم انسانی از بیمارانی که عمدتاً در شمال ایران زندگی می کردند، تهیه شد. این بیماران از نظر علایم بالینی، مشکوک به فاسیولولا بودند و در آزمایش مدفوع تعدادی از آنها، تخم کرم مشاهده شده بود.<sup>(۱۲)</sup>

نوع مطالعه، راه اندازی یک روش یا سیستم علمی بود که تجزیه و تحلیل اطلاعات آن با استفاده از آزمون همبستگی به روش spss انجام شد.

#### نتایج

در این تحقیق، تعدادی اجزاء آنتیژنیک برای کوتیکول و سایر اندام های فاسیولولا هپاتیکا در روش ژل کروماتوگرافی با سفادرکس G<sub>200</sub> بدست آمد که بررسی هر کدام از آنها در ذیل آمده است:

جزء یک کوتیکول فاسیولولا هپاتیکا با ۱۶ نمونه(٪/۵۳/۳) سرم انسانی از ۳۰ نمونه و با ۲۰ مورد(٪/۵۵/۵) از ۳۶ نمونه سرم خرگوش، واکنش رسوبی مثبت داشته و در ۵ مورد، با سرم کنترل، واکنش مثبت کاذب داشته است.

جزء دو کوتیکول فاسیولولا هپاتیکا با ۲۸ نمونه(٪/۹۲/۳) سرم افراد مشکوک به ابتلا به فاسیولیازیس و با ۲۲ نمونه (٪/۸۸/۸) سرم خرگوش از ۳۶ نمونه، واکنش مثبت داشته و در ۲ مورد، واکنش مثبت کاذب با سرم گروه کنترل داشته است.

جز سه کوتیکول فاسیولولا هپاتیکا با ۲۲ مورد(٪/۷۳/۳) از ۳۰ نمونه سرم انسانی و با ۱۰ مورد(٪/۲۷/۷) سرم

نمونه ها برای سیستم اولترافیلتر آماده شدند و عمل فیلتراسیون تا زمانی که سطح مایع داخل محفظه به اندازه مورد نظر برسد، ادامه پیدا کرد. سپس خروجی اولترافیلتراسیون، در ظروف استریل جمع آوری گردیدند. بعد از اندازه گیری پروتئین نمونه ها، آنها در دمای ۴- درجه سانتی گراد برای مراحل بعدی نگهداری شدند.


نمونه ها با فیلتر دارای پورسایز ۱۰، ۲۰ و ۱۰۰ کیلو دالتون، فیلتر شدند. برای کوتیکول فاسیولولا هپاتیکا، چهار جزء آنتیژنی، و برای سایر اندام ها نیز، ۴ جزء آنتیژنی بدست آمد. میزان پروتئین اجزایی بدست آمده پس از تغییظ، اندازه گیری و برای مراحل بعدی، در یخچال نگهداری شد.<sup>(۸)</sup> سپس خالص سازی نسبی آنتیژن ها با استفاده از روش ژل کروماتوگرافی انجام گرفت و کایه نمونه ها در دمای ۴- درجه سانتی گراد تا بررسی نتایج آنها، نگهداری گردیدند. در هر مرحله برای تغییظ نمونه ها، از کیسه دیا لیز استفاده شد.<sup>(۷)</sup>

برای تهیه سرم هیپرایمیون، ۴۰ سر خرگوش جوان انتخاب شدند. از تمامی خرگوش ها قبل از هر گونه تزریق آنتیژن، خونگیری بعمل آمد، ۴ سر از آنها، واکنش مثبت با آنتیژن نشان دادند، که در نتیجه ۳۶ سر خرگوش استفاده شدند. آنها به ۲ گروه ۱۸ تایی تقسیم شدند و گروه اول، با آنتیژن کوتیکول و گروه دوم، با آنتیژن سایر ارگان های فاسیولولا هپاتیکا این شدند. طول دوره ایمن سازی حدوداً ۲ ماه بطول انجامید و هیچ یک از خرگوش ها تلف نشدند. در طی روزهای ایمن سازی یعنی ۱۵ روز بعد از اولین تزریق، ۳۰ روز بعد از اولین تزریق و ۴۵ روز بعد از اولین تزریق، از ورید مارژینال گوش خرگوش ها خونگیری انجام شد.<sup>(۹)</sup>

ابتدا خون به مدت یک ساعت در حرارت ۳۷ درجه سانتی گراد قرارداده و سپس به مدت ۳۰ دقیقه با دور ۱۰۰۰۰ RPM سانتریفیوژ شد، پس از آن، سرم کاملاً شفاف جهت آزمایشات بعدی در لوله های آزمایش به اندازه ۱۰۰ لاندا، تقسیم شد و در دمای ۲۰- درجه سانتی گراد برای استفاده مراحل بعدی نگهداری شد.<sup>(۹)</sup>

خرگوش، واکنش مثبت داشته و با ۳ مورد سرم نرمال، واکنش مثبت کاذب داشته است.

جزء چهار سایر ارگان‌های فاسیولولاپاتیکا، با یک مورد(۲/۳٪) از نمونه سرم انسان واکنش داشته و با ۲ مورد(۵/۵٪) سرم خرگوش‌های مصنون، واکنش بسیار ضعیف داشته است(نمودار شماره ۲).




نمودار شماره ۲- ارزیابی آنتیژن ارگان‌های فاسیولولاپاتیکا با روش کانتر ایمونو الکتروفورز

در نمونه‌های سرم تهیه شده، ۱۵ روز بعد از آخرین تزریق، هیچ‌گونه واکنش رسویی به روش CIEP بوجود نیامد، ضمناً کلیه نمونه‌های تهیه شده از خرگوش‌ها قبل از تزریق آنتیژن‌های آماده شده، با آنتیژن‌های مورد آزمایش، هیچ‌گونه واکنش رسویی نداشته‌اند(نمودار شماره ۲). همچنین جهت تعیین میزان حساسیت روش CIEP، رقت‌های سریال دوتایی ۱:۸، ۱:۱۶، ۱:۳۲، ۱:۶۴، ۱:۱۲۸ و ۱:۲۵۶ تهیه شدند که با این روش، تنها تا رقت ۱:۶۴ سرم‌ها، جواب‌ها مثبت بوده است و از رقت ۱:۱۲۸ به بالا، قوس رسویی قابل توجه و مشاهده، بوجود نیامد. آنتیژن بکار گرفته شده در این آزمایش، اجزا خالص شده فاسیولولاپاتیکا بوده است. البته بهترین قوس رسویی در رقت ۱:۱۶ بدست آمد(شکل شماره ۱).

خرگوش‌های مصنون شده از ۳۶ نمونه، واکنش مثبت داشته است و تنها در ۴ مورد، با سرم خرگوش گروه کنترل، واکنش مثبت کاذب داشته است.

جزء چهار کوتیکول فاسیولولاپاتیکا، واکنش ضعیف داشته و قادر ارزش آنتیژنیک بوده و با ۲ مورد(۶/۶٪) از سرم انسانی و ۴ مورد از سرم خرگوش(۱۱/۱٪)، واکنش مثبت داشته است(نمودار شماره ۱).



نمودار شماره ۱- ارزیابی آنتیژن کوتیکول فاسیولولاپاتیکا با روش کانتر ایمونو الکتروفورز


جزء یک سایر ارگان‌های فاسیولولاپاتیکا در ۱۷ مورد(۵۶/۶٪) از ۳۰ نمونه سرم بیماران مشکوک به ابتلا و ۹ مورد(۲۵٪) سرم خرگوش از ۳۶ نمونه، واکنش رسویی مثبت داشته است و این آنتیژن با ۶ نمونه سرم گروه شاهد، واکنش مثبت کاذب داشته است.

جزء دو سایر ارگان‌های فاسیولولاپاتیکا با ۲۷ نمونه(۹۰٪) سرم افراد مشکوک به ابتلا و ۳۴ نمونه(۹۴/۴٪) سرم خرگوش‌های مصنون از ۳۶ مورد، واکنش رسویی مثبت داشته و در ۵ مورد، واکنش مثبت کاذب با سرم گروه شاهد داشته است.

جزء سه سایر ارگان‌های فاسیولولاپاتیکا با ۱۸ نمونه(۶۰٪) سرم افراد مشکوک و ۱۶ نمونه(۴۴/۴٪) سرم

برخوردار بود که با روش CIEP میزان حساسیت آن، ۹۰/۹٪ و اختصاصیت آن، ۹۴/۴٪ نشان داده شد. جزء سوم آنتی‌ژن کوتیکول فاسیولا هپاتیکا از ارزش اخباری مثبت ۸۸/۸٪ و ارزش اخباری منفی ۴۸/۴٪ برخوردار بود. جزء چهارم آنتی‌ژن کوتیکول فاسیولا هپاتیکا با حساسیت ۹۰/۹٪ فاقد ارزش آنتی‌ژنیک در تست سرولوژیک CIEP بوده است. نتایج نشان می‌دهد که در آنتی‌ژن‌های سایر اندام‌های G<sub>200</sub> فاسیولا هپاتیکا که به وسیله ژل کروماتوگرافی جداسازی شده بودند، بهترین نتایج را جزء ۲(F.2) داشته است که حساسیت آن، ۹۲/۴٪ و اختصاصیت آن، ۸۶/۱٪ بوده است. البته در محاسبات آماری بعدی، ارزش اخباری منفی آن نسبتاً مناسب بوده و رقمی برابر ۸۶/۱٪ را نشان می‌دهد و ارزش اخباری مثبت این جزء، بالا و برابر ۹۲/۴٪ بود که برای تست‌های CIEP دارای ارزش می‌باشد.

جزء یک سایر اندام‌های کرم فاسیولا هپاتیکا نیز نتایج خوبی نداشته است و ارزش اخباری منفی آن، ۴۲/۸٪ بوده است. جزء سه سایر اندام‌های کرم فاسیولا هپاتیکا نیز دارای ارزش اخباری منفی ۵۰/۷٪ بوده است. جزء چهارم سایر اندام‌های کرم فاسیولا هپاتیکا نیز با ارزش اخباری منفی ۳۶/۶٪ و حساسیت ۴/۵٪، فاقد ارزش آنتی‌ژنیک برای تست‌های سرولوژیک مثل CIEP می‌باشد (جدول شماره ۱ و نمودار شماره ۳).



شکل شماره ۱- نمایش نتایج مثبت و منفی آزمایش کانترايمونوالكتروفورز

با توجه به محاسبات آماری، ارزش اخباری مثبت (F.1) با حساسیت ۵۴/۵٪ و اختصاصیت ۸۶/۱٪ و علی‌رغم داشتن ارزش اخباری مثبت بالا برابر ۸۷/۸٪، از ارزش اخباری منفی (Negative predictive value=NPV) پایین برابر ۵۰/۸٪ برخوردار بود. جزء دوم کوتیکول فاسیولا هپاتیکا نیز از ارزش اخباری مثبت ۹۶/۷٪ و ارزش اخباری منفی ۸۵٪

جدول شماره ۱- ارزیابی فاسیولا هپاتیکا با روش کانترايمونوالكتروفورز از نظر حساسیت و اختصاصیت


نتیجه آزمایش	سرم آلوده انسان								نتیجه آزمایش
	سرم کترل خرگوش		سرم اینمن خرگوش		سرم آلوده انسان		سرم کترل خرگوش		
-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
آنتی‌ژن کوتیکول فاسیولا فرآکشن(۱)	۱۶	۲۰	۱۶	۱۶	۱۴	۱۶	۲۱	۲۱	۲۶
آنتی‌ژن کوتیکول فاسیولا فرآکشن(۲)	۲	۲۲	۴	۴	۲	۲۸	۲۴	۶۰	۶۰
آنتی‌ژن کوتیکول فاسیولا فرآکشن(۳)	۸	۲۲	۱۰	۲۶	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲
آنتی‌ژن کوتیکول فاسیولا فرآکشن(۴)	۲۸	۲	۴	۳۲	۲۸	۲	۲۶	۶	۶
آنتی‌ژن ارگان فاسیولا فرآکشن(۱)	۱۳	۱۷	۹	۲۷	۱۳	۱۷	۲۰	۲۰	۲۶
آنتی‌ژن ارگان فاسیولا فرآکشن(۲)	۳	۲۷	۲	۳۴	۳	۲۷	۵	۳۱	۶
آنتی‌ژن ارگان فاسیولا فرآکشن(۳)	۱۲	۱۸	۱۶	۱۶	۱۲	۱۸	۲۳	۲۳	۲۴
آنتی‌ژن ارگان فاسیولا فرآکشن(۴)	۲۹	۱	۲	۲۴	۲۹	۱	۰	۳۶	۳

## ادامه جدول شماره ۱

نتیجه آزمایش	منفی کاذب	منفی واقعی	مثبت کاذب	حساسیت	اختصاصیت	Pvalue منفی	Pvalue مثبت
آنتیژن کوتیکول فاسیولولا فراکشن(۱)	۳۰	۲۱	۵	%۵۴/۵	%۸۶/۱	%۵۰/۸	%۸۷/۸
آنتیژن کوتیکول فاسیولولا فراکشن(۲)	۶	۲۴	۲	%۹۰/۹	%۹۴/۴	%۸۵	%۹۶/۷
آنتیژن کوتیکول فاسیولولا فراکشن(۳)	۲۴	۲۲	۴	%۴۸/۴	%۸۸/۸	%۴۸/۴	%۸۸/۸
آنتیژن کوتیکول فاسیولولا فراکشن(۴)	۶۰	۳۶	۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۳۷/۵	%۱۰۰
آنتیژن ارگان فاسیولولا فراکشن(۱)	۴۰	۳۰	۶	%۳۹/۳	%۸۳/۳	%۴۲/۸	%۸۱/۲
آنتیژن ارگان فاسیولولا فراکشن(۲)	۵	۲۱	۰	%۹۲/۴	%۸۶/۱	%۸۶/۱	%۹۲/۴
آنتیژن ارگان فاسیولولا فراکشن(۳)	۳۲	۲۲	۲	%۵۱/۵	%۹۱/۶	%۵۰/۷	%۹۱/۸
آنتیژن ارگان فاسیولولا فراکشن(۴)	۶۲	۳۶	۰	%۷۴/۵	%۱۰۰	%۳۶/۶	%۱۰۰


R: Real حقیقی P: Positive مثبت Sens: Sensitivity حساسیت  
F: False کاذب N: Negative منفی Spec: Specificity اختصاصیت

نتایج حاصل از انتقال آنتیژن های خالص شده فاسیولولاپاتیکا روی ژل پلی‌آکریل آمید الکتروفورز در حضور سدیم دودسیل سولفات در شکل شماره ۲ نشان داده شده است.




شکل شماره ۲- الکتروفورز اجزای مختلف آنتیژنیک فاسیولولاپاتیکا با روش SDS-PAGE

همانطوری که مشاهده می شود، جزء (۱) آنتیژن های حاصل از ژل کروماتوگرافی با سفادکس  $G_{200}$  با در نظر گرفتن منحنی استاندارد، در سه نقطه، به ترتیب در موقعیت ۶۷، ۴۳ و ۱۴ کیلو دالتون، باند رسوبی تشکیل دادند. ضمناً موقعیت این باندها در مورد کوتیکول و سایر اندازه های کرم فاسیولولاپاتیکا کاملاً شبیه به هم است. جزء (۲) آنتیژن های




نمودار شماره ۳- ارزیابی فاسیولولاپاتیکا با روش کانتر ایموونو الکتروفورز از نظر حساسیت و اختصاصیت

این آزمایش نشان می دهد که نتایج جزء ۲ کوتیکول و سایر ارگان های فاسیولولاپاتیکا، اختلاف معنی دار آماری نشان نمی دهد. به دنبال دستیابی به نتایج بسیار مطلوب، اجزاء آنتیژنیک خالص شده کوتیکول فاسیولولاپاتیکا در آزمایش CIEP و اختصاصیت و حساسیت بسیار بالای این آنتیژنها در تشخیص و اندازه گیری آنتی بادی در سرم خرگوش های مصنون شده و سرم بیماران مشکوک به ابتلاء به فاسیولیازیس، به همراه آنتیژن سایر ارگان های حاصله از ژل کروماتوگرافی ستونی ( $G_{200}$ )، جهت تعیین وزن مولکولی و تعیین خلوص، مورد آزمایش قرار گرفتند.



نمودار شماره ۴- آزمایش الایزا جهت دستیابی به نقطه مطلوب غلظت آنتی‌ژن

نتایج مقایسه روش الایزا با روش کانترایمونوکتروفورز، بیانگر حساسیت بالای این روش است که می‌تواند به عنوان یک تست کاملاً اختصاصی و حساس در تشخیص و اندازه‌گیری آنتی‌بادی موجود در سرم افراد آلووده و حیوان آزمایشگاهی باشد(نمودار شماره ۵).



نمودار شماره ۵- مقایسه روش الایزا با روش کانترایمونوکتروفورز

کوتیکول و سایر ارگان‌های فاسیولولا‌هپاتیکا در موقعیت ۶۰ کیلو دالتون یعنی بین دو وزن مولکولی نمونه استاندارد ۴۳ و ۶۷ کیلو دالتون، باند رسوبی تشکیل دادند و مشخصاً در تمام طول ژل تنها یک باند مشخص داشتند. جزء ۲ کوتیکول و سایر اندام‌های فاسیولولا‌هپاتیکا باندهای ضعیف در موقعیت ۴۰ و ۱۲ کیلو دالتون داشتند.

با استفاده از الکتروفورز و بکارگیری پلی‌آکریل آمید ژل الکتروفورز در حضور سدیم دودسیل سولفات، از خالص بودن آنتی‌ژن‌های جزء ۲ کوتیکول، اطمینان حاصل شد و با توجه به نتایج بسیار خوب آنها در روش CIEP، اقدام به پوشش دادن آنتی‌ژن فوق در سطح میکروپلیت‌های پلی‌استیرنی گردید. آنتی‌ژن فوق در مدت ۲۴ ساعت و به مقدار ۵۰ میکرولیتر با استفاده از بافر کربناته  $\text{pH} = ۹$  در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد، خشک شده و پوشش داده شد. پس از اطمینان از عملیات مربوط به پوشش دادن و گرفتن نتیجه مطلوب، جهت تعیین نقطه اپتیم برای رقت آنتی‌ژن و آنتی‌بادی به ترتیب ذیل عمل شد: آنتی‌ژن با رقت‌های ۱:۱۰۰، ۱:۲۰۰، ۱:۴۰۰ و ۱:۸۰۰ شد و سرم انسانی نیز با رقت‌های ۱:۶۴، ۱:۱۲۸، ۱:۲۵۶، ۱:۵۱۲، ۱:۱۰۲۴، ۱:۲۰۴۸ و ۱:۴۰۹۶ مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمایش فوق توسط دستگاه الایزا در ۴۹۲ نانومتر و بر مبنای رنگ ایجاد شده بدست آمد(نمودار شماره ۶).

این آزمایش حتی با رقت ۱:۸۰۰ آنتی‌ژن، در مقابل آخرین رقت آنتی‌بادی یعنی ۱:۴۰۹۶، جواب مثبت داشت و میزان (Optical density)OD برابر cut off دستگاه بوده و عدد بدست آمده از OD کمپکس‌های غیر اختصاصی، بسیار بالاتر بود. بنابراین آنتی‌ژن‌های حاصله به عنوان یک آنتی‌ژن حساس در روش الایزا می‌توانند کاربرد داشته باشند.

از تعداد ۳۰ نمونه سرم مربوط به انسان، تعداد ۲۶ مورد با روش الایزا و با آنتی‌ژن جزء ۲ کوتیکول فاسیولولا‌هپاتیکا و ۳۶ سرم مربوط به خرگوش‌های مصنوع شده با این آنتی‌ژن، جواب مثبت داشتند.

ELISA امکان دستیابی به آنتی بادی اختصاصی در کلیه خرگوش های مصون شده، بوده است، در حالی که نمونه سرم همین خرگوش ها قبل از تزریق نمونه آنتیژن با همین روشهای هیچ گونه واکنش مثبت نداشته اند. رایموند نیز میزان حساسیت این روشهای را با آنتیژن جزء ۲ حاصل از ژل کروماتوگرافی با سفادرکس G<sub>200</sub>, ۹۰٪ اعلام نموده است.<sup>(۱۸)</sup>

روش ELISA بکار گرفته شده در طی مراحل انجام کار و ماحصل آن، روشنی است که با coat نمودن آنتیژن در هر چاهک و استفاده از آنتی بادی اولیه ایجاد شده در خرگوش و مقادیر آنتیژنیک مشخص، به صورت غیر مستقیم انجام گرفته است و در مطالعات متعددی از این روش استفاده شده است که شمای کلی آن مشابه روش انجام عمل در این تحقیق می باشد.<sup>(۱۹)</sup>

یافته های حاصل از این پژوهش در کمک به بهبود وضعیت بهداشتی کشور در تشخیص بموقع فاسیولیازیس انسانی می تواند قابل استفاده باشد. علی رغم اینکه جمع آوری نمونه های آلوده از کشتارگاهها و تهیه سرم انسان های بیمار می تواند محدودیت هایی را در پژوهش ایجاد نماید.

#### نتیجه گیری

بنابراین استفاده از آنتیژن ۶۰ کیلو دالتونی کوتیکول کرم فاسیولا به عنوان آنتیژن خالص در تست های سرولوژیک CIEP والا یزا توصیه می شود و نتایج حاصله، بیانگر حساسیت بالای روش الا یزا نسبت به روش CIEP می باشد.

#### تقدیر و تشکر

این تحقیق با استفاده از حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران در قالب طرح تحقیقاتی (شماره ثبت: ۴۸۳) انجام گردیده است که بدین وسیله نویسندها مقاله مراتب تقدیر و تشکر خود را از مسؤولین آن مرکز ابراز می دارند.

#### بحث

نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که در روش ژل کروماتوگرافی، ۴ جزء آنتیژنیک برای کوتیکول و سایر اندام های کرم فاسیولا هپاتیکا جمع آوری شده است که جزء ۲ کوتیکول فاسیولا هپاتیکا، بهترین نتایج را از نظر اختصاصیت و حساسیت داشته است و این فراکشن نسبت به فراکشن ۳ نیز از نظر آماری اختلاف معنی داری در دادن جوابهای مثبت نداشته است.

هایلیر و یوسف نیز طی یک مطالعه، جزء ۲ و ۳ حاصل از ژل کروماتوگرافی را، در بررسی و اندازه گیری آنتی بادی با روشهای کانترا یامونو الکتروفورز و الایزا، به عنوان آنتیژن خالص معرفی نمودند.<sup>(۲۰)</sup>

در مطالعه ای توسط سندر، جزء ۲ به عنوان یک آنتیژن خالص معرفی شده است<sup>(۱)</sup>، که بررسی اخیر نیز این نتیجه را به همراه دارد. یافته دیگر این تحقیق بیانگر این مطلب است که جزء ۲ (فراکشن ۲) با وزن مولکولی حدود ۶۰ کیلو دالتون در الکتروفورز با ژل پلی آکریل آمید ۱۲٪ در حضور دودسیل سولفات، ضمن داشتن حساسیت بالا، بیش از ۹۴٪ اختصاصیت داشته که بررسی پتری سیا و دژور گولاس نیز آنتیژن هایی با وزن مولکولی بالای ۵۵ و کمتر از ۶۰ کیلو دالتون را که عموماً در فراکشن ۲ ژل کروماتوگرافی جمع آوری می شوند، به عنوان بهترین آنتیژن از نظر داشتن اختصاصیت و حساسیت بالا معرفی نمودند.<sup>(۱۵)</sup>

همچنین بعضی از محققین نیز در بررسی های انجام شده، روش الا یزا را دارای حساسیت ۱۰۰٪ و ویژگی ۹۳٪ ذکر نموده اند.<sup>(۱۶)</sup> تحقیقات ملونگ و همکاران نیز حساسیت، ویژگی و ارزش اخباری مثبت و منفی این تست را به ترتیب ۹۷٪/۴٪، ۹۸٪/۲٪ و ۹۷٪/۹٪ گزارش نمودند.<sup>(۱۷)</sup>

در این تحقیق، آزمایش آنتیژن ها با روش CIEP و ELISA کاملاً به هم نزدیک بوده و مشخص شد که پروتئین موجود در کوتیکول کرم، از پروتئین موجود در سایر اندام ها، بیشتر است و توانایی تحریک سیستم ایمنی توسط آنتیژن کوتیکول، از سایر اندام ها بیشتر است که با روش های سرولوژیک حساس و اختصاصی مثل CIEP و

## فهرست منابع

- 13- Hillyer GV, Soler M, Garcia Mi. Immunodiagnosis of human and animal Fascioliasis. J CAB international 1999; 7: 1201-10.
- 14- Gorgolas De, Torres M, Verdejo RA. Fasciola hepatica infestation biopathology and new diagnostic and therapeutic aspects. Enfem- Infec- Microbiol-clin 1996; 10(9):514-9.
- 15- Patricia B, Carlos F, Carmona C. Fasciola hepatica: Parasite secreted proteinases determination of the specific cleavage sites and identification of the immunoglobulin fragments produced .Experimental parasitology 2000; 94: 99-100.
- 16- Hagab Mm, Moustafa N. Role of ELISA in early detection of *Fasciola hepatica* copro-antigen in experimentally infected animals. J Egypt Soc Parasitol 2003; 28(2): 379-87.
- 17- Maleewong w, Nateeworanart S. Immunodiagnosis of human fascioliasis using an antigen of fascioliasis adult worm. J Trop med public healt 2003; 34(4): 713-17.
- 18-Raymond J, Landley F, Ana M. Detection of circulating parasite Antigen in Murine fascioliasis by two-site Enzyme- linked immuno sorbent assays. Am J Trop Med Hyg 1989; 41(4): 472-8.
- 19- Ibarra F, Jaime J, Fores J. Comparison of three ELISA Tests for seroepidemiology of bovine fascioliasis. Veterinary Parasitology 1998; 77: 229-36.
- 1- مسعود جعفر، وضعیت آلودگی های کرمی در ایران، سومین کنگره سراسری انگلشناسی پزشکی ایران، ۹-۱۱ اسفند ۱۳۷۹، دانشگاه مازندران، صفحه: ۱۴.
- 2- WHO.control of food borne trematode infection. WHO tec Repser 2002; Geneva 128: 54-60.
- 3- Pachauri Sp, Dalton J. Fascioliasis. 1st ed. J CAB international 2004; 4: 34-40.
- 4- Sandra MO, Neill A, Michael P. Immunodiagnosis of human Fascioliasis using recombinant *F.hepatica* cathepsin L1 Cysteine proteinase. Am J Trope Med Hyg Go 1999; 5: 749-51.
- 5- Rokni MB, Massoud J. Diagnosis of human Fascioliasis in the Gilan Province of Northern Iran: Application of cathepsin L\_Elisa. Acta Tropica 2002; 3: 46-50.
- 6- Shaker A, Demerdash Z. Evaluation of specific *Fasciola* antigen in the immunodiagnosis of human fascioliasis in Egypt. Journal of the Egypiton Society of Parasitology 1998; 24: 463-7.
- 7- Espino AM, Marcet R, Finaly CM. *Fasciola hepatica*: detection of antigen emia and coproantigens in experimentally infected rats. Exp-parasitology 1997; 85(2): 117-20.
- 8- Youssef FG, Mansour NS. A purified *Fasciola gigantica* worm antigen for the serodiagnosis of human Fascioliasis. Tran-Roy-Soc-Trop-Med-Hyg 1994; 90(4): 535-9.
- 9- Shehab Ay, Shabrawi El. Evaluation of *Fasciola E/S* product in diagnosis of acute human Fascioliasis by IgM ELISA. Am-J-Trop- Med parasitol 1995; 46(2): 115-8.
- 10- Hillyer GV, Cornovi M, Laurel A. Crossed immunoelectrophoresis and affinity chromatography for the purification of a parasite antigen. J Immunological method 1994; 30: 385-90.
- 11- Rickard LG. Iwata H, Inoue T. Development and application of a dot- ELISA test for the detection of serum antibodies to *Fasciola hepatica*, antigens in Hamster. Vet-parasitology 1995; 58(1-2): 9-15.
- 12- Donald M, Levine GV, Hillyer SL. Comparison of counter electrophoresis the ELISA and kato fecal examination for the diagnosis infected mice and rabbits. Am-J Trop Med Hyg 1994; 34(4): 602-8.

# *Preparation and Purification of Mature *Fasciola Hepatica* Worm's Antigens for the Diagnosis of Fascioliasis*

/      \*F. Maleki, PhD

//      S. Sadegh Hassani, MS

## *Abstract*

**Background & Aim:** Fascioliasis as a zoonosis is one of the important parasitic diseases which is caused when fasciola species enter the host's body. Approximately 2.4 million people throughout the world are infected with this parasite and 180 million people are vulnerable to it. On time diagnosis and rapid treatment of the disease can substantially prevent the harmful effects of the infection on patients. In the present study, we have tried to separate, purify and assess a useful antigen and apply it as a sensitive and specific serologic method.

**Material & Method:** In this experiment, first healthy worms were collected and then cuticles and the other organs of them were detached, homogenized and sonicated separately. Their levels of protein were measured by Bradford method. Then, all the samples were thickened and put on chromatography gel column(G200 sephadex). Four antigenic reactions for each part were observed. By using ultrafiltration method, the protein level of the samples was adjusted to a suitable level so that the obtained antigen could be used to immunize 36 rabbits. The antibodies taken from the rabbits as well as 30 samples of human sera with fascioliasis were tested with CIEP method. In the present study, fraction 2 antigen of fasciola hepatica's cuticles showed 90.9% sensitivity and 94.4% specificity in CIEP test. The above-mentioned antigen which was identified by SDS-PAGE method had one distinct band of 60 K<sub>D</sub>, and no other band was recognized along the gel. This antigen, then, went under experiment by ELISA method which revealed that the antibody in 26 out of 30 samples of human sera and all 36 rabbits was detectable and measurable.

**Results:** Altogether, 60 samples out of 66 including 30 human sera and 36 rabbit sera showed positive sedimentary reaction in CIEP method whereas 62 samples did so in ELISA method.

**Conclusion:** Therefore, it is suggested that 60 K<sub>D</sub> antigen of fasciola worm's cuticles be used as a pure antigen in serologic tests such as ELISA and CIEP. However, the results indicate high sensitivity of ELISA method to CIEP method.

**Key Words:** 1) Purification    2) Antigen    3) *Fasciola Hepatica*    4) Fascioliasis

I) Associate Professor of Parasitology. Faculty of Paramedical Sciences. Shahid Hemmat Highway. Shahid Chamran Crossroad. Iran University of Medical Sciences and Health Services. Tehran, Iran. (\*Corresponding Author)

II) MS in Parasitology. Instructor. Iran University of Medical Sciences and Health Services. Tehran, Iran.