

# ارتباط پلیمورفیسم $\beta_3$ -Adrenoreceptor ژن Trp64Arg، نمایه توده بدنی و غلظت سرمی لپتین در مطالعه قند و لیپید تهران

## چکیده

زمینه و هدف: موتاسیون و پلیمورفیسم‌های ژن  $\beta_3$ -Adrenoreceptor(ADRB3)، در ارتباط با چاقی مطرح می‌باشند. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط پلیمورفیسم Trp64Arg با نمایه توده بدنی و میزان لپتین در جمعیت قند و لیپید تهران بود.

روش بررسی: مطالعه از نوع Cross-sectional می‌باشد. افراد شرکت کننده در مطالعه قند و لیپید تهران در ۴ گروه براساس نمایه توده بدنی(BMI) (قرار گرفتند) ( $BMI \geq 20$ ,  $20 \leq BMI < 25$ ,  $25 \leq BMI < 30$ ,  $BMI \geq 30$ ) و از میان آنها در مجموع ۴۰۱ نفر با میانگین سنی  $44 \pm 14$  سال(۱۹۷ مرد  $46 \pm 14$  ساله و ۲۰۴ زن  $42 \pm 13$  ساله) به طور تصادفی انتخاب شدند. هر گروه به ترتیب شامل ۱۰۴، ۸۷ و ۱۰۲ نفر بود. میزان لپتین با استفاده از روش Enzyme immuno assay (EIA) و میزان قند خون ناشتا، (High density lipoprotein-HDL-C)، تری‌لیپید و کلسترول نیز به روش رنگ‌سننجی آنژیمی اندازه‌گیری شد. فاکتورهای موثر در چاقی شامل نمایه توده بدنی و فشارخون مشخص گردیدند. یک قطعه ۲۱۰ چفت‌بازی از ژن مورد نظر با استفاده از تکنیک PCR (Polymerase chain reaction) تکثیر و ژنوتیپ مورد نظر با استفاده از تکنیک RFLP (Restricted fragment length polymorphism) (با آنژیم MvaI) (با آنژیم PstI) تعیین گردید. از آزمون ANOVA دو دامنه به دنبال post-hoc با آزمون‌های چندگانه توکی برای مقایسه یافته‌های آزمایشگاهی چهار گروه BMI همچنین دو گروه (حامelin آرژنین) و (غير حاملین آرژنین) استفاده گردید. داده‌ها به وسیله نرم‌افزار SPSS(version 11.5) تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: فراوانی ال A در افراد مورد مطالعه،  $0.8 \pm 0$  بود و از تعادل هاردی و وینبرگ تبعیت می‌کرد. این ال با افزایش نمایه توده بدنی (TT:  $25 \pm 5$  کیلوگرم بر مترمربع در مقابل AA:  $27 \pm 6$  کیلوگرم بر مترمربع،  $P = 0.043$ ) و افزایش سطح لپتین (TT:  $22 \pm 21$  کیلوگرم بر مترمربع در مقابل AA:  $30 \pm 25$  کیلوگرم بر مترمربع،  $P = 0.009$ ) ارتباط معنی‌داری نشان داد.

نتیجه‌گیری: این یافته‌ها ارتباط پلیمورفیسم Arg  $\beta_3$ -Adrenoreceptor ژن Trp64Arg را با افزایش نمایه توده بدنی و سطح لپتین در افراد مورد مطالعه نشان داد.

کلیدواژه‌ها: ۱- چاقی ۲- نمایه توده بدنی ۳- لپتین ۴- پلیمورفیسم ۵-  $\beta_3$ -Adrenoreceptor

تاریخ دریافت: ۸۵/۷/۲۴، تاریخ پذیرش: ۸۵/۱۲/۵



- (I) کارشناس ارشد بیولوژی سلولی و مولکولی، مرکز تحقیقات چاقی، پژوهشکده غدد درون‌ریز و متابولیسم، بیمارستان طالقانی، اوین، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران.
- (II) استادیار و PhD بیوشیمی، مرکز تحقیقات چاقی، پژوهشکده غدد درون‌ریز و متابولیسم، بیمارستان طالقانی، اوین، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران.
- (III) استادیار و PhD تغذیه، مرکز تحقیقات چاقی، پژوهشکده غدد درون‌ریز و متابولیسم، بیمارستان طالقانی، اوین، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران.
- (IV) استاد و فوق‌تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم، مرکز تحقیقات چاقی، پژوهشکده غدد درون‌ریز و متابولیسم، بیمارستان طالقانی، اوین، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران(\*مؤلف مسئول).

## مقدمه

در ساختمان گیرنده ADRB3 می‌گردد.<sup>(۱۴)</sup> گزارشات

متفاوتی مبنی بر وجود ارتباط بین پلیمورفیسم Trp64Arg و افزایش میزان اضافه وزن وجود دارد.<sup>(۱۳)</sup><sup>(۱۴)</sup> از طرف دیگر، لپتین یک هورمون مترشحه داخلی با نقشهای متابولیک متفاوت است که ساختمان آن در بین گونه‌های مختلف به شدت حفظ شده است.<sup>(۱۵)</sup> آزاد شدن لپتین از سلولهای چربی، به میزان توده این بافت و پیامهای ارسالی از مغز بستگی دارد.<sup>(۱۶)</sup><sup>(۱۵)</sup>

با توجه به نقش لپتین در چاقی، وابستگی میزان آن با نمایه توده بدنی و دخالت پلیمورفیسم ژن ADRB3، در این مطالعه، ارتباط بین پلیمورفیسم ژن ADRB3، نمایه توده بدنی و سطح لپتین در جمعیت قند و لیپید تهران مورد بررسی قرار گرفت.

## روش بررسی

جامعه مورد بررسی از میان شرکت کنندگان طرح مطالعه قند و لیپید تهران انتخاب شد. مطالعه قند و لیپید تهران بررسی آینده‌نگری است که جهت بررسی عوامل خطرساز بیماری‌های غیرواگیر در ۱۵۰۰۵ نفر از جمعیت تهران انجام شد.<sup>(۱۷-۱۹)</sup>

ابتدا کل افراد شرکت کننده در مطالعه قند و لیپید تهران براساس نمایه توده بدنی (حاصل تقسیم وزن بر حسب کیلوگرم بر مذکور قد بر حسب متر) به ۴ گروه تقسیم شدند. در تقسیم‌بندی مذکور، افراد با BMI کمتر از ۲۰ کیلوگرم بر مترمربع به عنوان افراد کم وزن، بین ۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم بر مترمربع به عنوان افراد با وزن طبیعی، بین ۲۵ تا ۳۰ کیلوگرم بر مترمربع به عنوان شاخص افراد دارای اضافه وزن و بیشتر از ۳۰ کیلوگرم بر مترمربع به عنوان افراد چاق در نظر گرفته شدند. در جمعیت مذکور، سن بالای ۱۸ سال، تریگلیسرید کمتر از ۴۰۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر، عدم مصرف دارو و فقدان بیماری قلبی - عروقی و فشار خون، معیارهای ورود به مطالعه بودند. براساس معیارهای مذکور، به طور تصادفی تعداد ۴۰۱ نفر با میانگین سنی  $44 \pm 14$  سال شامل ۱۹۷ مرد (۴۶ $\pm$ ۱۴ ساله) و ۲۰۴ زن (۴۲ $\pm$ ۱۳ ساله)

در جوامع مدرن، چاقی یکی از مشکلات مهم سلامتی افراد<sup>(۱)</sup> و یکی از عمدترين مشکلات رایج در اغلب کشورها می‌باشد. متأسفانه مشکل مذکور، علی‌الخصوص در مناطقی که اخیراً تغییرات روش زندگی به شیوه جوامع صنعتی ایجاد شده است، به سمت همه‌گیری پیش می‌رود.<sup>(۲)</sup> چاقی در انسان تحت تاثیر مجموعه پیچیده‌ای از فاکتورهای متفاوت با قابلیت انتقال ارشی می‌باشد.<sup>(۳)</sup> فاکتورهای محیطی و ژنتیکی، هر دو بر این مشکل تاثیر گذار بوده و سلامتی انسان را تحت تاثیر قرار می‌دهند.<sup>(۴)</sup> چاقی به عنوان تجمع بافت چربی منتج از عدم تعادل دریافت انرژی و مصرف آن تعریف می‌شود.<sup>(۵)</sup> پلیمورفیسم‌های ژنتیکی متفاوتی در ارتباط با فنوتیپ‌های چاقی وجود دارند.<sup>(۶)</sup> در مورد نقش کلیدی ژن‌ها و اثر متقابل پلیمورفیسم‌ها در پیشرفت چاقی در انسان، اطلاعات کمی در اختیار می‌باشد.<sup>(۷)</sup>

گیرنده‌های آدرنرژیک، پروتئین‌های سطح سلولی هستند که با تمایل زیادی، با آدرنالین و نورآدرنالین پیوند برقرار می‌کنند و منجر به تغییرات داخل سلولی می‌شوند. گیرنده‌های آدرنرژیک، براساس فعالیت‌های سلولی، به دو گروه آلفا و بتا تقسیم می‌شوند.<sup>(۸)</sup> شواهدی مبنی بر لیپولیز و افزایش مصرف انرژی توسط  $\beta$ -Adrenoreceptor مورد توجه محققان زیادی قرار گرفته است. ژن ADRB3 در انسان غالباً در بافت چربی بیان می‌شود.<sup>(۹)</sup> این پروتئین شامل ۷ ناحیه عرض غشایی است و به G پروتئین‌ها متصل می‌شود.<sup>(۱۰)</sup> ترکیبات مشابه بتا - آدرنرژیک از طریق فعال کردن آنزیم آدنیلات سیکلاز و افزایش سطح داخل سلولی cAMP، سبب لیپولیز و گرمایش می‌شوند. بنابراین، ADRB3 نقش تنظیمی در متابولیسم لیپید و گرمایش دارد.<sup>(۱۱)</sup> ژن ADRB3 بر روی کروموزوم ۸ انسانی در موقعیت ۱۲-p11.2 قرار دارد.<sup>(۱۲)</sup> در پلیمورفیسم Trp64Arg، باز تیمیدین(T) با سیتوزین(C) در نوکلئوتید شماره ۱۹۰ جایگزین می‌شود.<sup>(۱۳)</sup> این جابجاگایی منجر به جانشین شدن آرژنین(A) به جای تریپتوفان(T) در کدون ۶۴

(۱) مرحله واسرشت(Denaturation) ابتدایی: ۵ دقیقه در دمای ۹۴ درجه سانتی گراد(یک سیکل)

(۲) مرحله Denaturation: ۳۰ ثانیه در دمای ۹۴ درجه سانتی گراد

(۳) مرحله اتصال(Arnealing): ۴۵ ثانیه در دمای ۶۴ درجه سانتی گراد

(۴) مرحله طویل سازی(Extention): ۴۵ ثانیه در دمای ۷۲ درجه سانتی گراد(مراحل ۲ تا ۴، ۲۰ سیکل تکرار شد)

(۵) مرحله Extention نهایی: ۵ دقیقه در دمای ۷۲ درجه سانتی گراد(یک سیکل).

کنترل صحت تکثیر PCR با استفاده از کنترل های مثبت و منفی بررسی گردید. صحت تکثیر قطعه مورد نظر بر روی ژل آگاراز ۲٪ بررسی گردید و نمونه های تکثیر شده جهت بریده شدن با آنزیم محدود الاثر آماده گردیدن.<sup>(۲۰)</sup> صحت تکثیر قطعه مورد نظر بر روی ژل آگاراز ۲٪ بررسی گردید. میزان ۱۰ میکرو لیتر از محصولات PCR تحت اثر هضم آنزیم MvaI (شرکت Roche, آلمان) RFLP (انکوبه شدن، نتیجه الکتروفورز محصولات)، (ژل آگاراز Restricted fragment length polymorphism)، (٪ رنگ آمیزی با اتیدیوم برماید)، توسط دستگاه Transluminator مشاهده گردید.<sup>(۲۰)</sup>

داده ها به وسیله نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. متغیرهای کمی با میانگین ± انحراف معیار و متغیرهای کیفی به صورت درصد بیان شدند. از آزمون ANOVA دو دامنه به دنبال post-hoc با آزمون های چندگانه توکی برای مقایسه یافته های آزمایشگاهی چهار گروه BMI، همچنین دو گروه حاملین آرژنین و (TT) غیر حاملین آرژنین استفاده گردید. سطح معنی دار آماری، ۰/۰۵ در نظر گرفته شد.

#### یافته ها

در ۴۰۱ نفر(۱۹۷ نفر مرد و ۲۰۴ نفر زن) از افراد مورد مطالعه از مطالعه قند و لیپید تهران، متوسط متغیرهای بالینی و تن سنجی شامل سن، فشار خون، نمایه توده بدنی، دور کمر، دور باسن، نسبت دور کمر به دور باسن و همچنین

انتخاب شدند. تعداد افراد انتخاب شده در هر گروه به ترتیب ۹۷، ۹۸، ۹۸، ۹۷ و ۱۰۲ نفر بود. اطلاعات مربوط به سن، جنس، مصرف سیگار، سطح فعالیت بدنی، بیماری قلبی - عروقی و وضعیت افراد مونث از نظر بارداری و یا یائسگی به صورت پرسشنامه ای، ثبت شد. داده های مربوط به قد، وزن و فشار خون اندازه گیری گردیدند. از کلیه افراد مراجعه کننده به واحد تحقیقات قند و لیپید واقع در شرق تهران، دو نمونه خون محیطی، یکی لخته و دیگری حاوی ضدانعقاد EDTA (Ethylene diaminetetra-acetic acid) گرفته شد.

به همکاری شرکت پارس آزمون (تهران، ایران)، میزان کلسترول تام، تری گلیسرید سرم و قند خون ناشتا به روش رنگ سنجی آنژیمی و میزان HDL-C به روش رسوی فسفوتتگستات سدیم اندازه گیری شد. علظت سرمی لپتین تمام نمونه ها نیز با استفاده از کیت الایزای (diagnostics biochemical Canada Inc.) اندازه گیری شد.

استخراج DNA مطابق گزارش قبلی انجام گرفت.<sup>(۲۰)</sup> نمونه های DNA حاصل در ۲۰- درجه سانتی گراد نگهداری شدند. پس از بررسی کمی و کیفی DNA استخراجی با اسپکترو فوتومتر و الکترو فورز، تکثیر قطعه ۲۱۰ جفت بازی از ژن ADRB3 با استفاده از تکنیک PCR انجام گردید. هر مخلوط PCR به حجم ۲۵ میکرو لیتر، شامل (dNTPs، Nucleotid Tri Phosphate) Taq DNA Polymerase .MgCl<sub>2</sub>(1.5mM) mix(0.2mM) و (IU) 10X PCR buffer و جفت پرایمرهای رفت و برگشت 5'CGCCCAATACCGCCAACAC-3'

و 5'-CCACCAAG GAGTCCCATTCAACC-3'  
تهیه شده از شرکت آرمنین شگرف (بود. به هر لوله میزان ۵۰ نانو گرم از DNA استخراج شده اضافه گردید و پس از افزودن روغن معدنی استریل به نمونه ها، این لوله ها سانتریفیوژ شدند و سپس به دستگاه ترموسایکلر (ساخت کارخانه Hybaid انگلستان) منتقل گردیدند. شرایط ترموسایکلر پس از بهینه سازی شامل موارد ذیل بود:

۲۱ نفر(۴/۳۴٪) نیز با افزایش BMI، افزایش نشان داد. متغیرهای بالینی و بیوشیمیایی از جمله فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، قندخون ناشتا و تری‌گلیسرید نیز با افزایش نمایه توده بدنی، افزایش نشان دادند. در جدول شماره ۲، متغیرهای تنفسنگی، بالینی و بیوشیمیایی در دو گروه حاملین آرژنین و غیرحامelin آرژنین ارایه شد. در کل ۳۴۰ نفر ژنوتیپ TT و ۶۱ نفر ژنوتیپ AA/TA داشتند. فراوانی آلل آرژنین، ۰/۰۸ و فراوانی آلل Trp، ۰/۹۲ در جمعیت مورد مطالعه بدست آمد. فراوانی‌های حاصله، از تعادل هاردی - وینبرگ تبعیت می‌نمودند. در گروه حاملین آرژنین، متوسط نمایه توده بدنی، ۲۷ کیلوگرم بر مترمربع( $p=0.43$ ) و متوسط غلظت لپتین، ۳۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر( $p=0.009$ ) بود که بیشتر از متوسط این متغیرها در گروه غیرحامelin آرژنین بود. همچنین دور کمر، نسبت دور کمر به دور باسن، قند خون ناشتا، کلسترول تام و تری‌گلیسرید ( $P<0.05$ ) در این دو گروه اختلاف معنی‌دار نشان دادند.

متوسط میزان سرمی قند خون ناشتا، کلسترول تام، تری‌گلیسرید و HDL-C اندازه‌گیری شد. در جدول شماره ۱، متغیرهای بالینی و بیوشیمیایی افراد مورد مطالعه در چهار گروه آمده است. افراد مورد مطالعه در این چهار گروه، از نظر سن تفاوت معنی‌داری نشان ندادند. در این ۴ گروه، کلسترول تام( $BMI<20$ ): $197\pm 39$  میلی‌گرم در دسی‌لیتر،  $BMI\geq 20$ : $166\pm 39$  میلی‌گرم در دسی‌لیتر،  $P<0.05$ ، تری‌گلیسرید( $BMI<20$ ): $167\pm 71$  میلی‌گرم در دسی‌لیتر در مقابل  $BMI\geq 20$ : $97\pm 55$  میلی‌گرم در دسی‌لیتر،  $P<0.05$  و همچنین لپتین( $BMI<20$ ): $14\pm 20$  میلی‌گرم در دسی‌لیتر در مقابل  $BMI\geq 20$ : $9\pm 10$  میلی‌گرم در دسی‌لیتر( $P<0.05$ ) با افزایش نمایه توده بدنی، افزایش چشمگیری نشان دادند. فشار خون سیستولیک( $BMI<20$ ): $10.7\pm 1.5$  میلی‌متر جیوه در مقابل  $BMI\geq 20$ : $11.7\pm 1.3$  میلی‌متر جیوه،  $P<0.05$  و دیاستولیک( $BMI\geq 20$ ): $76\pm 8$  میلی‌متر جیوه در مقابل  $BMI\geq 20$ : $69\pm 8$  میلی‌متر جیوه در مقابله( $P<0.05$ ) نیز تفاوت معنی‌داری نشان داد. تعادل حاملین آرژنین [ $BMI<20$ : ۸ نفر (۱۳/۱٪) در مقابل  $BMI\geq 20$ : ۱۳ نفر (۱۳/۱٪)]

جدول شماره ۱- متغیرهای بالینی، بیوشیمیایی و فراوانی پلیمورفیسم ژن  $\beta$ -Adrenoreceptor براساس گروه‌های BMI

	(n=۱۰۲) $20\leq BMI$	(n=۱۰۴) $20\leq BMI<20$	(n=۹۸) $20\leq BMI<25$	(n=۹۷) $BMI\geq 25$	متغیر
سن(سال)	$44\pm 12$	$44\pm 12$	$44\pm 13$	$42\pm 18$	
فشارخون سیستولیک(میلی‌متر جیوه)	$117\pm 13$	$116\pm 12$	$109\pm 12^+$	$107\pm 15^*$	
فشارخون دیاستولیک(میلی‌متر جیوه)	$76\pm 7$	$75\pm 7$	$71\pm 8^+$	$69\pm 8^*$	
قدنناشتا(میلی‌گرم در دسی‌لیتر)	$96\pm 28$	$91\pm 26$	$89\pm 18$	$86\pm 13^*$	
کلسترول تام(میلی‌گرم در دسی‌لیتر)	$197\pm 40$	$20.5\pm 38$	$18.2\pm 27^+$	$16.6\pm 29^{\ddagger}$	
تری‌گلیسرید(میلی‌گرم در دسی‌لیتر)	$167\pm 71$	$16.2\pm 7.4$	$12.9\pm 6.4^+$	$9.7\pm 5.5^{\ddagger}$	
HDL-C(میلی‌گرم در دسی‌لیتر)	$39\pm 11$	$39\pm 11$	$39\pm 10$	$4.3\pm 1.0^{\ddagger}$	
لپتین(میلی‌گرم در دسی‌لیتر)	$41\pm 20$	$26\pm 19$	$18\pm 20^+$	$9\pm 10^{\ddagger}$	
$\beta$ -Adrenoreceptor ژنوتیپ	$21(34/4)$	$15(24/6)$	$17(27/9)$	$8(13/1)$	$\P(%)AA/TA$
	$81(22/8)$	$89(26/2)$	$81(23/8)$	$89(26/2)$	$\P(%)TT$

یافته‌ها در چهار گروه BMI به وسیله آزمون ANOVA مقایسه شدند و تفاوت معنی‌داری داشتند( $P<0.05$ ) و سپس با آزمون توکی دو به دو مقایسه گردیدند.

\*( $p<0.05$ ) مقایسه با گروه‌های  $20\leq BMI<20$ ،  $20\leq BMI<25$ ،  $25\leq BMI<20$ ،  $25\leq BMI<25$  مقایسه با گروه‌های  $20\leq BMI<20$ ،  $20\leq BMI<25$ ،  $25\leq BMI<20$ ،  $25\leq BMI<25$  ( $p<0.05$ ) مقایسه با گروه‌های  $20\leq BMI<20$ ،  $20\leq BMI<25$ ،  $25\leq BMI<20$ ،  $25\leq BMI<25$  ( $p<0.05$ ) مقایسه با گروه‌های  $20\leq BMI<20$ ،  $20\leq BMI<25$ ،  $25\leq BMI<20$ ،  $25\leq BMI<25$  ( $p<0.05$ ) اعداد، نشانگر تعداد و اعداد داخل پرانتز، نشانگر درصد می‌باشدند.

جدول شماره ۵- متغیرهای بالینی، تن سنجی و بیوشیمیایی در دو گروه حاملین آرژنین و غیرحامelin آرژنین در افراد مورد مطالعه

P value	غیرحامelin آرژنین (n=۳۴۰)	حامelin آرژنین (n=۶۱)	متغیر(تعادل)
۰/۲۷۷	۴۳±۱۴	۴۵±۱۲	سن(سال)
۰/۲۲۲	۱۱۲±۱۴	۱۱۴±۱۳	فشارخون سیستولیک(میلیمتر جیوه)
۰/۹۳۲	۷۳±۸	۷۳±۸	فشارخون دیاستولیک(میلیمتر جیوه)
۰/۰۲۱	۸۷±۱۳	۹۱±۱۲	دور کمر(سانتی متر)
۰/۲۱۶	۹۹±۱۰	۱۰۰±۱۱	دور باسن(سانتی متر)
۰/۰۲۱	۰/۸±۰/۱	۰/۹۰±۰/۱	نسبت دور کمر به دور باسن
۰/۰۴۲	۲۵±۵	۲۷±۶	نمایه توده بدنی(کیلوگرم بر مترمربع)
۰/۰۰۲	۹۰±۱۸	۱۰۰±۳۹	قندناشتا(میلی گرم در دسی لیتر)
۰/۰۱۶	۱۸۶±۴۰	۲۰۰±۴۴	کلسترول تام(میلی گرم در دسی لیتر)
۰/۰۲۱	۱۳۷±۷۰	۱۶۰±۸۲	تری گلیسرید(میلی گرم در دسی لیتر)
۰/۶۹۶	۴۰±۱۰	۴۰±۱۱	HCL-C(میلی گرم در دسی لیتر)
۰/۰۰۹	۲۳±۲۱	۳۰±۲۵	لپتین(میلی گرم در دسی لیتر)

## بحث

هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط پلیمورفیسم Trp64Arg با نمایه توده بدنی و میزان لپتین در جمعیت قند و لیپید تهران بود. یافته‌ها، ارتباط پلیمورفیسم مذکور را با افزایش نمایه توده بدنی و سطح لپتین در افراد مورد مطالعه نشان دادند.

گیرنده‌های  $\beta$ -Adrenergic در اثر زیادی بر روی تجمع چربی در دانش آموزان دیبرستانی ژاپنی تدارد.<sup>(۲۶)</sup> این عدم هماهنگی نتایج، می‌تواند به واسطه تغییرات نمونه‌گیری تصادفی، حجم نمونه کم، سن و یا درجه چاقی افراد باشد. طی گزارش قبلی، این پلیمورفیسم با افزایش نمایه توده بدنی در جمعیت قند و لیپید تهران ارتباط نشان داده است.<sup>(۲۰)</sup> در ارتباط مذکور، تاثیر وجود عدم وجود آرژنین در ۴ گروه نمایه توده بدنی ( $BMI < ۲۰$ ,  $BMI > ۲۵$ ,  $۲۰ \leq BMI < ۲۵$  و  $BMI > ۳۰$ ) و غلظت سرمی لپتین، مورد بررسی و آنالیز قرار گرفت. فراوانی آللی این پلیمورفیسم(Arg64) در جمعیت قند و لیپید تهران،  $0/۰۸$  تعیین شد. این فراوانی، کمتر از فراوانی‌های مشاهده شده در جمعیت‌های Pima India (۰/۰۳۱)، امریکایی‌های مکزیکی (۰/۱۳) و سیاه‌پوستان امریکایی (۰/۱۲) و مشابه سفیدپوستان<sup>(۲۷)</sup> مطالعه Yoshida و همکاران نیز افزایش وزن مرتبط است.<sup>(۱۴)</sup>

موید کاهش وزن کمتر حاملین چاق آلل Arg بعد از رژیم پرانرژی با ورزش، در مقایسه با حاملین Trp بود.<sup>(۲۶)</sup> طبق گزارش Ramis و همکاران، احتمالاً پلیمورفیسم Trp64Arg ژن ADRB3، در مکانیسم رهاسازی لپتین از بافت چربی درگیر است<sup>(۲۷)</sup>: از طرف دیگر، گزارشاتی مبنی بر عدم وجود این ارتباط وجود دارد، به عنوان مثال Kurokawa و همکاران نشان دادند پلیمورفیسم مذکور اثر زیادی بر روی تجمع چربی در دانش آموزان دیبرستانی ژاپنی ندارد.<sup>(۲۸)</sup> این عدم هماهنگی نتایج، می‌تواند به واسطه تغییرات نمونه‌گیری تصادفی، حجم نمونه کم، سن و یا درجه چاقی افراد باشد. طی گزارش قبلی، این پلیمورفیسم با افزایش نمایه توده بدنی در جمعیت قند و لیپید تهران ارتباط نشان داده است.<sup>(۲۰)</sup> در ارتباط مذکور، تاثیر وجود عدم وجود آرژنین در ۴ گروه نمایه توده بدنی ( $BMI < ۲۰$ ,  $BMI > ۲۵$ ,  $۲۰ \leq BMI < ۲۵$  و  $BMI > ۳۰$ ) و غلظت سرمی لپتین، مورد بررسی و آنالیز قرار گرفت. فراوانی آللی این پلیمورفیسم(Arg64) در جمعیت قند و لیپید تهران،  $0/۰۸$  تعیین شد. این فراوانی، کمتر از فراوانی‌های مشاهده شده در جمعیت‌های Pima India (۰/۰۳۱)، امریکایی‌های مکزیکی (۰/۱۳) و سیاه‌پوستان امریکایی (۰/۱۲) و مشابه سفیدپوستان<sup>(۲۷)</sup> مطالعه Yoshida و همکاران نیز افزایش وزن مرتبط است.<sup>(۱۴)</sup>

## فهرست منابع

- 1- Zipursky A. The genetics of childhood disease and development: A series of review articles. *Pediatr Res* 2003; 53(5): 721-5.
- 2- Arner P. Obesity-a genetic disease of adipose tissue? *Br J of Nut* 2000; 83(Suppl 1): S9-S16.
- 3- Andrea MS, Ken RW, Boyko EJ, Whitecross KF, Geoff N, Kotowica M, et al. Genetic variation and obesity in Australian women: A prospective study. *Obes Res* 2001; 9: 733-40.
- 4- Koichi M, Shinya S, Haruhito K, Izumi T, Mitsuru M, Kyoaki W, et al. Increased risk of obesity resulting from the interaction between high energy intake and the Trp64Arg polymorphism of the  $\beta_3$ -adrenergic receptor gene in healthy Japanese men. *J Epidemiol* 2005; 15(6): 203-9.
- 5- Kopelman PG. Obesity az a medical problem. *Nature* 2000; 404: 635-43.
- 6- Naoyuki K, Kunihiko N, Satomi K, Zhong-Min L, Hiroshi S. Relationship between the  $\beta_3$ -Adrenoreceptor gene variant and body fat in Japanese children. *Tohoku J Exp Med* 2003; 201: 271-6.
- 7- Snyder EE, Walts B, Perusse L, Chagnon YC, Weisnagel SI, Rankinen T, et al. The human obesity gene map: the 2003 update. *Obes Res* 2004; 12: 369-439.
- 8- Ellsworth DL, Coady SA, Chen W, Srinivasan SR, Boerwinkle E, Berenson GS. Interactive effects between polymorphisms in the  $\beta$ -adrenergic receptors and longitudinal changes in obesity. *Obes Res* 2005; 13(3): 519-26.
- 9- Mesh Browser[database on the internet]. Bethesda(MD): National Library of Medicine(US); Adrenoceptors. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/Mbrowser.html>. Accessed Jan 12, 2005.
- 10- Dionne IJ, Turner AN, Tchernof A, Pollin TI, Avirthi D, Gray D, et al. Identification of an interactive effect of  $\beta_3$ - and  $\alpha_{2b}$ -adrenoreceptor gene polymorphisms on fat mass in Caucasian women. *Diabetes* 2001; 50: 91-5.
- 11- Hao K, Peng S, Xing H, Yu Y, Hang A, Hong X, et al.  $\beta_3$  adrenergic receptor polymorphism and obesity-related phenotypes in hypertensive patients. *Obes Res* 2004; 12(1): 125-9.
- 12- Emorine LJ, Marullo S, Briand-Sutren MM, Patey G, Tate K, Delavier-Klutchko C, et al. Molecular characterization of the human beta 3-adrenergic receptor. *Science* 1989; 245: 1118-21.

امريکايي(۰/۰۸) بود.<sup>(۴)</sup> فراوانى آللی اين پلیمورفیسم، از تعادل هاردى - وینبرگ تبعیت نمود. نتایج، حاکی از وجود ارتباط معنی داری میان افزایش نمایه توده بدنی و سطح لپتین با حضور آرژنین بود، به عبارتی با افزایش نمایه توده بدنی و غلظت سرمی لپتین، تعداد افراد حامل آرژنین افزایش می یافتد(جدول شماره ۱). متوسط نمایه توده بدنی حاملین آرژنین(۲۷±۶)، از متوسط نمایه توده بدنی غيرحامelin آرژنین(۲۵±۵) بيشتر بود. همچنین متوسط غلظت لپتین حاملین آرژنین(۳۰±۲۵)، از متوسط میزان لپتین غيرحامelin آرژنین(۲۲±۲۱) به طور چشمگیری بيشتر بودست آمد(جدول شماره ۲). وجود اين آلل با افزایش فاكتورهاي ديگر شامل فشار خون سیستولیك، قندناشتا، تری گلیسیرید و کلسیرون تام ارتباط داشت، اما با توجه به اينكه چاقی، يك مجموعه پیچیده از فاكتورهاي متفاوت با قابلیت انتقال ارشی می باشد و ژنهای متعددی در آن دخیل هستند، صرفاً بررسی پلیمورفیسم يك ژن و ارتباط آن با چاقی کافی به نظر نمی رسد؛ لذا بررسی سایر ژنهای دخیل در چاقی در تحقیقات بعدی ضروری به نظر می رسد.

## نتیجه گیری

یافته های این مطالعه ارتباط معنی داری میان پلیمورفیسم و افزایش غلظت سرمی لپتین حاملین آرژنین در افراد مورد مطالعه نشان داد. لذا با توجه به دخیل بودن عوامل ژنتیکی متعدد در چاقی، نیاز به بررسی سایر ژنهای موثر در چاقی در کنار این پلیمورفیسم در افراد ایرانی احساس می شود.

## تقدیر و تشکر

این تحقیق با استفاده از حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید بهشتی در قالب طرح تحقیقاتی(شماره ثبت: ۱۶۴) انجام گردیده است که بدین وسیله نویسندها مقاله مراتب تقدیر و تشکر خود را از مسؤولین آن مرکز ابراز می دارند.

- 13- Walston J, Silver K, Bogardus C, Knowler WC, Celi FS, Austin S, et al. Time of onset of non-insulin-dependent diabetes mellitus and genetic variation in the beta 3-adrenergic-receptor gene. *N Engl J Med* 1995; 333: 343-7.
- 14- Clement K, Vaisse C, Manning BS, Basdevant A, Guy-Grand B, Ruiz J, et al. Genetic variation in the beta 3-adrenergic receptor and an increased capacity to gain weight in patients with morbid obesity. *N Engl J Med* 1995; 333: 352-4.
- 15- Loss RJF, Rankinen T, Chagnon Y, Tremblay A, Perreault L, Bouchard C. Polymorphisms in the leptin and leptin receptor genes in relation to resting metabolic rate and respiratory quotient in the Quebec Family Study. *Int J Obes* 2006; 30: 183-90.
- 16- Auwerx J, Staels B. Leptin. *The Lancet* 1998; 351: 737-42.
- 17- Azizi F, Rahmani M, Majid M. Tehran Lipid and Glucose Study(TLGS): Rationale and Design. *CVD Prevention* 2000; 3: 50-3.
- 18- Azizi F, Rahmani M, Ghanbarian A, Emami H, Salehi P, Mirmiran P, et al. A serum lipid level in an Iranian adult's population: Tehran Lipid and Glucose Study. *Eur J Epidemiol* 2003; 18(4): 311-19.
- 19- Azizi F, Salehi P, Etemadi A, Zahedi-Asl S. Prevalence of metabolic syndrome in an urban population: Tehran Lipid and Glucose Study. *Diabetes Res Clin Pract* 2003; 61(1): 29-37.
- 20- Eshraghi P, Hedayati M, Daneshpour MS, Mirmiran P, Azizi F. Association between  $\beta_3$ -Adrenoreceptor gene polymorphism and obesity: Tehran lipid and glucose study. *Iranian J Endo Metab* 2005; 7(S): 393-8.
- 21- Arner P, Hoffstedt J. Adrenoreceptor genes in human obesity. *J Int Med* 1999; 245: 667-72.
- 22- Ellsworth DL, Coady SA, Chen W, Srinivasan SR, Boerwinkle E, Berenson GS. Interactive effects between polymorphisms in the  $\beta$ -Adrenergic receptors and longitudinal changes in obesity. *Obes Res* 2005; 13(3): 519-26.
- 23- Hoffstedt J, Poirier O, Thorne A, Lonnqvist F, Herrmann SM, Cambien F, et al. Polymorphism of the human  $\beta_3$ -adrenoreceptor gene forms a well-conserved haplotype that is associated with moderate obesity and altered receptor function. *Diabetes* 1999; 48: 203-5.
- 24- Sipilainen R, Uusitupa M, Heikkinen S, Rissanen A, Laakso M. Polymorphism of the  $\beta_3$ -adrenergic receptor gene affects basal metabolic rate in obese Finns. *Diabetes* 1997; 46: 77-80.
- 25- Fujisawa T, Ikegami H, Kawaguchi Y, Ogihara T. Meta-analysis of the association of Trp64Arg polymorphism of beta 3-adrenergic receptor gene with body mass index. *J Clin Endocrinol Metab* 1998; 83: 2441-4.
- 26- Yoshida T, Sakane N, Unekawa T, Sakia M, Takahashi T, Kondo M, et al. Mutation of beta 3-adrenergic receptor gene and response to treatment of obesity. *Lancet* 1995; 346: 1433-44.
- 27- Ramis JM, Gonzalez-Sanchez JL, Proenza AM, Martinez-Llaea MT, Fernandez-Perez C, Palou A, et al. The Arg64 allele of the  $\beta_3$ -adrenoreceptor gene but not the -3826G allele of the uncoupling protein 1 gene is associated with increased leptin levels in the Spanish population. *Metabolism* 2004; 53(11): 1411-16.
- 28- Kurokawa N, Nakai K, Kameo S, Liu ZM, Satoh H. Relationship between the  $\beta_3$ -adrenoreceptor gene variant and body fat in Japanese children. *Tohoku J Exp Med* 2003; 201: 271-6.

# *Association of Trp64Arg Polymorphism of the $\beta_3$ -Adrenoreceptor Gene, Body Mass Index and Serum Leptin Level in Tehran Lipid and Glucose Study*

P. Eshraghi, MSc<sup>I</sup>      M. Hedayati, PhD<sup>II</sup>      M. Daneshpour, MSc<sup>I</sup>  
 P. Mirmiran, PhD<sup>III</sup>      \*F. Azizi, MD<sup>IV</sup>

## *Abstract*

**Background & Aim:** There are many articles on the association between  $\beta_3$ -adrenoreceptor gene polymorphisms and obesity. The aim of this study was to investigate the association between  $\beta_3$ -adrenoreceptor gene polymorphism and serum concentration of Leptin with body mass index(BMI).

**Materials and Methods:** The study was cross-sectional. Participants of Tehran Lipid and Glucose Study were divided on the basis of BMI in four groups: BMI<20, 20≤BMI<25, 25≤BMI<30, BMI≥30. Totally 401 subjects(mean age 44±14 years)[197 men(46±14 years), 204 women(42±13 years)] were selected randomly; each group including 97, 98, 104 and 102 subjects, respectively. Leptin level was determined by Enzyme immuno assay(EIA) method and FBS, HDL-C, Triglyceride and Total Cholesterol levels were determined by Enzyme colorimetric method. Factors including Body mass index and blood pressure were measured too. A 210 bp fragment of mentioned gene was amplified using PCR and subject's genotyping in Tehran Lipid and Glucose Study population was determined by RFLP(MvaI, restriction enzyme) method. Data were analyzed using the T-test. We used one-way ANOVA test followed by post hoc multiple comparison(Tukey) between four BMI groups and also between two groups, of AA/TA(arg Carrier) and TT(Arg non Carrier). All data were analyzed using SPSS 11.5.

**Results:** The A(Arg) allele frequency was 0.08 among the population and satisfied Hardy-Weinberg equilibrium. Presence of A(Arg) allele was significantly associated with increase of the BMI(AA/TA, 27±6kg/m<sup>2</sup>; TT, 25±5 kg/m<sup>2</sup>; P=0.043) and increase serum Leptin level(AA/TA, 30±25mg/dl; TT, 23±21 mg/dl; P=0.009).

**Conclusion:** These data showed the association between Trp64Arg polymorphism of  $\beta_3$ -adrenoreceptor gene with increasing BMI and Leptin level.

**Key Words:** 1) Obesity    2) Body Mass Index    3) Leptin    4) Polymorphism  
5)  $\beta_3$ -adrenoreceptor

**I**) MSc in Molecular and Cellular Biology, Obesity Research Center, Research Institute for Endocrine sciences, Evin st., Taleghani Hospital, Shaheed Beheshti University of Medical Sciences and Health Services, Tehran, Iran.

**II**) PhD in Biochemistry, Assistant Professor of Biochemistry, Obesity Research Center, Research Institute for Endocrine sciences, Evin st., Taleghani Hospital, Shaheed Beheshti University of Medical Sciences and Health Services, Tehran, Iran.

**III**) PhD in Nutrition, Assistant Professor of Nutrition, Obesity Research Center, Research Institute for Endocrine sciences, Evin st., Taleghani Hospital, Shaheed Beheshti University of Medical Sciences and Health Services, Tehran, Iran.

**IV**) Professor of Endocrinology, Obesity Research Center, Research Institute for Endocrine sciences, Evin st., Taleghani Hospital, Shaheed Beheshti University of Medical Sciences and Health Services, Tehran, Iran. (\*Corresponding Author)