

# بررسی اثر مهار گیرنده رایانیدینی (RYR) بر فعالیت پیس میکری گره سینوسی - دهلیزی - بطنی سالم و دست نخورده قلب موش

## چکیده

زمینه و هدف: نقش گیرنده های رایانیدینی (Ryanodine receptor=RYR) در فعالیت پیس میکری سلول های قلب، مناقشه انجیز است. گروهی از محققین نقش اجباری و مطلق برای آن قائل هستند، در حالی که گروهی دیگر، نقش جزئی و نه مطلق برای آن قائلند. هدف اصلی از انجام این مطالعه این بود تا یکبار دیگر، نقش گیرنده رایانیدینی بر فعالیت پیس میکری گره های سینوسی - دهلیزی و دهلیزی - بطنی قلب موش بررسی شود.

روش بررسی: در طی یک مطالعه تجربی، اثرات رایانیدین برو طول دوره پتانسیل عمل گره های سینوسی - دهلیزی و دهلیزی - بطنی سالم قلب موش مورد بررسی قرار گرفت. ثبت خارج سلولی پتانسیل های عمل توسط دو میکروالکترود فلزی جداگانه صورت گرفت. از آزمون T زوج و مستقل (بنا بر مورد) استفاده شد. اگر  $p < 0.05$  بود، تفاوت معنی دار فرض شد.

یافته ها: رایانیدین با غلظت  $2 \pm 0.0$  و  $2 \pm 0.0$  میکرومولار موجب افزایش طول دوره پتانسیل عمل در گره سینوسی - دهلیزی  $46 \pm 15$  و  $21 \pm 7$  درصد و در گره دهلیزی - بطنی  $25 \pm 22$  و  $91 \pm 41$  درصد شد. در تمام نمونه ها، فعالیت پیس میکری در اثاثی مصرف رایانیدین متوقف نگردیده بود. اثر رایانیدین در دو گره نسبت به حالت کنترل معنی دار بود. نتیجه گیری: براساس نتایج بدست آمد، می توان بیان کرد که جریان گیرنده رایانیدینی در هر دو گره سینوسی - دهلیزی و دهلیزی - بطنی موجود است و از آنجا که فعالیت پیس میکری با مصرف رایانیدین ادامه داشته و متوقف نگردیده، بنابراین گیرنده رایانیدینی نقش منحصر به فرد و اجباری نداشته است. اثر رایانیدین بر گره دهلیزی - بطنی نسبت به گره سینوسی - دهلیزی به طور معنی داری بیشتر بوده است، این بدين معنی است که نقش گیرنده رایانیدینی در هر دو گره یکسان نیست.

کلیدواژه ها: ۱- گره سینوسی - دهلیزی - ۲- گره دهلیزی - بطنی - ۳- فعالیت پیس میکری - ۴- گیرنده رایانیدینی

تاریخ دریافت: ۲۱/۱۱/۸۵، تاریخ پذیرش: ۲۰/۴/۸۶

## مقدمه

قلبی یافت شده اند.<sup>(۴-۷)</sup> کانال های رایانیدینی در مکانیسمی که بنام کلسیم القا شده - کلسیم رها شده (Ca<sup>2+</sup>-induced Ca<sup>2+</sup>-released Ca<sup>2+</sup>-released) نامیده می شود، در کوپل تحریک - انقباض ایفای نقش می کنند.<sup>(۸-۹)</sup> اگر چه بعضی از یافته ها توسط patch clamp و تصویربرداری confocal، از حرکت کلسیم رها شده از شبکه سارکوپلاسمیک از طریق RyR2 در داخل سلول حکایت می کنند، ولی هنوز هم در خصوص این نقش، بحث و گفتگوی فراوانی وجود دارد. بعضی همانند Bogdanov و همکاران<sup>(۹)</sup> و Vinogradova و همکاران<sup>(۱۰)</sup> نقش بسیار تعیین کننده ای برای آن قایل بوده و اظهار

Ryanodine =RyRs receptors یک خانواده از کانال ها یا گیرنده های رهاسازی کلسیمی هستند که در شبکه سارکوپلاسمیک و شبکه آندوپلاسمیک انواع سلول های بافت های تحریک پذیر و تحریک ناپذیر، واقع شده و نقش مهم و اساسی در انقباض و تولید سیگнал های کلسیمی ایفا می نمایند.<sup>(۱-۲)</sup> سه نوع ایزو فرم RyR در بافت های پستانداران تشخیص داده شده است. RyR1 غالباً در بافت های ماهیچه های اسکلتی، RyR2 در مغز و قلب و RyR3 به طور نسبی و کم در انواع بافت هایی از قبیل مغز، دیافراگم و ماهیچه صاف و

(۱) دانشیار و PhD فیزیولوژی، دانشکده علوم توانبخشی، میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید شاهنشهری، دامنه ایران، تهران، ایران.

توسط اکسیژن تازه، اکسیژن رسانی می شد، در درجه حرارت اتاق (۲۲ درجه سانتی گراد) قرار داده می شد. پس از شستن خونها و جدا کردن بافت‌های چربی، پیوندی، ماهیچه بطنی و دهليزی چپ، دهليز راست به تنهایی باقی می ماند که با قیچی مخصوص باز می شد تا سطح داخلی دهليز راست در معرض دید محقق قرار گیرد. در اين مرحله، در زير میکروسکوپ نوري، تمام قطعات دهليز راست با ظرفت با قیچی مخصوص تازمانی که گره سینوسی - دهليزی و گره دهليزی - بطنی و اطراف آن باقی بمانند، جدا می شد. در مرحله آخر هر دو گره از هم جدا می شدند. از اينجا به بعد نمونه‌های آماده شده جهت ثبت فعالیت‌های الکتریکی، در اتاق ثبت کننده، قرار داده می شدند و با سوزن‌های بسيار ظريفی که با چشم غير مسلح دیده می شدند، در ديش و يا ظرف شيشه‌ای حمام بافتی (Tissue bath) فيكس می شدند و دائمًا توسط محلول تايروود (Tyrode) به نحوی که سطح زيرین بافت هم در معرض محلول قرار گيرد، تغذيه می گردیدند.

محلول تايروود قبل از ورود به حمام بافتی، گرم می شد و يك دستگاه termistor کوچک که الکترود ثبات آن در داخل حمام بافتی قرار داشت، بررسی می گردید. براساس تجارب قبلی، درجه حرارت ۳۲ درجه سانتی گراد، بر درجه حرارت ۳۷ سانتی گراد ترجیح داده شد.<sup>(۱۴)</sup> در درجه حرارت مذکور کلیه مختصات الکتروفیزیولوژیکی از قبیل طول يک دوره پتانسیل عمل (cycle length) و سلسله مراتب فعالیت سلولها، برای مدتی که عمل ثبت سلولی انجام می شد، پایدار و ثابت حفظ می گردید.

محلول Tyrode، توسط نیروی جاذبه به حمام بافتی، وارد و توسط پمپ تخلیه مرکزی از حمام بافتی خارج می گردید. سرعت مایع ورودی و خروجی، ۴ میلی لیتر در دقیقه بود، که توسط يك جريان سنج (flow meter) تنظیم شده بود، بطوري که کل محلول موجود در حمام بافتی در هر لحظه در حدود ۵ میلی لیتر ثابت باقی می ماند. محلول تايروود شامل ۹۳ میلی مولار کلرید سدیم (NaCl)، ۲۰ میلی مولار بیکربنات سدیم (NaHCO<sub>3</sub>)، ۱ میلی مولار Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>، ۵ میلی مولار

داشته‌اند که در صورت بلوکه شدن اين جريان، فعالیت خودبخودی هم در گره سینوسی - دهليزی متوقف می شود. در مقابل، گروهی مانند Honjo و همکاران<sup>(۱۱)</sup>، نقش کم اهمیت‌تری برای آن در تولید فعالیت خودبخودی گره سینوسی - دهليزی قایل شده‌اند؛ بر اين اساس معلوم است که توافقی بر نقش گیرنده‌های رایانیدینی در فعالیت پیس میکری سلولهای قلب وجود ندارد بطوری که دیگران هم بر این امر اذعان دارند.<sup>(۱۲)</sup> در اين بررسی و با بكارگيري رایانيدین که به طور اختصاصي کanal RyR مهار می نماید، نقش اين جريان در تولید فعالیت خودبخودی گره سینوسی - دهليزی با اندازه‌گيري طول دوره پتانسیل عمل یا cycle length مورد مطالعه قرار گرفت. از آنجا که اثر اصلی رایانیدین بر پارامترهای پتانسیل عمل در طولانی شدن cycle length مشخص می شود، اين پارامتر انتخاب شد. از آنجا که بعد از گره سینوسی - دهليزی و در صورتی که به هر دليل قلب با فقدان کارکرد گره سینوسی - دهليزی مواجه شود، گره دهليزی - بطنی به زنش خود ادامه داده و فعالیت خودبخودی قلب را تنظیم می نماید<sup>(۱۳)</sup>، همزمان اثر رایانیدین بر فعالیت خودبخودی گره دهليزی - بطنی با اندازه‌گيري طول دوره پتانسیل عمل هم مورد بررسی قرار گرفته و برای اولین بار نتایج اثر رایانیدین بر طول دوره پتانسیل عمل در هر دو گره با هم مقایسه شده است.

پس بطور کلي هدف از انجام اين مطالعه، بررسی مجدد نقش گیرنده رایانیدینی در ايجاد طول دوره پتانسیل عمل گرههای سینوسی - دهليزی و دهليزی - بطنی بود. ضمناً اين مطالعه، يكى از زنجبيره تحقيقاتی محسوب می شود که نقش جريان گيرنده رایانیدینی را در گونه‌های مختلف پستانداران بررسی می نماید.

### روش بررسی

موشهای بالغ سیاه نژاد C57 BL6/J با وزن ۲۰-۳۰ گرم، از هر دو جنس انتخاب شدند، پس از اينکه با ضربه به سر، بيهوشی می شدند، سینه و پريكارديوم فوراً شکافته می شد و قلب در حال تپش سريعاً در محلول تايروود (Tyrode) که

نشانه گر ثابت، روی قله پتانسیل عمل مورد نظر (که زمان صفر را به نمایش می‌گذارد) و نشان گر دوم، بر قله پتانسیل عمل مجاور قرار داده می‌شد و فاصله زمانی دو قله، مقدار یک دوره پتانسیل عمل را نشان می‌داد. بدین طریق طول دوره ۵۰ پتانسیل عمل، اندازه‌گیری و سپس میانگین آنها به عنوان طول دوره پتانسیل عمل در نظر گرفته می‌شد.

روش بررسی مقاله، از نوع تجربی بود و میانگین و خطای معیار میانگین‌ها (SEMs) توسط نرم‌افزار Sigma stat (SEM) رسم شدند و از آزمون T زوج و مستقل (بنا به مورد) استفاده شد و در صورتی که  $p < 0.05$  بود، تفاوت معنی‌دار فرض شد.

#### یافته‌ها


یک نمونه از کنترل و حضور دارو در خصوص گره سینوسی - دهلیزی، در شکل شماره ۱ و در مورد گره دهلیزی - بطنی، در شکل شماره ۲ نشان داده شده است. در هر دو شکل، در قسمت A، ثبت خارج سلولی پتانسیل عمل در حالت کنترل و در قسمت B، ثبت خارج سلولی پتانسیل عمل در حضور رایانیدین نشان داده شده است. در هر دو شکل با استفاده از دارو طول دوره پتانسیل عمل ya length Cycle نسبت به حالت کنترل افزایش آشکاری داشت.

کلرید پتاسیم (KCl)، ۲ میلی‌مولار کلرید کلسیم (CaCl<sub>2</sub>)، ۱ میلی‌مولار سولفات منیزیوم (MgSO<sub>4</sub>)، ۲۰ میلی‌مولار سدیم استات و ۱۰ میلی‌لیتر گلوکز به اضافه ۵ واحد انسولین است. به منظور ایجاد pH مناسب (۷/۴)، محلول مذکور با (٪۰/۹۵) O<sub>2</sub> و (٪۰/۵) CO<sub>2</sub> متعادل می‌گردید.


حدود ۳۰ تا ۴۵ دقیقه، جهت بازیابی فعالیت الکتریکی، به بافت فرستاده می‌شد. قبل از اضافه کردن رایانیدین، ثبت فعالیت الکتریکی گره‌ها به صورت خارج سلولی، به عنوان کنترل، انجام و سپس نمونه‌ها به ترتیب در معرض ۰/۲ و ۲ میکرومولار رایانیدین به مدت هر کدام ۲۰ دقیقه قرار می‌گرفتند و مجدداً ثبت فعالیت الکتریکی به صورت خارج سلولی انجام می‌شد.

ثبت فعالیت توسط میکرو الکترودهای فلزی که به آمپلی فایر یا تقویت کننده وصل بودند، انجام می‌گرفت. حاصل ثبت فعالیت الکتریکی گره‌ها بر روی صفحه مانیتور کامپیوتر قابل مشاهده بود و در کامپیوتر ذخیره می‌گردید. دستگاه Power Lab مدل sp/4 که تبدیل کننده آنالوگ به دیجیتال می‌باشد هم، در مسیر قرار داده شد.


برای ثبت و اندازه‌گیری دوره پتانسیل عمل از نرم‌افزار chart 4 for windows تقسیم‌بندی زمان را حسب هزارم ثانیه برای ثبت‌های سلولی نشان می‌داد. جهت اندازه‌گیری طول دوره پتانسیل عمل،




شکل شماره ۱- تاثیر ۲ میکرومولار رایانیدین بر فعالیت خودبخودی طول دوره پتانسیل عمل گره سینوسی - دهلیزی. در بخش «A»، ثبت خارج سلولی در حالت کنترل و در بخش «B» در حضور دارو نشان داده شده است.



شکل شماره ۲- تاثیر ۲ میکرومولار رایانیدین بر فعالیت خودبخودی طول دوره پتانسیل عمل گره دهلیزی - بطئی. در بخش «A»، ثبت خارج سولوی در حالت کنترل و در بخش «B»، در حضور دارو نشان داده شده است.



شکل شماره ۳- فعالیت خودبخودی دوره پتانسیل عمل گره سینوسی - دهلیزی. میانگین و خطای معیار میانگین‌ها(n=۸) نشان داده شده است. \*= $p<0.05$  تفاوت معنی‌دار با کنترل



شکل شماره ۴- فعالیت خودبخودی دوره پتانسیل عمل گره دهلیزی - بطئی. میانگین و خطای معیار میانگین‌ها(n=۸) نشان داده شده است. \*= $p<0.05$  تفاوت معنی‌دار با کنترل

در شکل شماره ۳ و ۴، میانگین و خطای معیار میانگین‌ها برای طول دوره پتانسیل عمل(که به طور خلاصه cycle length یا طول دوره نامیده شده است) در حالت کنترل و مصرف رایانیدین با غلظت ۰/۰ و ۲ میکرومولار جهت گره سینوسی - دهلیزی و گره دهلیزی - بطئی به ترتیب در ۸ و ۸ نمونه نمایش داده شده است. طول دوره پتانسیل عمل در گره سینوسی - دهلیزی، طول دوره پتانسیل ثانیه(شکل شماره ۳) و در حالت کنترل، طول دوره پتانسیل ثانیه(شکل شماره ۴) بود که در گره دهلیزی - بطئی به طور معنی‌داری(نشان داده نشده است) بزرگ‌تر از طول دوره پتانسیل عمل در گره سینوسی - دهلیزی بود. بعد از مصرف رایانیدین با غلظت ۰/۰ و ۲ میکرومولار، طول دوره پتانسیل عمل در گره سینوسی - دهلیزی به ترتیب به ۴۷۶/۸۰±۳۶ و ۴۹۵/۲۰±۶۱/۷۵ هزارم ثانیه(شکل شماره ۴) تغییر کرد که در هر دو غلظت، تفاوت با حالت کنترل، کاملاً معنی‌دار ولی اثر تفاوت دو غلظت، معنی‌دار نبوده است.

طول دوره پتانسیل عمل در گره دهلیزی - بطئی بعد از مصرف رایانیدین با غلظت ۰/۰ و ۲ میکرومولار نیز به ترتیب ۴۴۳/۵±۸۲/۷۵ و ۳۵۶±۵۷ هزارم ثانیه(شکل شماره ۴) ۱۱۷۲±۴۲۳/۷۵ و ۱۵۷۲±۴۲۳/۲۰ هزارم ثانیه(شکل شماره ۳) تغییر کرد که در هر دو غلظت، ولی تفاوت اثر دو غلظت دارو در هر دو گروه معنی‌دار نبوده است.

مطالعه بکار رفته است، یک آلکالوئید استخراج شده از عصاره گیاه *Rynia speciosa* Vahl. رایانیدین با میل ترکیبی بالا و به صورت اختصاصی، گیرنده یا کانال رایانیدینی را مهار می‌نماید.<sup>(۱۵)</sup> از آنجا که رایانیدین در مسدود کردن سایر جریان‌های یونی نقشی ندارد، بنابراین تغییرات ایجاد شده در طول دوره پتانسیل عمل در هر دو گره، بر اثر کاربرد رایانیدین با غلظت  $0.2\text{ μM}$  و  $2\text{ μM}$  میکرومولار، تنها مربوط به اثر دارو بر گیرنده رایانیدینی است.<sup>(۱۶)</sup>

Masumiya و همکاران با بررسی که انجام دادند به این نتیجه رسیدند که نوع RyR1 در قلب موش وجود ندارد<sup>(۱۷)</sup> و صرفاً ایزوفرم نوع RyR2 موجود است، بنابراین می‌توان گفت که دارو بر RyR2 اثر داشته است.

اثر دارو حتی پس از گذشت ۹۰ دقیقه از شستن رایانیدین، برگشت ناپذیر بود. این پدیده هم با یافته‌های دیگران کاملاً موافق داشت.<sup>(۱۸)</sup>


غلظت‌های بکار رفته از رایانیدین در گره سینوسی - دهیزی موجب آریتمی گردید که این پدیده اولاً در بررسی دیگری که بر روی گره سینوسی - دهیزی قلب خرگوش انجام گرفته بود(نتایج بررسی آماده چاپ است)، مشاهده نگردید در حالی که در بررسی دیگری که بر گره سینوسی - دهیزی قلب موش صحرایی انجام گرفته بود(نتایج بررسی آماده چاپ است)، در بعضی از نمونه‌های بافتی از گره سینوسی - دهیزی مشاهده شد که به نظر می‌رسد وجود و یا عدم وجود چنین پدیده‌ای به نوع حیوان و بافت یا سلول مورد آزمایش بستگی دارد. Rigg & Terrar که از غلظت ۱ میکرومولار رایانیدین و سلولهای گره سینوسی - دهیزی قلب خرگوش استفاده کرده بودند، وجود هیچ گونه آریتمی را گزارش نکردند<sup>(۱۹)</sup>، این در حالی است که دیگران، آریتمی را در سگ<sup>(۲۰)</sup>، خوکچه هندی و گاو<sup>(۲۱)</sup> گزارش کرده‌اند.

ضمناً نتایج نشان داد که جریان رهاسازی یون کلسیم رایانیدینی در هر دو گره سینوسی - دهیزی و دهیزی - بطی قلب موش و مقایسه نقش آن در دو گره، از رایانیدین با غلظت  $0.2\text{ μM}$  و  $2\text{ μM}$  میکرومولار جهت مهار جریان مذکور، استفاده و طول دوره پتانسیل عمل در حالت کنترل و مصرف دارو اندازه‌گیری شد.

رایانیدین با فرمول شیمیایی  $\text{C}_{25}\text{H}_{35}\text{NO}_9$  که در این

در شکل شماره ۵، تغییرات هر دو گره بر اثر مصرف رایانیدین با غلظت  $2\text{ μM}$  میکرومولار بر طول دوره پتانسیل عمل بر حسب درصد نشان داده شده است. درصد تغییرات در گره سینوسی - دهیزی  $= 21/75 \pm 7.0\%$  (ستون سمت چپ ۱) و در گره دهیزی - بطی  $= 241/50 \pm 9.1\%$  (ستون سمت راست ۲) بود. درصد تغییرات طول دوره پتانسیل عمل در گره دهیزی - بطی به طور معنی‌داری بیش از ۳ برابر بزرگتر از طول دوره پتانسیل عمل در گره سینوسی - دهیزی بود.

در کلیه نمونه‌های گره سینوسی - دهیزی، بعد از مصرف دارو، در ثبت طول دوره پتانسیل عمل، آریتمی یا بی‌نظمی مشاهده شد که در بحث و نتیجه‌گیری از آن بیار خواهد شد.



شکل شماره ۵- مقایسه تغییرات دوره پتانسیل عمل گره سینوسی - دهیزی (ستون ۱) و دهیزی - بطی (ستون ۲) بر حسب درصد. میانگین و  $\pm$  خطای معیار میانگین‌ها نشان داده شده است.  $* = p < 0.05$  (تفاوت معنی‌دار با گره سینوسی - دهیزی)

## بحث

به منظور بررسی نقش جریان کanal یا گیرنده رایانیدینی بر فعالیت پیس میکری گره سینوسی - دهیزی و دهیزی - بطی قلب موش و مقایسه نقش آن در دو گره، از رایانیدین با غلظت  $0.2\text{ μM}$  و  $2\text{ μM}$  میکرومولار جهت مهار جریان مذکور، استفاده و طول دوره پتانسیل عمل در حالت کنترل و مصرف دارو اندازه‌گیری شد.

رایانیدین با فرمول شیمیایی  $\text{C}_{25}\text{H}_{35}\text{NO}_9$  که در این

اثر رایانیدین بر هر دو گره باشد.<sup>(۲۸)</sup>

از آنجا که در گرههای مورد بحث تنوع سلولی فراوانی وجود دارد، بنابراین عدم توانایی روش حاضر در تعیین اینکه رایانیدین بر کدام دسته از سلولهای هر دو گره اثر داشته است، از محدودیت‌های این مطالعه می‌باشد که البته اگر چه هدف مورد نظر در این مطالعه نبوده است، ولی با انجام تحقیقات جدگانه و با استفاده از پروتئین‌های نشان‌دار و به روش میکروسکوپ confocal و جداسازی سلولهای متتنوع هر دو گره، شاید بتوان نوع سلول اثربخشی رایانیدین و مقدار اثر را تعیین کرد.

### نتیجه‌گیری

به طور خلاصه از بررسی حاضر چنین می‌توان نتیجه گرفت که نقش گیرنده رایانیدینی در سلولهای گره سینوسی - دهیزی و دهیزی - بطنی سالم و دست نخورده یک نقش مطلق و اجباری نبوده است. همچنین این بررسی نشان داد که اثر دارو در گره دهیزی - بطنی به مراتب بیشتر از گره سینوسی - دهیزی است.

### تقدیر و تشکر

بدین وسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران به جهت اعزام اینجانب به فرصت مطالعاتی کشور انگلستان (دانشگاه منچستر) تشکر و قدردانی می‌نمایم و همچنین از پروفسور مارک بویت (Mark Boyett) و دکتر مینگلی (Ming Lei) که نهایت همکاری را با در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات آزمایشگاهی داشته‌اند، تشکر و قدردانی می‌نمایم.

### فهرست منابع

1- Franzini-Armstrong C, Jorgensen AO. Structure and development of e-coupling units in skeletal muscle. *Annu Rev Physiol* 1994; 56: 509-34.

2- Clapham DE. Calcium signalling. *Cell* 1995; 80: 259-68.

3- Fill M, Copello JA. Ryanodine receptor calcium release channels. *Physiol Rev* 2002; 82(4): 893-22.

بطنی بیش از ۳ برابر گره سینوسی - دهیزی بوده است. شاید تفاوت مذکور را بتوان به تفاوت غلظت جریان گیرنده رایانیدینی در هر دو گره سینوسی - دهیزی و دهیزی - بطنی نسبت داد، به این معنی که احتمالاً غلظت گیرنده رایانیدینی در گره دهیزی - بطنی بیشتر از گره سینوسی - دهیزی است. این تفاوت در نتایج، احتمالاً نشان از واپستگی اثر دارو به نوع بافت و سلول مورد آزمایش دارد.<sup>(۲۳-۲۶)</sup>

در بررسی دیگری که بر بافت دست نخورده و سالم گره سینوسی - دهیزی و دهیزی - بطنی قلب خرگوش و تحت شرایط مشابه با این بررسی انجام گرفت (نتایج در دست چاپ است)، رایانیدین طول دوره پتانسیل عمل را در گروه سینوسی - دهیزی ۳۰٪ افزایش داد که به طور معنی‌داری کمتر از افزایش طول دوره پتانسیل عمل در گره سینوسی - دهیزی قلب موش در بررسی حاضر است. بنابراین شاید بتوان گفت که اثر رایانیدین در مهار گیرنده رایانیدینی به نوع حیوان مورد آزمایش بستگی دارد.

از طرفی محققین نشان داده‌اند که در گره سینوسی - دهیزی قلب خرگوش، رایانیدین بر سلولهای بزرگتر که احتمالاً در بخش محیطی گره موجودند، اثر داشته است، در حالی که هیچ گونه اثر معنی‌داری بر سلولهای کوچکتر گره که احتمالاً مربوط به مرکز گره هستند، نداشت.<sup>(۲۲)</sup> همین طور مشخص شد که محتوای کلسیم شبکه سارکوپلاسمیک در سلولهای بزرگتر، بیشتر از سلولهای کوچکتر در گره سینوسی - دهیزی قلب خرگوش بود. Lancaster و همکاران<sup>(۲۷)</sup> نشان داده‌اند که رایانیدین در سلولهای بزرگتر، اثر بیشتری بر ترازیت کلسیم در مقایسه با سلولهای کوچکتر داشته و موجب کاهش فعالیت‌های پیس میکری در سلولهای بزرگتر شده و بر فعالیت سلولهای کوچکتر اثری نداشته است و بنابراین کوچکترین سلولها که در مرکز گره سینوسی - دهیزی قرار دارند، برای فعالیت پیس میکری خود، نیازی به کلسیم شبکه سارکوپلاسمیک ندارند.<sup>(۱۱)</sup>

Cari و همکاران نشان داده‌اند که در بافت دهیز و بطن جانوران بچه‌ز، انواع RyR2 در شبکه سارکوپلاسمیک وجود دارد که تنوع مذکور، می‌تواند معرف مکانیسم‌های متفاوت

- 4- Takeshima H, Nishimura S, Matsumoto T, Ishida H, Kangawa K, Minamino N, et al. Primary structure and expression from complementary DNA of skeletal muscle ryanodine receptor. *Nature* 1989; 339: 439-45.
- 5- Wu X, Bers DM. Free and bound intracellular calmodulin measurements in cardiac myocytes. *Cell Calcium* 2007; 41: 353-64.
- 6- Murayama T, Ogawa Y. Properties of Ryr3 ryanodine receptor isoform in mammalian brain. *J Biol Chem* 1996; 271: 5079-84.
- 7- George CH, Jundi H, Thomas NL, Fry DL, Lai FA. Ryanodine receptors and ventricular arrhythmias: emerging trends in mutations, mechanisms and therapies. *J Mol Cell Cardiol* 2007; 42: 34-50.
- 8- Wehrens XH, Lehnart SE, Marks AR. Intracellular calcium release and cardiac disease. *Annu Rev Physiol* 2005; 67: 69-98.
- 9- Bogdanov KY, Vinogradova TM, Lakatta EG. Sinoatrial nodal cell ryanodine receptor and  $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$  exchanger: molecular partners in pacemaker regulation. *Circ Res* 2001; 88: 1254-8.
- 10- Vinogradova TM, Zhou Y-Y, Bogdanov KY, Yang D, Kuschel M, Cheng H, et al. Sinoatrial node pacemaker activity requires  $\text{Ca}^{2+}$ /calmodulin-dependent protein kinase II activation. *Circ Res* 2000; 87: 760-7.
- 11- Honjo H, Inada S, Lancaster MK, Yamamoto M, Niwa R, Jones SA, et al. Sarcoplasmic reticulum  $\text{Ca}^{2+}$  release is not a dominating factor in sinoatrial node pacemaker activity. *Circ Res* 2003; 92: 41-4.
- 12- Bridge JHB, Davidson CJ, Galamberti ES. A novel mechanism of pacemaker control that depends on high level of cAMP and PKA-Dependent phosphorylation. *Circ Res* 2006; 98: 437-9.
- 13- Wanatabe Y, Dreifus LS. Site of impulse formation within the atrioventricular junction of the rabbit. *Circ Res* 1968; 22: 717-27.
- 14- Kodama I, Boyett MR. Regional differences in the electrical activity of the rabbit sinus node. *Pflugers Archiv-European Journal of Physiology* 1985; 404: 214-26.
- 15- Hata T, Noda T, Nishimura M, Watanabe Y. The role of  $\text{Ca}^{2+}$  release from sarcoplasmic reticulum in the regulation of sinoatrial node automaticity. *Heart Vessels* 1996; 11: 234-41.
- 16- Meissner G. Molecular regulation of cardiac ryanodine receptor ion channel. *Cell Calcium* 2004; 35(6): 621-8.
- 17- Masumiya H, Wang R, Zhang J, Xiao B, Chen SRW. Localization of the 12.6-kDa FK506-binding Protein (FKBP12.6) Binding site to the NH<sub>2</sub>-terminal Domain of the cardiac  $\text{Ca}^{2+}$  release Channel(Ryanodine Receptor). *J Biol Chem* 2003; 278(6): 3786-92.
- 18- Lamont C, Eisner DA. The sarcolemmal mechanisms involved in the control of diastolic intracellular calcium in isolated rat cardiac trabeculae. *Pflugers Arch* 1996; 432: 961-9.
- 19- Rigg L, Terrar DA. Possible role of calcium release from the sarcoplasmic reticulum in pacemaking in guinea-pig sino-atrial node. *Exp Physiol* 1985; 81: 877-80.
- 20- Kahn MD, Wittingham DJ, Wiesner K. Effects of ryanodine in normal dogs and in those with digitalis-induced arrhythmias. *Am J Cardiol* 1964; 14: 658-68.
- 21- Sutko JL, Kenyon JL. Ryanodine modification of cardiac muscle responses to potassium-free solutions. Evidence for inhibition of sarcoplasmic reticulum calcium release. *J Gen Physiol* 1983; 82: 385-404.
- 22- Kafiluddi R, Kennedy RH, Seilfen E. Effect of ryanodine on ionotropic and arrhythmogenic actions of cardiotonic steroids. *Eur J Pharmacol* 1986; 131: 273-8.
- 23- Honjo H, Boyett MR, Kodama I, Tpyama J. Correlation between electrical activity and the size of rabbit sino-atrial node cells. *J Physiol* 1996; 496: 795-808.
- 24- Honjo H, Lei M, Boyett MR, Kodama I. Heterogeneity of 4-aminopyridine-sensitive current in rabbit sinoatrial node cells. *Am J Physiol* 1999; 276: H1295-H1304.
- 25- Lei M, Brown HF, Terrar DA. Modulation of delayed rectifier potassium current,  $i_K$ , by isoprenaline in rabbit isolated pacemaker cells. *Exp Physiol* 2000; 85: 27-35.
- 26- Lei M, Honjo H, Kodama I, Boyett MR. heterogeneous expression of the delayed-rectifier  $K^+$  currents  $i_{K,r}$  and  $i_{K,s}$  in rabbit sinoatrial node cells. *J Physiol* 2001; 535: 703-14.
- 27- Lancaster MK, Jones SA, Harrison SM, Boyett MR. Intracellular  $\text{Ca}^{2+}$  and pacemaking within the rabbit sinoatrial node: heterogeneity of role and control. *J Physiol* 2004; 556: 481-94.
- 28- Cari K, Felix AH, Caswell NR, Brandt WJ, Ball JR, Vaghy G, et al. Immunolocalization of sarcolemmal dihydropyridine receptor and sarcoplasmic reticular triadin and ryanodine receptor in rabbit ventricle and atrium. *J Cell Biol* 1995; 129: 672-82.

# *The Effect of Inhibition of the Ryanodine Receptor(RYR) on Pacemaker Activity of intact Sinoatrial and Atrioventricular Nodes in the Heart of Mouse*

/  
M.R. Nikmaram, PhD

## *Abstract*

**Background & Aim:** The role of ryanodine receptor(RYR) on pacemaker activity of heart cells is controversial. Some investigators have suggested that it is obligatory, while others believe it is partial and not obligatory. The principle aim of this study was once more to characterize the role of ryanodine receptor(RyR) on the pacemaker activity of the sinoatrial node(SAN) and the atrioventricular node(AVN) in the mouse.

**Material and Methods:** In an experimental study the effect of ryanodine on the cycle length(CL) of action potential of the intact SAN and the AVN of the heart mouse was assessed. The recording of action potential was extra cellular and was done by 2 separated metal microelectrodes. Paired and independent t tests were carried on accordingly. If the P values were less than 0.05, the differences were considered significantly.

**Results:** Ryanodine with 0.2 and 2 $\mu$ M concentrations prolonged CL of action potential by 46.50 $\pm$ 15.75% and 70 $\pm$ 21% in SAN preparations while 163 $\pm$ 72.25% and 241 $\pm$ 91.25% in AVN preparations. During ryanodine use, the pacemaker activity was not stopped for all preparations. The effect of ryanodine on two nodes was significant with respect to control.

**Conclusion:** On the basis of obtained result, it may be said that the ryanodine receptor current exists in SAN & VAN. AVN the pacemaker activity was functioning continuously in cardiac nodes when ryanodine was used, therefore, the role of RyR for pacemaker activity is not obligatory. The effect of ryanodine on AVN is significantly greater than SAN; that is, the role of RyR in two nodes is not similar.

**Key Words:** 1) Sinoatrial Node    2) Atrioventricular Node    3) Pacemaker Activity  
4) Ryanodine Receptor

*I)* Associate Professor of Physiology, Faculty of Rehabilitation sciences, Shah Nazari st., Mirdamad Ave, Madar Sq., Iran University of Medical Sciences and Health Services, Tehran, Iran.