

## مطالعه اثر آنتی اکسیدانی عصاره تام و فلاونوییدی گیاه سس بر سلول های PC12 مدل دیابتیک

دکتر مونا فرهادی: استادیار جنین شناسی، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران monafarhadi@yahoo.com

\*دکتر سید بهنام الدین جامعی: دانشیار آناتومی و علوم اعصاب، دپارتمان علوم پایه، دانشکده پرایپرشکی و گروه آناتومی دانشکده پرایپرشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسئول). behnamjameie@tums.ac.ir

پریسا حیات: کارشناس آزمایشگاه، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی تهران (پردیس همت)، تهران، ایران. parisa\_h56@yahoo.com

تاریخ پذیرش: ۹۰/۸/۱۵

تاریخ دریافت: ۹۰/۶/۲۱

### چکیده

**زمینه و هدف :** نوروپاتی های محیطی و مرکزی یکی از مهمترین عوارض ابتلا به دیابت شیرین می باشد، تاکنون مکانیسم های دقیق سلولی و مولکولی نوروتوکسیسیتی ناشی از افزایش گلوکز مشخص نگردیده است. در تحقیقات سال های اخیر به نقش رادیکال های آزاد به عنوان یکی از دلایل نوروپاتی های دیابتیک توجه شده است. بر این مبنای استفاده از آنتی اکسیدان ها یکی از گرینه های درمانی برای جلوگیری از آسیب های ناشی از عوامل استرس اکسیداتیو مانند افزایش گلوکز می باشد. در تحقیق حاضر اثر آنتی اکسیدانی عصاره تام و فلاونوییدی گیاه سس با نام علمی *Cuscuta lehmanniana Bunge*، که گیاه انگلی بومی ایران می باشد، بر سلول های PC 12 تحت تیمار با افزایش گلوکز به عنوان مدل سلولی نوروپاتی دیابتیک استفاده گردید.

**روش کار:** در تحقیق حاضر از سلول های رده PC12 در محیط کشت با افزایش گلوکز به عنوان القا مدل سلولی نوروپاتی دیابتیک استفاده گردیده است. از گیاه سس، پس از جمع آوری عصاره تام و فلاونوییدی تهیه گردید. فعالیت به دام اندازی رادیکال های آزاد نسبت به گیاه به روش (2,2-DPPH diphenyl-1-picrylhydrazyl) و سپس اثر عصاره تام و فلاونوییدی بر روی سلول های PC 12 تحت افزایش گلوکز با استفاده از تست MTT، رنگ آمیزی هسته ای PI-Annexin و وسترن بلاستین (Western blot) برای پروتئین پروآپوتوتیک Bax مورد مطالعه قرار گرفت.

**یافته ها:** نتایج DPPH نشان داد که عصاره تام و فلاونوییدی گیاه سس دارای خاصیت به دام اندازی رادیکال های آزاد می باشد. پس از به کار بردن عصاره فلاونوییدی با غلظت ۵۰ $\mu$ g/ml رادیکال های آزاد نسبت به گروه کنترل، ۷۰/۴۵٪ کاهش نشان داده اند. نتایج تست MTT هم چنین نشان داد که عصاره تام گیاه در غلظت ۱۰۰ $\mu$ g/ml و عصاره فلاونوییدی با غلظت ۵۰ $\mu$ g/ml ۵۰ توان حیاتی سلول ها را به ترتیب ۷۰ و ۸۳٪ افزایش داده است. رنگ آمیزی Annexin نشان داد که تعداد سلول های آپوتوتیک در مقایسه با گروه کنترل از ۳۸/۲ به ۱۵/۸٪ کاهش یافته است، سنجش وسترن بلاستین هم چنین نشان دهنده کاهش معنی دار بیان پروتئین پروآپوتوتیک Bax متعاقب استفاده از عصاره تام و فلاونوییدی می باشد.

**نتیجه گیری:** بر اساس یافته های این تحقیق عصاره تام و فلاونوییدی گیاه سس دارای خاصیت نوروپوتکتیو در برابر افزایش گلوکز در محیط کشت می باشد، به نظر می رسد خواص درمانی این گیاه بتواند در کنترل و یا کاهش نوروپاتی های دیابتیک موثر واقع گردد.

**کلیدواژه ها:** گیاه سس، نوروپاتی دیابتیک، سلول های PC12

سلولی از طریق القا اپیتوز در نورون های نواحی مختلف سیستم عصبی مانند ناحیه هیپوکامپ گزارش شده است (۱). مطالعات زیادی پیرامون مواد آنتی اکسیدان گیاهی صورت گرفته و خواص و ترکیبات موثره آنها مورد بررسی قرار گرفته است. سس گیاهی انگلی است که به دور گیاهان دیگر می پیچد و در طب سنتی چین و ایران استفاده های فراوانی داشته و اثرات درمانی بارزی در کبد، کلیه و طحال دارد (۲). این گیاه همچنین دارای اثرات ضد پیری و محافظتی می باشد. نشان داده شده است که فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره اتانولی سس، بر سلول های کبدی از سمیت کبدی ناشی از استاتامینوف

### مقدمه

دیابت ملیتوس شایع ترین بیماری غدد درون ریز با شیوع ۱-۲٪ است. این بیماری با اختلالات متابولیک، Retinopathy (Retinopathy)، نوروپاتی (Neuropathy) و اسکولوپاتی (Vasculopathy) و ضایعاتی درغشاء پایه مشخص می گردد (۱). علت اصلی این بیماری بالا بودن طولانی مدت غلظت گلوکز پلاسمایی باشد. هایپرگلیسمی ناشی از دیابت به عنوان یک استرس اکسیداتیو (Oxidative stress) موجب مشکلاتی مانند نوروپاتی می گردد. نوروپاتی دیابتیک می تواند تمام قسمت های سیستم عصبی را گرفتار کند. روند مرگ

### گروه های آزمایش

گروه کنترل: سلول های کشت داده شده در محیط Dulbecco's Modified DMEM (Eagle Medium) قرار گرفتند، با  $4\text{--}5 \mu\text{g}/\text{ml}$  گلوکز که بر طبق دستورالعمل استفاده جهت کشت سلول های PC12 بسیار مناسب است و هم چنین سلول های کشت شده در  $6\text{--}7$  برابر غلظت گلوکز نیز به عنوان گروه های کنترل در نظر گرفته شدند.

گروه تجربی: شامل سلول های کشت داده شده در محیط با  $6\text{--}7$  برابر غلظت طبیعی گلوکزی باشند که تحت تیمار با غلظت های  $1\text{--}5 \mu\text{g}/\text{ml}$  و  $50\text{--}250 \mu\text{g}/\text{ml}$  عصاره تام و عصاره فلاونوپییدی در زمان های  $48\text{--}72\text{--}96$  قرار گرفتند.

**کشت سلول های PC12:** سلول های PC12 از انسنتیتو پاستور تهیه شد. سلول ها در دمای  $37^\circ\text{C}$  درجه و رطوبت  $90\text{--}95\%$  CO<sub>2</sub> و محیط DMEM به علاوه  $5\%$  سرم جنین گاوی Fetal Bovine Serum (HS) و  $10\%$  سرم اسب (FBS) و  $50\text{--}100 \mu\text{g}/\text{ml}$  Streptomycin و  $50\text{--}100 \text{IU}/\text{ml}$  Penicillin رشد داده شدند.

**سنجهش فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه سس با DPPH:** ۱ گرم از عصاره تام و فلاونوپییدی در ۱ میلی لیتر از اتانول  $90\%$  حل شد و سپس از محلول  $1000 \mu\text{g}/\text{ml}$  شامل:  $200\text{--}500\text{--}1000 \mu\text{M}$   $200\text{--}50\text{--}25 \mu\text{g}/\text{ml}$  از DPPH را در اتانول به صورت محلول در آورده، به هر غلظت هم حجم خودش محلول DPPH اضافه گردید. پس از مخلوط کردن به مدت  $30$  دقیقه در تاریکی انکوبه شده و جذب آن در طول موج  $517\text{--}517$  نانومتر خوانده شد و از اسید آسکوربیک  $20 \mu\text{g}/\text{ml}$  به عنوان کنترل مثبت استفاده گردید و فعالیت به دام اندازی رادیکال های آزاد با فرمول زیر محاسبه شد. آزمایش سه بار تکرار شد.

= به دام اندازی رادیکال های آزاد

جذب کنترل - جذب گروه ها آزمایش  $\times 100$

جذب کنترل

**سنجهش توان حیاتی (MTT):** پس از دو پاساژ سلولی (Cell passaging) جهت سنجهش MTT سلول های PC12 به میزان  $5000$  سلول در هر خانه در


در موش ها جلوگیری می کند (۴). عصاره گلیکوزیدی این گیاه موجب القای تمایز سلولی در رده سلول های PC12 شده است و عملکردی مشابه فاکتور های نوروتروفیک را نشان داده است (۴، ۵). ترکیبات فعال بذر سس اساسا شامل فلاونوپییدهای مانند کویرستین، کامپفرون، کوسکوتین، آسترالگالین و گلیکوزیدهای آن ها می باشد (۶). فلاونوپییدها یکی از بزرگترین گروه های فنلی طبیعی هستند. این ترکیبات در گیاهان سبز و اغلب عصاره های گیاهی وجود دارند (۷). فعالیت آنتی اکسیدانی این ترکیبات در بسیاری از مطالعات آمده است، عصاره تام این گیاه اثر محافظتی روی بسیاری از سلول ها داشته است و اثرات فلاونوپییدی آن در محافظت از سلول ها و درمان سرطان به دامنه وسیعی از مکانیسم هایی شامل خواص به دام اندازی رادیکال های آزاد، تعدیل آنزیم هایی که کارسینوژن ها را فعال می کنند و جلوگیری از القای فاکتور رونویسی فعال کننده پروتئین AP-1 (۸، ۹). با توجه به سابقه بسیار طولانی استفاده از گیاهان دارویی در مناطق مختلف و هم چنین فلور طبیعی گیاهی اقلیمی ایران و بومی گیاه سس و اثرات متفاوت آن در رده های سلولی مختلف در تحقیق حاضر اثر آنتی اکسیدانی آن روی سلول های عصبی تحت تیمار با افزایش گلوکز به عنوان یک مدل برای نوروپاتی دیابتی مورد ارزیابی قرار گرفت.

### روش کار

**عصاره گیری:** برای عصاره گیری تام از روش پرکولاسان (Percolation) استفاده گردید. به این منظور  $220$  گرم پودر و  $1200$  سی سی حلال هیدروالکلی استفاده گردید. عمل عصاره گیری در سه مرحله انجام پذیرفت و  $800$  سی سی عصاره تام حاصل گردید. برای تهیه عصاره فلاونوپییدی  $400$  سی سی از عصاره تام حاصل از نوبت اول با  $200$  سی سی اتر دوپترول دو مرحله دیگر هر مرتبه با  $150$  میلی لیتر اتردوپترول و با استفاده از قیف جدا کننده (Decanter) شستشو داده شد. ترکیبات فلاونوپییدی در فاز مایع باقی مانده و ناخالصی ها وارد فاز اتردوپترولی گردیدند. فاز مایع نگهداری و فاز اتردوپترولی جدا گردیدند. فاز مایع حاوی فلاونوپییدها توسط دستگاه روتاری (Rotary) تغییط گردید و بصورت عصاره فلاونوپییدی آماده سازی شد.

رادیکال های آزاد را به میزان معنی داری کاهش داد. از اسید اسکوربیک  $20\text{ }\mu\text{g/ml}$  که مهار رادیکال های آزاد را به میزان  $90/20\%$  نشان داد، به عنوان کنترل مثبت استفاده گردید. در عصاره فلاونوییدی با غلظت  $50\text{ }\mu\text{g/ml}$  به میزان  $70/45\%$  رادیکال های آزاد مهار گردید. عصاره های تام (T) در غلظت های T200، T100 و T50 نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی دار نشان دادند. همچنین در عصاره های فلاونوییدی در غلظت های F200، F100 و F50 در مقایسه با گروه کنترل از نظر به دام اندازی رادیکال آزاد در سلول ها تفاوت معنی دار مشاهده گردید، ولی بین غلظت های مختلف دو عصاره تفاوت معنی دار مشاهده نشد (نمودار ۱).

**نتایج آزمایش سنجش توان حیاتی سلول:** ابتدا مرگ سلولی در غلظت های مختلف گلوکز در زمان های ۴۸، ۷۲ و ۹۶ ساعت بررسی گردید. نتایج حاصل از تست MTT نشان داد که افزایش گلوکز در غلظت با فرآیند  $13/5\text{ mg/ml}$  در زمان  $48$  و  $72$  ساعت کاهش



نمودار ۱: الف- نتایج سنجش توان حیاتی سلولی برای رادیکال های آزاد غلظت های مختلف عصاره تام گیاه سس و ب- غلظت های مختلف عصاره فلاونوییدی گیاه سس و DPPH با غلظت  $100\text{ }\mu\text{g/ml}$  در طول موج  $517\text{ nm}$  با استفاده از آسید اسکوربیک با غلظت  $20\text{ }\mu\text{g/ml}$  محاسبه گردید. نتایج براساس  $\text{Mean} \pm \text{SD}$  و سه تکرار می باشد.

ظرف ۹۶ خانه کشت داده شد. توان حیاتی سلول ها با استفاده از ۳-(4, 5-dimethylthiazol-2-yl)-2-phenyl tetrazolium (MTT assay) به این ترتیب که  $20\text{ }\mu\text{g/ml}$  MTT به غلظت  $5\text{ mg/ml}$  به هر کدام از خانه های ۹۶ تایی اضافه شد و سلول ها برای یک ساعت در انکوباتور در حرارت  $37^\circ\text{C}$  در گرفته شدند. پس از این که محیط سلول ها دور  $nm$  در دستگاه ELIZA reader بررسی شد.

**اندازه گیری سیتوکسیسیتی و آپوپتوز:** به منظور بررسی آپوپتوز از رنگ آمیزی PI-Annexin و ارزیابی با فلوسیتومتر (Flowcytometer) انجام گرفت. به این منظور در ظروف ۹۶ خانه در هر خانه حدود  $10^6$  سلول ریخته شد و پلیت به مدت ۱ شب در انکوباتور قرار گرفت و سپس غلظت های مورد نظر عصاره ها اضافه شد و حجم نهایی هر خانه با محیط به  $3\text{ ml}$  رسانده شد. پلیت ها تا زمان مورد نظر در انکوباتور قرار گرفتند و  $20\text{ }\mu\text{l}$  مایکرولیتر از معرف نشان دار Annexin-v را در  $1\text{ ml}$  بافر رقیق کرده و  $1\text{ ml}$  از محلول PI به آن اضافه گردید. همچنین از تکنیک Sub-G1 نیز برای تعیین سلول های تحت فاز G1 سیکل سلولی استفاده گردید.

**سنجدش بیان پروتئین پرواپوتیک Bax:** جهت آنالیز دو پروتئین Bax و Bcl2 از روش وسترن بلاستینگ استفاده گردید. به این منظور پس از استخراج پروتئین ها از سلول ها طبق روش Bradford  $40\text{ }\mu\text{g/ml}$ , *Polyvinylidene* (PVDF) پس از انتقال به کاغذ Rabbit anti rat Bax and (fluoride) از آنتی بادی Alkaline phosphates goat anti-rabbit و Bcl2 IgG استفاده شد. سپس باندها پس از انکوبه شدن در سوبستراتی BCIP, NBT (Substrate) قابل رویت شدند.

**روش های آماری:** نتایج با روش آنالیز واریانس یک طرفه با کمک آزمون Bonferonnes و SPSS (ver. 14) معنی دار بودن نتایج در سطح احتمال  $p < 0.05$  و سه تکرار برای هر آزمایش محاسبه شد.


### یافته ها

**نتایج سنجش رادیکال آزاد:** عصاره فلاونوییدی گیاه سس در غلظت های  $100$ ،  $50$  و  $20\text{ }\mu\text{g/ml}$


**نتایج تست Sub G1:** این تست نشان می دهد که سلول ها در چه مرحله ای از چرخه سلولی واقع شده است. همان طور که در نمودار ۴-الف نشان داده شده است، در گروه تحت تیمار با افزایش گلوکز ۴۳٪ سلول ها اپوپتوز نشان می دهند و درصد سلول ها در مرحله S, G1, G2 به ترتیب ۲۹ و ۸/۵ و ۱۲/۹٪ است. در نمودار ۴-ب، گروه تحت تیمار با عصاره تام گیاه میزان اپوپتوز سلول ها به ۱۶/۹٪ کاهش یافته است و سلول ها در مراحل دیگر چرخه سلولی افزایش معنی دار نشان داده اند. در نمودار ۴-ج، گروه تحت تیمار با عصاره فلاونوییدی را نشان می دهد و در آن میزان آپوپتوز به ۱۱/۵٪ رسیده است که نسبت به گروه ۶X تفاوت معنی داری را نشان می دهد. هردو گروه عصاره تام و فلاونوییدی نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی دار داشتند ولی عصاره فلاونوییدی تفاوت معنی داری با عصاره تام از نظر کاهش میزان آپوپتوز نشان ندادند (نمودار ۴ و ۵).

**نتایج سنجش آپوپتوز (Annexin ( تست Sub G1:** در این سنجش نوع مرگ سلول ها ( اپوپتوز و نکروز) و میزان سلول های اپوپتوز شده و نکروزه تعیین گردید. نتایج حاصل از فلوزایتمتری نشان داد که در سلول های ۱۲ تحت تیمار با عصاره تام  $\mu\text{g}/\text{ml}$  T100 و فلاونوییدی گیاه سس  $50\mu\text{g}/\text{ml}$  F درصد سلول های زنده بعد از ۷۲ ساعت به ترتیب  $70/8\%$  و  $85/9\%$  بود و تعداد سلول های اپوپتوز شده به ترتیب به  $15/8\%$  و  $11/3\%$  کاهش یافت و سلول های نکروزه  $10/5\%$  و  $7/0\%$  بودند. نتایج به دست آمده از عصاره تام و فلاونوییدی با گروه کنترل ۶X تفاوت معنی داری را نشان داد، درحالی که بین عصاره تام و فلاونوییدی در غلظت های فوق تفاوت معنی داری مشاهده نگردید (نمودار ۶ و ۷).

**نتایج سنجش وسترن بلاتینگ:** در این تحقیق میزان بیان پروتئین Bax ۲۱ KD در گروه تحت تیمار با عصاره تام غلظت  $100\mu\text{l}/\text{ml}$  و عصاره فلاونوییدی غلظت  $50\mu\text{l}/\text{ml}$  در زمان ۷۲ ساعت بررسی گردید. همان طور که در شکل مشخص می باشد، پروتئین پروپوتوتیک Bax نسبت به گروه کنترل کاهش و مقدار بیان پروتئین Bcl2 افزایش نشان می دهد. هم چنین نسبت بین این دو پروتئین نیز نسبت به گروه کنترل افزایش نشان می دهد که بیان گر اثر محافظتی عصاره می باشد (شکل ۱ و نمودار ۸).






نمودار ۲- نمودار توان حیاتی سلول های PC تحت تأثیر گلوکز در ۷۲ ساعت. توان حیاتی سلول ها در غلظت های  $13/5$  و  $18/0$  mg/ml در مقابل گروه کنترل C نشان داده شده است. در غلظت  $27\text{ mg/ml}$  بیشترین مرگ سلولی نشان داده شد. نتایج بر اساس mean  $\pm$  SEM (n=6) می باشد. \*p<0.05.



نمودار ۳- نمودار سنجش توان حیاتی سلول ها پس از تأثیر عصاره تام و فلاونوییدی در زمان ۷۲ ساعت: به ترتیب  $6X$  گروه کنترل با  $4\text{ }\mu\text{g}/\text{ml}$  افزایش گلوکز،  $T25$  گروه تیمار با عصاره تام غلظت  $25\text{ }\mu\text{g}/\text{ml}$ ،  $F25$  گروه تیمار با عصاره فلاونوییدی  $25\text{ }\mu\text{g}/\text{ml}$ ،  $T50$  گروه تیمار با عصاره  $50\text{ }\mu\text{g}/\text{ml}$ ،  $F50$  گروه تیمار با عصاره فلاونوییدی  $50\text{ }\mu\text{g}/\text{ml}$ ،  $T100$  گروه تیمار با عصاره تام غلظت  $100\text{ }\mu\text{g}/\text{ml}$ ،  $F100$  گروه تیمار با عصاره فلاونوییدی  $100\text{ }\mu\text{g}/\text{ml}$ . نتایج براساس  $\pm SD$  و سه تکرار می باشد. \*p<0.05.


معنی داری را در توان حیاتی سلول ها ایجاد نمی کند، ولی در غلظت  $27\text{ mg/ml}$  این کاهش هم در زمان ۷۲ و هم در زمان ۹۶ ساعت معنی دار بود. سنجش MTT برای عصاره های تام و فلاونوییدی گیاه سس در یک روش وابسته به مقدار و زمان، موجب محافظت از سلول های PC12 در برابر افزایش گلوکز به عنوان یک فاکتور سایتو توکسیک (Cytotoxic) شدند و بیشترین اثر محافظتی مربوط به عصاره های فلاونوییدی با غلظت  $50\text{ }\mu\text{g}/\text{ml}$  بود، در حالی که عصاره تام گیاه با غلظت  $100\text{ }\mu\text{g}/\text{ml}$  توان حیاتی معنی داری را برای سلول ها نشان دادند (نمودار ۲ و ۳).




نحوه ۴- نمایش تست Sub G1 در گروه کنترل F50 و T100 در مراحل مختلف چرخه سلولی: M1 مرگ سلولی، M2 فاز G1، M3 فاز S یا سنتز و M4 فاز G2 و تقسیم را نشان می دهد

## بحث و نتیجه گیری

دیابت شیرین بیماری هتروژنیک (Heterogenic) متابولیکی است که در آن افزایش گلوکز در محیط اطراف سلول موجب سمیت در سلول ها و نهایتاً مرگ آن ها می گردد. در مطالعات گذشته نشان داده شده است که دیابت غلظت گلوکز را در سلول های عصبی تا چهار برابر افزایش داده و موجب آسیب نورونی می گردد (۱۰). افزایش گلوکز هم چنین موجب پیشبرد و آزاد سازی رادیکال های آزاد می گردد. زمانی که تولید واکنش اختصاصی اکسیژن (ROS= Reactive Oxygen Species) از عوامل خشی کننده آن بیشتر شود، استرس اکسیداتیو به وجود می آید که ممکن است منجر به مرگ سلولی شود (۱۱). شکل های فعال شده اکسیژن در ROS به دلیل هایپرگلیسمی، قادر به تغییر ساختارهای مختلف مولکولی در فرد دیابتی به روش های مختلف مانند پراکسیداسیون لیپید، اتوکسیداسیون گلوکز، و گلیکاسیون غیرآنزیماتیک پروتئین می باشند. افزایش گلوکز موجب گسیختگی زنجیره انتقال الکترون در کمپلکس III میتوکندریایی می گردد و در نتیجه اکسیداسیون، اکسیژن مولکولی بوسیله کوازنیم Q تبدیل به آنیون سوپر اکساید (Superoxide anion) می گردد. بنابراین بازده نرمال گلوکز در موقع استرسی مانند افزایش گلوکز می تواند تولید رادیکال های آزاد باشد. ترکیبات استرس اکسیداتیو در بسیاری از رده های سلولی اپیتوز و نکروز را ایجاد می کنند (۱۲). پراکسیدهیدروژن که به وسیله سوپر اکساید دیسموتاز (Superoxide dismutases) تحت افزایش گلوکز در میتوکندری ایجاد می گردد، یکی دیگر از مکانیسم های احتمالی استرس اکسیداتیو تحت دیابت است. هایپر گلیسمی در مدل های حیوانی و در محیط کشت تعدادی از مسیرهای پیچیده متابولیسمی گلوکز را فعال می کند که در نوروپاتی های دیابتی سهیم اند. از آنجا که فلاونوپیدها یک دسته وسیع از ترکیبات طبیعی با خواص بیولوژیکی و ساختار آروماتیک هتروسیکل Heterocyclic aromatic compound) می باشند که اثرات آنتی استروژنیک (Antiesterogenic) آن ها به عنوان عوامل محافظتی گزارش شده اند، تعداد قابل توجهی از انواع داروهای استفاده شده در بالین از منابع طبیعی جداسازی شده و یا با آن ها مرتبطند (۱۳). در تحقیق حاضر تاثیر عصاره تام و فلاونوپید گیاه C. lemanniana Bunge بر سلول های PC12 به



نمودار ۶- a: سلول های نکروز، UR سلول های مرحله انتهاهی اپوپتوز، LL سلول های زنده و LR سلول های آپوپتوز شده را نشان می دهد. محور افقی: سلولهای آپوپتوز شده (سلولهایی که رنگ Annexin V را جذب کرده اند)، محور عمودی: سلولهای نکروزه (سلولهایی که رنگ PI را جذب کرده اند)




نمودار ۶: نمودار مقایسه گروه X ۶ ییمار با عصاره تام و عصاره فلاوونوییدی در مراحل مختلف چرخه سلولی.


عنوان یک مدل از سلول های عصبی ارزیابی شد و نشان داده شد که این عصاره می تواند موجب جلوگیری از مرگ سلولی و محافظت آن در برابر افزایش گلوكز و سمیت آن گردد (۵). حدود ۱۰۰-۱۷۰ گونه گیاهان انگل دارد و به عنوان گیاه دارویی در چین از شهرت بالایی برخوردار است. این گیاه خواص دارویی فراوانی دارد دارویی با اثر بخشی بالا محسوب می شود. تا کنون عوارض جانبی برای استفاده از آن ذکر نشده است (۱۴). بذر گیاه *Cuscuta chinensis* یکی از رایج ترین ترکیبات گیاهی استفاده شده برای بهبود عملکرد کبد و کلیه و دیگر موارد در طب سنتی چین و تایوان می باشد (۱۵). ترکیبات شیمیایی سس شامل فلاونولهایی مانند کوئرستین، کامپفرون و گلیکوزیدهای است که این ترکیبات مسئول فعالیت های بیولوژیکی این گیاه باشند (۱۶ و ۱۷). در تحقیق حاضر از *C. lehmanniana Bunge* سس بومی ایران (اطراف شهرستان ساوه) در برابر عامل سایتوکسیک افزایش گلوكز استفاده گردید.

نتایج DPPH در مطالعه حاضر نشان داد که عصاره تام و فلاونوییدی گیاه *C. lehmanniana Bunge* دارای خاصیت به دام اندازی رادیکال های آزاد می باشد. میزان به دام اندازی رادیکال های آزاد در عصاره فلاونوییدی با غلظت ۵۰ µg/ml و غلظت های بالاتر و هم چنین میزان رادیکال های آزاد در عصاره تام با غلظت ۱۰۰ µg/ml مشابه اسید اسکوربیک بود.


غلظت  $100 \mu\text{g}/\text{ml}$  و  $200 \mu\text{g}/\text{ml}$  کاهش رادیکال های آزاد را در مقایسه با اسید آسکوربیک در غلظت  $100 \mu\text{g}/\text{ml}$  نشان داد (نمودار ۴). با توجه به نتایج گیاه C. reflexa به نظر می رسد که فلاونوپیداین گیاه در غلظت پایین تری خاصیت به دام اندازی قوی تری دارد. در این مطالعه نیز جهت بررسی اثر محافظتی این گیاه روی سلول های عصبی تحت تیمار با افزایش گلوکز از روش سنجش MTT استفاده شد. در این سنجش عصاره های تام و فلاونوپیدی گیاه مذکور نشان دادند که در یک روش وابسته به مقدار و زمان موجب محافظت از سلول های PC12 می گردد و بیشترین اثر محافظتی و جلوگیری از مرگ سلولی مربوط به عصاره های فلاونوپیدی با غلظت  $100 \mu\text{g}/\text{ml}$  به میزان  $80\%$  بود، در حالی که عصاره تام حاصل از گیاه با غلظت  $100 \mu\text{g}/\text{ml}$  توان حیاتی  $75\%$  را در زمان ۷۲ ساعت نشان داد و بین عصاره تام و فلاونوپیدی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. اثر محافظتی گیاه Hypericum perforatum روی میزان بقا و مرگ سلول های PC12 به ترتیب  $48\%$  و  $52\%$  گزارش شد، که در آن از تیمار با  $\text{H}_2\text{O}_2$  برای ایجاد سمیت در سلول ها استفاده شده بود (۱۸). به نظر می رسد فلاونوپید های گیاه lehmanniana Hypericum perforatum C. Bunge نسبت به دارای اثر محافظتی بیشتری می باشد. عصاره های بذر گیاه سس C. chinensis دارای فعالیت های آنتی اکسیدانی هستند و در سلول های محیط کشت و در موجود زنده منجر به القای خاصیت آنتی اکسیدانی و خاصیت ضد پراکسیداسیون لبید می شوند. بنندیر سال ۲۰۰۴ نشان داد که فعالیت های آنتی اکسیدانی بذر سس به میزان زیادی متناسب با مقادیر ترکیبات فعال فلاونولی یعنی کویرستین و کامپفرون می باشد، که این ممکن است به دلیل بیشتر بودن میزان کویرستین موجود در عصاره فلاونوپیدی نسبت به عصاره تام باشد (۲۰). در سال های اخیر تلاش برای تشخیص پتانسیل درمانی فلاونوپیدها، روی فلاونوپید کویرستین متمرکز شده است، که به میزان زیادی در رژیم غذایی انسانی وجود دارد و به طور کلی فلاونوپیدی با بالاترین فعالیت آنتی اکسیدانی می باشد. به نظر می رسد که میزان کویرستین این گیاه نسبت به Hypericum perforatum C. reflexa بیشتر باشد (۲۱). نتایج حاصل از رنگ آمیزی annexin با استفاده از



نمودار ۷- مقایسه درصد سلول های اپوپتوز شده به نکروز شده در عصاره فلاونوپیدی و تام گیاه سس



نمودار ۸- نمایش نسبت پروتئین Bax / Bcl2



شکل ۱- نمایش وسترن بلاستینگ بیان پروتئین Bax, Bcl2,  $\beta$  actin استخراج شده از سلول های گروه کنترل 6X و گروه تیمار شده با عصاره تام Total Extract با غلظت  $100 \mu\text{g}/\text{ml}$  و عصاره فلاونوپیدی با غلظت  $50 \mu\text{g}/\text{ml}$  پس از ۷۲ ساعت دهنده نشان دهنده کاهش بیان پروتئین Bax گروه های تحت تیمار می باشد. آزمایش سه بار تکرار شد.

C. reflexa این نتایج با نتایج قبلی روی گیاه مطابقت دارد (۱۸). درصد به دام اندازی رادیکال های آزاد در غلظت  $600 \mu\text{g}/\text{ml}$  در تحقیق مذکور در مقایسه با اسید آسکوربیک با غلظت  $20 \mu\text{g}/\text{ml}$  بود (۱۹). در حالی که در تحقیق حاضر عصاره فلاونوپیدی در

طريق مسیر داخلی آپوپتوزی یا همان اپوپتوز میتوکندریایی موجب جلوگیری مرگ سلولی گردد. البته از آن جایی که اپوپتوز دارای دو مسیر داخلی و خارجی است، پیشنهاد می‌گردد که پروتئین P53 و میزان گلوتاتیون نیز ارزیابی گردد.

با توجه به عوارض جانبی داروهای شیمیایی نسبت به داروهای گیاهی و هم چنین فلور طبیعی گیاهی ایران به نظر می‌رسد که استفاده از گیاهان دارویی می‌تواند اثرات درمانی قابل توجهی را ایجاد نماید.

### تقدیر و تشکر

این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی تحت عنوان بررسی اثر عصاره فلاونوییدی گیاه سس بر القای آپوپتوز در سلول‌های PC12 تحت تیمار با گلوكزمصوب دانشگاه آزاد اسلامی ساوه به کد ۹۶۲-۱-۱۳۰۰ می‌باشد، که با حمایت دانشگاه آزاد اسلامی ساوه اجرا شده است.

### منابع

- Shepered PR, Kan BB. Glucose transporters and insulin action implication for insulin resistance and diabetes mellitus. *N Engl J Med.* 1999; 341:248–257.
- Vinik AI, Ziegler D. Diabetic cardiovascular autonomic neuropathy. *Circulation.* 2007 Jan 23; 115(3):387-97.
- Bao X,Wang Z, Fang J, LiX. Structural features of an immunostimulating and antioxidant acidic polysaccharide from the seeds of Cuscuta chinensis. *Planta Medica.* 2002; 68:237–243.
- Yen FL, Wu TH, Lin LT, Lin CC. Hepatoprotective antioxidant effects of Cuscuta chinensis against hepatotoxicity in rats. *J Ethnopharmacol.* 2007; 123- 128.
- Liu J H, Jiang B, Bao Y M, An L J. Effect of Cuscuta chinensis glycoside on the neuronal differentiation of rat pheochromocytoma PC12 cells. *Int J Dev Neurosci.* 2003; 21: 277–281.
- Ye M, Yan Y.N., Qiao L. , Ni X.M..Studies on chemical constituents of Cuscuta chinensis.China J Chinese Materia Medica. 2002; 27: 115–117.
- Choi JA, Kim JY, Lee JY, Kang CM, Kwon HJ, Yoo YD,et al. Induction of cell cycle arrest and apoptosis in human breast cancer cells by quercetin. *Int J Oncol* 2001; 19: 837-844.
- Su SJ, Chow NH, Kung ML, Hung TC, Chang KL. Effects of soy isoflavones on apoptosis induction and G2-M arrest in human hepatoma cells involvement of caspase-3 activation, Bcl-2 and Bcl-XL downregulation, and Cdc2 kinase activity. *Nutr. Cancer.* 2003; 45: 113-123.
- Canivenc-LavierMF, Verneaut M, Totis MH,

فلوسایتمتری نشان داد که در غلظت  $T_0 = 100 \mu\text{g}/\text{ml}$  درصد سلول‌هایی که در مرحله نهایی و ابتدایی آپوپتوز هستند، تفاوت معنی داری با گروه کنترل دارد. عصاره فلاو نوییدی در غلظت  $F_0 = 50 \mu\text{g}/\text{ml}$  نیز نسبت به گروه کنترل معنی دار بود. ولی بین عصاره تام و فلاو نوییدی تفاوت معنی داری در سلول‌های آپوپتوزی و زنده مشاهده نشد. عملکرد میتوکندری در مرگ سلولی آپوپتوزی نیازمند آزاد شدن فاکتور آپوپتوزنیک میتوکندریایی از غشاء خارجی می‌باشد. نفوذ پذیری غشاء خارجی میتوکندری بوسیله اعضای خانواده Bcl 2 تنظیم می‌شود. در پستانداران خانواده Bcl 2 شامل تنظیم کننده‌های آنتی آپوپتیک و پرو آپوپتیک می‌باشند.  $Bcl_2$  پروتئین ۲۵-۲۶ کیلو دالتونی است و محل اصلی عمل آن در میتوکندری قرار دارد که آزاد شدن فاکتورهای آپوپتوزنیک را تنظیم می‌نمایند ( $Bax$ )  $22 \text{ kDa}$  پروتئین ۲۱ کیلو دالتونی و سیتوپلزی است. در هنگام القای آپوپتوز این پروتئین مجدداً در میتوکندری قرار می‌گیرد. قرار گیری مجدد  $Bax$  در میتوکندری به هردو بخش پایانه C و N آن بستگی دارد. نسبت بیان پروتئین  $Bax$  و  $Bcl_2$  تعیین کننده سرنوشت سلول و هدایت کننده آن‌ها به سمت مرگ می‌باشد. به همین دلیل مطالعات زیادی پیرامون تغییرات این دو پروتئین در سلول‌ها با تیمار‌های مختلف تا کنون انجام شده است ( $\# 23$ ). در تحقیق حاضر به روش وسترن بلاست پروتئین  $Bax$  نقش آن در اپوپتوز سلول‌های PC12 و هم چنین اثر عصاره بر روی میزان بیان آن، نشان داده شد که این پروتئین پس از تاثیر عصاره کاهاش معنی داری داشته است که نماینده جلوگیری از مرگ سلولی با دخالت میتوکندری با واسطه پروتئین  $Bax$  و از طريق مسیر داخلی می‌باشد. به این ترتیب در این مطالعه معلوم شد که عصاره گیاه *C. lehmanniana* Bunge می‌تواند رادیکال‌های آزاد را با غلظت پایین تر  $50 \mu\text{M}$  و میکروگرم در میلی لیتر به میزان بیشتری ( $\# 89$  %) نسبت به عصاره‌های گیاهی دیگر ذکر شده مهار نماید، هم چنین به دام اندازی بیشتر رادیکال‌های آزاد و اثر محافظتی عصاره با سنجش Annexine C تایید شد و نشان داده شد که درصد جلوگیری از مرگ سلولی آپوپتوزی آن نیز معنی دار است. سنجش وسترن بلاستینگ نشان داد که با مهار بیان پروتئین  $Bax$  و نسبت بین بیان  $Bax/Bcl_2$  این عصاره می‌تواند از

Siess J, Magdalou , Suschetet M. Comparative effects of flavonoids and model inducers on drug-metabolizing enzymes in rat liver. *Toxicology* 1996;114:19–27.

10. Tomlinson DR, Gardiner NJ .Glucose neurotoxicity. *Nat Rev.* 2008; 25:612-628.

11. Ghosh S, An D, Pulinikunnil T, Qi D, Lau HC, Abrahani A, et al. Role of dietary fatty acids and acute hyperglycemia in modulating cardiac cell death. *Nutrition.* 2004; 20:916-23.

12. Schulz JB, Matthews RT, Beal MF. Role of nitric oxide in neurodegenerative diseases. *Curr Opin Neurol.* 1995; 8: 480–486.

13- Kumar N, K. Allen, D. Riccardi, A. Kazi , J. Heine. Isoflavones in breast cancer chemoprevention: where do we go from here? *Front Biosci.* 2004; 9: 2927–2934.

14-Guo C, Zhang Z, Zheng H, Shu Z, Li C. Studies of the herbal and botanical origins of semen Cuscutae. *Zhongguo Zhong Yao Za Zhi* .1990; 15: 138-40.

15-Cragg GM, Newman DJ. Antineoplastic agents from natural sources: achievements and future directions. *Expert Opinion on Investigational Drugs.*2000; 9: 151-159.

16- Zheng H Z, Dong Z H, She J. *Tusizi* .Modern study of traditional Chinese medicine. Beijing: Beijing Xue Yuan Press of the People's Republic of China. 1st Ed. 1998; pp. 4110–4120.

17- Williamson G, Barron D, Shimoi K, Terao J . In vitro biological properties of flavonoid conjugates found in vivo. *Free Radical Res.* 2005; 39: 457–469.

18- Amol P, Vikas P, Kundan C, Vijay P. Invitro free radicals scavenging activity of stems of cuscuta reflexa. *J Pharmacy Res* 2009; 2: 58-62.

19- Benedi J, Arroyo R, Romero C, Martin S, Villar A M. Antioxidant properties and protective effects of standardized extract of Hypericum perforatum on hydrogen peroxide- induced oxidative damage in PC12 cells. *Life Sci.* 2004; 75:1263-1276

20- Feng-LinYen, Tzu-Hui Wu, Liang-Tzung Lin, Thau -Ming Cham, Chun- Ching Lin. Nanoparticles formulation of Cuscuta chinensis prevents acetaminophen-induced hepatotoxicity in rats. *Food and Chemical toxicol.* 2008; 46: 1771–1777.

21- Rice-Evans C A, Miller N J, Paganga G. Structure-antioxidant activity relationships of flavonoids and phenolic acids . *Free Radical Biol. Med.*1996; 20: 933–956.

22- Oltvai ZN, Millman CL, Korsmeyer SJ. Bcl-2 heterodimerizes in vivo with a conserved homolog, Bax that accelerates programmed cell death .*Cell.* 1993; 74:609-619.

23- Shimizu S, Narita M, Tsujimoto Y. Bcl-2 family proteins regulate the release of apoptogenic cytochrome c by the mitochondrial channel VDAC. *Nature.* 1999; 399:483–487.

## Study of the antioxidant effects of total and flavonoids extracts of *Cuscuta lehmanniana* Bunge against on PC12 cells in vitro diabetic model

**Mona Farhadi, PhD.** Assistant Professor of Embryology, Biology group, Agriculture Faculty, Azad Islamic University of Saveh, Saveh, Iran. monafarhadi@yahoo.com

**\*Seyed Behnamaddin Jameie, PhD.** Associate Professor of Anatomy and Neuroscience, Basic Sciences Department, Faculty of Allied Medicine & Anatomy Department, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (\*Corresponding author). behnamjameie@tums.ac.ir

**Parisa Hayat, BSc.** Medical laboratory technician, Cellular and Molecular Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. parisa\_h56@yahoo.com

### Abstract

**Background:** Central and peripheral neuropathies are the most common side effects of Diabetes Mellitus (DM). The exact mechanisms of diabetic neurotoxicity are still unknown. Recently oxidative stress is introduced as one of the factors for diabetics' neuropathies. Antioxidants also used as therapeutic agents to reduce the side effects of diabetes. In the present research the antioxidant effects of total and flavonoid extracts of *Cuscuta lehmanniana* Bunge on high glucose induced PC12 were studied.

**Methods:** PC12 cell line treated with high glucose was used. Total and flavonoid extract of *C. lehmanniana* Bungs were prepared. PC12 cells treated with 6X fold high glucose concentration exposed to extracts. Antioxidant activity of extracts, cell viability and apoptosis were studied by DPPH, MTT, Annexin staining and Western Blotting respectively.

**Results:** The MTT result showed 50 $\mu$ g/ml of flavonoid extract and 100 $\mu$ g/ml of total *C. lehmanniana* Bungs extract increased cell viability after 3 hours pretreatment. DPPH assay demonstrated 50  $\mu$ g/ml flavonoid extract can increased radical scavenging inhibits compare with ascorbic acid. Several assays were used for evaluated of anti apoptotic effect such as: Annexin, SubG1 and Western blotting for expression of Bax protein.

**Conclusion:** Based on our findings, it is concluded that both total and flavonoid extract of *C. lehmanniana* Bungs have the potential to protect PC12 cells against glucose neurotoxicity by reducing apoptosis via increased Bax expression protein.

**Keywords:** PC12 cells, Diabetic neuropathy, *C. lehmanniana* Bunge.