

## بررسی اثر تجویز مزمن خوراکی ریشه بوزیدان (Withania somnifera) بر شدت درد موشهاي صحرائي نر دیابتي

مهرداد روغنی<sup>\*</sup>، توراندخت بلوچ نژاد مجرد<sup>\*\*</sup>، محسن خلیلی<sup>\*</sup>، سیده فاطمه مهدوی سلیمانی<sup>\*\*\*</sup>

### چکیده

**هدف:** هیپرآلرژی یکی از علائم بارز دیابت قندی در میان مدت محسوب می شود که بر کیفیت زندگی افراد مبتلا تاثیر دارد. با توجه به وجود شواهد تحقیقاتی مبنی بر اثر ضد دیابتی بوزیدان، در این بررسی اثر ضد دردی ریشه این گیاه در موشهاي صحرایی دیابتی شده در مراحل حاد و مزمن آزمون فرمالین مورد ارزیابی قرار گرفت.

**روش بررسی:** موشها به شش گروه کنترل، کنترل تحت تیمار با بوزیدان، کنترل دریافت کننده سدیم سالیسیلات، دیابتی، دیابتی دریافت کننده سدیم سالیسیلات، و گروه دیابتی تیمار شده با بوزیدان تقسیم شدند. برای دیابتی شدن از داروی استرپتوزوتوسین به میزان ۶۰ میلی گرم بر کیلوگرم بطور داخل صفاقی استفاده گردید. دو گروه تحت تیمار با بوزیدان نیز پودر مخلوط شده این گیاه با غذای استاندارد موش (۲۵/۶۷ درصد) را دریافت نمودند.

**یافته ها:** نتایج نشان داد که نمرات درد در موشهاي دیابتی پس از گذشت دو ماه در دو فاز حاد و مزمن بدنبال تجویز کف پایی فرمالین بیشتر از موشهاي کنترل بوده و درمان با بوزیدان به مدت دو ماه موجب کاهش معنی دار در نمرات درد در مراحل حاد و مزمن می گردد ( $p < 0.05$ ). ضمناً با تجویز سدیم سالیسیلات به موشهاي دیابتی، کاهش معنی دار در نمره درد فقط در مرحله مزمن آزمون فرمالین مشاهده گردید ( $p < 0.1$ ).

**نتیجه گیری:** از طرف دیگر کاهش معنی دار در نمرات درد در گروه کنترل تیمار شده با بوزیدان در مقایسه با گروه کنترل مشاهده نشد. بطور خلاصه نتیجه گیری می شود که تجویز خوراکی بوزیدان به مدت دو ماه موجب کاهش معنی دار میزان احساس درد در مدل تجربی دیابت قندی القا شده توسط استرپتوزوتوسین گردیده که این می تواند بعنوان یک درمان کمکی در هیپرآلرژی دیابتی مطرح گردد.

**کلید واژه گان:** بوزیدان، درد، دیابت تجربی، موش صحرایی

### مقدمه

نظیر کتواسیدوز و اغمای هیپراسمولار و با یک اختلال متابولیک مزمن و عوارض نامطلوب در درازمدت نظری رتینوپاتی، گرفتاری عروق کلیوی، نوروپاتی، ضایعات پوستی، اختلالات دستگاه قلب و گرداش خون همراه می باشد<sup>(۱)</sup>.

بیماری دیابت قندی یکی از شایعترین بیماریهای غدد درون ریز بدن محسوب می شود که بر اساس پیش بینی بعمل آمده، شیوع آن در جامعه انسانی در آینده بیش از این افزایش خواهد یافت<sup>(۱)</sup>. کمبود و یا کاهش نسبی میزان انسولین در این بیماری، با عوارض متابولیکی حاد

\*دانشیار گروه فیزیولوژی و مرکز تحقیقات گیاهان داروئی دانشگاه شاهد

\*\*دانشیار گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

\*\*\*دانشجوی پزشکی، دانشگاه شاهد

۱- نویسنده مسئول

دریافت مقاله: ۱۳۸۴/۶/۱۹ دریافت مقاله اصلاح شده: ۱۳۸۵/۷/۲۲ اعلام قبولی: ۱۳۸۶/۱/۲۸

طرف دیگر، بوزیدان به عنوان یک دارو برای بیماران مبتلا به خستگی مفرط با مشاً عصبی، عدم توانایی در به خواب رفتن، و ناتوانیهای ناشی از استرس فیزیکی و روانی کاربرد دارد و دارای خاصیت محرك سیستم ایمنی در بیماران با کاهش شدید تعداد گلولول سفید می باشد (۱۳). لذا با توجه به اینکه قبل اثر هیپوگلیسمیک، دیورتیک، و هیپوکلسترولمیک تجویز خوراکی ریشه گیاه بوزیدان در افراد مبتلا به دیابت قندی نوع ۲ مورد تأیید قرار گرفته است و از نظر بالینی عارضه جانبی خاص بر اثر مصرف آن مشاهده نشده است (۱۴) و هملاً اند همکاران (۲۰۰۴) اثر هیپوگلیسمیک میوه برخی گیاهان خانواده سولاناسه که بوزیدان نیز در این گروه قرار می گیرد را در مدل تجربی دیابت قندی نوع ۱ القا شده توسط استرپتوزو توسین در موش صحرایی نشان داده اند (۱۵)، با توجه به این یافته ها، در تحقیق حاضر، اثر ضد دردی تجویز درازمدت و خوراکی ریشه بوزیدان در مدل تجربی دیابت قندی القا شده توسط داروی استرپتوزو توسین در موش صحرایی نر به کمک آزمون فرمالین مورد بررسی قرار گرفت.

### روش بررسی

در این تحقیق از موشهای صحرایی نر سفید نژاد Wistar (n=۵۴) تهیه شده از انستیتو پاستور تهران در محدوده وزنی  $۳۵ \pm ۳۰۰$  گرم پس از ۱ ماه قرنطینه در شروع بررسی استفاده گردید. تمام حیوانات در خانه حیوانات در دمای  $۲۰-۲۲^{\circ}\text{C}$  در گروههای ۳-۴ تابی در هر قفس قرار داده شدند. ضمناً حیوانات آزادانه به آب و غذای فشرده مخصوص موش ساخت شرکت خوراک دام پارس و غذای مخلوط شده با پودر ریشه بوزیدان به نسبت ۶/۲۵ درصد به مدت دو ماه دسترسی داشتند (۸). روش تهیه غذای حاوی بوزیدان: پس از خریداری ریشه گیاه بوزیدان از بازار محلی و تأیید علمی توسط بخش گیاه شناسی دانشگاه شهید بهشتی (نورانی و همکاران)، پودر

درد ناشی از نوروپاتی اعصاب محیطی یکی از شکایات مهم بالینی افراد مبتلا به دیابت قندی محسوب می شود و کیفیت زندگی این افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین تعديل درد در این افراد از اهمیت زیادی برخوردار است (۳،۴). نتایج برخی تحقیقات اخیر نشان می دهد که بروز هیپرگلیسمی با اعمال اثرات توکسیک بر روی سیستم عصبی محیطی یکی از علل بروز نوروپاتی در دنناک می باشد. علاوه بر این هیپرگلیسمی با تغییر دادن عملکرد باقهای عمومی بدن موجب یکسری تغییرات خاص شیمیایی در بدن می گردد که خود می تواند موجب بروز نوروپاتی شود (۵). بر خلاف شواهد موجود، نتایج برخی تحقیقات دیگر نشان می دهد که هیپرگلیسمی تاثیری در تغییر آستانه درد ندارد (۶). با توجه به اینکه تا کنون ترکیب دارویی مناسب (نظری سالیسیلاتها و ترکیبات ضد التهابی غیر استروئیدی) عاری از عوارض جانبی برای درمان برخی حالات درد حاد و مزمن بویژه در مورد دیابت قندی یافت نمی شود (۷)، لذا توجه محققان بسیاری به گیاهان دارویی منبع مناسبی جهت ارتباط طب سنتی و گیاهان دارویی منبع مناسبی جهت یافتن داروهای ضد درد می باشد (۸). در این خصوص، بوزیدان یک گیاه با خواص دارویی مهم در طب سنتی در دنیا محسوب می گردد (۹). از نظر تاریخی، این گیاه دارای خواص تقویت کننده، ترمیم کبدی، و ضدالتهاب بوده و در طی سالیان اخیر کاربرد آن در درمان و یا بهبودی برانشیت، آسم، زخم، اختلالات خواب، و زوال عقل در پیری، دیس کینزی و سکته مغزی مورد تائید قرار گرفته است (۱۰). علاوه نتایج تحقیقات بالینی و آزمایشگاهی بر روی نمونه های حیوانات نشان می دهد که این گیاه در مورد اضطراب و بیماریهای شناختی و برخی اختلالات عصبی نظری بیماری پارکینسون می تواند سودمند باشد (۱۱). همچنین جدیداً استفاده از این گیاه به عنوان یک داروی جانبی در ارتباط با شیمی درمانی و رادیوتراپی در بیماران سرطانی مطرح شده است (۱۲). از

پای چپ حیوان تزریق شد و شدت درد حیوان بر اساس تقسیم بندی زیر به چهار درجه تفکیک گردید: (۰) - حیوان بدون احساس درد روی پای تزریق شده می ایستد و راه می رود. (۱) - پای حیوان با محفظه تماس داشته ولی حیوان وزن بدن خود را بیشتر روی پای سالم خود می اندازد. (۲) - حیوان پنجه دردنگ را کاملا از سطح محفظه بلند می نماید. (۳) - حیوان پنجه تزریق شده را از شدت درد می لیسد، گاز می گیرد یا به شدت تکان می دهد ثبت پاسخ های رفتاری بالافاصله پس از تزریق فرمالین آغاز و تا دقیقه ۶۰ ادامه می یافتد. در این ارتباط پاسخ در هر ۱۵ ثانیه ثبت و به عنوان شاخصی از میزان درد در آزمون فرمالین در نظر گرفته می شد. با استفاده از این روش اعداد ۰ تا ۳ برای امتیاز درد در زمان های مختلف بدست می آید. میانگین درد در هر دقیقه اول بعد از تزریق فرمالین به عنوان مرحله اول یا حاد و در دقایق ۱۶ تا ۶۰ بعنوان مرحله دوم یا مزمن در نظر گرفته شد. محاسبه نمره درد بر اساس متده Dubuisson انجام پذیرفت (۱۶)

آنالیز آماری تمام داده ها در بررسی حاضر به صورت  $\pm$  S.E.M. میانگین بیان شده است. برای آنالیز آماری Repeated measure ANOVA در مورد نتایج وزن و گلوکز از آزمون One-way ANOVA و در مورد درد از آزمون Tukey شدن از آزمون استفاده گردید. بعلاوه،  $p < 0.05$  بعنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شد.

### بحث

در بررسی حاضر، وزن موشها در هفته قبل از القا دیابت و در هفته های چهارم و هشتم پس از بررسی تعیین گردید (جدول ۱). از نظر وزن حیوانات در هفته های پس از بررسی، در موشها دیابتی تیمار نشده، یک کاهش

بدست آمده از آسیاب نمودن ریشه با یک نسبت وزنی ۶۷/۲۵ درصد با غذای پودر شده و استاندارد موش مخلوط و مجدداً غذای فشرده تولید گردید (۸).

### یافته ها

در این بررسی از آن دسته موشهای صحرایی استفاده شد که در شرایط طبیعی بدون برقراری حالت روزه داری میزان گلوکز سرم آنها پائین تر از حد ۲۵۰ میلی گرم/ دسی لیتر بود. کترل، کترل دریافت کننده بوزیدان، کترل دریافت کننده سدیم سالیسیلات، دیابتی، دیابتی دریافت کننده سدیم سالیسیلات (کترل مثبت) و دیابتی دریافت کننده بوزیدان تقسیم شدند. دو گروه کترل و دیابتی دریافت کننده سدیم سالیسیلات پس از گذشت دو ماه، سدیم سالیسیلات را به میزان ۲۰۰ میلی گرم/ کیلو گرم (سیگما، آلمان) بطور داخل صفاقی یک ساعت قبل از انجام بررسی دریافت نمودند (۱۵). برای دیابتی نمودن حیوانات از داروی STZ<sup>۱</sup> به صورت تک دوز و داخل صفاقی به میزان ۶۰ میلی گرم/ کیلو گرم حل شده در محلول سرم فیزیولوژیک سرد استفاده گردید (۱۶). حجم تزریق محلول به حیوانات در هر گروه ۵ میلی لیتر بود. پس از گذشت دو ماه، آزمون فرمالین بر روی تمام موشها انجام گرفت. در این ارتباط در مورد هر موش آزمون فرمالین فقط یک بار انجام پذیرفت. اندازه گیری میزان گلوکز سرم توسط روش آنزیمی گلوکز اکسیداز تهیه شده از شرکت زیست شیمی، تهران و با استفاده از اسپکترو فوتومتر<sup>۲</sup> قبل از انجام کار و در هفته های چهارم و هشتم قبل از انجام آزمون درد انجام پذیرفت.

آزمون فرمالین: برای این آزمون از روش متداول Dubuisson and Dennis<sup>۳</sup> استفاده گردید (۱۶). بدین ترتیب که حیوان در یک محفظه از جنس پلکنسی گلاس ( $40 \times 40 \times 40$  سانتیمتر) در تحت شرایط آرام قرار گرفته و پس از گذشت یک ساعت، ۵۰ میکرولیتر از محلول فرمالین ۲/۵ درصد به صورت زیر جلدی به کف

(جدول ۱). در هفته قبل از بررسی هیچگونه تفاوت معنی دار بین گروهها مشاهده نگردید. همچنین، در مoshهای دیابتی درمان نشده، افزایش معنی دار سطح گلوکز در هفته های چهارم و هشتم ( $p<0.001$ ) پس از بررسی در مقایسه با هفته قبل بررسی مشاهده گردید بعلاوه تیمار گروه دیابتی با بوزیدان هیچگونه تغییر معنی دار در سطح گلوکز در همین هفته ها در مقایسه با گروه دیابتی ایجاد ننمود، هر چند که میزان گلوکز در گروه دیابتی تیمار شده به میزان  $10/6$  درصد و  $11/2$  درصد کمتر از گروه دیابتی تیمار نشده به ترتیب در هفته های چهارم و هشتم بود.

معنی دار در وزن در هفته های چهارم ( $p<0.01$ ) و هشتم ( $p<0.005$ ) نسبت به هفته قبل بررسی مشاهده گردید.

### 1-Upjohn, France

### 2- Spectronic, USA

علاوه، مoshهای دیابتی تحت تیمار با بوزیدان نیز مشابه گروه دیابتی درمان نشده کاهش وزن را در هفته های چهارم و هشتم در مقایسه با گروه کترول نشان دادند ( $p<0.05$  و  $p<0.01$ )، هر چند که این کاهش بطور غیر معنی دار کمتر از گروه دیابتی درمان نشده بود. در این بررسی، میزان گلوکز سرم نیز در هفته قبل از بررسی و در هفته های چهارم و هشتم پس از بررسی تعیین گردید


جدول ۱: اثر تجویز خوراکی ریشه بوزیدان بر میزان وزن و گلوکز سرم در مoshهای صحرابی کترول و دیابتی

میزان گلوکز سرم (میلی گرم بر دسی لیتر)				وزن بدن (کرم)			
۸ هفته	۴ هفته	۰ (قبل از بررسی)	۸ هفته	۴ هفته	۰ (قبل از بررسی)	۰ هفته	
$123/4 \pm 9/7$	$148/5 \pm 10/6$	$139/3 \pm 9/2$	$321/6 \pm 9/1$	$309/8 \pm 8/3$	$299/2 \pm 9/6$	کترول	
$127/6 \pm 9/2$	$142/6 \pm 8/9$	$145/2 \pm 10/1$	$322/5 \pm 11/4$	$318/3 \pm 10/5$	$312/6 \pm 9/1$	دیابتی	
$411/3 \pm 13/9****$	$423/2 \pm 18/4****$	$138/4 \pm 11/3$	$207/4 \pm 10/7***$	$220/1 \pm 12/6**$	$291/6 \pm 10/3$	دیابتی + بوزیدان	
$365/0 \pm 17/6****$	$378/4 \pm 15/1***$	$129/9 \pm 8/3$	$238/3 \pm 15/4**$	$277/1 \pm 10/8*$	$315/7 \pm 11/4$		

(در مقایسه با هفته قبل بررسی)  $P<0.05$  \*،  $p<0.01$  \*\*،  $p<0.005***$ ،  $p<0.001$  \*\*\*\* (در مقایسه با هفته قبل بررسی)

دار بین دو گروه دیابتی دریافت کننده سدیم سالیسیلات و بوزیدان مشاهده نگردید، از طرف دیگر، تجویز خوراکی بوزیدان به مدت دو ماه به Moshهای کترول و دیابتی شده بترتیب موجب کاهش نمرات درد در دو فاز حاد و مزمن آزمون فرمالین در مقایسه با گروه کترول و دیابتی درمان نشده به میزان  $10/1$  درصد (غیر معنی دار) و  $7/2$  درصد (غیر معنی دار) برای گروه کترول تیمار شده و به میزان  $6/1$  درصد ( $p<0.05$ ) و  $6/16$  درصد ( $p<0.05$ ) برای گروه دیابتی تیمار شده گردید.

شکل ۱: نتایج حاصله از آزمون فرمالین را در دو فاز حاد و مزمن در گروههای مختلف نشان می دهد. تزریق کف پایی فرمالین یک پاسخ بارز دو فازی را در تمام گروهها ایجاد نمود. هیپرآلرژی القا شده بر اثر فرمالین در Moshهای دیابتی درمان نشده در هر دو فاز تست فرمالین بیشتر از گروه کترول بود ( $p<0.05$ ). علاوه تجویز سدیم سالیسیلات به Moshهای گروه کترول و دیابتی به ترتیب موجب کاهش معنی دار نمره درد فقط در فاز دوم آزمون فرمالین در مقایسه با گروههای کترول و دیابتی گردید ( $p<0.01$  و  $p<0.05$ ). علاوه هیچگونه تفاوت معنی



شکل ۱: اثر تجویز خوراکی بوزیدان مخلوط شده با غذای استاندارد موش (به نسبت ۱/۱۵) بر میزان احساس درد در آزمون فرمالین در موشهای دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین پس از گذشت دو ماه در دو مرحله حاد و مزمن  
\*) p<0.05 (## در مقایسه با گروه کنترل # در مقایسه با گروه دیابتی

### نتیجه‌گیری

(۱۸). بعلاوه وجود حالت دیابت پردازش سیگنانهای درد را در ناحیه نخاع تحت تاثیر قرار می‌دهد (۱۷-۱۸). از طرف دیگر نتایج تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که موشهای صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین را می‌توان عنوان مدل درد مزمن به حساب آورد که در مورد آن نشانه‌های پردردی و آلدودینی<sup>۱</sup> در کوتاه مدت (۱۱ الی دو ماه) بخوبی مشاهده می‌شود (۱۹). با توجه به اینکه در فاز مزمن تست فرمالین در موجودات نرمال و دیابتی شده مکانیسمهای محیطی و در فاز حاد آن مکانیسمهای مرکزی دخالت دارند (۲۰-۲۱)، و تزریق داخل صفاقی سدیم سالیسیلات به موشهای گروه کنترل و دیابتی موجب کاهش میزان احساس درد فقط در فاز دوم آزمون گردید، لذا این ماده از طریق یک مکانیسم محیطی اثرات خود را اعمال می‌کند که تحقیق حاضر مؤید این نظر است. نتایج بدست آمده در این بررسی نشان داد که مصرف خوراکی ریشه بوزیدان در گروه دیابتی به مدت دو ماه هر چند فائق اثر هیپوگلیسیمیک در حد معنی دار

نتایج بررسی حاضر نشان داد که تجویز خوراکی ریشه بوزیدان کاهش معنی دار در میزان گلوکز سرم در گروه دیابتی در مقایسه با گروه دیابتی تحت درمان بوجود نمی‌آورد در حالیکه یک اثر آنالژزیک بازد در موشهای دیابتی شده تحت تیمار در آزمون فرمالین اعمال می‌نماید. در این ارتباط، نتایج تحقیقات قبلی نشان داده است که موشهای صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین بطور غیرمنتظره یک رفتار شدید شده مربوط به درد را در آزمون فرمالین بدنیال تجویز محركهای شیمیایی بداخل پنجه پا پس از گذشت ۳-۴ هفته نشان می‌دهند که خود دلالت بر وجود مکانیسمهای غیر نرمال و متعدد در پردازش سیگنانهای محیطی درد دارد (۱۷). قبلاً وجود هیپرآلژزی مکانیکی عنوان اولین نشانگان نوروپاتی دیابتیک به اثبات رسیده است که علت آن تا حدودی به اثرات توکسیک مقداری بالای گلوکز بر سیستم عصبی محیطی و فعال شدن مسیرهای بیوشیمیایی آلدوز ردوکتاز و الکلهای با چند گروه هیدروکسیل نسبت داده شده است

توسط ایزوپرالین در موش صحرایی می باشد که از این نظر قابل مقایسه با قدرت اثر ویتامین E از نظر خاصیت آنتی اکسیدانتی و حفاظت قلبی - عروقی است (۲۲). همچنین، نتایج تحقیقات گوپتا و همکاران (۲۰۰۳) نشان داد که تیمار با بوزیدان به یک فرم واپسته به دوز موجب کاهش فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و مهار پراکسیداسیون لیپیدی و اکسیداسیون پروتئینی القا شده توسط مس در موش کوچک آزمایشگاهی می گردد که بر این اساس در برقراری سلامت جسم و روان مؤثر خواهد بود (۱۲). بطور خلاصه، مصرف خوراکی و درازمدت ریشه بوزیدان با یک نسبت وزنی ۱/۱۵ هر چند فاقد اثر هیپوگلیسمیک بارز در موشهاي صحرایی دیابتی می باشد، ولی یک اثر آنالژیک در حد ملایم تا متوسط در حیوانات دیابتی شده اعمال می نماید و این بعنوان یک درمان کمکی در هیپرآلزی دیابتی مطرح می گردد.

### قدرتانی

بخشی از بودجه تحقیقاتی پژوهش حاضر از محل اعتبار پژوهشی معاونت پژوهشی دانشگاه شاهد (۱۳۸۳-تهران) تأمین شده است. ضمناً نویسندها مقاله مراتب تشکر و افر خود را از سرکار خانم فربیا انصاری کارشناس گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی شاهد در تهیه مواد و وسایل پژوهش و کمک به انجام آزمایشات اعلام می دارند.

بوده، ولی موجب کاهش معنی دار پاسخ درد در هر دو

1- Allodynia  
فاز آزمون فرمالین در موشهاي دیابتی می گردد. نتایج تحقیقات قبلی توسط Hemalatha و همکاران (۲۰۰۴) اثر هیپوگلیسمیک میوه برخی گیاهان خانواده Solanaceae که بوزیدان نیز در این گروه قرار می گیرد را در مدل تجربی دیابت قدمی نوع ۱ القا شده توسط استرپتوزوتوسین در موش صحرایی نشان داده اند (۱۵) که که علت تفاوت تا حدودی به استفاده از ریشه گیاه در تحقیق حاضر و تفاوت در مواد مؤثره اجزاء مختلف گیاه مربوط می باشد. بعلاوه، در بررسی حاضر اثر سودمند و آنالژیک مصرف مزمن و خوراکی ریشه بوزیدان در حیوانات دیابتی پس از دو ماه مورد تأیید قرار گرفت. در این خصوص قبلاً مشخص شده است که بروز دیابت استرپتوزوتوسین موجب افزایش استرس اکسیداتیو ناشی از تشدید تشکیل رادیکالهای فعل اکسیژن در برخی نواحی مغز می شود و درمان با عصاره بوزیدان موجب کاهش پراکسیداسیون لیپیدی و در نتیجه تخفیف دژنراسیون در مغز می گردد (۱۲-۱۳). از طرف دیگر، در بررسی انجام شده توسط موهانی و همکاران (۲۰۰۴) مشخص شد که تجویز عصاره هیدروالکلی بوزیدان به فرم خوراکی به مدت چهار هفتاه دارای خاصیت محافظت کننده قلب در مدل تجربی نکروز میوکارد القا شده

### منابع

- 1-Tripathi BK, Srivastava AK. Diabetes mellitus: complications and therapeutics. Med Sci Monit 2006;12:RA130-47
- 2-Gleckman R, Mory J. Diabetes-related foot infection. J of Contemporary Internal Med 1994; 6: 57-62.
- 3-Galer BS, Gianas A, Jensen MP. Painful diabetic polyneuropathy: epidemiology, pain description, and quality of life. Diabetes Res Clin Pract 2000; 47: 123-8.
- 4-Dobretsov M, Hastings SL, Romanovsky D, Stimers JR, Zhang JM. Mechanical hyperalgesia in rat models of systemic and local hyperglycemia. Brain Res 2003; 960: 174-83.

- 5-Dobretsov M, Hastings SL, Stimers JR, Zhang JM. Mechanical hyperalgesia in rats with chronic perfusion of lumbar dorsal root ganglion with hyperglycemic solution. *J Neurosci Methods* 2001; 110: 9-15.
- 6-Raz I, Hasdai D, Seltzer Z, Melmed RN. Effect of hyperglycemia on pain perception and on efficacy of morphine analgesia in rats. *Diabetes* 1988; 37: 1253-9.
- 7-Nakamura-Craig M, Follenfant R L. Effect of lamotrigine in the acute and chronic hyperalgesia induced by PGE2 and in the chronic hyperalgesia in rats with streptozotocin-induced diabetes. *Pain* 1995; 63, 33-7.
- 8-Swanston-Flatt SK, Day C, Bailey CJ, Flatt PR. Evaluation of traditional plant treatments for diabetes: studies in streptozotocin diabetic mice. *Acta Diabetol Lat* 1989; 26(1):51-5.
- 9-Mishra LC, Singh BB, Dagenais S. Scientific basis for the therapeutic use of *Withania somnifera* (ashwagandha): review. *Altern Med Rev* 2000; 5:334-46.
- 10-Czap K. *Withania somnifera* – monograph. *Altern Med Rev* 2004; 9:211-4.
- 11-Ahmad M, Saleem S, Ahmad AS, Ansari MA, Yousuf S, Hoda MN, Islam F. Neuroprotective effects of *Withania somnifera* on 6-hydroxydopamine induced Parkinsonism in rats. *Hum Exp Toxicol* 2005; 24:137-47.
- 12-Gupta SK, Dua A, Vohra BP. *Withania somnifera* (Ashwagandha) attenuates antioxidant defense in aged spinal cord and inhibits copper induced lipid peroxidation and protein oxidative modifications. *Drug Metabol Drug Interact* 2003; 19:211-22.
- 13-Dhuley JN. Effect of ashwagandha on lipid peroxidation in stress-induced animals. *J Ethnopharmacol* 1998; 60:173-8.
- 14-Andallu B, Radhika B. Hypoglycemic, diuretic and hypcholesterolemic effect of winter cherry (*Withania somnifera*, Dunal) root. *Indian J Exp Biol* 2000; 38:607-9.
- 15-Hemalatha S, Wahi AK, Singh PN, Chansouria JP. Hypoglycemic activity of *Withania coagulans* Dunal in streptozotocin induced diabetic rats. *J Ethnopharmacol* 2004; 93:261-264.
- 16-Dubuisson D, Dennis SG: The formalin test: a quantitative study of the analgesic effects of morphine, meperidine, and brain stem stimulation in rats and cats. *Pain* 1977; 4: 161-74.
- 17-Cesena RM, Caleutt NA. Gabapentin prevents hyperalgesia during the formalin test in diabetic rats. *Neurosci Lett* 1999; 262: 101-4.
- 18-Calcutt NA. Potential mechanisms of neuropathic pain in diabetes. *Int Rev Neurobiol* 2002; 50: 205-28.
- 19-Piercy V, Banner SE, Bhattacharyya A, Parsons AA, Sanger GJ, Smith SA, Bingham S. Thermal, but not mechanical, nociceptive behavior is altered in the Zucker Diabetic Fatty rat and is independent of glycemic status. *J Diabetes Complications* 1999; 13: 163-9.
- 20-Shibata, M., Ohkubo, T., Takahashi, H., Inoki, R. Modified formalin test: characteristic biphasic pain response. *Pain* 1989; 38: 347-52.
- 21-Rosland, J.H., Tjolsen, A., Maehle, B., Hole, K. The formalin test in mice-effect of formalin concentration. *Pain* 1990; 42: 235-42.
- 22-Mohanty I, Arya DS, Dinda A, Talwar KK, Joshi S, Gupta SK. Mechanisms of cardioprotective effect of *Withania somnifera* in experimentally induced myocardial infarction. *Basic Clin Pharmacol Toxicol* 2004; 94:184-90.