



هنگاریابی مقیاس تجدید نظر شده حافظه و کسلر در شهر شیراز

مریم اورنگی^{*}، دکتر محمد کاظم عاطف وحید^{**}، دکتر حسن عشايري^{***}

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش آماده سازی، انطباق و هنگاریابی مقیاس تجدید نظر شده حافظه و کسلر در شهر شیراز، بررسی پایایی و روایی، تهیه جداولها و نمرات هنگاری آن در سنین ۱۶-۶۴ سال بوده است. **روش:** پس از انجام پژوهش مقدماتی، فرم فارسی پرسشنامه یاد شده تهیه شد. آزمودنیهای پژوهش را ۲۰۵ آزمودنی بهنگار تشکیل داده اند که در چهار گروه سنی ۱۶ سال تمام تا ۶۴ سال و ۱۱ ماه با استفاده از مقیاس یاد شده مورد آزمون قرار گرفتند. **نتیجه:** داده های به دست آمده از عملکرد آزمودنیها به پنج نمره ترکیبی، نمرات استاندارد و پنج شاخص ترکیبی تبدیل گردید. همچنین رتبه های درصدی منطبق با پنج نمره ترکیبی در هر گروه سنی تهیه گردید. پایایی مقیاس به شیوه بازآزمایی محاسبه شد. ضریب های بازآزمایی برای خرده آزمونها و ترکیبها از ۰/۹۸ تا ۰/۹۱ به دست آمد که در حد رضایت بخش می باشد. همچنین خطای معیار اندازه گیری محاسبه شد که پایاترین شاخص، شاخص توجه/تمرکز و سپس شاخص حافظه کلامی بود. به منظور بررسی روایی مقیاس، اجرای مقیاس روی گروه بالینی دارای آسیب حافظه یا مشکوک به آن، صورت گرفت. این گروه در پنج شاخص با نمونه هنگاریابی مقایسه شد که نمرات پایین در شاخصهای مقیاس برای گروه بالینی به دست آمد.

Andeesheh
Va
Raftari
اندیشه و رفخار

۵۶

کلید واژه: مقیاس حافظه و کسلر، هنگاریابی، حافظه

*کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، خیابان قرآن، بیمارستان ابن سينا (نویسنده مسئول).

** دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. تهران، خ طالقانی، کوچه جهان، پلاک ۱، انتیتو روانپزشکی تهران.

*** نورولوژیست، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. تهران، خیابان میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید شاه نظری، دانشکده علوم توانبخشی.

بالینی سودمندی برای ارزیابی ابعاد اساسی
Archive of SID
کارکردهای حافظه در جوانان و بزرگسالان و به عنوان یک وسیله سرند^{۱۷} تشخیصی در معاينه عصب شناختی عمومی در نظر گرفته شده است (وکسلر، ۱۹۸۷) و بررسیها ساده بودن و کاربردی بودن آنرا در زمینه حافظه عملی برای تفکیک اختلالات عضوی و کنشی حافظه نشان داده اند.

فرم تجدید نظر شده مقیاس حافظه وکسلر ادامه نخستین فرم مقیاسهای وکسلر یعنی فرم های I و II می باشد که توسط استون^{۱۸} و همکاران (۱۹۷۴) وکسلر (۱۹۴۵)، وکسلر و استون (۱۹۷۴) به نقل از لزاك، (۱۹۹۵) انتشار یافته است. این تجدید نظر تلاش برای از میان برداشتن نارسایی های ویرایش اول آزمون یعنی: ۱) نمره بهر حافظه (MQ) ۲) ارزیابی ناکافی حافظه بینایی/غیر کلامی^۳ فقدان سنجش یادآوری تأخیری و ۴) نمونه هنجاری و روشهای هنجاریابی ناکافی بوده است. تغییرات ایجاد شده در تجدید نظر جدید شامل موارد زیر می باشد:

- تهیه هنجارهای طبقه بنده شده در نه سطح سنی.
- تعویض خلاصه عنوان کلی واحد (بهر حافظه یا MQ) با پنج شاخص ترکیبی.
- افزودن خرده آزمونهای اندازه گیری حافظه شکلی^{۱۹} و فضایی^{۲۰}.

ارزیابی ویژگیهای رفتاری و روانی یکی از عوامل مؤثر در پیدایش روانشناسی علمی و پیشرفت آن بوده است و امروزه ارزیابی بالینی یکی از جنبه های مهم کار بالینی به شمار می رود (آناستازی^۱، ۱۳۷۱). گردآوری داده های اولیه در روانشناسی به ویژه در بررسی های مربوط به تفاوت های گروهی و نقش عوامل زیستی و فرهنگی نیازمند به کارگیری آزمونها است. آزمونهای روانشناسی در عین حال به تشخیص نیز کمک نموده و برای درمان نیز راهنمایی کننده هستند (کاپلان^۲، سادوک^۳، گرب^۴، ۱۳۷۵).

برای ارزیابی عملکرد حافظه در بیماران روانپزشکی و عصب شناختی نیز ابزارهای گوناگونی در دسترس می باشد. این ابزارها برای تشخیص بیماری و پیگیری دراز مدت بیماران در زمینه عملکرد حافظه کاربرد دارند، مانند مقیاس تجدید نظر شده حافظه وکسلر^۵ که وسیله سودمندی برای سنجش حافظه است (اسکویر^۶ و مک کی^۷، ۱۹۹۶). بررسیها نشان داده اند که نمره بهر حافظه^۸ این مقیاس برای جدا کردن بیماران بدون بدکاری^۹ مغزی از بیماران دارای بدکاری مغزی کاربرد دارد (کوهن^{۱۰}، ۱۹۵۰). تلاش های بسیاری برای تهیه نظام نمره گذاری ویژه ای از نمره های خسرده آزمونهای WMS-R به منظور افزایش اعتبار این آزمون به عنوان یک ابزار غربالگری بد کاری مغزی انجام شده است (بچراج^{۱۱}، ماینز^{۱۲}، ۱۹۷۴؛ هاوارد^{۱۳}، ۱۹۶۶؛ کاپلان و همکاران، ۱۳۷۵؛ کییر-کالول^{۱۴}، ۱۹۷۳). همچنین شیوه مقایسه درصد یادآوری تأخیری در برابر یادآوری فوری کلامی (حافظه منطقی) و تصویری (بازآفرینی بینایی) اطلاعات سودمندی را برای شناسایی برخی بیماران با بدکاری مغزی فراهم نموده است (بروکس^{۱۵}، ۱۹۷۶؛ راسل^{۱۶}، ۱۹۷۵a).

متفاصل SID.ir تجدید نظر شده حافظه وکسلر ابزار

| | |
|------------------------------------------|--------------------|
| 1- Anastasi | 2- Kaplan |
| 3- Sadock | 4- Grebb |
| 5- Wechsler Memory Scale-Revised (WMS-R) | |
| 6- Squire | 7- McKee |
| 8- memory quotient (MQ) | 9- dysfunction |
| 10- Cohen | 11- Bachrach |
| 12- Mintz | 13- Howard |
| 14- Kear-Colwell | 15- Brooks |
| 16 – Russell | 17-screening |
| 18- Stone | 19- figural memory |
| 20- spatial | |

جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش شامل جوانان و بزرگسالان بهنچار دارای ۱۶ سال تمام تا ۶۴ سال و ۱۱ ماه ساکن شیراز بود که هیچ گونه اختلال روانپزشکی یا نورولوژی در گذشته یا در حال را گزارش نکردن.

نمونه مورد نظر این پژوهش در گروه سنی ۱۶-۱۷ سال از نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شیراز و در ۵ گروه سنی دیگر از مناطق شش گانه شهرداری انتخاب گردیدند، تعداد افراد مورد نظر در هر کدام از گروههای سنی با در نظر گرفتن نسبت جمعیت هر ناحیه به جمعیت کل تعیین شد (جدولهای ۱ و ۲). برای سین ۱۹-۱۸، ۳۴-۲۵، ۵۴-۴۵ که در آزمون هنچاریابی حضور نداشتند، هنچارها با شیوه درونیابی^۰ تخمین زده شدند، بنابراین هنچارهای نهایی جداگانه برای ۷ گروه سنی بین ۱۶ و ۶۴ سال قابل استفاده است.

در نمونه هنچاریابی همانند سایر بررسیهای انجام شده در این زمینه، تقریباً^۱ به تعداد مساوی از مرد و زن در هر گروه سنی انتخاب و آزمون شدند (۱۰۷ مرد، ۹۸ زن). وضعیت تحصیلی آزمودنیها، در سه سطح: تا ۱۱ سال تحصیلی، ۱۲ سال و ۱۳ سال یا بیشتر و همچنین بر اساس سن و جنسیت مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین آزمودنیها پس از اجرای WMS-R به کمک بخشی از مقیاس هوشی تجدید نظر شده وکسلر بزرگسالان^۲ (وکسلر، ۱۳۷۰، ۱۹۸۷) که توسط نصری و همکاران (وکسلر، ۱۳۷۰) ترجمه و آماده گردیده بود، آزمون شدند*. جدول ۲ میانگین و انحراف معیار هوشی مقیاس WAIS-R را در گروههای سنی نمونه هنچاریابی نشان داده است.

1-delayed recall 2- Prigatano

3- temporal lobe 4- hippocampal areas

5- interpolation

6- Wechsler Adult Intelligence Scale-Revised (WAIS-R)

* لازم به ذکر است که به علت عدم وجود نرم ایرانی برای گروه ۶۴-۵۵، تست وکسلر بر روی این گروه انجام نشد.

- افزودن اندازه‌گیریهای یادآوری تأخیری.^۳
- تجدیدنظر در روش‌های محاسبه نمره برای چند خرده آزمون در جهت بهبود دقت نمره گذاری (وکسلر، ۱۹۸۷).

اگر چه انتقاداتی بر این مقیاس وارد شده است (پریگاتانو، ۱۹۷۸) اما هنوز این مقیاس برای پژوهشگران و متخصصان بالینی در ارزیابی بدکاری حافظه کاربرد گسترده‌ای دارد.

این آزمون اغلب تأثیر آشتفتگی‌های یادزدایی را که مرتبط با آسیب نیمکره مغزی چپ است نشان می‌دهد، به ویژه هنگامی که آسیبها در بخش‌های قطعه گیجگاهی^۴ یا نواحی هیپوکامپ^۵ باشد (همانجا).

همچنین برای ارزیابی کارکردهای حافظه در موقعیتهاي گوناگون مانند تعیین محل آسیب عضوي مغز و تهیه اطلاعات مفید برای تشخیص بدکاری مغز، پیگیری درمان و تغییرات در وضعیت بیماری و تهیه اطلاعات مناسب برای آموزش و توانبخشی بیماران در نظر گرفته شده است.

از آنجا که آزمونهای روانی وابسته به فرهنگ می‌باشند باید بر پایه فرهنگ حاکم بر آن جامعه ساخته شوند (آناستازی، ۱۳۷۱). مقیاس حافظه وکسلر فرم I (وکسلر، ۱۳۷۰) در ایران ترجمه و تنظیم گردیده و بر روی جمعیت ساکن در شهر تهران در ۹ گروه سنی ($N=1007$) با قابلیت اعتماد ۰/۸۵ هنچاریابی گردیده است (صرامی، ۱۳۷۱). اما در زمینه انطباق و هنچاریابی این مقیاس تا کنون در ایران گزارشی منتشر نگردیده است. بنابراین این پژوهش به منظور هنچاریابی (بررسی اعتبار، پایابی و تهیه جدولهای هنچاری) آزمون تجدید نظر شده حافظه وکسلر بر روی گروهی از جمعیت ایرانی ساکن در شهر شیراز صورت گرفته است.

جدول ۲- توزیع فراوانی مطلق و نسبی
آزمودنیهای پژوهش بر حسب نواحی شهرداری
شهر شیراز، جنس و سن.

| گروه سنی | | | | | | |
|----------|-------|-------|-------|-------|---------|--|
| ۷۰-۷۴ | ۶۵-۶۹ | ۵۵-۶۴ | ۳۵-۴۴ | ۲۰-۲۴ | نواحی | |
| ۵ | ۵ | ۶ | ۴ | ۵ | مرد | |
| ۵ | ۵ | ۵ | ۴ | ۴ | زن | |
| ۱۰ | ۱۰ | ۱۱ | ۸ | ۹ | جمع | |
| ۲۰ | ۱۹ | ۲۲ | ۱۰ | ۱۸ | درصد | |
| | | | | | ناحیه ۲ | |
| ۸ | ۸ | ۷ | ۶ | ۷ | مرد | |
| ۷ | ۷ | ۶ | ۶ | ۶ | زن | |
| ۱۵ | ۱۵ | ۱۳ | ۱۲ | ۱۳ | جمع | |
| ۳۰ | ۲۹ | ۲۵ | ۲۴ | ۲۶ | درصد | |
| | | | | | ناحیه ۳ | |
| ۶ | ۶ | ۶ | ۷ | ۶ | مرد | |
| ۵ | ۵ | ۵ | ۶ | ۶ | زن | |
| ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۳ | ۱۲ | جمع | |
| ۲۲ | ۲۲ | ۲۲ | ۲۰ | ۲۲ | درصد | |
| | | | | | ناحیه ۴ | |
| ۴ | ۵ | ۵ | ۵ | ۴ | مرد | |
| ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | زن | |
| ۸ | ۹ | ۹ | ۹ | ۸ | جمع | |
| ۱۵ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۶ | درصد | |
| | | | | | ناحیه ۵ | |
| ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۴ | مرد | |
| ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۳ | زن | |
| ۵ | ۵ | ۵ | ۶ | ۷ | جمع | |
| ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۴ | درصد | |
| | | | | | ناحیه ۶ | |
| ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | مرد | |
| ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | زن | |
| ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۲ | جمع | |
| ۳ | ۳ | ۴ | ۶ | ۳ | درصد | |

جدول ۱- توزیع فراوانی مطلق و نسبی آزمودنیهای پژوهش در گروه سنی ۱۷-۱۶ سال بر حسب جنس و ناحیه‌های آموزش و پرورش شهر شیراز.

| ناحیه‌ها | تعداد نمونه در صد | پسران (n=۲۶) | | دختران (n=۲۴) | |
|----------|-------------------|--------------|------------|---------------|------------|
| | | انتخاب شده | انتخاب شده | انتخاب شده | انتخاب شده |
| ناحیه ۱ | ۳۵ | ۹ | ۸ | ۳۲ | ۸ |
| ناحیه ۲ | ۲۰ | ۵ | ۵ | ۲۳ | ۵ |
| ناحیه ۳ | ۲۳ | ۶ | ۶ | ۲۴ | ۶ |
| ناحیه ۴ | ۲۲ | ۶ | ۵ | ۲۱ | ۵ |
| کل | ۱۰۰ | ۲۶ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۲۶ |

ابزار اندازه گیری بکار رفته در این پژوهش به شرح زیر است:

۱- مصاحبه نیمه ساخت دار؛ برای بررسی سلامت عمومی آزمودنیها و تشخیص گروه بهنجار از گروه بالینی و اینکه افراد دارای هیچ گونه اختلال پزشکی، عصب شناختی و روانپزشکی نیستند پیش از اجرای آزمون و پس از برقراری ارتباط^۱ پرسشهایی در این زمینه از آزمودنیها پرسیده شد که در صورت وجود اختلال آزمودنی از گروه بهنجار حذف می‌گردید.

۲- مقیاس تجدید نظر شده حافظه و کسلر و کسلر کار خود را روی فرم تجدید نظر شده حافظه و کسلر در اوخر سال ۱۹۷۰ آغاز کرد، اما نتوانست تغییرات لازم را پیش از درگذشتن در سال ۱۹۸۱ به پایان برساند. مقیاس شامل مجموعه‌ای از خرده آزمونها (۱۳ خرده آزمون) است که هر یک جنبه مختلفی از حافظه را می‌سنجد.

تکالیف در مجموعه‌ای با یک خرده آزمون، شامل سؤالاتی که به عنوان بخشی از معاینه وضعیت روانی^۲ (اطلاعات و جهت یابی) می‌باشد

ج) تغییر در نام افراد و مکانها، حذف چند ماده در خرده آزمون حافظه منطقی (دانستان و(B) که از نظر فرهنگی با جامعه ایرانی تناسب نداشت و جایگزین کردن ماده هایی مطابق با فرهنگ ایرانی.

د) تغییر چهار ماده خرده آزمون تداعی زوجهای کلامی. افزون بر آن ملاک نمره گذاری ماده های مقیاس ترجمه و بر پایه تغییرات انجام شده در ماده های مقیاس، تغییر داده شد تا با آنها سازگار گردد. کل امتیازات ماده های خرده آزمون های مقیاس با امتیازات و ملاک های نمره گذاری WMS-R (وکسلر، ۱۹۸۷) منطبق شد.

هیچ ماده ای از خرده آزمون های مقیاس حذف نگردید و ماده جدیدی به آن اضافه نشد، و تنها برخی تغییرات لازم منطبق با فرهنگ ایرانی صورت گرفت.

پس از تهیه فرم فارسی WMS-R با در نظر گرفتن دو هدف یعنی:

- ۱- بررسی روش نمونه گیری به کار گرفته شده.
- ۲- بررسی میزان سازگاری ماده های مقیاس با جامعه و فرهنگ ایرانی، مقیاس فراهم آمده روی ۲۲ نفر آزمودنی در تمام گروه های سنی (۱۶-۷۴ ساله) اجرا گردید و پس از آن بررسی اصلی انجام شد.

با انتخاب تصادفی دو دیبرستان پسرانه و دخترانه در هر منطقه آموزش و پرورش و انتخاب تصادفی دانش آموزانی از این مدارس و نیز انتخاب تصادفی یک خیابان اصلی از نواحی شش گانه شهرداری و مراجعه به اولین خیابان فرعی و نخستین خانه در آن خیابان، نمونه های اصلی پژوهش انتخاب گردیدند.

داده های اولیه به دست آمده از عملکرد آزمودنیها به شرح زیر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. داده های اولیه به پنج نمره ترکیبی، نمرات

گنجانیده شده و از آن برای مقاصد سرند کردن استفاده شده است. هشت خرده آزمون بعد که به دنبال هم می آیند بسیاری کوتاه مدت و بسیار آوری مواد کلامی و تصویری را می سنجند. پس از اجرای هشت خرده آزمون، فوراً "کوششهای یادآوری" تأخیری برابر چهارتا از خرده آزمونهای دنبال می شوند. دو تا از این چهار کوشش نگهداری مواد کلامی و دو خرده آزمون، نگهداری مواد بنایی را آزمون می کنند.

در این پژوهش، پس از ترجمه ماده های مقیاس، به منظور بررسی مطابقت آن با فرهنگ ایرانی و توانایی در درک ماده ها چند تغییر در

ماده های مقیاس به شرح زیر انجام شد:

الف) تغییر در ماده یک و شش خرده آزمون اطلاعات و پرسشهای جهت یابی که عبارت های جایگزین به کار برده شد تا منطبق با فرهنگ ایرانی باشد.

ب) تغییر در ماده دوم خرده آزمون کنترل ذهنی، که در WMS-R اصلی وظیفه آزمودنی بیان حروف الفبای انگلیسی می باشد و به گفتن ماههای سال تغییر یافت.

جدول ۳- توزیع فراوانی آزمودنیها پژوهش بر حسب گروه سنی، میانگین سنی و هوشیار کل

مقیاس پر پایه فرم کوتاه آزمون R WAIS-R

هوشیار مقیاس کل

| گروه سنی | میانگین سنی | فرافانی | میانگین انحراف معیار | گروه سنی | میانگین سنی | فرافانی | میانگین انحراف معیار |
|-----------|-------------|---------|----------------------|----------|-------------|---------|----------------------|
| ۱۶-۱۷ | ۱۰/۱ | ۱۰۶ | ۵۰ | ۱۴/۲ | ۱۶ | ۱۰۶ | ۵۰ |
| ۲۰-۲۴ | ۱۳/۶ | ۱۰۸ | ۵۴ | ۲۱/۸ | ۲۰ | ۱۰۸ | ۵۴ |
| ۳۵-۴۴ | ۱۵/۶ | ۱۱۶ | ۵۱ | ۳۹ | ۳۵ | ۱۱۶ | ۵۱ |
| ۵۵-۶۴ | * | * | ۵۰ | ۵۹ | ۵۵ | ۵۰ | ۵۰ |
| تمام سنین | ۱۴ | ۱۱۰ | ۲۰۵ | — | — | — | — |

* برای این گروه سنی آزمون هوشی انجام نشد

پس از انجام تغییر و اصلاحات لازم در ماده‌های مقیاس و انجام بررسی مقدماتی، پاسخنامه فارسی تهیه و مقیاس بر روی نمونه انتخاب شده اجرا شد که نتایج بدست آمده به شرح زیر بوده است:

تهیه جدول هنجار برای سین ۱۶-۶۴ سال، تعیین ساختار مقیاس، نمرات شاخص برای پنج ترکیب حافظه عمومی، توجه/تمرکز، حافظه کلامی، حافظه بصری و یادآوری تأخیری. دو فرم نمره‌گذاری اصلی که نتایج WMS-R را خلاصه می‌کند برای ترکیب حافظه عمومی و ترکیب توجه و تمرکز در نظر گرفته شد.

شاخصها با میانگین ۱۰۰ و انحراف معیار ۱۵ برای نمرات ترکیب حافظه عمومی و توجه/تمرکز گزارش شدند. این عمل اجازه می‌دهد که ترکیهای اصلی WMS-R با هوشپرها مقایسه شوند. میانگین و انحراف معیارهای نمره‌های خام خرده آزمونهای WMS-R در گروههای سنی نمونه هنجاریابی در جدول ۴ نشان داده شده است. برای ترکیب نمره‌های خام خرده آزمونها، توسط وکسلر (۱۹۸۷) ضرایبی به نمرات خام داده شده و سپس نمرات ترکیب شده‌اند.

مجموع نمره‌های خام برای پنج ترکیب برای اعضاء نمونه هنجاریابی محاسبه گردید و فراوانی توزیع نمرات ترکیبها به طور جداگانه برای چهار گروه سنی نمونه آماده شد. میانگین و انحراف معیارهای ترکیهای نمرات خام در گروههای سنی در جدول ۵ داده شده است.

به منظور بهنجارسازی نمرات خام ترکیبها همانطور که گفته شد تبدیل خطی به کار گرفته شد و نمرات معیارهای شاخصهای نهایی در جدول ۵ برای چهار گروه سنی که به عنوان بخشی از نمونه هنجاریابی WMS-R آزمون شدند نشان داده شده است.

استاندارد و پنج شاخص ترکیبی، رتبه‌های درصدی و برآورد درونی نمرات ترکیبی سه گروه سنی ۱۸-۱۹، ۲۰-۳۴ و ۴۵-۵۴ تبدیل گردید.

برای به دست آوردن پنج نمره ترکیبی (حافظه کلامی، حافظه بصری، حافظه عمومی، توجه و تمرکز، یادآوری تأخیری)، نمرات خام خرده آزمونها در هر گروه سنی به روش زیر با هم ترکیب گردید. ترکیب حافظه کلامی: خرده آزمون حافظه منطقی I+تداعی زوجهای کلامی I.

ترکیب حافظه بصری: حافظه تصویری+تداعی زوجهای بینایی I+بازآفرینی بینایی I. ترکیب حافظه عمومی: حافظه کلامی+حافظه بصری. ترکیب توجه/تمرکز: کترول ذهنی+فراختای اعداد+فراختای حافظه بینایی. ترکیب یادآوری تأخیری: حافظه منطقی II+تداعی زوجهای بینایی II+تداعی زوجهای کلامی II+بازآفرینی II+بینایی II.

بررسی پایایی نمرات مقیاس از طریق بازآزمایی روی ۵۰ نفر از آزمودنیها در سین مختلف با فاصله زمانی چهار تا شش هفته اجرا گردید.

برای تهیه نمرات استاندارد و نمرات شاخص برای پنج ترکیب در هر گروه سنی (چهار گروه سنی) شیوه تبدیل خطی (مکتوسون، ۱۳۷۰) به کار برده شد و رتبه‌های درصدی منطبق با نمرات ترکیبی در هر گروه سنی نیز تهیه شد.

اجرای WMS-R روی یک نمونه بالینی شامل ۳۰ بیمار دارای تشخیص آسیب به حافظه و یا مشکوک به آن صورت گرفت. این الراد با تشخیصهای افسردگی، دمانس، صرع، سکته و ضربه سر توسط متخصصان نورولوژی و اعصاب و روان مراکز درمانی شهر شیراز معرفی شده بودند و از نظر مدت بستری و بیماری، دارو، شدت بیماری و زیر گروههای تشخیصی کترول شده بودند. این گروه در زمینه پنج شاخص با نمونه هنجاریابی مقایسه شدند.

جدول ۴- میانگین و انحراف معیار نمره های خام شرده آزمونها در گروه هنرجویان بر حسب گروه های سنی مختلف

| گروه سنی | | ۳۰-۳۶ (n=۵۰) | | ۳۷-۴۲ (n=۶۱) | | ۴۳-۵۰ (n=۵۴) | | ۵۱-۵۷ (n=۵۰) | | ۵۸-۶۴ (n=۵۰) | | خود آزمون | |
|---------------------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|-----------|--|
| اطلاعات و سوالات جهت پالی | | | | | | | | | | | | | |
| کنترل ذهنی | | | | | | | | | | | | | |
| حافظه تصویری | | | | | | | | | | | | | |
| حافظه منطقی | | | | | | | | | | | | | |
| تدابعی زوجهای بیانی I | | | | | | | | | | | | | |
| تدابعی زوجهای کلامی I | | | | | | | | | | | | | |
| بازآوردن پتانسیل I | | | | | | | | | | | | | |
| فراخنای اعداد | | | | | | | | | | | | | |
| دو به جلو | | | | | | | | | | | | | |
| دو به عقب | | | | | | | | | | | | | |
| فراخنای حافظه پتانسیل | | | | | | | | | | | | | |
| دو به جلو | | | | | | | | | | | | | |
| دو به عقب | | | | | | | | | | | | | |
| حافظه منطقی II | | | | | | | | | | | | | |
| تدابعی زوجهای پتانسیل II | | | | | | | | | | | | | |
| تدابعی زوجهای کلامی II | | | | | | | | | | | | | |
| بازآوردن پتانسیل II | | | | | | | | | | | | | |

Andeesheh
Va
Raftar
اندیشه و رفتار

۴۲

| گروههای سنی | | | | | | | | | | خرده آزمونها |
|-------------|--------------|--------|---------|--------|--------------|--------|---------|--------|--------------|----------------|
| ۵۵-۶۴ | | ۳۵-۴۴ | | ۲۰-۲۴ | | ۱۶-۱۷ | | | | خرده آزمونها |
| (n=۵۰) | انحراف معیار | (n=۵۰) | میانگین | (n=۵۰) | انحراف معیار | (n=۵۰) | میانگین | (n=۵۰) | انحراف معیار | |
| ۱۵/۶ | ۹۹/۴ | ۱۶/۵ | ۹۹/۴ | ۱۶/۴ | ۹۸/۶ | ۱۶/۱ | ۹۷/۴ | ۱۶/۶ | ۹۷/۷ | حافظه عمومی |
| ۱۶/۰ | ۹۹/۳ | ۱۸/۳ | ۱۰/۱/۲ | ۱۷/۳ | ۹۸/۱ | ۱۷/۶ | ۹۷ | | | توجه/تمرکز |
| ۱۶/۸ | ۱۰۰/۲ | ۱۷/۰ | ۹۵/۸ | ۱۶/۰ | ۹۷/۷ | ۱۸/۹ | ۹۷/۹ | | | حافظه کلامی |
| ۱۵/۰ | ۹۹/۴ | ۱۷/۳ | ۹۷ | ۱۹/۱ | ۹۶/۶ | ۱۹/۳ | ۹۷/۷ | | | حافظه بصری |
| ۱۶/۱ | ۹۹/۰ | ۱۶/۱ | ۹۸/۳ | ۱۶/۱ | ۹۷/۴ | ۱۶/۶ | ۹۷/۷ | | | پادآوری تأخیری |

آزمونها شده‌اند و در تفسیر نتایج آزمون باید پایایی‌های پس این و در نتیجه خطاهای معیار اندازه‌گیری بزرگتر این خرده آزمونها را در نظر گرفت.

از زیابی روایی مقیاس تجدید نظر شده حافظه و کسر نتایج زیر را نشان داد:

بنچ شاخص، برای تفاوت‌های جنسی با استفاده از آزمون Δ محاسبه شد. تفاوت بین شاخصهای WMS-R در زنان و مردان به جز شاخص حافظه بصری معنی دار بود. همچنین خرده آزمون اطلاعات و جهت پایایی در زنان و مردان تفاوت معنی داری نشان داد ($P<0.001$). همچنین تحلیل واریانس یک متغیری نمره‌های خام پنج ترکیب WMS-R در گروههای سنی مختلف تفاوت معنی داری را در این زمینه نشان داد ($P<0.05$). این یافته نشان می‌دهد که استفاده کننده از آزمون باید تأثیر سن را در تفسیر نمرات

همان گونه که بیان گردیده‌هنچار شاخصها برای سه گروه سنی ۱۹-۱۸-۱۹، ۴۵-۵۴، ۲۵-۳۴ که در آزمون هنجاریابی حضور نداشتند با روش برآورد درونی آماده شد.

نتایج هنجار شاخصها در تمام گروههای سنی دامنه‌ای از ۵۶ تا ۱۳۴ (± 24 انحراف معیار از میانگین) را دربر گرفته است. چون افراد با بدکاریهای حافظه به طور فراوان نمره زیر محدوده این هنجارها را دارند، هنجارها به طور نزولی^۱ به شاخصهای ۵۰ یا ۳ انحراف معیار زیر میانگین برآورد بروند^۲ شدند. هنجارهای شاخصها برای مجموع نمرات خام (نمرات ترکیبی) در چهار گروه سنی تهیه گردید.

بررسی پایایی نمرات مقیاس به کمک بازآزمایی روی ۵۰ نفر از آزمودنیها ضریب‌های پایایی برای خرده آزمونها و ترکیبها را از ۰/۲۸ تا ۰/۹۸ در نوسان نشان داد. گفتنی است که چندین خرده آزمون دامنه نمرات محدود داشتند که موجب کاهش ضرایب پایایی برای این خرده www.SID.ir

| شاخص | گروه بهنجرار | | گروه بالینی | | میانگین |
|----------------|--------------|-------|--------------|-------|---------|
| | انحراف معیار | نموده | انحراف معیار | نموده | |
| حافظه عمومی | ۸۹/۹ | ۲۴/۱ | ۶۲/۱ | ۲۸/۵ | ۷/۴۷* |
| توجه/تمرکز | ۲۸/۶ | ۸/۶ | ۱۷/۷ | ۸/۹ | ۷/۲۸* |
| حافظه کلامی | ۴۷/۳ | ۱۲/۲ | ۲۸/۶ | ۱۴/۴ | ۷/۴۷* |
| حافظه بصری | ۵۱/۶ | ۱۳/۰ | ۳۳/۵ | ۱۶/۱ | ۶/۵۶* |
| یادآوری تأخیری | ۶۷/۷ | ۲۱/۸ | ۳۶/۲ | ۲۵/۴ | ۷/۰۶* |

* P<0.001

مقیاس تجدید نظر شده حافظه وکسلر، بررسی پایایی و روایی آن و تهیه جداول و نمرات استاندارد در سالین ۶۴-۱۶ سال در شهر شیراز بوده است.

برای تهیه جدولهای نمرات هنجاری در مورد نمرات ترکیبی و شاخصها و به منظور بده دست آوردن پنج نمره ترکیبی (ترکیب حافظه کلامی، حافظه بصری، حافظه عمومی، توجه/تمرکز و یادآوری تأخیری) بر پایه شیوه کار وکسلر نمرات خام خوده آزمونها ترکیب شد و پنج نمره ترکیبی به دست آمد که این روش معایب موجود در یک نمره بهر حافظه واحد را از میان میبرد (پریگاتانو، ۱۹۷۸).

برای بهنجراسازی نمرات خام ترکیبها، تبدیل خطی (مگنوسون، ۱۳۷۰) به کار برده شد و نمرات با میانگین ۱۰۰ و انحراف معیار ۱۵ تبدیل گردید که با استفاده از این روش که شیوه کار وکسلر میباشد پنج شاخص ترکیبی به دست آمد.

هنجرار شاخصها برای سه گروه سنی ۱۸-۱۹، ۲۰-۳۵، ۴۵-۵۴ که در آزمون هنجاریابی حضور نداشتند با روش درونیابی آماده شد. میتن برگ^۱ و همکاران (۱۹۹۲) برای ارزیابی این شیوه

شاخص در نظر داشته باشد. در نمونه هنجاریابی، سالهای تحصیل به طور معنی داری با تمام پنج شاخص ارتباط داشت ($P<0.001$). همبستگی با حافظه عمومی، توجه/تمرکز، حافظه بصری، حافظه کلامی و یادآوری تأخیری به ترتیب 0.72 , 0.75 , 0.78 , 0.54 , 0.73 بود. در بررسی بیشتر ارتباط میان سطح تحصیلات و نمرات WMS-R، تحلیل واریانس یکطرفه تفاوت معنی داری را در سطوح مختلف تحصیلی نشان داد ($P<0.001$).

میانگین و انحراف معیار شاخصهای پنج گانه برای نمونه بالینی و بهنجرار در جدول ۶ ارائه شده است. این بررسی نمرات به دست آمده در زمینه شاخصهای WMS-R را در گروه بالینی پایین نشان داد. همچنین گروه بالینی در خرده آزمون اطلاعات و پرسش‌های جهت یابی با استفاده از آزمون آ با گروه بهنجرار مقایسه شد که تفاوت دو گروه معنی دار بود ($P<0.001$).

هوشبهر کلامی بالاترین همبستگی را با شاخص حافظه کلامی و هوشبهر عملی بالاترین همبستگی را با شاخص حافظه بصری داشت.

Andeesheh
Va
Raftar
اللهبه و رفوار

۶۴

بحث

هدف اصلی پژوهش، انطباق و هنجاریابی

رضایت‌بخش نشان می‌دهد.

همچنین خطای معیار اندازه‌گیری در واحد شاخصها ارائه گردید. پیاترین شاخص، شاخص توجه/تمرکز و سپس شاخص حافظه کلامی بود. این یافته‌ها با یافته‌های وکسلر (۱۹۸۷) همخوانی دارد.

معنی‌داربودن تفاوت میان شاخص‌های WMS-R در زنان و مردان به جز شاخص حافظه بصری و تفاوت معنی‌دارمیان خردۀ آزمون اطلاعات و سؤالات جهت‌یابی در زنان و مردان با یافته‌های پژوهش وکسلر (۱۹۸۷) که تفاوت معنی‌داری میان شاخصها در زنان و مردان گزارش نکرده است همسو نیست. در زمینه ارتباط نمرات WMS-R با سن و میزان تحصیلات نتایج پژوهش حاضر با نتایج ارائه شده توسط وکسلر (۱۹۸۷) همخوانی داشته و تأثیر معنی‌دار سن و سالهای تحصیل روی نمرات ترکیبی را نشان داده است، از این رو استفاده کننده آزمون باید تأثیر سن را در تفسیر نمرات شاخص در نظر داشته باشد. همچنین هنگامی که کارکرد حافظه چندان مشخص نباشد گرفتن سطح تحصیل برای تفسیر مهم خواهد بود.

برای ارزیابی روایی مقیاس، WMS-R روی گروه‌های بالینی نیز اجرا شد و در پنج شاخص با نمونه هنجاریابی مقایسه شد. این مقایسه میانگین نمرات خام گروه بالینی را کمتر از میانگین نمرات خام گروه بهنجار نشان داد ($P < 0.001$).

همچنین مقایسه گروه بالینی در خردۀ آزمون اطلاعات و سؤالات جهت‌یابی با گروه بهنجار نتایج معنی‌داری را ($P < 0.001$) نشان داد. این یافته با نتایج ارائه شده توسط وکسلر (۱۹۸۷) در بررسی روایی مقیاس همخوانی داشته و بیانگر روایی ساختار مناسب این مقیاس می‌باشد.

(درون‌یابی) نمرات شاخص‌های گروه سنی ۲۵–۳۴ را برآورد کردند یعنی هنجاریابی روی افراد این گروه صورت گرفت و نتایج نشان داد که نمرات شاخص متشر شده توسط وکسلر که با شیوه برآورد درونی انجام شده بود سودمند است.

نمرات هنجار شاخص‌های مقیاس پژوهش حاضر در تمام گروه‌های سنی، در دامنه‌ای از ۰ تا ۱۴۰ (از سه و یک سوم انحراف معیار زیر میانگین تا دو و دو سوم انحراف معیار بالای میانگین) مشابه کار وکسلر (۱۹۸۷) گستره بوده است. این نمرات در کل دامنه خود، واحدهای یکسانی هستند و تفاوت در عملکرد بین نمرات هنجاری ۱۰۰ و ۱۱۵ مشابه تفاوت در عملکرد میان نمرات ۱۳۰ و ۱۴۵ می‌باشد.

در پیشتر نمرات خردۀ آزمونها و ترکیهای دومین آزمون افزایشی نسبت به نمره‌های خردۀ آزمونهای نخست دیده شد. در تبیین این افزایش باید گفت که آشنا شدن با روش‌های آزمون و بادگیری، نمره‌های آزمودنیها را افزایش داده است.

همچنین رتبه‌های درصدی شاخصها تعیین شد. اگر چه نمرات هنجاری از نظر روان‌سنجی برتر از رتبه‌های درصدی هستند اما به آسانی در ک نمی‌شوند. بنابراین رتبه‌های درصدی در درک مفهوم نمرات هنجاری کمک می‌کنند.

همانطور که بیان گردید، به منظور بررسی پایایی خردۀ آزمونها و ترکیهای مقیاس روشن بازآزمایی به کار گرفته شد. ضرایب پایایی برای خردۀ آزمونها و ترکیهای در پژوهش حاضر از ۰/۲۸ تا ۰/۹۸ گستره شده است. در پژوهش وکسلر (۱۹۸۷) متوسط ضرایب پایایی در میان گروه‌های سنی برای خردۀ آزمونها و ترکیهای از ۰/۴۱ تا ۰/۹۰ یا مقدار متوسط ۰/۷۴ بوده است. مقایسه ضرایب پایایی بازآزمایی پژوهش حاضر با ضرایب پایایی بازآزمایی فرم اصلی (وکسلر، ۱۹۸۷)، ضرایب پایایی این مقیاس را در حد

از همکاران و دوستانی که زمینه اجرای این پژوهش را فراهم کردند نهایت تشکر و قدردانی را می‌نماید. از شادروان دکتر محمد تقی براهنی استاد راهنما که با گرمی و صمیمیت راهنماییهای لازم را نمودند، از آقای محمد جعفر بهره‌دار که در اجرای پژوهش همکاری لازم را داشتند، آقای هوشنگ قره خانی که در طول اجرای پژوهش همکاری خود را دریغ ننمودند، از همکاران مرکز بهداشت شهدای والجبر، آموزش و پرورش کل شیراز، همچنین مسئولین مرکز درمانی شرکت نفت شیراز تشکر و قدردانی می‌شود.

همچنین از همکاران در انتیتو روانپژوهی تهران که در اجرای این پژوهش یاری لازم را نمودند نیز تشکر و سپاسگزاری می‌نماییم.

Andeeshah
Va
Raftari
اندیشه و رفخار

۶۶

منابع

- Anastasi, A. (1371). روان آزمایی. ترجمه محمد تقی براهنی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- Andeeshah Va Raftari (1370). مبانی نظری آزمونهای روانی. ترجمه محمد تقی براهنی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- Andeeshah, Va Raftari (1370). مقیاس حافظه وکسلر (فرم الف). ترجمه صادق نصری، سید عباس باقری بزدی، انتیتو روانپژوهی تهران، گزارش متشر نشده.
- Bachrach, H., & Mintz, J. (1974). The Wechsler Memory Scale as a tool for the detection of mild cerebral dysfunction. *Journal of Clinical Psychology*, 30, 58-60.
- Brooks, D. N. (1976). Wechsler Memory Scale performance and its relationship to brain damage
- Cohen, J. (1950). Wechsler Memory Scale performance on psychoneurotic, organic and schizophrenic groups. *Journal of Consulting Psychology*, 14, 371-372.
- Howard, A. R. (1966). A fifteen-Year follow-up with the Wechsler Memory Scale. *Journal of Consulting Psychology*, 30, 175-176.
- Kear-Colwell, J. J. (1973). The structure of the Wechsler Memory Scale and its relationship to brain damage. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 12, 384-392.
- Lezak, M.D. (1995). *Neuropsychological assessment* (3rd ed.). New York: Oxford University Press.
- Mittenberg, W., Burton, D. B., Darrow, E., & Thompson, G. B. (1992). Normative data for the Wechsler Memory Scale – Revised: 25-to 34-year olds. *Psychological Assessment*, 4, 363-368.
- Prigatano, G. P. (1978). Wechsler Memory Scale: A selective review of the literature. *Journal of Clinical Psychology*, 34, 816-832.
- Russell, E. W. (1975). A Multiple scoring method for the assessment of complete memory functions. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 43, 800-809.
- Squire, L. R., & McKee, R. D. (1996). Biology of memory. *Comprehensive textbook of psychiatry* (6th ed.). Baltimore: Williams & Wilkins.
- Stone, C. P., Girdner, J., & Alberch, R. (1946). An alternate form of Wechsler Memory Scale *Journal of Psychology*, 22, 199-206.
- Wechsler, D. (1945). A standardized memory scale for clinical use. *Journal of Psychology*, 19, 87-95.
- Wechsler, D. (1987). Wechsler Memory Scale-Revised manual. New York: Psychological Cooperation Inc.