



کاربرد الگوی «پرسید» در کاهش میزان اضطراب مأموران آتش‌نشانی تهران

دکتر شیرین لسان^{*}، دکتر فضل ا... غفاری بور^{*}، دکتر بهروز بیرشك^{**}، دکتر سفراط فقیهزاده^{***}

چکیده

هدف: بررسی حاضر با هدف تعیین میزان کاربری الگوی پرسید در کاهش میزان اضطراب مأموران آتش‌نشانی تهران انجام شده است.

روش: بررسی حاضر یک بررسی شبۀ آزمایشی است. آزمودنی‌های پژوهش را ۱۱۸ مأمور آتش‌نشانی شهر تهران تشکیل دادند که به روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برنامه آموزشی با بهره‌گیری از الگوی پرسید و نظریه‌های خودکارآمدی و آموزش بزرگسالان در قالب این الگو تدوین شد. داده‌های پژوهش به کمک آزمون α ، آزوج و آزمون خی دو تحلیل گردید.

یافته‌ها: از نظر میزان اضطراب آشکار و اضطراب پنهان، بین گروه‌های آزمایشی و گواه پس از آموزش تفاوت معنی‌داری دیده شد و تنها در گروه آزمایشی میان اضطراب آشکار و پنهان پیش و پس از آموزش تفاوت معنی‌داری وجود داشت.

نتیجه: این بررسی نشان‌دهنده کاربرد مؤثر الگوی پرسید در کاهش میزان اضطراب آشکار و پنهان مأموران آتش‌نشانی می‌باشد.

کلیدواژه: اضطراب، مأمور آتش‌نشانی، آرام‌سازی کاربردی، الگوی پرسید

برآورد می‌کند (حسینی، ۱۳۷۸). بنابراین در میان

مقدمه

اختلال‌های روانی، اختلال‌های اضطرابی، احتمالاً

سازمان جهانی بهداشت شیوع اضطراب را در جهان

شایع‌ترین دانسته شده است (کاپلان^۱ و سادوک^۲)

(۴۰۰ میلیون نفر) بالاتر از سایر اختلال‌های روانی

* دکترای تخصصی آموزش بهداشت، مریمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، خیابان پورسینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، گروه

پزشکی اجتماعی (نویسنده مسئول).

** دکترای تخصصی آموزش بهداشت، استادیار دانشگاه تربیت مدرس، تهران، خیابان جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده

علوم پزشکی، گروه آموزش بهداشت.

*** دکترای تخصصی مشاوره، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، خیابان طالقانی، بین خیابان بهار و خیابان شریعتی، کوچه جهان، پلاک ۱.

**** دکترای تخصصی آمار حیاتی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، تهران، خیابان جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم

پزشکی، گروه آموزش بهداشت.

سستی پدید می‌آورد، با تضعیف دستگاه ایمنی بدن، فرد را آماده ابتلا به بیماری می‌سازد و کارآمدی وی را کاهش می‌دهد (استورا^{۱۷}، ۱۳۷۷).

از آنجا که کارکرد مأموران آتش‌نشانی افزون بر سلامت خود آنها، تأثیر مستقیم بر سلامت سایر افراد جامعه نیز دارد و از سوی دیگر سودمندی‌بودن آموزش برپایه الگوی پرسید^{۱۸} بر سایر مشکلات بهداشتی (جلیلی، ۱۳۷۹؛ دهقانی، ۱۳۷۶؛ شریفی‌راد، ۱۳۷۹) و همچنین تأثیر آرام‌سازی بر کاهش اضطراب در سایر بررسی‌ها (احمدی نژاد، ۱۳۷۷؛ پور معماری، ۱۳۷۳؛ آراکاوا^{۱۹}، ۱۹۹۷؛ رشید^{۲۰} و پریش^{۲۱}، ۱۹۹۸؛ ریس^{۲۲}، ۱۹۹۵؛ راب^{۲۳}، ۲۰۰۰) مورد تأیید قرار گرفته است، در بررسی حاضر برای سنجش تأثیرآموزش، نظریه‌های آموزشی خودکارآمدی^{۲۴} و آموزش بزرگ‌سالان^{۲۵} و روش آرام‌سازی کاربردی در چارچوب الگوی پرسید برای رویارویی با اضطراب به کار برده شد.

روش

این بررسی از نوع شبه‌آزمایشی^{۲۶}، جامعه آماری شامل مأموران آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران به تعداد تقریبی ۱۱۰ نفر و روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای بود. در مرحله اول به روش خوش‌های، دو منطقه از مناطق چهارگانه آتش‌نشانی و در مرحله بعد بازهم به شیوه خوش‌های ۷ ایستگاه آتش‌نشانی با استفاده از روش آماری نمونه‌گیری با احتمال‌های متفاوت انتخاب گردید. پس از انجام پیش آزمون در ۷ ایستگاه

1- Barnard	2- Duncan
3- Beaton	4- Murphy
5- Pike	6- Corneil
7- Safren	8- Gonzalez
9- Horner	10- Leung
11- Sarason	12- Noyes
13- Hoehn	14- Peiffer
15- Fahrion	16- Norris
17- Stora	
18- Predisposing, Reinforcing, Enabling Causes in Educational Diagnosis and Evaluation (PRECEDE)	
19- Arakawa	20- Rashid
21- Parish	22- Rees
23- Robb	24- self-efficacy
25- adult education	26- quasi-experimental

۱۹۹۸). یک بررسی نشان‌دهنده شیوع اضطراب به میزان ۷/۴٪ در جمعیت بالای ۱۵ سال شهر تهران است (نور بالا، محمد و باقری بزدی، ۱۳۷۸).

با در نظر گرفتن شیوع نسبتاً بالای اضطراب و با توجه به اینکه عدم پیش‌گیری اولیه، تشخیص زودرس و کنترل به موقع این اختلال، شروع و تداوم آن را به دنبال دارد، به کار بردن روش‌های پیش‌گیری در زمینه شناخت اضطراب در مراحل اولیه و مقابله درست با آن دارای اهمیت می‌باشد.

افراد مشغول به کار در مشاغلی مانند آتش‌نشانی، دارای استرس فراوان و در معرض ابتلا به اضطراب هستند (بارنارد^۱ و دونکان^۲، ۱۹۷۵). بررسی‌ها نشان می‌دهند که بیشترین میزان بیماری‌ها و مرگ‌ومیر مأموران آتش‌نشانی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به طبیعت استرس‌زای کار آنها ارتباط دارد؛ به طوری که این شغل در ایالات متحده به علت پرس استرس و خطرناک بودن از نظر مرگ‌ومیر شغلی، پنجمین رتبه را دارد (بیتون^۳، مورفی^۴، پایک^۵ و کورنیل^۶، ۱۹۹۷).

اگرچه اضطراب برای بیشتر افراد، یک واکنش بهنجار و گذرا است و موجب حفاظت آنان در برابر صدمات بالقوه می‌گردد (سافرن^۷، گونزالز^۸، هورنر^۹ و لونگ^{۱۰}، ۲۰۰۰)، اضطراب بیمارگونه با نگرانی، ترس، تشویش، فکرهای مزاحم، علامت‌های فیزیکی و احساس‌تنش همراه است (ساراسون^{۱۱} و ساراسون، ۱۹۹۹). اختلال اضطرابی باعث ضعیف شدن عملکرد فرد می‌شود (نویز^{۱۲} و هوهن^{۱۳}، ۱۹۹۸) و افرادی که دارای شخصیت مضطرب هستند در برابر استرس کمتر از افراد عادی اعتماد به نفس دارند (پیفسر^{۱۴}، ۱۳۷۹) و اضطراب آنان به دنبال استرس، بیشتر افزایش می‌یابد (فاهریون^{۱۵} و نوریس^{۱۶}، ۱۹۹۰). افراد مضطرب در صورت افزایش کار به‌آسانی آزرده می‌شوند و این، کش‌وری فرد را در زمینه‌های اجتماعی، روان‌شناختی، جسمانی و خانوادگی دچار اختلال می‌کند. ناخشنودی حرفة‌ای، کاهش تولید، افزایش خطاهای و تصادف‌ها، کاهش سطح قضاوت و افزایش زمان واکنش را در پی دارد، هم‌چنین در کارکرد حرفة‌ای فرد نارسانی و

شامل ۶۰۰ نفر بودند، برپایه فرمول الفای کرونباخ محاسبه شده و در مورد مقیاس اضطراب آشکار، ۰/۹۱ مقیاس اضطراب پنهان ۰/۹۰ و کل مقیاس ۰/۹۴ گزارش شده است. مهرام (۱۳۷۲) برای بررسی روابیس، شیوه ملاکی هم زمان را به کار برد که برپایه آن در هر دو مقیاس اضطراب آشکار و پنهان و همچنین کل آزمون، تفاوت های معنی داری در سطح ۰/۰۱ و ۰/۰۵ میان گروه های بهنجار و ملاک و برپایه مقایسه میانگین ها گزارش نمود.

برای آماده کردن برنامه آموزش بهداشت گروه آزمایشی، الگوی پرسید که در برگیرنده واژه هایی در زمینه عوامل مستعد کننده^۹، تقویت کننده^{۱۰} و توانمند کننده^{۱۱} در تشخیص آموزشی^{۱۲} و ارزشیابی^{۱۳} (باتلر^{۱۴}، ۲۰۰۱) و دارای ۷ مرحله می باشد، به کار برده شد. این مراحل به ترتیب عبارتند از مرحله ۱ و ۲: تشخیص اجتماعی و همه گیر شناسی، مرحله ۳: تشخیص رفتاری، مرحله ۴ و ۵: تشخیص آموزشی، مرحله ۶: تشخیص مدیریتی و مرحله ۷: ارزشیابی (گرین و همکاران، ۱۹۸۰).

در این پژوهش، برپایه اطلاعاتی که از مطالعه در جمیعت هدف و بررسی های پیشین به دست آمده بود چهار چوب کلی الگو طراحی گردید.

در مرحله تشخیص رفتاری برپایه میزان اهمیت و تغییر پذیری، به کار گیری فنون آرام سازی کاربردی به عنوان رفتار هدف مشخص گردید. در آرام سازی کاربردی هدف این است که فرد بتواند به سرعت خود را آرام نماید، با واکنش های اضطرابی مقابله و از پیشرفت آنها جلوگیری کند (است^{۱۵}، ۱۹۸۷). پس از مرحله تشخیص آموزشی در بخش برنامه ریزی آموزشی این الگو برای تغییر رفتار فردی، نظریه آموزش بزرگسالان و خود کار آمدی در قالب الگوی پرسید

انتخاب شده، یک گروه شامل ۳ ایستگاه و گروه دیگر شامل ۴ ایستگاه برپایه معیارهای پژوهش (اضطراب آشکار و پنهان) و برخی متغیرهای اجتماعی مؤثر بر اضطراب در این جمعیت (سمت شغلی، تحصیلات، سن و سابقه کار) با یکدیگر هم تا و به طور تصادفی به دو گروه گواه و آزمایشی تقسیم شدند. نظر به اینکه برپایه بررسی راهنمای افرادی که نمره اضطراب آشکار شان کمتر از ۴۳ بود، به دلیل احساس بی نیازی، تمایل به شرکت در کلاس نداشتند و از آنچا که در الگوی پرسید بر برنامه ریزی برای گروهی که این مداخله برای آنها سودمند است تأکید می شود (گرین^۱، کروتسر^۲، دیدز^۳ و پارتریج^۴، ۱۹۸۰)، همه مأموران ایستگاه های یاد شده که نمره اضطراب آشکار شان از ۴۳ به بالا (از متوسط به بالا) بود و به دلیل اضطراب تحت درمان نبودند، وارد پژوهش شدند. این افراد ۱۲۸ نفر بودند که در نهایت ۱۱۸ نفر آنها (۵۹ نفر در گروه آزمایشی و ۵۹ نفر در گروه گواه) در پژوهش شرکت نمودند.

ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای کتبی خود ساخته (شامل پرسش های اجتماعی و بهداشتی مرتبط با اضطراب) و پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشیل برگر^۵ بود. پرسشنامه خود ساخته با بهره گیری از روش روابی محتوا^۶ بررسی گردید. پایایی^۷ آن به روش آزمون - باز آزمون^۸ اندازه گیری شد و ضریب همبستگی پیش از ۰/۸۰ به دست آمد.

برای تعیین اضطراب آشکار و پنهان نیز پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشیل برگر به کار برده شد. این پرسشنامه دارای چهل عبارت است، این عبارت ها در دو مقیاس اضطراب آشکار و پنهان، ویژگی اضطراب را به دو صورت «حالات» و «صفت» می سنجند. نمره های هر کدام از دو مقیاس اضطراب آشکار و پنهان می توانند در دامنه ای از ۲۰ تا ۸۰ قرار گیرد. این پرسشنامه را می توان به دو صورت فردی و یا گروهی اجرا نمود. آزمونگر، پیش از اجرای آن باید با آزمودنی ها تفاهم و ارتباط برقرار نماید. پایایی هر دو مقیاس برای اجرا بر روی آزمودنی های گروه بهنجار که

1- Green	2- Kreuter
3- Deeds	4- Partridge
5- Spielberger State-Trait Anxiety Inventory	
6- content validity	7- reliability
8- test-retest	9- predisposing
10- reinforcing	11- enabling
12- educational diagnosis	13- evaluation
14- Butler	15- Ost

۱۱/۹، ۱۲/۶، ۱۸/۶، ۵۰/۹ در صد افراد دارای سمت‌های یادشده بودند.

میانگین سنی گروه آزمایشی ۳۶ سال (انحراف معیار ۷/۱۵) و میانگین سنی گروه گواه ۳۶/۴ (انحراف معیار ۸/۰) بود.

هم‌چنین در گروه آزمایشی به ترتیب ۸/۵ و ۹۱/۵ در صد افراد مورد بررسی دارای تحصیلات کمتر از دیپلم و دیپلم یا بالاتر و در گروه گواه به ترتیب ۱۱/۹ و ۸۸/۱ در صد افراد دارای تحصیلات یادشده بودند.

میانگین سابقه کار آزمودنی‌های گروه آزمایشی ۱۳ سال (انحراف معیار ۸/۲۳) و میانگین سابقه کاری گروه گواه ۱۳/۹ سال (انحراف معیار ۸/۵) بود.

دو گروه آزمایشی و گواه پیش از برنامه آموزشی از نظر متغیرهای اضطراب آشکار، اضطراب پنهان و متغیرهای مؤثر بر اضطراب یعنی من، سابقه کار، سمت شغلی و تحصیلات با یکدیگر تفاوت معنی‌داری نداشتند. ولی پس از مداخله آموزشی، دو گروه از نظر اضطراب آشکار و پنهان تفاوت معنی‌داری ($p < 0.001$) نشان دادند (جدول ۱).

جدول ۱ - میانگین و انحراف معیار اضطراب آشکار و اضطراب پنهان آزمودنی‌های دو گروه پیش از مداخله آموزشی و پس از آن

		گروه گواه			گروه آزمایشی		
		میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار
اضطراب آشکار							
۷/۰۱	۵۱/۰۴	۵/۰۵	۵۰/۰۵	۵۰/۴۹	۵/۰۴	پیش آزمون	
۰/۹۰	۵۰/۳۶	۷/۲۲	۳۹/۷۱	۳۹/۷۱	۷/۲۲	پس آزمون	
اضطراب پنهان							
۷/۳۱	۴۲/۲۰	۷/۳۷	۴۲/۸۳	۴۲/۸۳	۷/۳۷	پیش آزمون	
۷/۱۱	۴۲/۰۸	۷/۹۸	۳۷/۰۹	۳۷/۰۹	۷/۹۸	پس آزمون	

1- progressive relaxation

2- release-only relaxation

3- cue – controlled relaxation

4- differential relaxation 5- rapid relaxation

به کار برده شد. در زمینه شیوه برگزاری جلسات نیز از اصول و راهکارهای الگو و نظریه‌های یادشده بهره گرفته شد. در این بررسی، مرحله گوناگون آرام‌سازی شامل منطق این روش، مرحله آرام‌سازی پیشرونده^۱، آرام‌سازی از طریق رهاسازی^۲، آرام‌سازی از طریق کنترل نشانه‌ای^۳، آرام‌سازی افتراقی^۴ و آرام‌سازی سریع^۵ آموزش داده شد.

کلاس‌های آموزشی برای هر یک از گروه‌های ۹ گانه آزمایشی (سه استگاه، هر استگاه سه نوبت، در مجموع ۹ گروه) به تفکیک به مدت ۷ هفته نامتناوب، هر هفته یک روز و هر روز ۲-۲/۵ ساعت برگزار گردید. هر گروه در مجموع ۱۴-۱۷ ساعت آموزش دید.

این کلاس‌ها به شیوه سخنرانی کوتاه مدت همراه با پرسش و پاسخ، بحث گروهی، نمایش عملی و نمایش فیلم برگزار گردید. در هر جلسه برای تمرین مهارت‌های آموزش داده شده در آن جلسه، جزو راهنمای شرکت کنندگان داده می‌شد و انجام تمرین‌ها به مدت یک یا دو هفته (بسته به مرحله آموزشی) و انعکاس آن در فرم‌های ثبت تمرین‌ها از آنها در خواست می‌گردید. محل تشکیل کلاس‌ها استگاه‌های آتش‌نشانی بود. هم‌زمان با تشکیل کلاس‌های آموزشی در گروه آزمایشی کلاس‌هایی نیز (غیر از آموزش‌های مقابله با اضطراب) در استگاه‌های گروه گواه برگزار گردید. پس از پایان کلاس‌ها و انجام تمرین‌های جلسه آخر، پس آزمون انجام شد.

تحلیل داده‌ها به کمک آزمون^۶، ^۷ زوج و آزمون^۸ انجام شد.

یافته‌ها

در گروه آزمایشی به ترتیب ۵۰/۸، ۱۸/۶، ۱۶/۹ و ۱۳/۶ در صد افراد مورد بررسی، آتش‌نشان، کاردان، کمک فرمانده و فرمانده و در گروه گواه به ترتیب

با توجه به این که گروه‌های گواه و آزمایشی پیش از آموزش از نظر متغیرهای مؤثر بر اضطراب در این جمعیت، یعنی سمت شغلی، تحصیلات، سن و سابقه کار و همچنین اضطراب آشکار و پنهان با یکدیگر تفاوت معنی دار نداشتند، تفاوت پدیدآمده پس از مداخله آموزشی نشان دهنده تأثیر آموزش بر کاهش میزان اضطراب می‌باشد. این تأثیر با مقایسه میزان اضطراب پیش و پس از مداخله در گروه آزمایشی نیز تأیید می‌گردد.


بررسی‌های انجام شده در زمینه تأثیر روش‌های آرام‌سازی بر اضطراب، نشان دهنده تأثیر روش‌های گوناگون آرام‌سازی در جمعیت‌های مورد بررسی بر میزان اضطراب آشکار یا پنهان بوده است. در یک بررسی با عنوان تأثیر دو روش آرام‌سازی بر سطح اضطراب دانش‌آموزان دیربرستانی، رشید و پریش (۱۹۹۸) نشان دادند که پس از آموزش، نمره اضطراب آشکار افراد آموزش‌دیده با افرادی که این آموزش را ندیده بودند تفاوت معنی داری داشت، اما در نمره اضطراب پنهان آنان تفاوتی دیده نشد.

راب (۲۰۰۰) با مقایسه چهار روش آرام‌سازی در ۶۰ دانشجو نشان داد که این روش‌ها به یک اندازه در ایجاد تفاوت معنی دار در اضطراب و آرامش درک شده بین پیش آزمون و پس آزمون مؤثر بوده است. هم‌چنین در یک بررسی که برای تعیین تأثیر آرام‌سازی با تصویرسازی هدایت شده^۱ بر میزان اضطراب مادرانی که تازه زایمان کرده بودند انجام شد، نشان داده شد که نمره‌های اضطراب آشکار و پنهان گروه آزمایشی پس از آموزش به طور معنی دار کمتر از گروه گواه بوده است (ریس، ۱۹۹۵).


پژوهش‌های انجام شده (بورعماری، ۱۳۷۳ و احمدی‌نژاد، ۱۳۷۷) برای تعیین تأثیر آرام‌سازی بر اضطراب بیماران کاتریسم قلبی و بر اضطراب دانشجویان سال اول پرستاری در آغاز ورود به محیط

همان‌گونه که نمودارهای ۱ و ۲ نشان می‌دهند در گروه آزمایشی میان اضطراب آشکار و پنهان پیش از مداخله آموزشی و پس از آن تفاوت معنی داری وجود دارد ($p < 0.01$)، ولی در گروه گواه این تفاوت معنی دار نمی‌باشد.

نمودار ۱ - میانگین اضطراب آشکار پیش از مداخله و پس از آن



نمودار ۲ - میانگین اضطراب پنهان پیش از مداخله و پس از آن



بحث

یافته‌های بررسی حاضر نشان داد که پس از مداخله آموزشی، میزان اضطراب آشکار و پنهان در گروه آزمایشی نسبت به گروه گواه کاهش یافته است.

بدون همکاری آنان انجام آن میسر نبود سپاسگزاریم.
همچنین از آقای مهرداد کاظم زاده عطوفی که در
اجرای این بررسی همکاری نمودند قدردانی می‌نماییم.

منابع

- استورا، جین (۱۳۷۷). *تئیدگی با استرس بیماری جدید تمدن*. ترجمه
پریخ دادستان. تهران: انتشارات رشد (ص، ۲۱).
- احمدی نژاد، سرور (۱۳۷۷). *بررسی تأثیر آموزش تن آرامی بر سطح
اضطراب آشکار دانشجویان سال اول پرستاری در بدو ورود به محیط
بالینی در دانشکده پرستاری و مامایی*. پایان نامه کارشناسی ارشد
آموزش پرستاری. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-
درمانی تهران.
- پورمعماری، محمد حسین (۱۳۷۳). *بررسی تأثیر کاربرد روش
آرامسازی بنیون روی اضطراب و دیس ریتمی های قلبی بیماران
کلتریسم قلبی*. پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش پرستاری.
دانشگاه تربیت مدرس (ص، ۷۳).
- پیغمبر، ورا (۱۳۷۹). *احصول گنتر استرس*. ترجمه آرین ابوک. تهران:
انتشارات نسل نوآندیش، (ص، ۲۵).
- جلیلی، زهرا (۱۳۷۹). *گنتر گم خونی فقر آهن کودکان ۵-۱۱ ساله به
استفاده از الگوی آموزشی پرسیمه*. پایان نامه دکتری رشته آموزش
بهداشت. دانشگاه تربیت مدرس، (ص، ۱۲۱).
- حسینی، ابوالقاسم (۱۳۷۸). *طب مشکلات مربوط به بهداشت
روانی، فصلنامه علمی-پژوهشی احصول بهداشت روانی*. سال اول،
شماره ۱، ۴-۶.
- دهقانی، علی (۱۳۷۶). *بررسی تأثیر مدل پرسید در خانواده بر وضعیت
کوتو آندمیک فرزندان در شهر بزرگ*. پایان نامه کارشناسی ارشد
آموزش بهداشت. دانشگاه تربیت مدرس (ص، ۹۴).
- دیویسون، جرالدی: گلدفرید، مارین آر. (۱۳۷۱). *رفتار درمانی
بالینی*. ترجمه احمد احمدی علوی آبادی. تهران: مرکز نشر
دانشگاهی، (ص، ۸۷).
- شریفی راد، غلامرضا (۱۳۷۹). *بررسی میزان تأثیر آموزش بهداشت در
کاهش بیماریهای اتکی روده‌ای*. پایان نامه دکتری رشته آموزش
بهداشت. دانشگاه تربیت مدرس، (ص، ۱۲۴).

بالینی، نشان داد که آرامسازی در کاهش اضطراب آشکار
آنان مؤثر است که با یافته‌های پژوهش حاضر همسوی دارد.
بهره‌گیری از الگوی پرسید به عنوان یک چهارچوب
مداخله‌ای در کاهش یک مشکل بهداشتی (اضطراب)
در تأیید یافته‌های سایر پژوهش‌هایی است که الگوی
پرسید را برای کاهش و کنترل مشکلات بهداشتی دیگر
از جمله گواتر آندمیک کودکان (دهقانی، ۱۳۷۶)،
بیماری‌های انگلی روده‌ای (شریفی راد، ۱۳۷۹) و
کم خونی ناشی از فقر آهن در کودکان ۱-۵ ساله
(جلیلی، ۱۳۷۹) به کار برده‌اند.

از آنجا که در محل کار، افراد مورد بررسی در
دسترس هستند، پیگیری مداخلات آموزشی و تشویق
آنها به شرکت در برنامه‌های بهداشتی آسان‌تر است.
همچنین در محل کار انسجام و همبستگی میان افراد
موجب حمایت همکاران در راستای در پیش گرفتن
رفتار بهداشتی می‌گردد و می‌توان افراد را به بهره‌گیری
از روش‌هایی برای محافظت در برابر آسیب‌های شغلی
احتمالی مجهز نمود (نایدو^۱ و ویلز^۲، ۲۰۰۰). با توجه
به یافته‌های پژوهش حاضر مبنی بر ناآشنایی مأموران با
روش‌های آرامسازی، استقبال آنان از برنامه آموزشی و
اضطراب‌زا بودن این شغل، پیشنهاد می‌شود که سازمان
آتش‌نشانی و خدمات ایمنی برنامه آموزشی رویارویی
با اضطراب را نیز در چهارچوب برنامه آموزشی افراد در
آغاز استخدام و در حین خدمت در سازمان درنظر گیرد.
به طور کلی می‌توان گفت یافته‌های این پژوهش
نشان‌دهنده کاربرد مؤثر الگوی پرسید در کاهش میزان
اضطراب آشکار و پنهان مأموران آتش‌نشانی شهر تهران
و سودمندبوzen برگزاری کلاس‌های آموزشی برای این
افراد است.

سپاسگزاری

از مستولین سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی
شهر تهران که زمینه را برای انجام این پژوهش آماده
نمودند تشکر می‌کنیم و از مأموران سازمان آتش‌نشانی
و خدمات ایمنی که در این پژوهش شرکت نمودند و

- Ost,L.G.(1987). Applied relaxation: description of a coping technique and review of controlled studies. *Behavior Research and Therapy*, 25,397-409.
- Rashid,Z.M.,&Parish,T.(1998). The effect of two type of relaxation training on students' levels of anxiety. *Adolescence*, 3, 99-101.
- Rees,B.L.(1995). Effect of relaxation with guided imagery on anxiety, depression, and self-esteem in primiparas. *Journal of Holistic Nursing*, 13, 255-267.
- Robb,S.L.(2000). Music assisted progressive muscle relaxation, progressive muscle relaxation, music listening and silence: a comparison of relaxation techniques. *Journal of Music Therapy*, 37,2-21.
- Safren,S.A.,Gonzalez,R.E.,Horner,K.J., &Leung,A.W. (2000). Anxiety in ethnic minority youth. *Behavior Modification*, 24, 147-183.
- Sarason,I.G., &Sarason,B.R.(1999). *Abnormal psychology*. New Jersey: Prentice-Hall.
- مهرام، بهروز (۱۳۷۲). راهنمای آزمون اضطراب آنکار و پنهان اشیل بروگر. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، (صص، ۴-۹).
- نوریالا، احمد؛ محمد، کاظم؛ باقری یزدی، سیدعباس (۱۳۷۸). بررسی شیوه اختلالهای روانپردازی در شهر تهران. *مجله پژوهشی حکیم*، دوره ۲، شماره ۴، ۲۲۳-۲۱۲.
- Arakawa,S.(1997). Relaxation to reduce nausea, vomiting and anxiety induced by chemotherapy in Japanese patients. *Cancer Nursing*,20,342-349.
- Barnard,R.J., &Duncan,H.W.(1975). Heart rate and ECG responses of firefighters. *Journal of Occupational Medicine*, 17,247-250.
- Beaton,R.D.,Murphy,S.A.,Pike,K.C., &Corneil,W. (1997). Social support and network conflict in firefighters and paramedics. *Western Journal of Nursing Research*, 19, 297-313.
- Butler,J.T.(2001). *Principles of health education and health promotion*. Belmont: WADSWORTH, (p.269).
- Fahrion,S.L., &Norris,P.A.(1990). self regulation of anxiety. *Bulletin of the Menninger Clinic*, 54, 217-232.
- Green,L. W.,Kreuter,M. W.,Deeds,S. G.,&Partridge, K.B.(1980). *Health education planning: A diagnostic approach*. California: Mayfield Publishing Company, (p.p.12-16).
- Kaplan,H.I., &Sadock,B.J.(1998). *Synopsis of psychiatry*. Baltimore: Williams & Wilkins Co, (p. 581).
- Naidoo,J., &Wills,J.(2000). *Health promotion foundations for practice*. Edinburgh: Bailliere Tindall, (p.265).
- Noyes,R.,&Hoehn,R.(1998). *The anxiety disorders*. United Kingdom, Cambridge University,(p.p.25-26).

- ۱- مجتبی احسان منش
۲- دکتر جعفر بوالهری
۳- دکتر سید اکبر بیان زاده
۴- دکتر بهروز پیرشك
۵- دکتر مریم رسولیان
۶- شهلا زعفری نویری
۷- دکتر مجید صادقی
۸- دکر محمد کاظم عاطف وحید

همچون شماره های پیش، برایر نهاده های فارسی چند واژه روانشناسی و روانپژوهی که استادان و شورای نویسنده گان فصلنامه اندیشه و رفتار برگزیده اند، به آگاهی می رسد. کارشناسان و استادانی که در این زمینه همکاری داشته اند، عبارتند از:

antisocial personality	شخصیت ضد اجتماعی
collaborative	همکارانه
desensitization	حساسیت زدایی
evaluation	ارزشیابی
self-stimulation	خودانگیزی
self-verbalization	خودگویی
sexual dysfunction	اختلال عملکرد جنسی
stop task	تکلیف ایست
supportive behaviors	رفتارهای حمایت گر
unstructured interview	مصالحبه غیر ساختاری

Andeesheh
Va
Raftar
اندیشه و رفتار

۸۴