



افکار خودکشی و سطح کلسترونل خون

دکتر سعید چمن آزاد شهری^{*}، دکتر سید کاظم ملکوتی^{**}، دکتر سید محمدی حسن زاده^{***}

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی سطح کلسترونل خون بیماران روانپردازیکی بستری دارای افکار خودکشی و مقایسه‌ی آن با سطح کلسترونل خون بیماران مشابه که دارای افکار خودکشی نبوده‌اند، انجام شده است.

روش: در این پژوهش توصیفی- مقاطعی سطح کلسترونل خون ۳۷۴ بیمار (۲۴۷ مرد، ۱۲۷ زن) بستری در مرکز آموزشی- درمانی روانپردازی ایران، در دو گروه با و بدون افکار خودکشی سنجیده و با هم مقایسه شد. این افراد با تشخیص‌های اسکنپر فرزنیا (۱۵۷ نفر)، اختلال دوقطبی (۱۹۲ نفر)، افسردگی اساسی (۶۸ نفر) و سایر اختلال‌های روانپردازیکی بستری شده بودند. برای تحلیل داده‌ها آزمون آماری χ^2 به کار برده شد.

یافته‌ها: سطح کلسترونل پایه در دو گروه بیماران با و بدون افکار خودکشی تفاوت معنی‌دار نداشت.

نتیجه: شاید نتوان کلسترونل خون را به عنوان شناختی زیست‌شناسی و عامل خطر برای خودکشی در بیماران روانپردازیکی بستری به شمار آورد.

کلیدواژه: افسردگی، افکار خودکشی، کلسترونل

افکار یا اقدام به خودکشی از علامت‌های اختلال

مقدمه

افکار خودکشی اساسی است. در زمینه‌ی سبب‌شناسی افسردگی علت‌های گوناگون عصبی- زیست‌شناسی،

خودکشی یکی از فوریت‌های روانپردازیکی و یکی از مشکلات روانی- اجتماعی به شمار می‌رود. وجود

* روانپردازیکی، اسلام آباد غرب، بیمارستان امام خمینی (نویسنده مسئول).

** روانپردازیکی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران. تهران، خیابان طالقانی، بین خیابان بهار و شریعتی، کوچه جهان، پلاک ۱، انتستیتو روانپردازیکی تهران و مرکز تحقیقات بهداشت روان.

*** روانپردازیکی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران. تهران، خیابان طالقانی، بین خیابان بهار و شریعتی، کوچه جهان، پلاک ۱، انتستیتو روانپردازیکی تهران و مرکز تحقیقات بهداشت روان.

ارثی و استرس‌های روانی - اجتماعی مطرح گردیده است (کاپلان^۱ و سادوک^۲، ۱۹۹۸).

درومان و پیش‌گیری بیماران با افرادی که خودکشی از یافته‌های آن سود برد و همچنین در تعیین رژیم غذایی این بیماران از آنها بهره‌برداری نمود.

روش

این بررسی مقطعی- توصیفی بود. جمعیت پژوهش کلیه بیماران با سن بیشتر از ۲۰ سال بستری در مرکز آموزشی- درمانی روانپزشکی ایران از آغاز زمستان ۱۳۸۰ تا پایان تابستان ۱۳۸۱ بودند. از مجموع ۴۵۵ بیمار ارزیابی شده ۱۰۷ نفر با تشخیص اسکیزوفرنیا، ۶۸ نفر با افسردگی اساسی، ۱۹۲ نفر با اختلال دوقطبی و سایر بیماران با تشخیص‌های دیگر بستری شده بودند. در این بررسی معیارهای حذف عبارت بودند از بیماری‌های بدنی مؤثر بر کلسترون خون، سابقه‌ی مصرف داروهای مؤثر بر سطح کلسترون خون، مصرف الكل و سابقه‌ی خانوادگی کلسترون بالا. برای بررسی سابقه‌ی بودن یا نبودن فکر خودکشی (در طی یک ماه پیش از بستری)، بیمار و خانواده‌اش به‌طور مستقیم مورد پرسش قرار گرفتند و یا از اطلاعات موجود در پرونده‌ی بالینی آنها بهره گرفته شد. برای اندازه‌گیری کلسترون خون در بیماران، به صورت ناشتا و در نخستین فرصت ممکن پس از بستری، پسنج میلی‌لیتر خون گرفته شد. برای اندازه‌گیری کلسترون، روش لیبرمن بوشارد^{۱۳} به کار یارده شد. سپس اطلاعاتی در زمینه‌ی بیماری‌های بدنی مؤثر بر چربی‌خون (مانند بیماری‌های گوارشی و کبدی)، داروهای مؤثر بر سطح

هم‌چنان که سطوح بالای کلسترون خون تهدیدکننده‌ی زندگی انسان است (برای نمونه به علت افزایش خطر حمله‌های قلبی) کاهش آن نیز می‌تواند زیان‌بار باشد. در برخی بررسی‌ها ارتباطی میان سطح کلسترون خون و بروز افسردگی و خودکشی دیده شده (گوبلن^۲ و پلی‌سول^۳، ۲۰۰۲؛ لستر^۴، کیم^۵، لی^۶ و کیم، ۲۰۰۱)، و در برخی بررسی‌ها چنین ارتباطی گزارش نشده است (آلمندا- مونتز^۷، ۲۰۰۰؛ استیگمن^۸، ۲۰۰۱).

افزایش گیرنده‌ی ایترولوکین^۹، وجه مشترک بیماران افسردگی خودکشی کننده و دارای سطح پایین کلسترون است (پتین^{۱۰}، ۱۹۹۵). کاهش کلسترون استریفیه باعث اختلال در شناوری^{۱۱} غشای سلولی و کارکرد گیرنده‌های سروتونین و نوراپی‌نفرین می‌شود (میز^{۱۲}، دلانگه^{۱۳} و ملنر^{۱۴}، ۱۹۹۴). کاهش کلسترون به‌علت مصرف کم چربی، کاهش اسیدهای چرب سرم را به‌دبیال دارد. از آنجاکه اسیدهای چرب برای چسبندگی به آلبومین سرم با تریپتوфан رقابت می‌کنند، کاهش اسیدهای چرب باعث افزایش چسبندگی تریپتوfan به آلبومین، کاهش مقدار آزاد آن در سرم و در نتیجه، کاهش سنتز سروتونین می‌گردد (هیل بارندز^{۱۵}، اسپیتز^{۱۶} و فوستر^{۱۷}، ۱۹۹۵). کاهش سروتونین و نوراپی‌نفرین از عوامل ایجاد افسردگی و به‌دبیال آن افکار و اقدام به خودکشی می‌باشند (کاپلان و سادوک، ۱۹۹۸).

1- Kaplan	2-Sadock
3-Guillen	4-Pelissol
5- Lester	6- Kim
7- Lee	8- Almeida- Montes
9- Steegman	10- Patienen
11- fluidity	12- Maes
13- Delanghe	14- Meltzer
15- Hillbarnds	16- Spitz
17- Foster	18- Liberman Bushard

این بررسی با هدف پاسخ به این پرسش که آیا بین سطح کلسترون تام خون بیماران روانپزشکی بستری با افکار خودکشی و سطح آن در بیماران بدون افکار خودکشی تفاوتی وجود دارد یا خیر، انجام گردیده است و در صورت مثبت بودن پاسخ شاید بتوان در

مقایسه شد. برای تحلیل داده‌ها، آزمون آماری t -به کار برد.

یافته‌ها

آزمون آماری t تفاوت معنی‌داری میان سطح کلسترول خون بیماران دارای افکار خودکشی و بیماران بدون افکار خودکشی نشان نداد (جدول ۱). هم‌چنین آزمون آماری t تفاوت معنی‌داری در زمینه‌ی سطح کلسترول خون بیماران زن و مرد مورد بررسی (با و بدون افکار خودکشی) نشان نداد (جدول ۲).

کلسترول خون (مانند آندروژن‌ها، مادرها، کاتکولامین‌ها، ...)، سابقه‌ی خانوادگی کلسترول بالا و سابقه‌ی مصرف الكل از بیمار و خانواده‌اش گردآوری شد و در صورت مثبت بودن هر یک از موارد یاد شده، فرد مورد نظر از پژوهش کنار گذاشته می‌شد. ۴۵۵ بیمار مورد ارزیابی قرار گرفتند که ۸۱ مورد آنها کنار گذاشته شدند. از ۳۷۴ بیمار باقی‌مانده، ۲۴۷ نفر (۶۶٪) مرد و ۱۲۷ نفر (۳۴٪) زن بودند. ۱۸٪ آزمودنی‌های پژوهش افکار خودکشی داشتند.

پس از انتخاب نمونه‌های مورد نظر (بیماران با افکار خودکشی)، سطح کلسترول خون این افراد با سطح کلسترول خون بیماران بدون افکار خودکشی

جدول ۱ - مقایسه‌ی میانگین و انحراف معیار سطح کلسترول آزمودنی‌ها به تفکیک وجود افکار خودکشی

گروه	تعداد	میانگین	انحراف معیار	df	نمره t	سطح معنی‌داری	N.S.
با افکار خودکشی	۷۰	۱۸۱/۴۸	۴۶/۵۱	۳۷۲	۱/۲		
بدون افکار خودکشی	۳۰۴	۱۷۵/۰۳	۴۷/۶۶				

جدول ۲ - مقایسه‌ی میانگین و انحراف معیار سطح کلسترول آزمودنی‌ها به تفکیک جنس

گروه	تعداد	میانگین	انحراف معیار	df	نمره t	سطح معنی‌داری	N.S.
مرد	۲۴۷	۱۷۷/۸۷	۴۱/۹۳	۳۷۲	۰/۶۸		
زن	۱۲۷	۱۷۴/۲۷	۵۱/۸۷				

1- t-test

در زمینه‌ی مصرف الكل و افکار خودکشی، یکسان نبودن بیماران مورد پژوهش در زمینه‌ی نوع بیماری و عالیم آن و همچنین همتانشدن آزمودنی‌ها از نظر عوامل مداخله‌گر وزن، قد، تغذیه و سایر موارد نیز از دیگر محدودیت‌های این پژوهش می‌باشدند. انجام چنین پژوهشی با به کارگیری کلسترول تمام، آزاد و استریفیه و همچنین بهره‌گیری از پرسشنامه‌های معابر برای سنجش فعالیت‌های بدنی و الگوی تغذیه و همتاسازی با حذف دقیق مداخله‌گرها می‌توانند راه‌گشا باشند.

سپاسگزاری

با تشکر از زحمات سرکار خانم محبوبه دادفر و سرکار خانم سودابه طاهری که در تهیه و تنظیم این مقاله همکاری نمودند.

منابع

- Almeida-Montes,L.G.(2000). Relation of serum cholesterol, lipid, serotonin and tryptophan levels to severity of depression and to suicide attempt. *Journal of Psychiatry and Neuroscience*, 25, 371-377.
- Guillen,E.,& Pelissol, A.(2002). Relationship between attempted suicide, serum cholesterol level and novelty seeking in psychiatric inpatients. *Psychiatry Research*, 15,83.
- Hillbarns,M.,Spitz,R.T.,& Foster,H.G.(1995). Serum cholesterol and aggression in hospitalized male forensic patients. *Journal of Behavioral Medicine*, 18, 33-43.

- | | |
|--------------|--------------|
| 1- Salter | 2- Hillbarnd |
| 3- Huang | 4- Kunugi |
| 5- Takei | 6- Lindberg |
| 7- Rastam | 8- Gulberg |
| 9- Muldeon | 10- Manuck |
| 11- Mathews | 12- Shirely |
| 13- Fontenot | 14- Owens |

نظریه‌های گوناگونی برای تبیین پایین بودن سطح کلسترول و بروز رفتارهای تکانه‌ای و خودکشی ارایه شده است. برپایه‌ی نظریه‌ی سالتر^۱ (هیلبارندز^۲ و همکاران، ۱۹۹۵) که شاید مهم‌ترین نظریه در این زمینه باشد، کاهش کلسترول خون باعث کاهش سروتونین مغز می‌گردد و به دنبال آن عالیم افسردگی یا تکانه‌ای بروز می‌کند. در پژوهش حاضر، مقایسه‌ی کلسترول سرم دو گروه بیماران روانپزشکی بسته با و بدون افکار خودکشی تفاوت معنی‌دار نشان نداد. این یافته با یافته‌های هوانگ^۳ (۲۰۰۱) و آلمیدا-مونتس (۲۰۰۰) هم خوانی دارد.

یک بررسی فراتحلیلی (کونوجی^۴، ۲۰۰۱) نشان داد که افراد با سطح سرمی پایین کلسترول، افکار و رفتار خودکشی بیشتری نسبت به افراد با سطوح بالای کلسترول داشته‌اند. تاکه‌ای^۵ (۱۹۹۴) گزارش نمود که هر ۱۰ میلی‌گرم بر دسی لیتر افزایش سطح کلسترول، ۷/۱۸ احتمال وجود افکار و اقدام به خودکشی را کمتر می‌کند. همچنین طبق بررسی لیندبرگ^۶، رستم^۷ و گولبرگ^۸ (۱۹۹۲)، خطر مرگ و میر به ازای هر ۱ میلی‌مول در لیتر کاهش کلسترول سرم، ۱/۸٪ افزایش می‌یابد. مولدنون^۹، مانوک^{۱۰} و ماتیوس^{۱۱} (۱۹۹۰) و کاپلان^{۱۲} و فونت‌نوت^{۱۳} (۱۹۹۴) اثر کاهش کلسترول سرم را مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که کاهش آن باعث بروز افسردگی و رفتار پرخاشگرانه می‌شود. با این حال، برخی پژوهشگران مانند اوتنز^{۱۴} (۱۹۹۴) و هوانگ (۲۰۰۱) یافته‌های به دست آمده از پژوهش‌های انجام شده در این زمینه را به علت عدم کنترل دقیق عوامل مداخله‌گر، نارسانی‌های روش‌شناختی و نیز کمبودن شمار آزمودنی‌ها، مورد تردید قرار داده‌اند.

عوامل گوناگونی می‌توانند بر یافته‌های این پژوهش تأثیر بگذارند. برای بررسی مشکلات پزشکی مؤثر بر سطح کلسترول خون، نیاز به افراد متخصص و اقدامات پاراکلینیک ویژه می‌باشد. ارایه‌ی اطلاعات ناکافی

Huang,T.L.(2001). Serum cholesterol levels in mood disorders associated with physical violence or suicide attempts,In Taiwanese. *Chang Gung Medical Journal*, 24,563-568.

Kaplan,H.I.,& Sadock,B.J.(1998). *Synopsis of psychiatry* (8th ed.). Baltimore:Williams & Wilkins.

Kaplan,J.R.,Shirely,C.A.,& Fontenot,M.B.(1994). Demonstration of an association among dietary cholesterol, central serotonergic activity, and social behavior in monkeys. *Psychosomatic Medicine*, 56, 479-484.

Kim,Y.K.,Lee,H.J.,& Kim,J.Y. (2001). Low serum cholesterol is correlated to suicidality in a Korean sample. *Acta Psychiatrica Scandinavica*,105,141-148.

Kunugi,H. (2001). Low serum cholesterol and suicidal behavior.*Nippon Rinsho*, 59, 1599- 1604.

Lester,D. (2002). Serum cholesterol levels and suicide a meta analysis. *Suicide Life Threatening Behavior*, 32, 333-340.

Lindberg,G.,Rastam,L.,& Gulberg,B.(1992). Low serum cholesterol concentration and short-term mortality from injuries in men and women. *British Medical Journal*, 305, 277-279.

MacS.M.,Delanghe,J.,& Meltzer,H.Y.(1994). Low degree of stratification of serum cholesterol in depression: relevance for depression and suicide. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 90, 252-258.

Muldeon,M.F.,Manuck,S.B.,& Mathews,K.A. (1990). Low cholesterol concentrations and mortality: a quantitative review of primary prevention trials. *British Medical Journal*, 301, 309-314.

Owens,D.(1994). Cholesterol and violent death clinical importance in questionable (letter). *British Medical Journal*, 309, 1228.

Patienen,J.(1995).Low serum cholesterol, and interleukin-2. *American Journal of Epidemiology*, 141,716-718.

Steegman,P.H.(2001). Higher prevalence of depressive symptoms in middle-aged men with low serum cholesterol level. *Psychosomatic Medicine*, 62, 205-209.

Takei,N.(1994). Low serum cholesterol and suicide attempts.*British Journal of Psychiatry*,148, 703-708.