

رابطه بین عفونت‌های توکسoplasma گوندی و اسکیزوفرنیا

دکتر مهرزاد سرائی صحنه‌سرائی^۱، دکتر فرهاد شاملو^۲، دکتر حسن جهانی‌هاشمی^۳، فرهاد خباز^۳، صفرعلی علیزاده^۴

Relation Between Toxoplasma Gondii Infections and Schizophrenia

Mehrzed Saraei-Sahnesaraei^{*}, Farhad Shamloo^a, Hassan Jahani Hashemi^b,
Farhad Khabbaz^c, Safar-ali Alizadeh^c

Abstract

Objectives: With reference to the hypothesis of association between central nervous system infections and schizophrenia, in this study the relationship between Toxoplasma gondii infections and schizophrenia was studied. **Method:** In this case-control study, the serums of 104 inpatient schizophrenic patients admitted to 22 Bahman Hospital in Qazvin, Iran and 114 matched control subjects were examined. IgG and IgM specific antibodies to Toxoplasma gondii were detected using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Data were analyzed using χ^2 test, t-test and Fisher exact test. **Results:** 55.3% of the cases and 50.9% of the controls were seropositive for IgG specific antibodies to Toxoplasma gondii; and the differences were not statistically significant. The proportion of seropositive subjects was significantly lower in the first-episode patients (33.3%) than those in the next episodes (59.8%) ($P<0.05$). Moreover, 14.6% of the cases and 20% of the controls were seropositive for IgM specific antibodies to Toxoplasma gondii. However, the differences were not statistically significant. **Conclusion:** An epidemiological association between Toxoplasma gondii infections and schizophrenia was not observed.

Key words: *Toxoplasma gondii; toxoplasmosis; schizophrenia; ELISA*

[Received: 2 December 2007; Accepted: 23 June 2008]

چکیده

هدف: با توجه به فرضیه رابطه میان عفونت‌های مزمن دستگاه عصبی مرکزی و اختلال‌های روان پریشی، در این پژوهش رابطه ابتلاء به توکسoplasma گوندی و اسکیزوفرنیا بررسی شد. **روش:** در این بررسی مورود-شاهدی، سرم‌های ۱۰۴ بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا بستری در بیمارستان ۲۲ بهمن قزوین و ۱۱۴ فرد گواه مراجعه کننده به آزمایشگاه همتشاهد از نظر آنتی‌بادی‌های IgG و IgM برای توکسoplasma، آزمایش شدند. برای سنجش آنتی‌بادی‌ها، آزمون ELISA به کار برده شد. داده‌ها با آزمون χ^2 آزمون دقیق فیشر و آزمون t -تحلیل شدند.

یافته‌ها: ۵۵.۳٪ از مبتلایان به اسکیزوفرنیا و ۵۰.۹٪ از افراد گواه دارای آنتی‌بادی IgG علیه توکسoplasma بودند که از نظر آماری تفاوت معنی‌دار نبود. نسبت افراد IgG توکسoplasma مثبت در بیمارانی که در نخستین دوره بیماری بودند (۳۳٪) از آنها بیکار در دوره‌های بعدی بیماری بودند (۵۹٪) به طور معنی‌دار کمتر بود ($P<0.05$). هم‌چنین، ۱۶٪ از بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و ۲۰٪ از افراد گواه دارای آنتی‌بادی IgM علیه توکسoplasma بودند که از نظر آماری تفاوت معنی‌دار نبود. **نتیجه گیری:** بین آسودگی به توکسoplasma و بروز اسکیزوفرنیا رابطه همه‌گیرشناختی دیده نشد.

کلیدواژه: توکسoplasma گوندی؛ توکسoplasmoz؛ اسکیزوفرنیا؛ الایزا

[دریافت مقاله: ۱۳۸۶/۹/۱۱؛ پذیرش مقاله: ۱۳۸۷/۴/۳]

^۱ دکترای انگل شناسی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، پلکان شهید باهنر، دانشکده پزشکی شهید بابایی، بخش انگل شناسی و قارچ شناسی، دورنگار: ۰۳۳۲۴۹۷۱-۲۸۱، (نویسنده مسئول).
^۲ متخصص روانپردازی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛ ^۳ دکترای آمار حیاتی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛ ^۴ دانشجوی دکترای میکروب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مرکز توسعه و تحقیقات علوم پایه دانشکده پزشکی قزوین.

* Corresponding author: PhD. in Parasitology, Assistant Prof. of Qazvin University of Medical Sciences, Faculty of Medicine, Shahid Babaei Faculty of Medicine, Shahid Bahonar Boulevard, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran, IR. Fax: +98281-3324971. E-mail: msaraei@qums.ac.ir; ^a Psychiatrist, Assistant Prof. of Qazvin University of Medical Sciences; ^b PhD. in Bio-statistics, Associate Prof. of Qazvin University of Medical Science; ^c Postgraduate Student in Microbiology, Qazvin University of Medical Science.

مقدمه

توکسoplasmای آلدود می‌شوند (هالونن^{۲۸}، لیمن^{۲۹} و چیو^{۳۰}، ۱۹۹۶). در بررسی پس از مرگ بیماران مبتلا به اسکیزوفرنسیا نیز کاهش شمار آستریوستیت‌ها گزارش شده است (دویل^{۳۱} و دیکین^{۳۲}، ۲۰۰۲). چند داروی به کار برده شده برای درمان بیماری‌های روان‌پریشی از جمله هالوپریدول^{۳۳} می‌تواند افزایش تاکیزوئیت‌های توکسoplasmای را در کشت یاخته‌های فیبروبلاست انسانی مهار کند (جونز-براندو^{۳۴}، توری و یولکن، ۲۰۰۳). این داروهای مانند داروهای ضد توکسoplasmای در پیش‌گیری از تغییرات رفتاری در موش‌های رت^{۳۵} مؤثر می‌باشند (ویستر و همکاران، ۲۰۰۶).

در بررسی‌های همه‌گیرشناسی از الگوهای گوناگونی برای تعیین ارتباط میان توکسoplasmای اسکیزوفرنسیا بهره گرفته شده است. در بیشتر بررسی‌ها شیوع توکسoplasmای در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنسیا و گروه گواه مقایسه شده است (لویک^{۳۶} و همکاران، ۲۰۰۴؛ یولکن و همکاران، ۲۰۰۱؛ ستین کایا^{۳۷}، یازار^{۳۸}، جکیکی^{۳۹} و ناملی^{۴۰}، ال-سهن^{۴۱}، شاتات^{۴۲} و گیتانی^{۴۳}؛ آلواردو-اسکوئیول^{۴۴} و همکاران، ۲۰۰۶؛ وانگ^{۴۵} و همکاران، ۲۰۰۶؛ باخمن^{۴۶}، شرودر^{۴۷}، بوتمر^{۴۸}، توری و بولکن، ۲۰۰۵؛ آمنینجر^{۴۹} و همکاران، ۲۰۰۶؛ گو^{۵۰} و همکاران، ۲۰۰۱؛ آپاریشیو گاردیو^{۵۱} و پانیا گو آردوندو^{۵۲}؛ کوئینگ^{۵۳}، کسیائونیان^{۵۴} ولی^{۵۵}، ۱۹۹۹). در بررسی‌های دیگری چنین فرض شده که در عفونت‌های دوران بارداری،

اسکیزوفرنسیا یک اختلال روان‌پریشی^۱ با سبب‌شناسی ناشناخته است که با ناهنجاری‌هایی در تفکر، خلق و رفتار مشخص می‌گردد. میزان شیوع آن در جمعیت عمومی ۱/۵-۱٪ است (سادوک^۲ و سادوک، ۲۰۰۵). ژنتیک، زمینه‌ساز اصلی ابتلا به این بیماری است. عوامل عفونی در سبب‌شناسی اسکیزوفرنسیا مطرح هستند و بیشتر بررسی‌ها بر عوامل شناخته شده‌ای متوجه شده‌اند که امکان انتقال مادرزادی آنها وجود داشته است (یولکن^۳ و توری^۴، ۲۰۰۶). یکی از این عوامل توکسoplasmای گوندی^۵ است. این تک‌یاخته انتشار جهانی دارد و ۲۰-۸۰ درصد افراد در بیشتر مناطق به آن آلدود هستند (ویستر^۶، لمبرتون^۷، دونلی^۸ و توری^۹، ۲۰۰۶). انسان به طور معمول با خوردن گوشت خام یا نیم‌پز دارای کیست‌های نسجی^{۱۰} و یا خوردن آب، غذا و سبزیجات دارای اواووسیست‌های^{۱۱} دفع شده با مدفع گریه، آلدود می‌شود. عفونت مادرزادی با انتقال از جفت تاکیزوئیت‌های توکسoplasmای رخ می‌دهد. اشکال بدحیم توکسoplasmوز شامل موارد مادرزادی و اختلال اینمی است (موتنایا^{۱۲} و رمینگتون^{۱۴}، ۲۰۰۵).

فرضیه ارتباط توکسoplasmای اسکیزوفرنسیا در گذشته دورتر مورد توجه بود، اما در سال‌های اخیر بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است. این فرضیه از آنجا سرچشمه گرفت که اسکیزوفرنسیا یک بیماری روان‌پریشی با سیر مزمن است و توکسoplasmای نیز انگلی است که به صورت عفونت مزمن (نهفته) در بافت‌های گوناگون به ویژه مغز باقی می‌ماند. بنابراین چنین فرض شد که ممکن است این تک‌یاخته در بروز برخی موارد اسکیزوفرنسیا نقش داشته باشد. توکسoplasmای سبب تغییرات رفتاری در موش‌ها شده (بردوی^{۱۵}، ویستر و مکدونالد^{۱۶}، ۲۰۰۰) و افزایش دوپامین در مغز موش‌های با عفونت مزمن را در پی دارد (استیبس^{۱۷}، ۱۹۸۵). دوپامین پیام‌رسان عصبی اصلی در گیر در پاتوتوز اسکیزوفرنسیا است. هم‌چنین، آلدودگی به توکسoplasmای سبب افزایش بیان اندول آمین، ۲ و ۳-دی اکسیزناز^{۱۸} و کینورنین^{۱۹} در مغز موش‌ها شده (سیلو^{۲۰} و همکاران، ۲۰۰۲) و باعث تغییر چشم گیر در میزان اکسید نیتریک^{۲۱} در میکروگلیا^{۲۲} و سایر یاخته‌های دستگاه عصبی مرکزی می‌شود (روزنفلد^{۲۳}، مارتینز^{۲۴} و فیگویردو^{۲۵}، ۲۰۰۳). چنین تغییراتی در مغز افراد مبتلا به اسکیزوفرنسیا نیز نشان داده شده است. در کشت یاخته‌های عصبی، یاخته‌های گلیال^{۲۶} به ویژه آستریوستیت‌ها^{۲۷} به

1- psychotic	2- Sadock
3- Yolken	4- Torrey
5- Toxoplasma gondii	6- Webster
7- Lamberton	8- Donnelly
9- Torrey	10- tissue cysts
11- oocysts	12- tachyzoites
13- Montoya	14- Remington
15- Berdoy	16- Stibbs
17- Macdonald	
18- indoleamin 2,3-dioxygenase	
19- kynurenone	20- Silva
21- nitric oxide	22- microglia
23- Rozenfeld	24- Martinez
25- Figueiredo	26- glial cells
27- astrocytes	28- Halonen
29- Lyman	30- Chiu
31- Doyle	32- Deakin
33- haloperidol	34- Jones-Brando
35- rat	36- Leweke
37- Cetinkaya	38- Yazar
39- Gecici	40- Namli
41- El-Sahn	42- Shatat
43- Ghitany	44- Alvarado-esquivel
45- Wang	46- Bachmann
47- Sheroder	48- Bottmer
49- Amninger	50- Gu
51- Aparicio Garrido	52- Paniagua Redondo
53- Qiuying	54- Xiaonian
55- Li	

از بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و افراد گواه سرم تهیه شد. همه این افراد برای آزمایش‌هایی غیر از سروولوژی توکسوپلاسموز خون گیری شده بودند. سرم‌ها تا زمان انجام آزمایش در دمای ۲۰-۲۰ درجه سانتی گراد نگهداری شدند.

از روش ELISA^۹ برای سنجش آنتی‌بادی‌های IgG و IgM اختصاصی علیه توکسوپلاسمما در سرم افراد بهره گرفته شد. سرم‌ها با به کارگیری کیت‌های تجاری "Trinity Biotech, USA" به کمک دستگاه "Microplate Reader, Anthos 2020" مقدار پایین خوانده شد و بر حسب IU/ml^{۱۰} گزارش گردید. مقادیر مثبت و تراز ۱۷/۴ IU/ml منفی، بیشتر یا مساوی ۲۱/۹ IU/ml مثبت و مقادیر بین این دو، حد مرزی^{۱۱} در نظر گرفته شدند. مقادیر حد مرزی در آنالیز آماری لحاظ نشدند. آزمون‌ها در آزمایشگاه مرکز تحقیقات علوم پایه دانشکده پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی قزوین انجام شدند.

از آنجا که هیچ یک از بیماران گروه گواه برای انجام بررسی، حاضر به خون گیری نشدند، در همه موارد از سرم‌های باقی‌مانده آنها برای انجام سایر آزمایش‌ها استفاده گردید. از اطلاع‌رسانی به افراد بیمار و گواه در زمینه انجام آزمون توکسوپلاسموز پرهیز شد، زیرا آگاهی از آلودگی به توکسوپلاسمما سبب تشویش خاطر می‌شود (بیشتر عفونت‌های توکسوپلاسمما مزمن بوده و تا کنون علایم و عوارض مشخصی به این مرحله عفونت نسبت داده نشده است و به دلیل بی‌تأثیربودن داروهای موجود بر کیست‌های نسجی، اقدام درمانی هم ندارد). ولی به پژوهشک معالج نتایج آزمایش‌ها اطلاع داده شد.

برای تحلیل داده‌ها آزمون خی دو، آزمون دقیق فیشر و آزمون t به کار برده شد.

یافته‌ها

شصت و شش نفر از بیماران (۶۳/۵٪) مرد و ۳۸ نفر (۳۶/۵٪) زن بودند. ۲۷ نفر (۲۶٪) زنان خانه‌دار و ۳۹ نفر (۳۷/۵٪) کارگر و کشاورز بودند. نفر ۷۰ (۶۷/۳٪) ساکن شهر و ۳۴ نفر (۳۲/۷٪) ساکن روستا بودند. میزان تحصیلات

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1- Brown | 2- herpes simplex virus-type 2 |
| 3- Buksa | 4- Mortensen |
| 5- odds ratio | 6- Bortko |
| 7- Lun | |
| 8- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th. ed.) Text Revision | |
| 9- Enzyme-Linked Immunosorbent Assay | |
| 10- international unit | 11- borderline |

آن‌بادی‌های علیه عوامل عفونی از راه جفت به رویان منتقل می‌شوند و این آنتی‌بادی‌ها مسئول بروز اسکیزوفرنیا در سال‌های پس از تولد می‌باشند. برای اثبات این ادعا سرم‌های ذخیره‌شده مادران در سه ماهه سوم بارداری آزمایش شدند و نشان داده شد که آنتی‌بادی‌های مادری علیه ویروس آفلواز A (براون^۱ و همکاران، ۲۰۰۴)، ویروس هرپس سیمپلکس نوع ۲ (HSV-2)^۲ (بوکا^۳ و همکاران، ۲۰۰۱) و تک‌یاخته توکسوپلاسمما گوندیبی (براون و همکاران، ۲۰۰۵) با بروز اسکیزوفرنیا در فرزندان آنها ارتباط دارد. در الگویی دیگر، خون‌های ذخیره‌شده دوران نوزادی افرادی بررسی شد که در آغاز بلوغ اختلال‌های روان‌پریشی شدیدی نشان دادند. فراوانی نوزادانی که بعدها به اسکیزوفرنیا مبتلا شدند از نظر آنتی‌بادی‌های IgG علیه توکسوپلاسمما به طور معنی‌دار از افراد کنترل بیشتر بوده، ولی از نظر آنتی‌بادی‌های IgM علیه این انگل تفاوت معنی‌دار بین دو گروه دیده نشد (مورتنسن^۴ و همکاران، ۲۰۰۷).

در فراتحلیل ۴۲ بررسی انجام شده در زمینه ارتباط توکسوپلاسمما با اسکیزوفرنیا نسبت بخت‌ها^۵ طی پنج دهه در ۱۷ کشور دنیا در مجموع ۲/۷۳ (۲/۶۰-۳/۶۰) (CI: ۲/۱۰-۳/۶۰) بود (توری، بارتکو^۶، لون^۷ و یولکن، ۲۰۰۷). در برخی از این بررسی‌ها گروه گواه همتانشده به کار برده شده و یا شمار افراد گواه از بیماران کمتر بوده است (یولکن و همکاران، ۲۰۰۱؛ ستین کایا و همکاران، ۲۰۰۷؛ وانگ و همکاران، ۲۰۰۶؛ توری و یولکن، ۲۰۰۳). با توجه به اهمیت رعایت این دو مورد در پژوهش‌های مورد-شاهدی، بررسی حاضر انجام شد. به این معنی که افراد گروه گواه از نظر سن، جنس، شغل، سطح تحصیل و محل سکونت (شهر/ روستا) با بیماران همتا شدند و شمار آنها از بیماران بیشتر بود.

روش

آزمودنی‌های پژوهش ۱۰۴ نفر بودند که به تشخیص پژوهشک متخصص اعصاب و روان بر پایه معیارهای تشخیصی DSM-IV-TR^۸ (انجمان روانپزشکی آمریکا، ۲۰۰۴) به اسکیزوفرنیا مبتلا و در بخش اعصاب و روان مرکز پژوهشکی جامعه‌نگر قزوین بستری شده بودند.

شمار آزمودنی‌های گروه گواه ۱۱۴ نفر بود که برای انجام آزمایش‌های پیش از ازدواج و آزمایش‌های بهداشت مشاغل به آزمایشگاه مرکز بهداشت شهید بلندیان قزوین مراجعه کرده بودند. اینها از نظر سن، جنس، میزان تحصیل، شغل و محل سکونت با گروه بیمار همتا شدند.

جدول ۱- نتایج سنجش آنتی‌بادی‌های IgG و IgM علیه توکسoplasmای در بیماران اسکیزوفرنیا و گروه گواه با آزمون ELISA

	جمع	IgM (+)	جمع	IgG (+)
گروه اسکیزوفرنیا	۵۷ (٪۵۵/۳)	۱۴ (٪۱۴/۴)	* ۱۰۳	**۹۷
گروه گواه	۵۸ (٪۵۰/۹)	۲۲ (٪۲۰)	۱۱۴	**۱۱۰

* نتیجه آزمون یک بیمار در حد مرزی بود و مورد محاسبه قرار نگرفت؛ ** نتیجه آزمون هفت بیمار و چهار فرد گواه در حد مرزی بود و مورد محاسبه قرار نگرفت.

نبود (جدول ۱). نتایج آزمون هفت بیمار و چهار فرد گواه در حد مرزی بود.

بحث

در این بررسی شیوع توکسoplasmای در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و افراد گواه تفاوت معنی دار نداشت، حال آن که در پیشتر گزارش‌ها شیوع آن در مبتلایان به اسکیزوفرنیا به طور معنی داری بیشتر از افراد گواه بوده (لویک و همکاران، ۲۰۰۴؛ یولکن و همکاران، ۲۰۰۱؛ ستین کایا و همکاران، ۲۰۰۷؛ ال-سهن و همکاران، ۲۰۰۵؛ آلواردو-اسکوئیول و همکاران، ۲۰۰۶؛ وانگ و همکاران، ۲۰۰۶؛ آمنینجر و همکاران، ۲۰۰۶؛ گو و همکاران، ۲۰۰۱) و در شمار کمی از آنها تفاوت معنی دار دیده نشده است (آپاریشیو گارادیو و پانیا گو آردندو، ۱۹۶۸؛ کوئینگ و همکاران، ۱۹۹۹). به نظر می‌رسد، این تفاوت‌ها تا اندازه‌ای به تفاوت شیوه گزینش گروه گواه در پژوهش‌های گوناگون مربوط به توکسoplasmای بوده است.

همتابودن افراد گواه با بیماران از نظر متغیرهای جمعیت‌شناختی به ویژه سن، وضعیت اجتماعی-اقتصادی و مکان جغرافیایی که در آن زندگی می‌کنند، بسیار مهم و تعیین کننده است. این مهم در بررسی حاضر و بیشتر بررسی‌های انجام شده در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. از سیزده بررسی مربوط به سال‌های پیش از ۱۹۸۰، در ده بررسی، جمعیت عادی، در یک بررسی، بیماران با اختلال‌های عصب‌شناختی، در یک بررسی، کارمندان بیمارستان و در یک بررسی زنان تحت عمل جراحی به عنوان گروه گواه در بررسی وارد شده‌اند. هم‌چنین در هشت بررسی، شیوع توکسoplasmای در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا به طور معنی داری بیشتر از گروه گواه بوده است (توری و

۷۶ نفر (٪۷۳) پایین تر از دیبرستان بود. فراوانی هذیان ۸۸ نفر (٪۸۴/۶)، توهمند ۷۹ نفر (٪۷۶)، سخنگفتان نابسامان ۲۴ نفر (٪۲۳/۱)، رفتار نابسامان ۶۳ نفر (٪۶۰/۶)، اختلال عملکرد ۸۴ نفر (٪۸/۸) و علایم منفی ^۱ ۴۲ نفر (٪۴۰/۴) بود. هیجده نفر (٪۱۷/۳) از بیماران در دوره نخست و ۸۳ نفر (٪۷۹/۸) در دوره‌های بعدی بیماری بودند. برای سه بیمار دوره بیماری تعیین نشده بود. ۸۴ نفر (٪۸۰/۸) آزمودنی‌ها پارانویید، ۸ نفر (٪۷/۷) کاتاتونیک، ۸ نفر (٪۷/۷) آشفته و ۲ نفر (٪۱/۹) باقیمانده ^۲ بودند. برای دو بیمار، نوع بیماری اسکیزوفرنیا تعیین نشده بود. سن بیماران از ۱۶ سال تا ۷۳ سال بود. میانگین سنی آنها $35/36 \pm 12/65$ سال بود.

پنجماه و هفت نفر (٪۵۵/۳) از ۱۰۳ بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا (یک نفر به دلیل مرزی بودن نتیجه آزمون، در محاسبه وارد نشد) و ۵۸ نفر (٪۵۰/۹) از ۱۱۴ فرد گواه از نظر آنتی‌بادی‌های IgG علیه توکسoplasmای مثبت بودند، ولی تفاوت معنی دار نبود (جدول ۱).

نسبت افراد دارای آنتی‌بادی‌های IgG علیه توکسoplasmای در بیمارانی که در دوره‌های بعدی بیماری بودند (٪۵۹/۸) از بیمارانی که در دوره نخست بودند (٪۳۳/۳)، به طور معنی دار بیشتر بود ($p < 0.05$)؛ میانگین سنی بیماران در آنها به ترتیب $37/69 \pm 6/22$ و $25/44 \pm 6/38$ سال بود که تفاوت معنی دار بود ($p < 0.001$). نسبت افراد دارای آنتی‌بادی‌های IgG علیه توکسoplasmای در بیماران آشفته و پارانویید از افراد کاتاتونیک بیشتر بود ولی تفاوت معنی دار نبود. هم‌چنین، نسبت افراد دارای آنتی‌بادی‌های IgG اختصاصی علیه توکسoplasmای در بیماران ساکن روسنا (٪۵۷/۶) از بیماران ساکن شهر (٪۵۴/۴) بیشتر بود ولی تفاوت معنی دار نبود.

از نظر آنتی‌بادی‌های IgM اختصاصی علیه توکسoplasmای ۹۷ نفر (٪۱۴/۶) از بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و ۲۲ نفر (٪۲۰) از ۱۱۰ فرد کنترل، مثبت بودند، ولی تفاوت معنی دار

میزان شیوع اسکیزوفرنیا در جمعیت عادی نزدیک به ۱/۵ درصد است (سادوک و سادوک، ۲۰۰۵). بنابراین، با در نظرداشتن نقش قوی ترثیک در سبب‌شناسی این بیماری و نقش احتمالی برخی از عوامل عفونی و محیطی در سبب‌شناسی آن، شاید یافته‌های بررسی‌های همه‌گیرشناسی در زمینه ارتباط توکسوپلاسمما با اسکیزوفرنیا گمراه کننده باشد.

با توجه به این که بسیاری از افراد مبتلا به اسکیزوفرنیا از نظر آلودگی به توکسوپلاسمما منفی بوده و بسیاری از افراد آلوده به توکسوپلاسمما نیز عالمی از اسکیزوفرنیا نشان نمی‌دهند، فرضیه حساسیت ژنتیکی در این رابطه مطرح است (یولکن و توری، ۲۰۰۶).

شاید یکی دیگر از دلایل متفاوت‌بودن یافته‌های بررسی حاضر با سایر بررسی‌های انجام شده به ژنوتیپ^۱ توکسوپلاسمما گوندیبی مربوط باشد. این تک یاخته دارای ژنوتیپ‌هایی است که از نظر ویرولانس متفاوتند (دردی^۲، ۲۰۰۴) و ممکن است انتشار جغرافیایی ژنوتیپ‌های توکسوپلاسمما گوندیبی متفاوت باشد.

با آن که در بررسی حاضر شیوع توکسوپلاسمما در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا افزایش معنی دار نسبت به گروه گواه نداشت، اما به معنی رد فرضیه ارتباط سببی بین توکسوپلاسمما و اسکیزوفرنیا نیست، بلکه گویای آن است که برای اثبات این نظریه به بررسی‌های بیشتر با بهره‌گیری از روش‌های مطمئن‌تر نیاز است.

در سایر بررسی‌ها تشخیص بالینی اسکیزوفرنیا در هر بیمار توسط تیمی از روانپزشکان انجام شده است، ولی در بررسی حاضر این امر میسر نبود که از محدودیت‌های این پژوهش به شمار می‌رود. پیشنهاد می‌شود، بررسی گستردگی‌تر با آزمودنی‌های بیشتری در این زمینه انجام شود، و در آن گروهی از متخصصان انگل‌شناسی و روانپزشکی همکاری داشته باشند. هم‌چنین پیشنهاد می‌شود، در بررسی جداگانه‌ای میزان شیوع توکسوپلاسمما در دو منطقه کشور با بیشترین و کمترین میزان شیوع اسکیزوفرنیا بررسی و مقایسه شود.

سپاسگزاری

این پژوهش با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مرکز توسعه تحقیقات علوم پایه دانشکده پزشکی قزوین انجام شد. بدین‌وسیله از همه همکاران بهویژه خانم دکتر معصومه اصلانی‌مهر، رئیس مرکز تحقیقات علوم پایه، آقای دکتر غلامرضا درگاهی، رئیس آزمایشگاه

یولکن، ۲۰۰۳). در بررسی‌هایی که پس از سال ۱۹۹۸ انجام شده، بیشتر از گروه گواه همتا بهره گرفته شده است. در بررسی گو و همکاران (۲۰۰۱)، گروه گواه از نظر سن، جنس و محل تولد با بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا همتا شده بودند و توکسوپلاسمما در گروه مورد به طور معنی دار بیشتر بود. در بررسی‌های یالکن و همکاران (۲۰۰۱) و لویک و همکاران (۲۰۰۴)، گروه گواه از نظر سن، جنس و وضعیت اجتماعی-اقتصادی با بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا همتا بودند و توکسوپلاسمما در بیماران افزایش معنی دار داشت. در بیشتر گزارش‌های منتشر شده، توکسوپلاسمما در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا به طور معنی دار بیشتر از گروه شاهد بوده است.

با توجه به ماهیت بیماری‌های روانی، داوری در زمینه ارتباط همه‌گیرشناسی اسکیزوفرنیا با توکسوپلاسمما ملاحظاتی دارد که مهم‌ترین آن امکان آلودگی به توکسوپلاسمما پس از آغاز بیماری است. اسکیزوفرنیا یک بیماری با سیر مزمن است و پس از سپری شدن یک دوره زمانی به تشخیص قطعی می‌انجامد. ممکن است با آغاز بیماری عادات‌های بهداشتی بیمار تغییر نموده و فرد بیشتر در معرض ابتلاء به عفونت‌ها از جمله توکسوپلاسمما قرار گیرد. در برخی پژوهش‌ها برای کاهش تأثیر این عامل، بیماران در دوره نخست بیماری بررسی شده‌اند (لویک و همکاران، ۲۰۰۱؛ یولکن و همکاران، ۲۰۰۱؛ گو و همکاران، ۲۰۰۱؛ باخمن و همکاران، ۲۰۰۵).

در بررسی حاضر نسبت افراد دارای آنتی‌بادی‌های IgG اختصاصی علیه توکسوپلاسمما، در بیمارانی که در دوره‌های بعدی بیماری بودند از بیمارانی که در نخستین دوره بیماری بودند به طور معنی دار بیشتر بود. این یافته می‌تواند دو علت احتمالی داشته باشد. نخست تفاوت سنی بیماران در دو گروه است، زیرا سن بر شیوع توکسوپلاسمما تأثیر دارد و با افزایش آن، میزان شیوع زیادتر می‌شود. میانگین سنی گروه اول به‌طور معنی دار از گروه دوم بیشتر بود. علت دیگر، طولانی تریودن دوره بیماری در بیمارانی است که در دوره‌های بعدی بیماری هستند. شاید این بیماران بیشتر در معرض تماس با منابع آلوده کننده باشند.

به نظر می‌رسد، یکی دیگر از علت‌های احتمالی تفاوت یافته‌های بررسی‌های انجام شده در زمینه همه‌گیرشناسی توکسوپلاسمما با اسکیزوفرنیا تفاوت در میزان شیوع این دو در جامعه است. ۲۰ تا ۴۰ درصد افراد در بیشتر نقاط به توکسوپلاسمما آلوده هستند (وبستر و همکاران، ۲۰۰۶) ولی

- Cetinkaya, Z., Yazar, S., Gecici, O., & Namli, M. N. (2007). Anti-toxoplasma gondii antibodies in patients with schizophrenia: Preliminary findings in a Turkish sample. *Schizophrenia Bulletin*, 33, 789-791.
- Darde, M. L. (2004). Genetic analysis of the diversity in Toxoplasma gondii. *Annual Ist Super Sanita*, 40, 57-63.
- Doyle, C., & Deakin, J. F. W. (2002). Fewer astrocytes in frontal cortex in schizophrenia, depression and bipolar disorder. *Schizophrenia Research*, 53, 106.
- El-Sahn, A. A., Shatat, H. Z., & Ghitany, E. M. (2005). Seropositivity of toxoplasmosis in patients with schizophrenia. *Journal of Egyptian Public Health Association*, 80, 209-224.
- Gu, H., Yolken, R. H., Phillips, M., Yang, F., Bilder, R. M., & Gilmore, J. H. (2001). Evidence of Toxoplasma gondii infection in recent-onset schizophrenia. *Schizophrenia Research*, 49, 53.
- Halonen, S. K., Lyman, W. D., & Chiu, F. C. (1996). Growth and development of toxoplasma gondii in human neurons and astrocytes. *Journal of Neuropathology and Experimental Neurology*, 55, 1150-1156.
- Jones-Brando, L., Torrey, E. F., & Yolken, R. (2003). Drugs used in the treatment of schizophrenia and bipolar disorder inhibit the replication of toxoplasma gondii. *Schizophrenia Research*, 62, 237-244.
- Leweke, F. M., Gerth, C. W., Koethe, D., Klosterkötter, J., Ruslanova, I., Krivogorsky, B., Torrey, E. F., & Yolken, R. H. (2004). Antibodies to infectious agents in individuals with recent onset schizophrenia. *European Archives of Psychiatry Clinical Neuroscience*, 254, 4-8.
- Montoya, J. C., & Remington, J. S. (2005). Toxoplasma gondii. In G. L. Mandell, J. E. Bennet, & R. Dolin (Eds.), *Mandell, Douglas and Bennett's principles and practice of infectious diseases*. Philadelphia: Churchill Livingston.
- Mortensen, P. B., Nørgaard-Pedersen, B., Waltoft, B. L., Sørensen, T. L., Hougaard, D., Torrey, E. F., & Yolken, R. H. (2007). Toxoplasma gondii as a risk factor for early-onset schizophrenia: Analysis of filter paper blood samples obtained at birth. *Biological Psychiatry*, 61, 688-693.

مرکز بهداشت شهید بلندیان قزوین و خانم هاجر صادقی
کارشناس مرکز تحقیقات علوم پایه سپاسگزاری می‌شود.

منابع

- American Psychiatric Association (2004). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (4th. ed., text revision). Washington, DC: APA.
- Alvarado-Esquivel, C., Alanis-Quiñones, O. P., Arreola-Valenzuela, M. A., Rodriguez-Briones, A., Piedra-Nevarez, L. J., Duran-Morales, E., Estrada-Martinez, S., Martinez-Garcia, S. A., & Liesenfeld, O. (2006). Seroepidemiology of toxoplasma gondii infection in psychiatric inpatients in a northern Mexican city. *BMC Infectious Diseases*, 19, 178.
- Amninger, G. P., McGorry, P. D., Berger, G. E., Wade, D., Yung, A. R., Phillips, L. J., Harrigan, S. M., Franney, S. M., & Yolken, R. H. (2006). Antibodies to infectious agents in individuals at ultra-high risk for psychosis. *Biological Psychiatry*, 61, 1215-1217.
- Aparicio Garrido, J., & Paniagua Redondo, V. (1968). Toxoplasmosis y enfermedades mentales. *Archives de Neurobiología*, 31, 161-172.
- Bachmann, S., Schroeder, J., Bottmer, C., Torrey, E. F., & Yolken, R. H. (2005). Psychopathology in first-episode schizophrenia and antibodies to toxoplasma gondii. *Psychopathology*, 38, 87-90.
- Berdoy, M., Webster, J. P., & Macdonald, D. W. (2000). Fatal attraction in rats infected with Toxoplasma gondii. *Biological Sciences*, 267, 1591-1594.
- Brown, A. S., Schaefer, C. A., Quesenberry, C. P., Liu, L., Babulas, V. P., & Susser, E. S. (2005). Maternal exposure to toxoplasmosis and risk of schizophrenia in adult offspring. *American Journal of Psychiatry*, 162, 767-773.
- Brown, A. S., Begg, M. D., Gravenstein, S., Schaefer, C. A., Wyatt, R. J., Bresnahan, M., Babulas, V. P., & Susser, E. S. (2004). Serologic evidence of prenatal influenza in the etiology of schizophrenia. *Archives of General Psychiatry*, 61, 774-780.
- Buka, S. L., Tsuang, M. T., Torrey, E. F., Klebanoff, M. A., Bernstein, D., & Yolken, R. H. (2001). Maternal infections and subsequent psychosis among offspring. *Archives of General Psychiatry*, 58, 1032-1037.

- Qiuying, L., Xiaonian, L., & Li, L. (1999). The control study of schizophrenia and affective disorders and toxoplasma infections. *Acta Academiae Medicinae Hubei*, 20, 223-225.
- Rozenfeld, C., Martinez, R., & Figueiredo, R. T. (2003). Soluble factors released by toxoplasma gondii-infected astrocytes down-modulate nitric oxide production by gamma interferon-activated microglia and prevent neuronal degeneration. *Infection and Immunity*, 71, 2047-2057.
- Sadock, B. J., & Sadock, V. A. (2005). *Kaplan & Sadock's pocket handbook of clinical psychiatry*. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- Silva, N. M., Rodrigues, C. V., Santoro, M. M., Reis, L. F., Alvarez-Leite, J. I., & Gazzinelli, R. T. (2002). Expression of indoleamine 2, 3-dioxygenase, tryptophan degradation, and kynurenine of formation during in vivo infection with toxoplasma gondii: Induction by endogenous gamma interferon and requirement of interferon regulatory factor 1. *Infection and Immunity*, 70, 859-868.
- Stibbs, H. H. (1985). Changes in brain concentrations of catecholamines and indoleamines in toxoplasma gondii infected mice. *Annals of Tropical Medicine and Parasitology*, 79, 153-157.
- Torrey, E. F., Bartko, J. J., Lun, Z. R., & Yolken, R. H. (2007). Antibodies to toxoplasma gondii in patients with schizophrenia: A meta-analysis. *Schizophrenia Bulletin*, 33, 729-736.
- Torry, E. F., & Yolken, R. H. (2003). Toxoplasma gondii and schizophrenia. *Emerging Infectious Diseases*, 9, 1375-1380.
- Wang, H. L., Wang, G. H., Li, Q. Y., Shu, C., Jiang, M. S., & Guo, Y. (2006). Prevalence of toxoplasma infection in first-episode schizophrenia and comparison between toxoplasma-seropositive and toxoplasma-seronegative schizophrenia. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 114, 40-48.
- Webster, J. P., Lamberton, P. H., Donnelly, C. A., & Torrey, E. F. (2006). Parasites as causative of human affective disorder? The impact of anti-psychotic, mood-stabilizer and anti-parasite medication on Toxoplasma gondii's ability to alter host behaviour. *Biological Sciences*, 273, 1023-1030.
- Yolken, R. H., Bachmann, S., Rouslanova, I., lillehoj, E., Ford, G., Torrey, E. F., & Schroeder, J. (2001). Antibodies to toxoplasma gondii in individuals with first-episode schizophrenia. *Clinical Infectious Diseases*, 32, 842-844.
- Yolken, R. H., & Torrey, E. F. (2006). Infectious agents and gene-environmental interactions in the etiopathogenesis of schizophrenia. *Clinical Neuroscience Research*, 6, 97-109.