

ویژگی‌های روان‌سنجدی نسخه فارسی آزمون یادگیری شنوایی-کلامی‌ری در سالمندان

دکتر زهرا جعفری^۱، دکتر فیلیپ اشتافان موریتس^۲، دکتر احمد علی‌اکبری کامرانی^۳، سعید ملایری^۰

Psychometric Properties of Persian Version of the Rey Auditory-Verbal Learning Test (RAVLT) among the Elderly

Zahra Jafari*, Philip Steffen Moritz ^a, Taher Zandi ^b, Ahmad Aliakbari Kamrani ^c, Saeed Malyeri ^d

Abstract

Objectives: The goal of the present study was to assess the psychometric properties of the Persian version of Rey Auditory-Verbal Learning Test (RAVLT) in the elderly population. **Method:** 250 normal elderly individuals and 100 elderly individuals with Alzheimer's dementia, aged between 60 and 80 who were selected using stratified-randomized sampling, were evaluated using Mini-Mental State Examination, RAVLT, and DSM-IV diagnostic criteria. **Results:** In determining convergent validity, a positive significant correlation was revealed between the four parts of RAVLT (sum, immediate and delayed recall and recognition) and the logical sub test of Wechsler Memory Scale ($p < 0.001$, $r = 0.346$). By comparing the test scores between the normal and Alzheimer's group, discriminant validity analysis showed significant difference of their data in all parts of the test ($p < 0.001$). Roc curve exhibited a sensitivity of more than 89% and a specificity higher than 81% ($p < 0.001$), and the cut-off points of 2.5 to 6.5 were determined with U-Dense formula for different parts of the test. **Conclusion:** The Persian version of the RAVLT has good validity and reliability. Also, based on the determined cut-off points, it can be used to evaluate and interpret the situation of short term memory and learning performance in the elderly, and for

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجدی نسخه فارسی آزمون یادگیری شنوایی-کلامی‌ری (RAVLT) در جمعیت سالمندان بود. **روش:** ۲۵۰ سالمند سالم و ۱۰۰ سالمند مبتلا به دمانس آنرا یمر در دامنه سنی ۶۰ تا ۸۰ سال که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای-تصادفی برگزیده شده بودند، بر پایه آزمون معینه مختصر وضعیت شناختی، آزمون یادگیری شنوایی-کلامی‌ری و معیارهای تشخیصی DSM-IV ارزیابی شدند. **یافته‌ها:** در تعیین روابطی همگرای بین نتایج آزمون ری در چهار مرحله میانگین، یادگیری بدرنگ، یادآوری تأخیری و بازشناختی، و امتیاز زیرآزمون حافظه منطقی و کسلر، همبستگی مثبت معنی دار دیده شد ($1, 2 = 0.346, 0.001 > 0.001$). بررسی روابطی تفکیکی با مقایسه امتیازات آزمون بین دو گروه سالمندان سالم و مبتلا به دمانس آنرا یمر، تفاوت معنی دار یافته‌های آنها را در کلیه مراحل آزمون نشان داد ($0.001 > 0.001$). با رسم منحنی راک، حساسیت بالای ۱۹٪ و ویژگی بالای ۸۱٪ در مراحل مختلف آزمون بدست آمد ($0.001 > 0.001$). به کمک فرمول یوردنس، نقطه بررش ۲/۵ تا ۶/۵ برای بخش‌های گوناگون آزمون تعیین گردید. **نتیجه گیری:** نسخه فارسی آزمون یادگیری شنوایی-کلامی ری از روابطی و پایایی خوبی برخوردار است و با توجه به نقاط برش تعیین شده، می‌تواند برای ارزیابی و اظهارنظر نسبت به وضعیت حافظه کوتاه‌مدت و عملکرد یادگیری در سالمندان، و شناسایی افراد

^۰ دکترای نوروساینس شناختی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی، مرکز تحقیقات مسائل اجتماعی روانی سالمندان، تهران، اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودک‌کار، دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی، کد پستی: ۱۹۸۳۴، دوره‌گار: ۰۲۱-۲۲۱۰۰۰۴ (نوبنده مسئول).
^۱ روانپرداز، کلینیک روانپردازی، دانشگاه هامبورگ، آلمان؛ ^۲ روانپرداز، مرکز آنرا یمر دانشگاه ایالتی پلاتسبرگ، نیویورک، ایالات متحده؛ ^۳ متخصص داخلی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی؛ ^۴ دانشجوی دکترای ادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی.

* Corresponding author: PhD. in Cognitive Neuroscience, Assistant Prof. of University of Welfare and Rehabilitation Sciences, Iranian Research Centre on Aging, Kudakyar Ave., Daneshjui, Blvd., Evin, Tehran, Iran, IR. Fax: +9821-22180004. E-mail: zjafari@uswr.ac.ir;

^a Psychiatrist, Clinic of Psychiatry and Psychotherapy, Hamburg University, Germany; ^b Psychiatrist, Alzheimer's Center, Plattsburgh State University, New York, United States of America; ^c Internist, Associate Prof. of Welfare and Rehabilitation Sciences University; ^d Postgraduate student in audiology, Welfare and Rehabilitation Sciences University.

the identification of individuals with Alzheimer's dementia.

Key words: memory; learning; aging; Alzheimer; psychometrics

[Received: 27 March 2009; Accepted: 28 July 2009]

متلا به دمانس آلترا/یمر به کار برده شود.

کلیدواژه: آزمون یادگیری شناوی - کلامی ری؛ حافظه؛ یادگیری؛ سالمندی؛ آلترا/یمر؛ روان‌سنگی؛ ایران

[دریافت مقاله: ۱۳۸۸/۱/۷؛ پذیرش مقاله: ۱۳۸۸/۵/۶]

همکاران، ۲۰۰۳). از بیماری‌های شناخته شده‌ای که بر کار کرد حافظه تأثیر داشته و در سنین بالا شیوع چشم‌گیری دارند، آلترا/یمر بیش از همه شناخته شده و بررسی گردیده است. علت بروز این اختلال که شایع‌ترین شکل دمانس می‌باشد هنوز به درستی شناخته نشده است. با این حال، عواملی چون سن، وراثت، میزان تحصیلات پایین و آسیب‌های مغزی در شیوع بالای آن نقش دارند، و بین شدت آسیب مغزی و شدت علایم بالینی ارتباط نزدیکی وجود دارد (بارزوتو^۳، گارگیلو^۳، ماروتا^{۳۳}، تدسچی^{۳۴}، زانینو^{۳۵}، ۲۰۰۴).

بهره‌گیری از ابزارهای عصب-روان‌شناختی یکی از شیوه‌های پژوهشی معتبر در بررسی کارکردهای ذهنی و شناختی، بهویژه در زمینه سنجش عملکرد حافظه و یادگیری است. با آن‌که در بسیاری از کشورها از نسخه‌های هنجاریابی شده این آزمون‌ها بهره گرفته می‌شود، در ایران در زمینه روان‌سنگی ابزارهای روان‌شناختی از جمله آزمون‌های ارزیابی عملکرد حافظه و شناخت، بررسی‌های اندکی دیده می‌شود. پژوهش حاضر به چگونگی تعیین ویژگی‌های روان‌سنگی (پایابی، روایی، حساسیت و ویژگی) نسخه فارسی RAVLT در جمعیت سالمندان سالم (بدون مشکلات شناختی) و سالمندان متلا به دمانس آلترا/یمر انجام شد. هم

مقدمه

نارسایی‌های یادگیری و حافظه، یکی از شکایت‌های رایج افراد دچار اختلال‌های عصب‌شناختی است (لزاک^۱، هاووسون^۲ و لورینگم^۳، ۲۰۰۴؛ ملک^۴ و تامپسون^۵، ۱۹۹۴؛ شوئبرگ^۶ و همکاران، ۲۰۰۶). جنبه اخباری حافظه^۷ یا حافظه‌ای که به حقایق و تجارب واقعی مربوط است، یکی از موضوعات مورد توجه در روانشناسی عصبی است (بندیکت^۸، اسچرتلن^۹، گرونینگر^{۱۰} و برندت^{۱۱}، ۱۹۹۸)، از این رو آزمون‌های سیاری از جمله آزمون یادگیری شناوی - کلامی ری^{۱۲} (RAVLT)، آزمون یادگیری کلامی هاپکیتز^{۱۳}، آزمون یادگیری کلامی کالیفرنیا^{۱۴} و آزمون یادآوری انتخابی بوسچک^{۱۵} برای ارزیابی حافظه اخباری ساخته شده‌اند (همان‌جا).

آزمون یادگیری شناوی - کلامی ری (RAVLT) در دهه ۱۹۹۰ معرفی شد (اشمیت^{۱۶}، ۱۹۹۶) یکی از رایج‌ترین آزمون‌های روان‌شناختی در ارزیابی حافظه و یادگیری شناوی - کلامی است. این آزمون که مواد آن را واژه‌های یک یا چند‌هنجایی می‌سازند، دارای دو فهرست پانزده‌تا‌یی واژه‌ها (فهرست الف و ب) است و در آن هر واژه یک امتیاز دارد (در کل ۱۵ امتیاز). آزمون ری به نارسایی‌های حافظه در بسیاری از اختلال‌های شناختی از جمله بیماری آلترا/یمر حساس است. اگر درمانگر بخواهد در مدت کوتاهی توانایی یادگیری فرد را در چارچوب محدود آزمون ارزیابی کند و سازماندهی در کسی وی را که در آزمون یادگیری کلامی کالیفرنیا (لزاک و همکاران، ۲۰۰۴) ارزیابی می‌شود دنبال نکند، آزمون یادگیری شناوی - کلامی ری به سایر آزمون‌های رایج موجود برتری دارد. در آزمون ری، توانایی افراد در رمزگردانی^{۱۷}، تثیت^{۱۸}، ذخیره^{۱۹}، و بازیابی^{۲۰} اطلاعات کلامی در مراحل گوناگون حافظه آنی، تأثیر محرك‌های مداخله کننده، حافظه تأخیری^{۲۱} و بازشناختی^{۲۲} (مسینیس^{۲۳}، تسکونا^{۲۴}، مالفاكی^{۲۵} و پاتاناسوپولوس^{۲۶}، ۲۰۰۷؛ وندرالست^{۲۷}، ونبوستل^{۲۸} و ونبروکلن^{۲۹}، ۲۰۰۵) ارزیابی می‌شود.

یکی از تأثیرات افزایش سن بر کارکردهای ذهنی، کاهش توانایی فرآگیری اطلاعات کلامی و غیر کلامی و فراموشی سریع‌تر اطلاعات فرآگرفته شده است (ماتوز^{۳۰} و

1- Lezak	2- Howieson
3- Loringm	4- Malec
5- Thompson	6- Schoenberg
7- declarative memory	8- Benedict
9- Schretlen	10- Groninger
11- Brandt	
12- Rey Auditory-Verbal Learning Test	
13- Hopkins Verbal Learning Test	
14- California Verbal Learning Test	
15- Buschke Selective Reminding Test	
16- Schmidt	17- encoding
18- consolidation	19- storage
20- retrieval	21- delayed memory
22- recognition	23- Messinis
24- Tsakona	25- Malefaki
26- Papathanasopoulos	27- Van Der Elst
28- Van Boxtel	29- Van Breukelen
30- Mattos	31- Barzotti
32- Gargiulo	33- Marotta
34- Tedeschi	35- Zannino

برای گردآوری داده‌ها از آزمون‌های معاینه مختصر وضعیت‌شناختی (MMSE) (فروغان و همکاران، ۱۳۸۷)، آزمون یادگیری شنایی-کلامی ری (RAVLT) (جعفری، اشتافان موریتس، زندی و علی‌اکبری کامرانی، زیر چاپ) و معیارهای تشخیصی DSM-IV بهره گرفته شد. نسخه فارسی RAVLT، همانند نسخه انگلیسی آن (لزاک و همکاران، ۲۰۰۴) از سه فهرست زیر تشکیل شده است:

- ۱) فهرست ۱۵ ماده‌ای از واژه‌های فارسی (فهرست الف);
- ۲) فهرست ۱۵ واژه‌ای دیگری به نام فهرست مداخله‌کننده (فهرست ب);
- ۳) فهرست بازناسی واژه‌ها دارای ۵۰ واژه در برگیرنده مجموع واژه‌های دو فهرست الف و ب به اضافه ۲۰ واژه جدید دیگر.

برای بررسی پایایی نتایج آزمون یا امکان تکرار آن بدون رخداد اثر یادگیری، نسخه فارسی آزمون با رعایت ویژگی‌های لازم در دو نسخه متفاوت تهیه شده است. بر این پایه، نسخه فارسی دارای یک نسخه اصلی و یک نسخه دوم است. چگونگی اجرای این آزمون که دارای نه مرحله است، به شرح زیر می‌باشد. برای آزمایش هر فرد لازم است شیوه انجام هر مرحله از آزمون در سطحی که به راحتی قابل شنیدن باشد، توضیح داده شود.

مراحل یک تا پنج آزمون (V-I) یا مرحله یادآوری: نخست واژه‌های فهرست الف با ارایه یک واژه در ثانیه با صدای بلند برای فرد خوانده شده و از وی خواسته می‌شود پس از خواندن واژه‌ها، هر آنچه را که به یاد می‌آورد بیان نماید. زمانی که فرد اعلام کند دیگر واژه‌ای را به باد نمی‌آورد، همان فهرست با شرایط مشابه دوباره خوانده شده، و هر بار پاسخ فرد در فرم ثبت نتایج، نوشته می‌شود. برای بررسی تأثیر تکرار محرک و توان یادگیری فرد، فهرست اول طی پنج مرتبه به صورت پی در پی ارایه می‌شود. میانگین کل امتیاز یادآوری با عنوان امتیاز کل، با تعیین میانگین امتیازهای پنج مرحله نخست محاسبه می‌شود.

واژه‌های فهرست مداخله‌کننده (فهرست ب) نیز طی یک مرتبه با شرایط مشابه مرحله نخست ارایه شده و پاسخ فرد یادداشت می‌شود.

دو مرتبه در خواست از فرد برای یادآوری و تکرار واژه‌های فهرست الف انجام می‌شود؛ یک بار بی‌درنگ پس از

اکنون، آزمون ری به نه زبان در دسترس است که در بیشتر آنها ساخت آزمون، بر پایه کارهای لزاک و همکاران (۲۰۰۴) انجام شده است. از آن‌جا که در جمعیت عادی، بیشترین شکایت از نارسایی حافظه در سنین بالای ۶۰ سال دیده می‌شود، در اختیار داشتن مقادیر هنجر و ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی RAVLT در سالمدان فارسی زبان می‌تواند در شناسایی افراد دچار نارسایی حافظه و پی‌گیری پیشرفت آسیب و هم‌چنین تأثیر اقدامات درمانی، کاربرد داشته باشد.


روش

این بررسی از نوع توصیفی و بر روی ۲۵۰ سالمدان سالم و ۱۰۰ سالمدان مبتلا به دمانس آزایمر در دامنه سنی ۶۰ تا ۸۰ سال در مرداد تا بهمن ۱۳۸۷ در شهر تهران انجام شد. سالمدان سالم از بین افراد بدون سابقه مشکلات پزشکی یا هر گونه بیماری تأثیرگذار بر سلامت شناختی از جمله بیماری‌های عصبی مزمن (مانند دمانس، مشکلات عروقی مغز، صرع، پارکینسون، تومور مغزی و غیره)، ناتوانی ذهنی، مشکلات یا آسیب‌های روانپزشکی، سابقه مصرف یا وابستگی به مواد (صرف الکل و بنزودیازپین‌ها)، استفاده از داروهای روانپزشکی و هم‌چنین دیگر مشکلات پزشکی تأثیرگذار بر عملکرد روان‌شناختی (مانند کشم‌شنایی) و از میان افراد مراجعه‌کننده به فرهنگسراه‌های سالمدان، مساجد و بوستان‌ها در سطح شهر تهران انتخاب شدند و لازم بود در نسخه فارسی MMSE^۱ (فروغان، جعفری، شیرین‌یان، قائم‌مقام فراهانی و رهگذر، ۱۳۸۷)، امتیاز ۲۱ یا بالاتر را به دست آورده باشند. افراد مبتلا به آزایمر نیز شامل سالمدان مراجعه‌کننده به مرکز آزایمر ایران بودند که بیماری آنها قبل از آزمون آزایمر نیز شناسایی شده بود و نیز نتیجه MMSE آنها روانپزشک تشخیص داده شده بود و نیز نتیجه DSM-IV^۲ (انجمان روانپزشکی آمریکا، ۱۹۹۴) تشخیص دمانس آزایمر تأیید شده بود.

آزمودنی‌ها در دو گروه سنی ۶۰ تا ۷۰ سال و ۷۱ تا ۸۰ سال با تحصیلات دبستان تا دانشگاه بودند. پایایی ابزار پژوهش به روش بازآزمایی با فاصله دو ماه بر روی ۳۵ نفر بررسی گردید. اجرای آزمون نیز بر عهده دو دستیار آموخته دیده، زیر نظر مجری طرح بود که در بررسی‌های مشابه پیشین، همکاری داشتند.

1- Mini-Mental State Examination

2- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th. ed.)



شکل ۱- میانگین امتیازات مواحل مختلف آزمون ری در دو گروه سالمدنان سالم و سالمدنان مبتلا به دمانس آلزایمر

مرحله (یادآوری فهرست الف و میانگین آنها، فهرست ب، یادآوری بی درنگ، یادآوری تأخیری و بازشناسی) در دو گروه مورد بررسی، نشان داده شده است. همان‌گونه که شکل ۱ نشان می‌دهد در سالمدنان سالم میانگین امتیاز آزمون از ۴/۲۱ در مرحله I به ۹/۷۰ در مرحله VII افزایش یافته است. پس از ارایه فهرست مداخله کننده ب نیز امتیاز فهرست الف از مرحله VII به مرحله VI در سالمدنان ۶۰ تا ۳/۴۱ سال، در سالمدنان ۷۰ تا ۷۹ سال ۳/۵۶ و در کل ۳/۵۰ نمره، کاهش یافت.

در این بررسی، روایی ساختار نسخه فارسی آزمون ری به دو شیوه روایی تفکیکی و روایی همگرا، محاسبه شد. برای تعیین روایی تفکیکی، توانایی آزمون در تمایز سالمدنان مبتلا به آلزایمر از سالمدنان سالم، بررسی شد. پیش از مقایسه، نخست با انجام آزمون آماری کولموگروف- اسمیرنوف، توزیع بهنجار داده‌ها در بخش‌های گوناگون آزمون ری بررسی گردید. در بخش میانگین آزمون (میانگین امتیازهای مرحله I تا VII) با توجه به توزیع بهنجار داده‌ها، برای تعیین روایی تفکیکی از آزمون آماری t مستقل؛ و در دیگر بخش‌ها به دلیل توزیع نابهنجار داده‌ها، از آزمون آماری من- ویتنی یو^۴ بهره گرفته شد. بین امتیازات سالمدنان سالم و

ارایه فهرست مداخله کننده و بار دیگر با تأخیر و پس از گذشت ۲۰ دقیقه (مراحل VI و VII). در بررسی حاضر از افراد خواسته می‌شد در این فاصله زمانی استراحت نمایند. در مرحله بعد واژه‌های فهرست الف از میان ۵۰ واژه ۳۰ واژه از مجموع دو فهرست الف و ب به همراه ۲۰ واژه جدید دیگر) بازشناسی می‌شود.

شرکت افراد در این بررسی، با رضایت شخصی انجام شد. به افراد اطمینان داده می‌شد که اطلاعات آنها محترمانه نگهداری شده و تنها برای هدف‌های پژوهشی به کار برده می‌شود. آنها می‌توانستند هر گاه که بخواهند از پژوهش کناره گیری کنند.

بررسی توزیع بهنجار داده‌ها به کمک آزمون آماری کولموگروف- اسمیرنوف انجام شد. در بررسی تفاوت میانگین‌ها در مراحل گوناگون آزمون ری، در صورت برخورداری از توزیع بهنجار داده‌ها، آزمون آماری t مستقل و در غیر این صورت، آزمون آماری من- ویتنی - یو به کار برده شد.

برای بررسی روایی همگرا، همبستگی نتایج آزمون ری در چهار مرحله تعیین میانگین، یادآوری بی درنگ، یادآوری تأخیری و بازشناسی با امتیاز زیرآزمون حافظه منطقی آزمون وکسلر- نسخه اصلاح شده^۱ (اورنگی)، عاطف وحید و عشايري، ۱۳۸۱) مورد توجه قرار گرفت. این زیرآزمون از دو داستان کوتاه تشکیل شده است که هر یکی ۲۵ امتیاز دارد، و با محاسبه میانگین امتیاز حاصل از اجرای آنها، نمره فرد بین صفر تا ۲۵ خواهد بود.

بررسی پایایی آزمون با دو نسخه متفاوت آن، به روش بازآزمایی و به کمک آزمون همبستگی پیرسون انجام شد. برای تعیین حساسیت و ویژگی امتیازهای آزمون نیز منحنی راک^۲ رسم گردید و از فرمول یو دنس^۳، بهره گرفته شد. تحلیل داده‌ها به کمک نرم‌افزار رایانه‌ای SPSS.16 انجام شد.

یافته‌ها

در گروه سالمدنان سالم ۱۲۷ نفر (۵۰/۸٪) زن و ۱۲۳ نفر (۴۹/۲٪) مرد بودند. در سالمدنان مبتلا به آلزایمر، ۵۱ نفر زن و ۴۹ نفر مرد بودند. میانگین سن کل افراد در گروه سالمدنان سالم ۶۹/۶۲ سال (انحراف معیار ۶/۰) و در سالمدنان مبتلا به آلزایمر ۷۵/۰۱ سال (انحراف معیار ۴/۵) بود. در شکل ۱، میانگین امتیازهای مراحل گوناگون آزمون ری شامل پنج

1- Logical Memory Subset of Wechsler Memory Scale
2- roc curve
3- udense test
4- Mann-Whitney U test

جدول ۲- بررسی همبستگی امتیازات سخنه فارسی آزمون یادگیری شنوایی- کلامی ری در مراحل میانگین، یادآوری بی‌درنگ، یادآوری تأخیری و بازشناسی، با امتیاز زیرآزمون حافظه منطقی آزمون و کسلر برای تعیین روایی همکرا ($N=250$)

همبستگی امتیاز آزمون‌ها پیرسون	ضریب همبستگی پیرسون	میانگین (انحراف معیار)	میانگین پیرسون
حافظه منطقی و کسلر	(۲/۶۲)	۸/۴۳	(۲/۶۲)
فهرست A- میانگین	(۱/۳۷)	۷/۰۱	(۱/۳۷)
فهرست VI-A	(۱/۸۱)	۶/۲۰	(۱/۸۱)
(یادآوری بی‌درنگ)			
فهرست V-A	(۱/۶۳)	۵/۷۴	(۱/۶۳)
(یادآوری تأخیری)			
فهرست R-A	(۲/۶۹)	۱۰/۴۰	(۲/۶۹)
(بازشناسی)			

* $p<0.001$

سالمندان مبتلا به آزادایمر در کلیه مراحل آزمون ری، تفاوت آماری معنی‌داری دیده شد. در جدول ۱، نتیجه تحلیل‌های آماری انجام شده، آورده شده است. گفتنی است که تفاوت میانگین امتیاز فهرست A در دو گروه سالمندان سالم و سالمندان مبتلا به آزادایمر $t=597/459$ بود که آزمون آماری t این تفاوت را معنی‌دار نشان داد ($t=28/64$, $p<0.001$).

برای تعیین روایی همکرا، همبستگی امتیازات RAVLT در مراحل میانگین نمرات، یادآوری بی‌درنگ (VI)، یادآوری تأخیری (VII) و بازشناسی (R)، با امتیاز زیرآزمون حافظه منطقی آزمون و کسلر- سخنه اصلاح شده تعیین گردید. در جدول ۲، ضریب همبستگی و سطح معنی‌داری تحلیل‌های انجام شده، نشان داده است. همان‌گونه که دیده می‌شود،

جدول ۱- مقایسه امتیازات مراحل مختلف آزمون یادگیری شنوایی- کلامی ری در دو گروه سالمندان سالم و سالمندان مبتلا به آزادایمر برای تعیین روایی تحقیکی

مراحل مختلف آزمون حافظه ری آزمون من- ویتنی یو مقدار Z	تفاوت میانگین
-۱۳/۴۹۸	۱/۱۱۲E۳
*-۱۴/۰۳۵	۶۲۰/۵۰۰
*-۱۴/۴۱۲	۲۷۴/۰۰۰
*-۱۴/۵۲۱	۱۶۸/۰۰۰
*-۱۴/۶۶۳	۵۹/۵۰۰
*-۱۳/۶۴۴	۱/۰۷۶E۳
*-۱۳/۹۵۳	۶۴۸/۵۰۰
*-۱۴/۳۹۹	۲۹۸/۰۰۰
*-۱۴/۲۳۳	۳۶۳/۵۰۰

* $p<0.001$

۶۰
—
60

جدول ۳- تعیین پایابی نتایج سخنه فارسی آزمون یادگیری شنوایی- کلامی ری در سالمندان ($n=35$)

مراحل آزمون ری	نسخه اول	نسخه دوم	ضریب همبستگی پیرسون
مراحل آزمون ری	نسخه اول	نسخه دوم	ضریب همبستگی پیرسون
I-A	۱/۰۳(۴/۸۰	(۱/۲۹)(۴/۳۰	*۰/۷۳۲
II-A	۱/۲۳(۶/۳۱	(۱/۲۴)(۶/۱۰	*۰/۷۳۰
III-A	۱/۷۱(۷/۷۱	(۱/۲۶)(۷/۶۰	*۰/۷۲۶
IV-A	۱/۰۴(۹/۱۴	(۱/۲۹)(۹/۰	*۰/۷۴۱
V-A	۱/۰۵(۱۰/۵۴	(۱/۳۱)(۱۰/۰	*۰/۷۸۵
فهرست A- میانگین	۱/۲۲(۷/۷۰	(۱/۰۸)(۷/۴۰	*۰/۸۵۹
B	۰/۰۵(۴/۰	(۱/۰۷)(۴/۱۱	*۰/۷۴۶
VI-A (یادآوری بلا فاصله)	۱/۰۶(۸/۰	(۱/۳۲)(۷/۷۰	*۰/۷۶۱
V-A (یادآوری تأخیری)	۱/۴۸(۷/۲۰	(۱/۲۵)(۶/۷۰	*۰/۸۲۲
R-A (بازشناسی)	۱/۷۲(۱۲/۵۰	(۱/۵۲)(۱۱/۷۰	*۰/۸۱۶

* $p<0.001$

جدول ۴- سطح زیر منحنی راک، خطای معیار، مقدار یو دنس، حساسیت، ویژگی و نقطه برش محاسبه شده برای هر یک از بخش‌های آزمون حافظه‌ روی

مراحل آزمون روی	سطح زیر منحنی	خطای معیار	یو دنس	حساسیت	ویژگی	نقطه برش
I -A	۰/۹۵۶	*۰/۰۱۰	۰/۹۸	۰/۸۹۰	۰/۹۰۸	۲/۵
II -A	۰/۹۷۵	*۰/۰۰۷	۰/۸۶۶	۰/۹۳۰	۰/۹۳۶	۳/۵
III -A	۰/۹۸۹	*۰/۰۰۴	۰/۹۱۰	۰/۹۵۰	۰/۹۶۰	۴/۵
IV -A	۰/۹۹۳	*۰/۰۰۴	۰/۹۳۰	۰/۹۷۰	۰/۹۶۰	۵/۵
V -A	۰/۹۹۸	*۰/۰۰۱	۰/۹۵۰	۰/۹۷۰	۰/۹۸۰	۶/۵
فهرست -A میانگین	۰/۹۹۶	*۰/۰۰۳	۰/۹۵۰	۰/۹۵۰	۱/۰۰۰	۴/۱
B	۰/۹۵۷	*۰/۰۱۰	۰/۷۹۶	۰/۹۰۰	۰/۸۹۶	۲/۵
VI -A (یادآوری بی درنگ)	۰/۹۷۴	*۰/۰۰۷	۰/۸۱۲	۱/۰۰۰	۰/۸۱۲	۴/۵
VII -A (یادآوری تأخیری)	۰/۹۸۸	*۰/۰۰۴	۰/۹۰۸	۰/۹۸۰	۰/۹۳۰	۳/۵
R (بازشناسی)	۰/۹۸۵	*۰/۰۰۵	۰/۸۶۸	۰/۹۴۰	۰/۹۳۰	۶/۵

* p<0.001

سازوکارهای عصبی-رفتاری، عملکرد فرد را برآمد انگیختگی، انگیزش، توجه/تمرکز، درک شنوایی، ظرفیت حافظه کلامی فوری، ذخیره و بازیابی حافظه کلامی کوتاه‌مدت و پیشرفت در یادگیری نشان می‌دهند. این پژوهشگران نشان دادند که هر یک از مراحل اجرای RAVLT نسبت به اندازه گیری‌های هالستد- رایتن، استروپ و زیرآزمون حافظه منطقی آزمون وکسلر- نسخه اصلاح شده از توان تمايز بالاتری بین گروه سالم و بیمار برخوردار است (همان‌جا).

در بررسی حاضر، اجرای RAVLT روی سالم‌دان سالم، همانند بررسی‌های پیشین تأثیر تکرار آزمون در مراحل یک تا پنج را بر بھبود امتیازها یا «اثر یادگیری» نشان داد؛ بهطوری که در سالم‌دان سالم، میانگین امتیاز آزمون از مرحله I به مرحله VII افزایش یافت (میانگین میزان یادگیری ۵/۵۰ = V). همچنین پس از ارایه فهرست مداخله‌کننده ب، امتیاز فهرست الف از مرحله VII به مرحله VI کاهش یافت که با یافته‌های سینت^۳ و هولن^۴ (۱۹۹۹) هم خوانی دارد. با اجرای مرحله بازشناسی نیز می‌توان پی بردن که صرف نظر از توانایی یادآوری آنی، فرد تا چه اندازه یاد گرفته است. مقایسه امتیاز مرحله بازشناسی و یادآوری تأخیری، نوعی اندازه گیری توانایی بازیابی آنی به شمار می‌آید. با بهره گیری از این روش می‌توان موارد اختلال در یادآوری اطلاعات- برای نمونه در

برای افتراق سالم‌دان سالم از مبتلایان به دمانس آلزا یمر، نقطه برش نسخه فارسی RAVLT با رسم منحنی راک تعیین گردید و حساسیت و ویژگی آزمون به کمک فرمول یو دنس در هر یک از مراحل ده گانه آن محاسبه شد.

در جدول ۴، سطح زیر منحنی راک، خطای معیار، سطح معنی‌داری، مقدار یو دنس، حساسیت، ویژگی و نقطه برش RAVLT محاسبه شده برای هر یک از مراحل نسخه فارسی RAVLT آورده شده است.

همان‌گونه که در جدول ۴ دیده می‌شود، در همه مراحل آزمون، حساسیت و ویژگی به دست آمده بالاتر از ۸۰٪ است. با توجه به نقطه برش تعیین شده، در هر مرحله از اجرای آزمون در صورت کسب امتیاز بالاتر از نقطه برش، فرد سالم‌دان بر پایه توان تفسیر آن بخش از آزمون در دامنه بهنجار قرار می‌گیرد. برای نمونه، در صورت کسب امتیاز بالاتر از ۳/۵ در مرحله یادآوری تأخیری، با حساسیت ۹۸٪ و ویژگی ۹۳٪، سالم‌دان مورد بررسی از نظر حافظه کوتاه‌مدت کلامی در وضعیت طبیعی قرار می‌گیرد.

بحث

آزمون‌های حافظه مبتنی بر یادگیری فهرست واژه‌ها، از جمله حساس‌ترین آزمون‌های ارزیابی حافظه به شمار می‌روند. در توضیح سودمندی هر یک از مراحل اجرای RAVLT در جدا کردن اختلال‌های عصبی تأیید شده از گروه سالم، به نظر پاول^۱ و کریپ^۲ (۱۹۹۱) این امتیازات در یک مقطع از

پیشنهاد می‌شود. با توجه به نقاط برش تعیین شده، در هر مرحله از آزمون در صورت کسب امتیاز بالاتر از نقطه برش، می‌توان پیش‌بینی کرد که در زمان اجرای آزمون، فرد سالم‌مند با حساسیت بالایی در دامنه طبیعی قرار دارد.

اندرسون و همکاران (۲۰۰۶) با پی‌گیری ۲۲۴ فرد با شکایت از کاهش حافظه، میانگین سن ۶۰/۷ سال و متوسط امتیاز آزمون MMSE برابر با ۲۸/۲ در طول سه سال، کاربرد RAVLT را در شناسایی افراد در معرض خطر و در پی آن بروز آلزایمر بررسی نمودند. آنان دریافتند در صورت کسب امتیاز پایین‌تر از شش در بخش یادآوری تأخیری، فرد در گروه در معرض خطر شدید قرار می‌گیرد. پی‌گیری این افراد به مدت سه سال، کاهش چشم‌گیر نارسانی‌های شناختی و پیشرفت آنها بهسوی آلزایمر را نشان داد، در حالی که در افراد با عملکرد طبیعی در RAVLT در آغاز بررسی، عملکرد شناختی هم چنان در دامنه بهنجار قرار داشت.

آزمون‌های حافظه بیش از سایر آزمون‌های شناختی از «تکرار و تمرین» متأثر می‌شوند. بدین معنا که با تکرار یک فهرست آزمون، امتیاز فرد بهدلیل یادگیری و به یادسپردن مواد آزمون، افزایش می‌یابد. در روانشناسی از این پدیده با عنوان «اثر یادگیری» یاد می‌شود (لزاک و همکاران، ۲۰۰۴). حتی در گروه‌های مانند بیماران دچار اسکیزوفرنیای مزمن (الدی^۱، آرنولد^۲، میچل^۳، نستور^۴ و هوگر^۵، ۲۰۰۶) نیز تأثیر تمرین بر نتایج گزارش شده است. با بهره‌گیری از فهرست‌های معادل با سطح دشواری یکسان می‌توان تأثیر یادگیری بر نتایج آزمون‌های حافظه را تا اندازه‌ای کاهش داد (لزاک و همکاران، ۲۰۰۴؛ بندیکت، ۲۰۰۵).

در پژوهش حاضر با توجه به ساخت دو نسخه کامل از آزمون، تأثیر تمرین و یادگیری در تعیین پایایی نتایج آزمون، تا اندازه زیادی کاهش یافت. بررسی پایایی آزمون با اجرای نسخه دوم آن با فاصله زمانی دو ماه بر روی ۳۵ نفر از سالم‌مندان سالم، همبستگی بالایی بین نتایج دو نسخه آزمون، نشان داد. این یافته با یافته‌های و دینگ^۶، هورتون^۷ و ویستر^۸ (۱۹۸۶)، کرافورد^۹، استوارد^{۱۰} و سور^{۱۱} (۱۹۸۹) و گفن^{۱۲}، باترورث^{۱۳} و گفن (۱۹۹۴) هم‌سویی دارد.

افراد با نارسانی عملکرد لوب‌پیشانی - را شناسایی نمود. نمونه آن، بیمارانی هستند که به خوبی فرا می‌گیرند اما نمی‌توانند موضوعات یادگرفته شده را ردیابی کنند. در صورتی که بیمار در نگهداری اطلاعات جدید مشکل داشته باشد، در این صورت اجرای مرحله بازشناسی نسبت به مرحله VII مناسب تر به نظر می‌رسد (لزاک و همکاران، ۲۰۰۴).

تعیین روایی ساختار نسخه فارسی RAVLT، به روش همگرا و تفکیکی نشان داد که همبستگی امتیازهای RAVLT با نتیجه زیرآزمون حافظه منطقی و کسلر، مثبت و معنی‌دار است. تعیین روایی تفکیکی نیز توانایی RAVLT را در جدا کردن سالم‌مندان مبتلا به دمانس آلزایمر از سالم‌مندان سالم، خوب نشان داد.

مسینیس و همکاران (۲۰۰۶) برای تعیین روایی تفکیکی نسخه یونانی RAVLT، امتیازهای افراد سالم ۱۸ تا ۷۸ ساله را با دو گروه بزرگ‌سالان با سابقه مصرف طولانی مدت حشیش و افراد دچار ایدز، مقایسه نمودند و توانایی RAVLT را در جدا کردن افراد با سابقه مصرف حشیش و افراد با علایم ایدز از افراد سالم نشان دادند. آنان عملکرد هر دو گروه را ضعیف‌تر از افراد سالم گزارش کردند. شوتنبرگ و همکاران (۲۰۰۶) در بررسی ۱۵۸ فرد مبتلا به آلزایمر و ۱۲۲ فرد سالم بدون هیچ‌گونه سابقه اختلال کارکرد عصبی و یا مشکلات روانی نیز نشان دادند که RAVLT به خوبی می‌تواند افراد مشکوک به بیماری آلزایمر را از افراد بدون سابقه مشکلات روانی شناسایی نماید. موریتس، هیرن^۱، اندرسون^۲ و کراوسز^۳ (۲۰۰۱) برای نشان دادن وجود نوعی مشکل حافظه قابل شناسایی در دو گروه افراد مبتلا به اسکیزوفرنیا، افسردگی و کاهش توانایی یادگیری آنها، با کنترل متغیرهای اجتماعی و جمعیت‌شناختی، نتایج RAVLT در این گروه‌ها را با افراد سالم مقایسه نمودند و کاهش توانایی مبتلایان به اسکیزوفرنیا و افسردگی را در یادآوری واژه‌ها، یادآوری تأخیری و امتیاز باز‌شناسی نشان دادند.

اگر چه در بررسی حاضر، حساسیت، ویژگی و نقطه برش برای کلیه مراحل آزمون محاسبه گردید، از آنجا که در RAVLT، ارزیابی توانایی یادگیری و حافظه موردنظر بود و یافته‌های مراحل پایانی آزمون، اطلاعات ارزشمندی درباره مراحل شکل‌گیری و نگهداری حافظه بدست می‌داد، تفسیر نتایج بر پایه مقایسه امتیازهای هر سالم‌مند با نقاط برش مرحله پنج فهرست الف، میانگین یادآوری بی‌درنگ، یادآوری تأخیری، بازشناسی و حساسیت و ویژگی هر یک از آنها،

- | | |
|-------------|-----------------|
| 1- Heeren | 2- Andresen |
| 3- Krausz | 4- Alladi |
| 5- Arnold | 6- Mitchell |
| 7- Nestor | 8- Hodges |
| 9- Wedding | 10- Horton |
| 11- Webster | 12- Crawford |
| 13- Stewart | 14- Moore |
| 15- Geffen | 16- Butterworth |

منابع

- اورنگی، مریم؛ عاطف‌وحید، محمد‌کاظم؛ عشایری، حسن (۱۳۸۱). هنجاریابی مقیاس تجدیدنظرشده حافظه و کسلر در شهر شیراز. *فصلنامه آندازه و رفتار*، سال هفتم، شماره ۴، ۵۶-۶۶.
- جهانگردی، زهرا؛ اشتفان‌موریتس، فلیپ؛ زندی، طاهر؛ علی‌اکبری کامرانی، احمد (۱۳۸۹). هنجاریابی نسخه فارسی آزمون یادگیری شناوی - کلامی ری و بررسی تأثیر سن، جنسیت و سطح تحصیلات بر نتایج آن در جمعیت سالماندان. *فصلنامه پایش، پذیرفته شده برای چاپ*.
- فروغان، مهشید؛ جعفری، زهرا؛ شیرین‌بیان، پیمانه؛ قائم مقام فراهانی، ضیا؛ رهگذر، مهدی (۱۳۸۷). هنجاریابی معاینه مختصر وضعیت شناختی (MMSE) در سالماندان شهر تهران. *مجله تازه‌های علوم شناختی*، سال دهم، شماره ۲، ۳۷-۴۲.
- Alladi, S., Arnold, R., Mitchell, J., Nestor, P. J., & Hodges, J. R. (2006). Mild cognitive impairment: Applicability of research criteria in a memory clinic and characterization of cognitive profile. *Psychological Medicine*, 36, 507-515.
- American Psychiatric Association (1994). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (4th. ed.) Washington, DC: American Psychiatric Association.
- Andersson, C., Lindau, M., Almkvist, O., Engfeldt, P., Johansson, S. E., & Jönhagen, M. E. (2006). Identifying patients at high and low risk of cognitive decline using Rey Auditory-verbal Learning Test among middle-aged memory clinic outpatients. *Dementia and Geriatric Cognitive Disorder*, 21, 251-259.
- Barzotti, T., Gargiulo, A., Marotta, M.G., Tedeschi, G., & Zannino, G. (2004). Correlation between cognitive impairment and the Rey Auditory-verbal Learning Test in a population with alzheimer disease. *Archives of Gerontology and Geriatrics*, 9, 57-62.
- Benedict, R. (2005). Effects of using same-versus alternate-form memory tests during short-interval repeated assessments in multiple sclerosis. *Journal of International Neuropsychological Society*, 11, 727- 736 .
- Benedict, R., Schretlen, D., Groninger, L., & Brandt, J. (1998). Hopkins Verbal Learning Test-Revised: Normative data and analysis of inter-form and test-retest reliability. *Clinical Neuropsychology*, 12, 43-55.
- Crawford, J. R., Stewart, L. E., & Moore, J. W. (1989). Demonstration of savings on the AVLT and development of a parallel form. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*, 11, 975-981.

امروزه، با وجود پیشرفت روش‌های عینی پژوهش هم‌چون ثبت پتانسیل‌های برانگیخته حسی، بهره‌گیری از دستگاه‌های تصویربرداری عملکردی، روش‌های ثبت تک‌سلولی و چندسلولی، بررسی پیام‌رسان‌های عصبی و کاربرد روش‌های پیشرفت‌های در پژوهش‌های ژنتیکی، تلاش برای ساخت آزمون‌های عصب- روان‌شناختی در فرهنگ‌های گوناگون از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. به کارگیری این ابزار در جمعیت‌های بزرگ با هدف‌های غربالگری و بالینی، افزایش توان تعیین‌پذیری نتایج، هزینه پایین، سهولت اجرا و امکان بی‌گیری و تصمیم‌گیری‌های درمانی بر پایه یافته‌های به دست آمده در ارزیابی‌های دوره‌ای، از جمله عوامل مؤثر در مقبولیت ابزارهای عصب- روان‌شناختی به شمار می‌روند. با این حال، آن‌چه در کاربرد این ابزارها دارای اهمیت به شمار می‌رود، تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی آنها در جمعیت‌های هدف است.

کمبودن حجم نمونه به دلیل پیش‌گیری از افزایش هزینه‌های پژوهش و مدت اجرای آن در دو گروه سالماندان مورد بررسی را می‌توان محدودیت اصلی بررسی حاضر دانست. آزمون یادگیری شناوی - کلامی ری، می‌تواند در زمینه پژوهش‌های بالینی در جمعیت سالماندان، کاربرد گسترده‌ای داشته باشد. این آزمون در مراکز درمانی و مشاوره و مطب‌های روانشناسی و روانپزشکی کاربرد دارد.

به طور کلی بررسی حاضر نشان داد که نسخه فارسی RAVLT از روایی و پایابی خوبی برخوردار است و با توجه به نقاط برش تعیین‌شده در مراحل گوناگون اجرای آن، می‌تواند برای ارزیابی و اظهار نظر نسبت به وضعیت حافظه کوتاه‌مدت و توان یادگیری در سالماندان و شناسایی افراد مبتلا به دمانس آلزایمر به کار گرفته شود.

سپاسگزاری

از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به دلیل حمایت مالی از طرح پژوهشی حاضر قدردانی می‌گردد. همچنین از مدیریت و سالماندان «مرکز آلزایمر ایران» و فرهنگسراهای سالماندان شرکت کننده در این پژوهش صمیمانه سپاسگزاری می‌شود.
[بنا به اظهار نویسنده مسئول مقاله، تعارض منافع وجود نداشته است.]

- Geffen, G. M., Butterworth, P., & Geffen, L. B. (1994). Test-retest reliability of a new form of the Auditory Verbal Learning Test (AVLT). *Archives of Clinical Neuropsychology*, 9, 303-316.
- Lezak, M. D., Howieson, D. B., & Loring D. W. (2004). *Neuropsychological Assessment* (4th ed.). New York: Oxford University Press.
- Malec, J. F., & Thompson, J. M. (1994). Relationship of the Mayo-Portland Adaptability Inventory to functional outcome and cognitive performance measures. *Journal of Head Trauma Rehabilitation*, 9, 1-15.
- Mattos, P., Lino, V., Rizo, L., Alfano, A., Araujo, C., & Raggio, R. (2003). Memory complains and test performance in healthy elderly persons. *Arquivos de Neuro-Psiquiatria*, 61, 920-924.
- Messinis, L., Tsakona, I., Malefaki, S., & Papathanasopoulos, P. (2007). Normative data and discriminant validity of Rey's Verbal Learning Test for the Greek adult population. *Archives of Clinical Neuropsychology*, 22, 739-752.
- Messinis, L., Kyprianidou, A., Malefaki, S., & Papathanasopoulos, P. (2006). Neuropsychological deficits in long-term frequent cannabis users. *Neurology*, 66, 737-739.
- Moritz, S., Heeren, D., Andresen, B., & Krausz, M. (2001). An analysis of the specificity and the syndromal correlates of verbal memory impairments in Schizophrenia. *Psychiatry Research*, 101, 23-31.
- Powell, J. B., & Cripe, L. I. (1991). Assessment of brain impairment with the Ray Auditory Verbal Learning Test: A Comparison with other neuropsychological measures. *Archives of Clinical Neuropsychology*, 6, 241-249.
- Schmidt, M. (1996). *Rey Auditory-verbal Learning Test: A handbook*. Los Angeles, CA: Western Psychological Services.
- Schoenberg, M. R., Dawson, K. A., Duff, K., Patton, D., Scott, J. G., & Adams R. L. (2006). Test performance and classification statistics for the Rey Auditory-verbal Learning Test in selected clinical samples. *Archives of Clinical Neuropsychology*, 21, 693-703.
- Sinnet, E. R. Z., & Holen, M. C. (1999). Assessment of memory functioning among an aging sample. *Psychological Report*, 84, 339-350.
- Van Der Elst, W., Van Boxtel, M. P. J., & Van Breukelen, G. J. P. (2005). Rey's Verbal Learning Test: Normative data for 1855 healthy participants aged 24-81 years and the influence of age, sex, education, and mode of presentation. *Journal of International Neuropsychology Society*, 11, 290-302.
- Wedding, D., Horton, A. M., & Webster, J. S. (1986). *The Neuropsychology Handbook*. New York: Springer.